



THE UNIVERSITY  
OF ILLINOIS  
LIBRARY

595.79

Sch 4o

pt. 19-24

BIOLOGY


BOOK

DAY 1 1968









# Opuscula Ichneumonologica.

Herausgegeben

mit Beihilfe des Königl. Preuss. Ministeriums  
für Landwirtschaft und Forsten

von

**Professor Dr. Otto Schmiedeknecht.**




Fasc. XIX.



Blankenburg i. Thür.

1908.



7. **O. longigena** Thoms. 1888 *Ophion longigena* Thomson, Opusc. Entom. XII p. 1191 | 1889 O. l. Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII p. 90.

Dem *O. luteus* sehr ähnlich, aber Kopf hinter den Augen erweitert, Sporen der Mittelschienen fast gleich, Augen von den Nebenaugen weit abstehend, Wangen lang und aufgetrieben, Mandibeln stärker, das Tier etwas grösser und von hellerer Färbung als *O. luteus*. — Diese von Thomson gegebenen Merkmale treten bei einzelnen Exemplaren ganz gut hervor; es giebt aber auch Tiere, bei denen man zweifelhaft sein kann, ob sie zu *longigena* oder *luteus* zu stellen sind, die man also wohl als verbindende Zwischenformen ansehen könnte; hiernach erscheint mir die Berechtigung der Art noch fraglich. Thomson fand sie in Schweden (Schonen) und sie findet sich auch in Deutschland. Gezogen wurde sie noch nicht. (Brauns.)

8. **O. distans** Thoms. 1888 *Ophion distans* Thomson, Opusc. Entom. XII p. 1191 ♀♂ | 1889 O. d. Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII p. 91.

Gelb, Kopf hinter den Augen verengt, Nebenaugen von den Augen abstehend; Sporen der Mittelschienen sehr ungleich; Körper dichter, seidenartig behaart, namentlich der unten dunklere Hinterleib; sonst wie *O. luteus*, auch in der Grösse. — Auch bei dieser bei Stockholm und in Oeland gefundenen Art, die man bei sorgfältiger Untersuchung unter vielen Exemplaren des *luteus* herausfindet, glaube ich die bei der vorigen Art hervorgehobenen Bedenken über die Berechtigung ihrer Abtrennung aussprechen zu müssen. (Brauns.)

9. **O. luteus** L. 1758 *Ichneumon luteus* Linné, Syst. nat. Ed. 10. I p. 566 | 1798 O. l. Fabricius, Suppl. entom. system. p. 235 | 1829 O. l. Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 692 ♀♂ | 1889 O. l. Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII p. 90.

*Ophion luteus* gehört zu den häufigsten Schlupfwespen. Die Unterschiede von den verwandten Arten ergeben sich aus der Tabelle, doch ist bei den vorhergehenden Arten bereits betont worden, dass es unmöglich ist, constante Artunterschiede festzustellen. Nicht bloss die Färbung, namentlich das Auftreten gelber Zeichnungen, ist wandelbar, sondern auch die plastischen Unterschiede, wie z. B. die Leisten des Metathorax, die Seitenränder des Schildchens, die Länge des Ramellus u. s. w.

Brauns gibt die folgende Diagnose: Gelbbrot, glänzend, Augenränder gelblich, Nebenaugen fast an die Augen stossend, Wangen kurz, Hinterkopf etwas verengt; vordere Querleiste des Metathorax deutlich, hintere in der Mitte

unterbrochen; durch die Lücke hindurch ziehen sich 2 Längsleisten, die die vordere Querleiste nicht erreichen, neben ihnen im hinteren Felde zuweilen noch ein paar Längsleisten. Nervenast in den Vorderflügeln deutlich, Nervulus vor der Gabel, Nervellus in der Mitte gebrochen, Schiensporen ungleich. Hinterleib zuweilen gegen das Ende dunkler.

L. 15—20 mm.

Weit verbreitet und sehr häufig.

Die Art schmarotzt bei folgenden Schmetterlingsarten: *Sesia formicaeformis* (Brischke), *Chelonia villica* (Degeer), *Bombyx pini* (Ratzeburg), *B. quercus* (Marshall), *Demas coryli*, *Dicranura bifida* (Brischke), *D. vinula* (Degeer, Gravenhorst), *Cymatophora flavicornis*, *Acronycta aceris* (Brischke), *A. leporina* (Bignell), *Leucania lithargyria* (Butler), *Dipterygia pinastris* (Drewsen u. Boie), *Agrotis praecox* (Bignell), *Panolis piniperda* (Ratzeburg), *Taeniocampa populeti* (Bignell), *T. munda* (Giraud), *Dianthoecia capsincola* (Marshall), *D. cucubali* (Drewsen, Marshall), *Miselia oxyacanthae* (Bignell), *Hadena pisi* (Marshall), *Cucullia verbasci* (Giraud), *C. scrophulariae* (Brischke), *C. absynthii* (Müller, Brischke), *C. chamomillae*, *C. artemisiae* (Giraud, Brischke), *C. argentea*, *C. thapsiphaga*, *C. mixta*, *C. abrotani* (Brischke), *C. argentina* (Mocsary).

10. **O. parvulus** Kriechb. 1879 *Ophion parvulus* Kriechbaumer, Entom. Nachr. V p. 104 ♀♂ | 1879 O. p. Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. p. 61.

Diese Art zeichnet sich wie *O. minutus* schon durch weit geringere Grösse vor den übrigen Arten aus. Die Farbe ist das bei der Gattung *Ophion* gewöhnliche Rötlichgelb oder Braungelb, das stellenweise heller oder dunkler auftritt; die Augenränder sind nicht so scharf abgegrenzt blassgelb, die Augen und Nebenaugen schwarz. Der Metathorax lässt mit Mühe ein schmales, hinteres Mittelfeld und jederseits 2 Seitenfelder unterscheiden. Die Flügel sind fast hyalin, irisierend, das Stigma verhältnismässig ziemlich gross, blassgelb. Discocubitalnerv beim ♀ mit langem Ramellus, beim ♂ ist derselbe kaum angedeutet; Nervulus antefurcal, Nervellus unter der Mitte gebrochen. Beim ♂ sind Mesonotum und Metathorax etwas gebräunt.

L. 12 mm.

Bayern. — Kriechbaumer erhielt ein ♀ und ein ♂ aus den Puppen von *Plastenis retusa*.

11. **O. obscurus** F. 1804 *Ophion obscurus* Fabricius, Syst. Piez. p. 132 | 1829 O. o. Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 689 ♀♂ | 1889 O. o. Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII p. 91 | 1781 *Ichneumon luteus* Schrank, Enum. Insect. Austr. p. 371 ♀♂ (non Linné).

Kopf, Thorax und Schildchen gelb gezeichnet. Die Felderung des Metathorax ist sehr veränderlich; oft zeigt sich nur die vordere Querleiste, zuweilen ist die hintere in der Mitte da durchbrochen, wo von der vorderen her 2 Längsleisten kommen, so dass sich hinten ein offenes Mittelfeld bildet; mehrfach ist die Felderung ganz wie bei *O. luteus*. Da die Fleckenzeichnung nicht selten nur schwach hervortritt, so ist Vollenhoven sogar geneigt, die Art ebenfalls zu *luteus* zu ziehen. (Brauns.)

L. 15—20 mm.

Verbreitet, aber seltener als *O. luteus*.

Als Wirte werden angegeben: *Melanargia Galathea*, *Sesia formicaeformis* (Brischke), *Bombyx pini* (Ratzeburg), *Dicranura vinula*, *Pseudopterna cytisaria* (Brischke), *Episema scoriacea*, *Polysphaenis sericata* (Mocsary), *Hibernia aurantiaria*, *Lasiocampa pini*, *Acroncyta leporina* (Ratzeburg), *Agrotis porphyrea* (Brischke), *Hadena protea*, *Epunda lichenea*, *Miselia oxyacanthae*, *Agrotis praecox*, *Acroncyta leporina*, *Poecilocampa populi*, *Demas coryli* (Bignell).

12. **O. minutus** Kriechb. 1879 *Ophion minutus* Kriechbaumer, Entom. Nachr. V. p. 105 ♀♂ | 1889 O. m. Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII p. 91.

Diese Art ist noch kleiner als *O. parvulus*, die gelbe Färbung an Kopf und Thorax noch reicher. Es ist nämlich der Kopf mit Ausnahme der schwarzen Augen und Nebenaugen und der gelbbraunen Mitte des Gesichts und Hinterkopfes fast ganz gelb; Mesonotum und Schildchen sind gelb, das erstere mit 3 rotbraunen Längsstreifen, das letztere mit einem solchen Mittelfleck an der Basis. Der Metathorax zeigt nur eine äusserst schwache Spur von Leisten, die ein kaum zu unterscheidendes hinteres Feld abgrenzen. Das Stigma im Vorderflügel ist ziemlich kurz, schmutzig braungelb; der Discocubitalnerv ist fast in der Mitte in einem nahezu rechten Winkel gebrochen und hier mit kurzem Ramellus versehen; Nervellus in der Mitte in einem sehr stumpfen Winkel gebrochen.

L. 9—10 mm.

Verbreitet über den grössten Teil von Europa, aber meist selten. Nach Vollenhoven lebt die Art bei *Taeniocampa cruda* und *Pionea forficalis*.

13. **O. scutellaris** Thoms. 1888 *Ophion scutellaris* Thomson. Opusc. Entom. XII p. 1192 | 1889 O. s. Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII p. 92.

Dem *O. luteus* an Grösse und Färbung gleich, aber Hinterkopf stärker verengt, Sporen der Mittelschienen fast gleich, Schildchen an den Seiten fast bis zur Spitze scharf gerandet. Metathorax wie bei *O. luteus* gebildet, Nervulus interstitial, Nervellus über der Mitte gebrochen.

Schweden, Kurland.

14. **O. dispar** Brauns. 1895 *Ophion dispar* Brauns, Termés. Füzet. XVII p. 42 ♂.

Dem *O. luteus* in der Färbung sehr ähnlich aber nur halb so gross, Nervulus antefurcal, Nervellus über der Mitte gebrochen und Metathorax mit anderer Skulptur. Die vordere Querleiste fehlt fast vollständig, nur in der Mitte ist durch einen halbkreisförmigen Bogen eine nach hinten offene area superomedia angedeutet; die hintere Querleiste ist deutlich; der Raum zwischen den Querleisten ist runzlig-punktiert, die area posteromedia in der Mitte mit Längsrunzeln.

L. 10—11 mm. ♀ unbekannt.

Nördliches Ungarn und Schweiz (Wallis).

15. **O. longicornis** Brauns. 1889 *Ophion longicornis* Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII p. 92.

Durch die den Körper bedeutend an Länge übertreffenden Fühler und die in der Tabelle angegebene Bildung des Nervulus und Nervellus auffallend, sonst dem *O. luteus* an Grösse und Skulptur des Metathorax nahestehend. Kopf hinter den Augen verengt, Augen von den Nebenaugen absteehend, Wangen deutlich. Thorax sehr glänzend, mit 3 etwas undeutlichen dunkleren Längsstreifen. Stigma gelbrot, Ramellus deutlich. Beine viel schlanker und länger als bei den verwandten Arten, Tarsen sehr lang.

Mecklenburg. Auch in Thüringen habe ich zahlreiche Stücke gefangen, die ich auf diese Art beziehe.

16. **O. pteridis** Kriechb. 1879 *Ophion pteridis* Kriechbaumer, Entom. Nachr. V p. 89 ♀♂ | 1889 O. p. Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII p. 89.

Diese Art ist an der dunklen Thoraxunterseite leicht zu erkennen. — Augen und Nebenaugen gross, an einander stossend; Hinterkopf kurz, in flachem Bogen nach hinten stark verengt. An dem mässig gewölbten und ziemlich glatten Metathorax ist nur die in der Mitte bogenförmig



vortretende oder etwas unterbrochene vordere Querleiste, die am Seitenrande plötzlich aufhört, sichtbar; hinter derselben zwei nach vorne divergierende, die Querleiste nicht erreichende Längsleisten, am Seitenrande eine ziemlich scharfe, etwas gebogene Längsleiste als Rudiment der zweiten Querleiste. — Färbung rötlichbraun, Mittel- und Hinterbrust, Metathorax und Pleuren, zuweilen auch das Mesonotum dunkler braun. Stigma rötlichgelb, Nerven bräunlich, Ramellus klein. Nervulus interstitial, Nervellus wenig unter der Mitte gebrochen, postfurcal.

L. 17—18 mm.

Bayern, Böhmen, Thüringen. Ich habe die Art in verschiedenen Exemplaren hier gefangen.

Von Kriechbaumer aus *Eriopus pteridis* gezogen.

17. **O. sibiricus** Szepl. 1905 *Ophion sibiricus* Szepligeti, Ann. Mus. Nat. Hung. III p. 520 ♀.

Kopf hinter den Augen ziemlich schmal und gerundet; Clypeus deutlich vom Gesicht getrennt, vorn gerundet; Gesicht längs der Mitte vorstehend, sehr fein punktiert; Ocellen gross, an die Augen stossend. Fühler so lang wie der Körper. Mesonotum fast glatt, Parapsiden vorn deutlich; Schildchen fein punktiert, nicht gerandet; Meso- und Metapleuren fein punktiert; Metanotum an der Seite punktiert, oben glatt, am Ende gerunzelt. Ramellus lang, Nervulus etwas antefurcal, Nervellus kurz unter der Mitte gebrochen. Klauen dicht und lang gekämmt. — Gelbrot, Thorax schwarz, die Nähte mehr oder weniger gelbrot, Hinterkopf, Postpetiolus, 2. Segment oben und ein Fleck auf dem 3. schwarz. Umgebung der Augen und Petiolus weiss. Flügel gelblichgrau, Nerven schwarz, Stigma und Tegulä gelbrot.

L. 22 mm.

Ost-Sibirien.

18. **O. turcomanicus** Szepl. 1905 *Ophion turcomanicus* Szepligeti, Ann. Mus. Nat. Hung. III p. 521 ♀.

Glatt. Die hintere Querleiste des Metathorax fehlt. Kopf hinter den Augen gerundet. Nervulus interstitial oder schwach antefurcal. — Gelbrot; Kopf und Thorax gelblichbraun; Hinterleib oben und meist auch unten schwarz oder braun, Petiolus weiss. Flügel hyalin, Stigma gelb. Im Uebrigen mit *O. luteus* übereinstimmend.

Var. ♀. Metathorax ganz ohne Leisten. Hinterleib nicht schwarz.

L. 16—18 mm.

Turkestan. Die Varietät von Transkaspien.

19. **O. albistylus** Szepl. 1905 *Ophion albistylus* Szepligeti, Ann. Mus. Nat. Hung. III p. 521 ♀.

Kopf hinter den Augen verschmälert; Gesicht breit, nach unten zu verengt; Clypeus gerundet. Fühler so lang wie der Körper. Mesonotum fast glatt, Parapsiden bis zur Mitte deutlich; Schildchen fast bis zur Mitte gerandet; Mesopleuren und Metanotum runzlig, letzterer mit Querleisten, die hintere in der Mitte unterbrochen, area postica mit 2 Längsleisten. Ramellus ziemlich lang, Nervulus interstitial, Nervellus etwas unter der Mitte gebrochen. Klauen gekämmt. — Gelbrot, Mesopleuren und Metanotum schwarz, Petiolus weiss. Flügel hyalin, Stigma gelbrot, Nerven schwarz.

Var. ♂. Metanotum und Mesopleuren etwas gebräunt. L. 22 mm.

Ost-Sibirien.

\* \* \*

Anhangsweise führe ich die folgenden Arten an, die sich nicht gut in die Bestimmungstabelle einreihen lassen.

- O. pictus** Kok. 1906 *Ophion pictus* Kokujev, Revue Russe d'Entomologie, p. 159 ♀.

Kopf glänzend, nach hinten nicht verschmälert; Ocellen wie bei *O. luteus*, aber von den Augen weiter entfernt; Fühler etwas länger als der Körper. Mesonotum glatt und glänzend; Schildchen an der Basis gerandet, Mesopleuren fein punktiert; Metathorax mit 2 Querkielen, der hintere in der Mitte unterbrochen; area superomedia kaum angedeutet, area petiolaris mit 2 Längskielen. Discocubitalnerv mit deutlichem Ramellus, Nervulus antefurcal, Nervellus in der Mitte gebrochen. — Rötlichgelb, Kopf unten und Flecken des Thorax blassgelb, Ocellenfleck weisslich. Hinterleibsstiel zum grössten Teil blassgelb. Flügel hyalin, Stigma gelb.

L. 15 mm. ♂ unbekannt.

Krim (Simferopol).

- O. pravinervis** Kok. 1906 *O. pravinervis* Kokujev, Revue Russe d'Entomologie, p. 166 ♀.

Kopf glänzend, hinter den Augen rundlich verschmälert; Ocellen von den Augen entfernt, Gesicht dicht punktiert. Mesonotum ziemlich glatt und glänzend, Parapsidenfurchen sehr kurz aber tief, Schildchen poliert, nur an der Basis gerandet; Brustseiten fein punktiert, glänzend; Metathorax runzlig, matt, ohne Querkielen. Radius an der Basis gekrümmt, Nervulus interstitial. Tarsen nicht gedörnelt, Klauen lang gekämmt. — Rötlichgelb, Augenränder, die beiden Schildchen, Tegulä und kleine Flecken der Brust-

seiten hellgelb; Metathorax verdunkelt. Flügelnervatur und Klauenglied der Beine schwärzlich. Endränder der Bauchsegmente braun.

L. 12 mm. ♂ unbekannt.

Transkaukasien.

**O. asiaticus** Kok. 1906 O. asiaticus Kokujev, Revue Russe d'Entomologie, p. 167 ♀.

Kopf glänzend, hinter den Augen erweitert, Ocellen von den Augen entfernt, Fühler kürzer als der Körper. Mesonotum glatt und glänzend, Parapsidenfurchen kurz und tief; Schildchen nur an der Basis gerandet, sehr glatt und glänzend; Brustseiten glänzend, fein punktiert; Metathorax mit den beiden Querkiehlen, der hintere oft sehr schwach; von dem vorderen gehen 2 Längskiele bis zum Ende des Metathorax. Tarsen fein gedörnt, Klauen lang gekämmt. — Schwefelgelb, Flecken des Thorax, namentlich 3 Längsstreifen des Mesonotums rötlichgelb. Hinterleib blassgelb, Segment 2–6 mit dunklem Rückenstreif. Stigma rötlich.

L. 15–18 mm.

Transkaukasien, Transkaspien und Persien.

Die Art ist eng verwandt mit *O. obscurus* F., aber die Fühler sind kürzer und dicker, der Thorax glänzender, die Körperzeichnung verschieden. Durch den hellen Hinterleibsstiel nähert sie sich *O. turcomanicus* Szepl., weicht aber durch die Thoraxfärbung ab.

**O. eremita** Kok. 1906 Ophion eremita Kokujev, Revue Russe d'Entomologie, p. 168 ♀.

Stimmt in der Skulptur fast ganz mit *O. asiaticus* überein. — Rötlichgelb, Thorax zum Teil blassgelb gezeichnet, 3 Längsstreifen des Mesonotums und Makeln des Schildchens braun. Stigma im Vorderflügel rötlich, zum Teil blassgelb gerandet; Nerven schwärzlich. Hinterleib rötlichgelb, Petiolus hellgelb, unten braun; Hinterleibsmittle oben gebräunt, Segment 2 und 3 mit dunkler Linie, das 6. Segment fast ganz braun.

L. 16 mm. ♂ unbekannt.

Transkaspien.

**O. internigrans** Kok. 1906 Ophion internigrans Kokujev, Revue Russe d'Entomologie, p. 168 ♀.

Kopf hinter den Augen schwach erweitert; Ocellen mit den Augen zusammenstossend. Thorax ziemlich glänzend; Brustseiten mit gestreuten grossen aber flachen Punkten; Schildchen nur an der Basis gerandet; Metathorax mit 2 starken Querkiehlen und 2 Längskiehlen, Basis des Radius

fast gerade; Nervulus antefurcal; Nervellus über der Mitte gebrochen. — Gelbrot. Fühler, Beine mit Ausnahme der Hüften und Trochantern, Hinterleib und Flügelnervatur mit Einschluss des Stigmas braun; das 1. Segment und die Basis des 2. rötlich. Flügel ziemlich dunkel.

L. 15 mm. ♂ unbekannt.

Transkaukasien.

Unklar ist die folgende Art; es ist fraglich, ob sie zur Gattung *Ophion* gehört.

**O. amoenus** Tosquinet, Ann. Soc. Ent. Belgique XLIV (1900) p. 167 ♂.

Körper glatt und stark glänzend; Kopf dick und aufgetrieben, hinter den Augen stark erweitert; Clypeus convex, punktiert; Fühler etwas länger als der Körper. Mesonotum ohne Parapsidenfurchen; Schildchen bis zur Mitte seitlich gerandet; Metathorax fein punktiert, ohne Leisten. Flügel kurz, Nervulus interstitial, Nervellus schräg, etwa in der Mitte ganz schwach gebrochen. Beine kurz und ziemlich dick. Hinterleib glatt und glänzend. — Rotgelb; Fühler oben braun; Mesonotum mit 3 dunklen Längsstreifen. Flügel hyalin, Stigma braun mit heller Basis, Nerven braun. Tarsen bräunlich. Segment 1 und 2 schwarz, die übrigen je mit 3 dreieckigen braunen Flecken, wodurch 3 Fleckenreihen gebildet werden.

L. 13 mm. ♀ unbekannt.

Das Exemplar stammt von Sarepta in Südrussland.

## 6. Genus **Stauropogon** Brauns.

1889 *Stauropogon* Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII p. 93.

1905. *Eremotylus* (partim) Szepligeti, Gen. Ins. XXXIV p. 35.

Wangen ziemlich deutlich, Mandibeln nicht besonders kräftig, mit gleichen Endzähnen, Clypeus nicht vom Gesicht getrennt, am Ende abgerundet, Gesicht convex. Augen sehr gross, an die stark erhabenen Ocellen stossend. Scheitel sehr kurz, abschüssig, durch keine Leiste vom Hinterhaupt getrennt. Mesonotum mit undeutlichen Parapsidenfurchen; Schildchen convex, an der Basis gerandet. Metathorax nur vorn mit einer starken Querleiste, am Ende zwischen den Hinterhüften verlängert. Flügel mit schmalem Stigma, Basis des Radius verdickt und gekrümmt; Discocubitalnerv mit dem Basalnerv nach oben leicht convergierend, gekrümmt und ohne Ramellus; Nervulus etwas vor der Gabel oder interstitial, Nervellus postfurcal, über der Mitte gebrochen. Das 1. Segment lang und dünn, die Luftlöcher weit hinter der Mitte.

**S. bombycivorus** Grav. 1829 *Ophion bombycivorus* Gravenhorst, *Ichneum.* Eur. III p. 705 ♀ | 1889 S. b. Brauns. l. c. p. 94.

Scherbengelb mit reichlicher schwarzer Zeichnung. Am Kopfe ist meist nur der Hinterkopf und ein Ocellenfleck, am Thorax drei, zuweilen zusammenfliessende Längsstreifen des Mesonotums, ein Fleck des Metathorax und veränderliche Flecken der Unterseite und der Seiten schwarz. Beine scherbengelb, gewöhnlich die Hinterschenkel und Flecken der Hinterhüften schwarz. Das erste Drittel der sehr langen Fühler schwarz. Die ersten Hinterleibssegmente an der Basis etwas eingeschnürt. Das hintere, grosse, abschüssige Feld des Metathorax ist an den Seiten gerandet und sehr grob runzlig.

L. 20—22 mm.

Verbreitet im mittleren Europa, aber selten und nicht überall. Es ist mir noch nicht geglückt, die Art in Thüringen aufzufinden. Schmarotzer von *Stauropus fagi*; Cocon elliptisch, bronzefarbig, runzlig, mit flockiger Hülle. (Brauns.)

## 7. Gen. **Cymatoneura** Kriechb.

1901 *Cymatoneura* Kriechbaumer, *Zeitsch. Hym. Dipt.* I p. 22.

1888 *Allocamptus* Thomson. *Opusc. Ent.* XII p. 1189 (non Förster).

Anmerk. Da der Name *Allocamptus* schon früher von Förster gegeben worden ist, kann er nicht von Neuem verwendet werden.

Eng verwandt mit *Eremotylus* und *Enicospilus*, aber Flügel ohne Hornflecke und der Radius an der Basis verdickt und wellenförmig gekrümmt oder geschlängelt. Metathorax nur mit einer vorderen zarten Querleiste, hinten breit ausgehöhlt und mit Querstreifen.

**C. undulata** Grav. 1829 *Ophion undulatus* Gravenhorst, *Ichneum.* Eur. III p. 697 ♀♂ | 1888 *Enicospilus* (*Allocamptus*) *undulatus* Thomson, *Opusc. Ent.* XII p. 1189 | 1889 *Allocamptus undulatus* Brauns, *Arch. Naturg. Mecklenb.* XLIII p. 97 | 1901 *Cymatoneura undulata* Kriechbaumer, *Zeitschr. Hym. Dipt.* I p. 22.

Rostrot, Hinterleibsspitze zuweilen schwärzlich. Flügel etwas angeräuchert.

Diese an der eigentümlichen Bildung der Radiusbasis leicht kenntliche Art ist die grösste der einheimischen Ophioniden, denn sie erreicht eine Länge bis 30 mm. — Bei dieser Gelegenheit möchte ich eine Bemerkung nicht unterdrücken. Hat man viel Material, namentlich auch exotisches, so sieht man, dass die Biegung oder Schlän-

gelung der Radiusbasis eine sehr häufige und auch sehr variierende Bildung ist, sodass es schwer hält zu sagen, zu welcher Untergattung die einzelne Art gehört. Wollte man dieser Schwierigkeit aus dem Wege gehen, so könnte man *Cymatoneura* und *Stauropoctonus* mit zu *Eremotylus* rechnen.

*C. undulata* ist weitverbreitet, aber im Allgemeinen selten. In Jerusalem bekam ich eine grosse Anzahl frischer Stücke, die von dem deutschen Consul Paulus aus Spinnern gezogen waren.

Als Wirte sind zu erwähnen: *Lasiocampa tremulifolia*, *Bombyx quercus*, *spartii*, *trifolii*, *rubi*, *catax* und *Samia cecropia*.

### 8. Gen. **Eremotylus** Först.

1868 *Eremotylus* Förster, Verh. Naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 150.

1901 *Camptoneura* Kriechbaumer, Zeitschr. Hym. Dipt. I p. 23 u. 24.

1901 *Leptophion* Cameron, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 227.

Kopf hinter den Augen gerundet, nicht verschmälert sondern eher etwas verbreitet; Scheitel durch deutliche Leiste vom Hinterhaupt getrennt; Mandibeln sehr kräftig, mit gleichen Endzähnen; Clypeus undeutlich vom Gesicht getrennt, am Ende abgerundet; Augen und Nebenaugen gross, etwas von einander entfernt. Mesonotum ohne deutliche Parapsidenfurchen; Schildchen meist gerandet; Metathorax unregelmässig höckerig, ohne abgegrenztes hinteres Mittelfeld; die vordere Querleiste in der Mitte scharf kielartig erhaben. Radius an der Basis verdickt und einfach gebogen; Discocubitalnerv nicht gebrochen, ohne Ramellus, mit dem Basalnerv parallel; Nervulus interstitial oder antefurcal, Nervellus in oder unter der Mitte gebrochen. Klauen gekämmt.

#### Uebersicht der paläarktischen Arten.

1. Schildchen nicht gerandet. Metathorax mit Mittelfeld und jederseits noch mit 3 hintereinander liegenden Feldern. Färbung gelbrot.

##### 2. **curvinervis** Kriechb.

Schildchen gerandet. Metathorax mit anderer Felderung. 2.

2. Färbung gelbrot ohne dunkle Zeichnung. Fühler länger als der Körper. Mesopleuren dicht punktiert. Flügel gelblich.

##### 3. **hungaricus** Szepi.

Färbung gelbrot mit schwarzer Zeichnung. 3.

3. Braunrot, die Gegend um das Schildchen und die Nähte schwarz; auch der Hinterleib ausgedehnt schwärzlich. Flügel stark gelblich getrübt.

1. **marginatus** Jur.

Gelbrot; Kopf hinten, Stirn, Scheitel, Mesonotum und Metanotum, Brustseiten, Basis der Hüften und Hinterleibsende schwarz. Flügel fast hyalin.

4. **sibiricus** Szepl.

1. **E. marginatus** Jur. 1807 *Anomalon marginatum* Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. p. 116 ♀ | 1829 *Ophion marginatus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 704 ♀ ♂ | 1889 *Eremotylus m.* Brauns. Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII p. 98.

Bräunlichrot; Kopf und Thorax dicht punktiert mit veränderlicher schwarzer Zeichnung, namentlich um das Schildchen herum und in der Gegend der Nähte. Hinterleib ausgedehnt schwärzlich gefärbt, häufig nur an der Basis oben rot, der Stiel gewöhnlich schwarz. Hinterhüften schwarz gefleckt. Flügel gelblich getrübt.

L. 18—20 mm.

Verbreitet über einen grossen Teil von Europa, aber überall selten. Ich habe hier in Thüringen bis jetzt nur ein einziges Exemplar gefangen.

2. **E. curvinervis** Kriechb. 1878 *Camptoneura curvinervis* Kriechbaumer, Entom. Nachr. Fasc. IV. p. 249 ♀.

Gleicht im Aussehen am meisten dem *Ophion ventricosus* und der *Cymatoneura undulata*, unterscheidet sich aber in folgenden Punkten: Am Thorax und an den Beinen ist keine Spur von Schwarz, am Hinterleib ist nur oben eine leichte Bräunung vom 3. Segment an und eine etwas deutlichere unten am Ende. Metathorax schwach gefeldert und zwar sind ziemlich deutlich eine fast birnförmige, vorn dreieckig begrenzte *area superomedia* und jederseits 3 hinter einander liegende Seitenfelder, von denen das hinterste das grösste ist und oben seitlich in ein kleines scharfes Zähnchen ausläuft. Die Flügel haben kaum eine Spur gelblicher Trübung; der Radius ist an der Basis stark verdickt und deutlich nach hinten und innen gekrümmt, aber nicht wellenförmig. Discocubitalnerv kaum winklig gebrochen und ohne Ramellus. Nervellus etwas unter der Mitte gebrochen.

L. 15—20 mm.

Bisher nur aus Bayern bekannt.

3. **E. hungaricus** SzepI. 1905 E. h. Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hungar. p. 522 ♂.

Kopf hinter den Augen leicht geschwollen, gerundet; Gesicht kurz und breit, fein punktiert; Clypeus gerade abgeschnitten; Augen und Nebenaugen gross. Fühler länger als der Körper. Mesonotum fein punktiert, Parapsiden nur vorn wahrnehmbar. Schildchen gerandet, Propleuren fein punktiert, Meso- und Metapleuren dicht punktiert; Metanotum in der Mitte mehr oder weniger vertieft und hier runzlig; die vordere Querleiste kräftig, an den Seiten nicht ausgebildet, die hintere Querleiste in der Mitte unterbrochen. Discocubitalzelle nach vorne zu verschmälert, Nervulus interstitial, Nervellus fast in der Mitte gebrochen. Klauen gekämmt. Das 2. Segment etwas kürzer als das erste. — Gelbrot; Flügel gelblich, Nerven braun, Stigma gelb.

L. 20—22 mm.

Ungarn.

4. **E. sibiricus** SzepI. 1905 E. s. Szepligeti, Ann. Mus. Nat. Hungar. p. 522 ♀.

Kopf hinter den Augen gerundet, nicht verschmälert; Gesicht und Clypeus dicht punktiert; Wangen unter den Augen kurz, der Abstand zwischen den Nebenaugen und Netzaugen fast so gross wie der Durchmesser eines Nebenauges. Fühler kürzer als der Körper. Mesonotum sehr fein lederartig, glänzend; Schildchen punktiert, gerandet; Mesopleuren oben punktiert, unten lederartig; Metanotum an der Seite etwas zahnartig vorspringend, hinten in der Mitte mit breiten, unregelmässigen Längsrundeln, area superomedia hinten nicht vollständig geschlossen. Nervulus antefurcal, Nervellus etwas unter der Mitte gebrochen. — Gelbrot; Kopf hinten, Stirn, Scheitel, Mesonotum, Pleuren, Metanotum oben, ein Fleck am Schildchen, Basis der Hüften und Segmente vom 5. an schwarz. Flügel fast hyalin, Nerven schwarz, Stigma gelb.

L. 20 mm.

Ost-Sibirien.



### 3. Tribus **Nototrachini.**

- 1868 Trachynotidae, Familie 2, Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV pp. 140 und 147.  
 1887 Trachynotina, Tribus, Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1048.  
 1894 Trachynotini, Tribe II, Ashmead, Proc. Ent. Soc. Washington III p. 277.  
 1897 Trachydermatini Davis, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIV p. 195.  
 1900 Nototrachini, Tribe III, Ashmead, Smith's Insects of New Jersey p. 580.

Mittelschienen mit nur einem Sporn; der zweite Sporn zuweilen angedeutet. Flügel ohne Areola; der 2. rücklaufende Nerv vor oder hinter dem Cubitalquernerv mündend.

Von dieser Tribus kommt in Europa nur eine Art vor, der leicht kenntliche *Nototrachys foliator* F.

#### Uebersicht der Gattungen.

1. Die beiden rücklaufenden Nerven münden wie bei *Ophion* in die Discocubitalzelle, also vor dem Cubitalquernerv. Metathorax nicht gefeldert. Fühler fadenförmig.

##### 1. **Nototrachys** Marsh.

Der 2. rücklaufende Nerv mündet hinter dem Cubitalquernerv. 2.

2. Kopf kurz, Metathorax ganz oder wenigstens vorn gefeldert. 3.

Kopf nach unten stark verlängert. Metathorax nicht gefeldert. Schildchenseiten gekielt. Körper nicht gelb gefleckt. 4.

3. Seiten des Schildchens gekielt. Kopf aufgetrieben, breiter als der Thorax. Clypeus vorn nicht dreieckig ausgeschnitten. Körper rötlichgelb gezeichnet. Kleinasien.

##### 2. **Eugnomus** Först.

Seiten des Schildchens nicht gekielt. Kopf nicht aufgetrieben. Clypeus in der Mitte des Endrandes dreieckig ausgeschnitten. Körper reich gelb gezeichnet. 3 Arten aus Südafrika bekannt: *O. flavomaculata* Cam. Kopf und Thorax rot, gelb gefleckt. Beine mit den Hüften rot. *O. rufidens* Cam. Kopf und Thorax schwarz mit gelber Zeichnung. Hinterleib und Beine rot, das erste Segment und die Hüften schwarz. Gesicht und Thoraxseiten nicht gelb gefleckt. *O. bidentata* Cam. wie die vorige Art, aber Gesicht und Makeln der Brustseiten gelb.

##### **Ophioneura** Cam.

4. Schienen, zumal die 4 Vorderschienen aufgetrieben, an der Basis eingeschnürt. Körper rot; Bohrer von halber Körperlänge. Die einzige Art, *E. ferrugineus* Cam. ist 13–15 mm. lang und kommt im Kapland vor.

**Erythrophion** Cam.

Schienen schlank, an der Basis nicht eingeschnürt. Die einzige Art, *S. rufipes* Cam., ist schwarz; Beine mit Ausnahme der Hüften rot; Segment 2 und 3 braunrot. Länge 14–16 mm. Die Art, von der nur das ♂ bekannt ist, kommt ebenfalls im Kapland vor.

**Stictophion** Cam.

1. Gen. **Nototrachys** Marsh.

1872 *Nototrachys* Marshall, Catal. Brit. Hymen. III p. 50 und Trans. Entom. Soc. London p. 260.

1829 *Trachynotus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 713 [non Latreille 1829].

Kopf nach hinten etwas aufgetrieben; Clypeus mehr oder weniger vom Gesicht getrennt; Mandibeln mit 2 ungleichen Endzähnen; Fühler schlank, bei der einen Art kaum so lang wie der halbe Körper; Augen oval, innen schwach ausgerandet. Thorax bei der bekannten Art runzlig-rau, bei der zweiten Art zum grössten Teil glatt; Schildchen rings gerandet. Metathorax fast durchweg mit grober netzförmiger Runzelung. Flügel kurz, Nervatur wie bei *Ophion*, indem die Areola fehlt und der 2. rücklaufende Nerv vor dem Cubitalquernerv mündet; Discocubitalnerv gleichmässig gekrümmt. Schienen kräftig, die 4 vorderen nur mit 1 Endsporn; Klauen nur an der Basis mit einigen Kammzähnen. Hinterleib schlank, gestielt, zusammengedrückt; Luftlöcher des 1. Segments hinter der Mitte, das 1. und 2. Segment von gleicher Länge, das 3. kürzer als das zweite. Bohrer deutlich vorragend, etwas länger als das 1. Segment.

Flügel hyalin. Thorax mit Einschluss des Metathorax und der Brustseiten grob gerunzelt, fast matt.

1. **foliator** F.

Flügel bräunlich, auf dem rücklaufenden Nerven mit einem hyalinen Fleck. Thorax glänzend, Brustseiten poliert.

2. **fuscipennis** Tosquinet.

1. **N. foliator** F. 1798 *Ophion foliator* Fabricius, Suppl. entom. Syst. p. 239 | 1804 *Bassus foliator* Fabricius, Syst. Piez. p. 100 | 1829 *Trachynotus foliator* Gravenhorst, Ichneum. Eur. p. 715 ♀♂ | 1872 *Nototrachys foliator* Marshall, Catal. Brit. Hymen. p. 50.

Körper mit grober, zum Teil netzförmiger Runzelung, ziemlich matt, nur der Hinterkopf, der Raum vor der Schildchengrube und das Speculum der Mesopleuren glatt

und glänzend. Hinterleib fein lederartig, an Basis und Spitze mehr glatt und glänzend. — Braunschwarz, Kopf gewöhnlich ausgedehnt rot, auch der Thorax mit nicht scharf begrenzter roter Zeichnung, namentlich Prothorax, Seiten des Mesonotum und Schildchen verschwommen rot. Scheitelränder meist gelblich gefleckt. Beine rot, verschwommen schwärzlich, Vorderbeine mehr rötlichgelb, Basis der Hinterschienen gelblichweiss. Hinterleib namentlich an den Einschnitten und an der Basis des Stieles rötlich. Das ♂ ist in allen Teilen dunkler, der Körper ist nicht selten ganz schwarz.

L. 10—14 mm.

Nototrachys foliator hat eine grosse Verbreitung, er scheint im grössten Teile von Europa vorzukommen; ich habe ihn in Spanien, bei Elche und Algeciras gefunden, ferner auf Corfu, bei Athen und Olympia und vergangenes Jahr bei Syrakus auf Sizilien. Ebenso fand ich ihn nicht selten in Algerien und Tunesien. Hier in Thüringen habe ich beobachtet, dass er in manchen Jahren zahlreich, in anderen wieder höchst selten vorkommt. Er fliegt im Spätsommer, hier mit Vorliebe an Eichen.

2. **N. fuscipennis** Tosquinet. 1900 Trachynotus fuscipennis Tosquinet, Ann. Soc. Ent. Belgique XLIV p. 169 ♂.

Von der vorigen Art hauptsächlich durch den glatten Körper verschieden. Kopf und Thorax glänzend, ersterer verlängert und nach hinten etwas verbreitert; Fühler etwas kürzer als der Körper. Metathorax ganz vorn glatt und glänzend, der abschüssige Teil grob gerunzelt und hinten mit Querstreifung. Nervulus postfurcal, Nervellus schräg, unter der Mitte gebrochen. Hinterleib glatt und glänzend. — Kopf und Thorax schwarz, Fühler bräunlichrot. Flügel stark gebräunt, mit einem hyalinen Fleck auf dem 2. rücklaufenden Nerven. Beine rötlich, alle Hüften und die Basis der Trochantern schwärzlich. Hinterleib braunschwarz, das 2. und 3. Segment verschwommen rötlich.

L. 14 mm.

Diese neue im männlichen Geschlecht bekannte Art wurde in Spanien (Sampedor in Catalonien) gefunden.

## 2. Gen. **Eugnomus** Först.

1868 Eugnomus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV pp. 140 und 147.  
1871 Eugnomus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI p. 67.

Kopf aufgetrieben, breiter als der Thorax; Mandibeln mit ungleichen Endzähnen; Clypeus deutlich vom Gesicht getrennt, beiderseits mit Grube; Stirn eingedrückt; Augenränder der Stirne wulstig und über die Augen hervortretend, stark punk-

tiert; Augen oval, nicht ausgerandet; Fühler von halber Körperlänge, fadenförmig, mit etwas verdickter Geissel. Mesonotum ohne deutliche Parapsidenfurchen; Schildchen gross, an den Seiten gerandet, hinten abgerundet; Metathorax vollständig gefeldert, über die Basis der hintersten Hüften verlängert, mit ovalen Luftlöchern. Flügel ohne Areola, Discocubitalnerv über der Mitte gebrochen; der 2. rücklaufende Nerv hinter dem Cubitalquernerv mündend; Nervellus unter der Mitte gebrochen. Beine kurz und schlank, die mittelsten Schienen mit 1 Dorn; Klauen an der Basis mit entfernten Kammzähnen. Hinterleib lang gestielt, das 1. und 2. Segment verlängert, das 4. und die folgenden stark seitlich zusammengedrückt, auf dem Rücken gekielt. Bohrer vorstehend, gerade.

**E. Manni** Tschek. 1871 *Eugnomus Manni* Tschek, l. c. p. 67 ♀. Glänzend, punktiert. Kopf hinter den Augen nicht verschmälert; Gesicht mitten unten den Fühlern mit einer länglichen, am oberen Rande mit einem kleinen Zähnchen bewehrten Erhöhung, wie der Clypeus ziemlich stark und dicht punktiert. Stirne feiner punktiert, mitten mit einem Längskiel, der sich vor den Ocellen gabelig teilt. Mesonotum punktiert, wie der Kopf glänzend. Schildchen mit grosser Basalgrube, grob aber ziemlich sparsam punktiert. Metathorax dicht grob punktiert und vollständig gefeldert; area superomedia annähernd fünfseitig, länger als breit. Das 1. Hinterleibssegment beinahe um die Hälfte länger als die Hinterhüften mit den Trochantern; Postpetiolus etwas breiter als der Petiolus, um die Hälfte länger als breit; das 2. Segment sehr schmal, fast länger als das erste, gegen die Spitze allmählich und sehr wenig erweitert, der Länge nach gestreift. Bohrer etwa von halber Hinterleibslänge. — Schwarz, Augenränder der Stirne und der Schläfen, ferner auf dem Mesonotum vor den Flügeln jederseits ein dreieckiger Fleck rotgelb. Schildchen an der Spitze rötlich, an den Basalecken mehr gelblichrot. Flügel getrübt, Stigma schwarzbraun. Beine rotgelb, Hüften schwarz, die vorderen nur an der Basis; Schienen an Basis und Spitze und die Tarsen braun. Hinterleib hell braunrot, unten rötlichgelb; die beiden ersten Segmente schwarz, am hinteren Endrand rötlich gefleckt; die folgenden Segmente am Grunde mit einem schwarzen Fleck, der sich auf jedem folgenden Segment vergrössert; das 7. Segment fast ganz schwarz.

L. 12 mm.

Von diesem Tiere brachte Mann 2 ♀ von Amasia in Kleinasien mit. Sie befinden sich im Wiener Museum. Weitere Exemplare sind nicht bekannt.

4. Tribus **Anomalonini.**

1868 Anomaloidae, Familie 1, Förster, Verh. naturh. Ver. pr. Rheinl. XXV pp. 140 und 145.

1887 Anomalina, Tribus, Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1048.

1894 Anomalonini, Tribe I, Ashmead, Proc. Ent. Soc. Wash. III p. 277.

1900 Anomalonini, Tribe IV, Ashmead, Smith's Insects of New Jersey, p. 580.

Was die Anomalinen in erster Linie auszeichnet, ist der gestreckte Körper, namentlich der lang gestielte, stark compri-mierte Hinterleib. Die von Förster betonte Verdickung der Hinterferse trifft nicht in allen Fällen zu. Von den Tribus der Hellwigiinen, Ophioninen und Nototrachinen unterscheidet die Anomalinen schon die Einmündung des zweiten rücklaufenden Nerven; derselbe mündet meist hinter dem Cubitalquernerv, in seltenern Fällen ist er interstitial. Ein zweites Unterscheidungsmerkmal ist dann der auffallend verlängerte Metathorax, der sich deutlich über die Einlenkung der hintersten Hüften hinaus erstreckt. Von der Tribus der verwandten Campopleginen unterscheiden sich die Anomalinen besonders durch schlankere Form, namentlich den weit gestreckteren Hinterleib, dessen fast lineares langes 1. Segment gegen das Ende nur leicht und allmählich verdickt ist; ferner durch die Verdickung der Hintertarsen, wenn auch dieses Merkmal, wie bereits erwähnt, nicht immer so scharf hervortritt; schliesslich besitzen die Anomalinen auch mehr oder weniger deutliche Parapsidenfurchen, während diese den Campopleginen fast vollständig fehlen. Das Randmal im Flügel ist schmal und lang-gestreckt, ein Hauptunterschied von den Tribus der Pristomeren, Porizoninen, Cremastinen und den neuerdings ebenfalls der Unterfamilie der Ophioninen zugerechneten Plectiscinen.

Worauf es namentlich bei der Diagnose der Gattungen ankommt, ergibt sich aus den Tabellen und bedarf weiter keiner Erklärung. Von grosser Wichtigkeit für die Systematik ist die Beschaffenheit und Gestalt der Brachialzelle, namentlich ihre Aussenseite und der Ursprung des davon ausgehenden Längsnerven (nervus parallelus). Ich bemerke, dass die Brachialzelle diejenige ist, welche unter der grossen, aus Vereinigung der 1. Cubital- und 1. Diskoidalzelle entstandenen Discocubitalzelle liegt, also nach aussen vom Nervulus. Den Aussennerv der Brachialzelle (die äussere Humeralquerader) nannte Wesmael nervus transverso-discoïdalis und unterschied je nach dem Ursprung des nervus parallelus einen nervus transverso-discoïdalis supra, medio vel infra medium fractus.

Es kann sogar noch ein vierter Fall eintreten: der nervus parallelus entspringt mit aus dem oberen Winkel, wie bei der Gattung *Atrometus*. Förster drückt diese Verhältnisse etwas weitschweifig aus; so sagt er von der Gattung *Anomalus*: „Diskoidalzelle an der Basis breiter als die hintere mittlere Schulterzelle (= Brachialzelle) an der Spitze.“ Dies Verhältnis würde also dem Wesmael'schen nervus transverso - discoidalis infra medium fractus entsprechen. Thomson braucht die knappen Ausdrücke: nervus parallelus incidens (*Atrometus*), superus, medius et inferus.

Alle Arten leben parasitisch bei Lepidopteren; nähere Angaben finden sich bei den einzelnen Arten.

#### Uebersicht der Gattungen:

1. Stigma im Vorderflügel nicht vorhanden. Costalnerv verdickt. Nervellus nicht gebrochen. Nervus parallelus interstitial oder fast interstitial. Schildchen durch eine Längsfurche geteilt. Amerika.

cf. **Podogaster** Brullé.

(Tribus der Campoplegini.)

Stigma im Vorderflügel deutlich ausgebildet. 2.

2. Der 1. rücklaufende Nerv mündet in die Mitte der 1. Cubitalzelle, oder genauer gesagt: der 1. rücklaufende Nerv von gleicher Länge wie die obere Seite der Brachialzelle; beide Nerven bilden fast eine gerade Linie. Zähne der Mandibeln sehr ungleich. 3.

Der 1. rücklaufende Nerv mündet vor der Mitte der ersten Cubitalzelle oder vielmehr: der 1. rücklaufende Nerv weit länger als die obere Seite der Brachialzelle und meist stark gebogen, so dass beide Nerven keine gerade Linie bilden. Zähne der Mandibeln fast gleich. 5.

3. Der hinterste Metatarsus 4 Mal so lang als das nächste Glied, fast länger als die übrigen Glieder zusammen. Clypeus vorn breit abgerundet. Klauen rechtwinklig gekrümmt.

1. **Heteropelma** Wesm.

Der hinterste Metatarsus etwa doppelt so lang als das folgende Glied. 4.

4. Clypeus an der Spitze weit aufgebogen, in der Mitte tief ausgebuchtet, gleichsam zweilappig. Stirn mit Zähnchen. Metathorax mit tiefer Längsfurche. Nervellus über der Mitte gebrochen. Die hintersten Tarsen verdickt. Schildchen schwarz.

2. **Schizoloma** Wesm.

Clypeus an der Spitze abgestutzt. Oberlippe vorragend. Die hintersten Schienen nur bei dem ♂ stark verdickt. Schildchen meistens gelb.

3. **Exochilum** Wesm.

5. Augen deutlich behaart. Mesonotum ohne deutliche Parapsidenfurchen, dicht runzlig punktiert. Nervellus nicht gebrochen. Gesicht und Schildchen gelb.

4. **Trichomma** Wesm.

Augen nicht oder undeutlich behaart. 6.

6. Thorax, namentlich der Metathorax mit langen gelblichen Haaren bedeckt, auch der Hinterleib vom 2. Segment an mit gelblichem Toment. Borneo.

**Trichionotus** Cam.

Ann. and Mag. Nat. Hist. XVI (1905) p. 168.

Thorax ohne auffallende Behaarung. 7.

7. Rücklaufender Nerv (d. h. der 2. rücklaufende Nerv) interstitial, d. h. er trifft mit dem Cubitalquernerv (nervus areolaris) zusammen. 8.

Rücklaufender Nerv deutlich hinter dem Cubitalquernerv mündend. 10.

8. Nervus parallelus über der Mitte der Brachialzelle. Clypeus am Ende zugerundet oder etwas spitz vorgezogen.

13. **Barylypa** Först.

Nervus parallelus in oder unter der Mitte der Brachialzelle. 9.

9. Clypeus am Vorderrande nur schwach winklig vorgezogen. Fühler im Verhältnis kurz, kaum länger als der halbe Körper. Mesonotum ziemlich glatt und glänzend. Mittels-grosse Arten.

9. **Erigorgus** Först.

Clypeus in der Mitte des Vorderrandes mit scharfem Zahn. Fühler schlank borstenförmig, wenig kürzer als der Körper. Grosse Art aus Japan.

10. **Acanthostoma** Kriechb.

10. Die hintersten Sporen länger als die Breite des Schienenendes. Nervus parallelus aus oder unter der Mitte der Basalzelle; letztere nach aussen deutlich erweitert. Im Hinterflügel der Radiusabschnitt bis zum rücklaufenden Nerv länger als dieser. Nervellus gebrochen. Grössere Arten. 11.

Die hintersten Sporen nicht länger als die Breite des Schienenendes. Nervus parallelus meist über der Mitte der Brachialzelle; letztere nach aussen kaum erweitert. Im Hinterflügel der erste Radiusabschnitt nicht länger als der rücklaufende Nerv. Nervellus meist nicht gebrochen. 13.

11. Mesonotum glatt und ziemlich glänzend. Parapsidenfurchen tief, hinten gekerbt. Stirn ohne Leiste oder Zahn. Klauen deutlich gekämmt. Nervellus fast über der Mitte gebrochen.

5. **Habronyx** Först.

Mesonotum punktiert. Parapsidenfurchen schwach oder fehlend. 12.

12. Mesonotum vorn quer niedergedrückt. Klauen mehr oder weniger deutlich gekämmt. Stirn mit scharfer Leiste welche von oben betrachtet wie ein spitzer Zahn vortritt. Schildchen auf der Scheibe eingedrückt, an den Seiten nicht oder kaum gerandet. Geissel ganz oder grösstenteils rot. Das 2. Segment oben schwarz.

6. **Aphanistes** Först.

Mesonotum vorn nicht niedergedrückt (ausgenommen *Anomalon biguttatum* Grav.), Klauen nicht gekämmt. Stirn ohne Leiste oder Zahn. Schildchen mehr oder weniger gewölbt, dicht punktiert, an den Seiten meist deutlich gerandet. Parapsidenfurchen fehlen. Geissel gewöhnlich schwarz.

7. **Anomalon** Jur.

13. Nervus parallelus aus der Mitte der Brachialzelle. Nervellus weit unter der Mitte gebrochen, zwei unscheinbare Nerven aussendend. Parapsidenfurchen deutlich. Vorderhüften mit Querleiste. Die hintersten Tarsen stark verdickt.

8. **Blaptocampus** Thoms.

Nervus parallelus deutlich über der Mitte, zuweilen interstitial. Nervellus selten gebrochen. 14.

14. Nervellus deutlich gebrochen und einen Nerv aussendend. Parapsidenfurchen mehr oder weniger deutlich. Fühler oft von Körperlänge. 15.

Nervellus im Hinterflügel nicht gebrochen. 16.

15. Das 1. Tarsenglied fast 4 mal so lang wie das zweite, dieses kaum länger als breit und fast nur so lang wie das dritte.

11. **Hadromanus** Szepi.

Das 1. Tarsenglied nur etwa doppelt so lang wie das zweite, dieses deutlich länger als das dritte.

12. **Labrorychus** Först.

16. Hinterflügel mit unvollständiger Nervatur. Es befinden sich nur an der Basis 2 Zellen, eine grössere vorn, dahinter eine kleinere, welche nicht bis zur Mitte der davorliegenden reicht; alle übrigen Nerven fehlen. Hinterbeine sehr lang.



— Die einzige auf Ceylon vorkommende Art, *C. longipes* Cam., ist rotgelb mit schwarzer Zeichnung.

**Clatha** Cam.

*Spolia* Zeyl. III (1905) p. 129.

Hinterflügel mit vollständiger Nervatur. 17.

17. Nervus parallelus nicht interstitial. Hinterschienen verlängert. Trochanter nicht oder wenig länger als der Trochantellus. Fühler zuweilen von Körperlänge.

14. **Agrypon** Först.

Nervellus parallelus interstitial, die Diskoidalzelle also unten in einem Punkt zusammenlaufend. Hinterschienen kurz. Trochanter fast doppelt so lang als der Trochantellus. Kleine Arten.

15. **Atrometus** Först.

1. Gen. **Heteropelma** Wesm.

1849 *Heteropelma* Wesmael, Bull. Acad. Sc. Belgique XVI p. 119.

Fühler kürzer als der Körper; Kopf nach hinten etwas verschmälert, wie der Thorax dicht punktiert und ziemlich stark behaart. Mesonotum mit Parapsidenfurchen; Schildchen ziemlich flach, mit Längsfurche; Metathorax netzartig gerunzelt, ohne Kiele. Die Brachialzelle endet in der Mitte der unteren Seite der Discocubitalzelle, es ist also Brachial- und Discoidalzelle oben von gleicher Länge; der 2. rücklaufende Nerv mündet hinter dem Cubitalquernerv; Nervulus etwas postfurcal; Nervellus in der Mitte oder etwas darüber gebrochen. Beine schlank, die hintersten verlängert, beim ♂ die beiden ersten Glieder der hintersten Tarsen verdickt; der hinterste Metatarsus mindestens 3 mal so lang als das folgende Glied. Klauen knieartig gebogen, nicht gekämmt.

**H. calcator** Wesm. 1829 *Anomalon xanthopus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 652 ♀ (non ♂) [non Schrank] | 1849 H. c. Wesmael, Bull. Acad. Sc. Belgique XVI p. 120.

Einem ächten *Anomalon* ähnlich, lässt sich *Heteropelma* sofort durch die Flügel nervatur und den auffallend langen hintersten Metatarsus erkennen. — Kopf und Thorax schwarz, Mund und Gesicht gelb, Fühler zum grössten Teil rötlich. Flügel gelblich getrübt, Stigma rötlich. Beine rot, die vorderen mehr gelb, Hüften und Spitze der hintersten Schienen schwarz. Hinterleib rot, das Ende und der Rücken des 2. Segmentes schwarz. Bohrer kurz vorstehend.

L. 15—20 mm.

Verbreitet über ganz Europa und eine der häufigsten Anomalinen-Arten. Brischke zog die Art aus *Panolis piniperda* und *Hylophila prasinana*. Herr Amtsgerichtsrat Püngler sandte mir Stücke, die aus *Anarta myrtilli* geschlüpft waren.

## 2. Gen. **Schizoloma** Wesm.

1849 *Schizoloma* Wesmael, Bull. Acad. Sc. Belgique XVI p. 118.

1868 *Schizopoma* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 145.

Anmerk. Förster veränderte den Namen, weil *Schizoloma* bereits als Gattungsname bei der Pflanzenfamilie der Polypodiaceen angewandt war.

Augen gross, Stirn mit Zähnchen, Clypeus am Endrande aufgebogen und in der Mitte ausgebuchtet, Fühler fast so lang wie der Körper. Kopf und Mesonotum dicht punktiert, letzteres mit schwachen Parapsidenfurchen, Schildchen längs der Mitte eingedrückt. Flügelnervatur in der Hauptsache wie bei *Heteropelma*. Die hintersten Tarsen verbreitert, das 1. Glied etwa doppelt so lang, als das folgende; Klauen einfach.

Im paläarktischen Gebiete kommen 2 Arten vor.

Kopf hinten den Augen nicht oder kaum erweitert. Nervulus in der Regel deutlich postfurcal. Metathorax netzförmig gerunzelt. Körper mehr schlank.

### 1. **amictum** F. ♀ ♂.

Kopf hinter den Augen stark erweitert. Nervulus nahezu interstitial. Metathorax stark aber nicht netzförmig gerunzelt. Körper ziemlich plump.

### 2. **capitatum** Desv.

1. **Sch. amictum** F. 1772 *Ichneumon amictus* Fabricius, Syst. entom. p. 341 | 1798 *Ophion amictus* Fabricius, Suppl. entom. Syst. p. 237 | 1829 *Anomalon amictum* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 650 ♀ ♂ | 1849 *Schizoloma amictum* Wesmael, Bull. Acad. Sc. Belgique XVI p. 120 ♀ ♂.

Gehört mit zu den grössten Anomalinen. Kopf nach hinten nicht verbreitert; Wangen und Schläfen nicht aufgetrieben. Metathorax mit starken Runzeln, die zum Teil leistenartig hervortreten, ziemlich dicht behaart, hinten tief ausgehöhlt. — Schwarz, Gesicht und Fühlerschaft unten gelb, Fühler gegen das Ende rotgelb. Flügel gelblich getrübt, Stigma rostrot. Beine gelbrot, die vorderen mehr gelb, Spitzen der hintersten Schienen, zuweilen auch Flecken der Hinterhüften schwärzlich; die hintersten Tarsen namentlich in der Mitte gelblich. Hinterleib rot, das 2. Segment oben schwarz.

L. 18—22 mm.

Ueber ganz Europa verbreitet, aber an vielen Orten, wie z. B. hier in Thüringen, selten.

Als Wirte werden angeführt: *Callimorpha dominula*, *Orgyia pudibunda*, *Bombyx rubi*, *Cnethocampa processionea*, *Pygaera bucephala*, *Eupithecia linariata*, *Xylina rhizolitha*, *Hylophila prasinana*.

2. **Sch. capitatum** Desv. 1856 *Schizoloma capitatum* Desvignes, Cat. Brit. Ichn. p. 104 ♂ | 1898 *Schizoloma bucephalum* Brauns, Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklenb. Vol. 51 p. 71 ♂.

Schwarz, Gesicht, ein Scheitelpunkt beiderseits und Streifen der Schläfen an den Augen gelb; Fühler fast ganz rot, Unterseite des Schaftes und Fühlerspitze gelblich. Hinterleib gelbrot, am Ende kaum verdunkelt, Rücken des 2. Segmentes schwarz. Beine rot, die vorderen mehr gelb, die Spitzen der hintersten Schienen schwarz, die hintersten Tarsen gelblich. — Das Tier ist der vorhergehenden Art in der Färbung fast völlig gleich, aber durch die ganz ungewöhnliche Verbreiterung des Kopfes hinter den Augen und die viel breiteren Wangen und Schläfen auf den ersten Blick leicht zu unterscheiden. Der Thorax ist gedrungener als bei *amictum*, die Skulptur des Metathorax nicht wie bei jenem netzförmig gerunzelt, sondern die kräftigen Runzeln verlaufen verworren und es kommt sogar zu einer Andeutung von Feldern. Der Nervulus ist nahezu interstitial, bei *amictum* fast immer postfurcal. Der Metatarsus der Hinterbeine ist im Verhältnis zum 2. Gliede kürzer, etwa  $1\frac{1}{2}$  mal so lang als dieses. Das ganze Tier ist plumper als *amictum*, in der Grösse sonst wenig von ihm abweichend.

Von dieser Art ist nur das ♂ bekannt. Sie findet sich in Mitteleuropa einschliesslich England. Alle ♂ von *Schizoloma*, die ich in Thüringen gefangen habe, es sind nur wenige Stücke, gehören zu *capitatum*, sodass ich früher glaubte, der dicke Kopf wäre nur ein Merkmal des Männchens. Freilich war ich verwundert, dass die alten Autoren von diesem auffallenden Kennzeichen nichts erwähnten.

Gezogen wurde die Art aus *Smerinthus populi*.

### 3. Gen. **Exochilum** Wesm.

1849 *Exochilum* Wesmael, Bullet. Acad. Sc. Belgique XVI p. 119.

*Exochilum* ist die 3. Gattung der Anomaloninen, bei welchen die Brachial- und Discoidalzelle oben von gleicher Länge sind und der sie hier begrenzende Nerv eine gerade Linie bildet. Ein zweites gutes Merkmal, wodurch sich die Arten von denen

der beiden vorhergehenden Gattungen, überhaupt auch von den meisten übrigen Arten dieser Tribus leicht unterscheiden, ist das fast stets gelb gefärbte Schildchen. — Kopf und Mesonotum dicht punktiert; Oberlippe vorstehend; Clypeus am Ende abgerundet; Fühler ziemlich kurz; Stirn mit kleinem Zahn oder Dorn. Der 2. rücklaufende Nerv hinter dem Cubitalquernerv; Nervulus meist interstitial; nervus parallelus in oder etwas unter der Mitte der Brachialzelle; Nervellus über der Mitte gebrochen. Sporn der hintersten Schienen länger als die Breite des Schienenendes; der hinterste Metatarsus doppelt so lang wie das folgende Glied, dieses und das 3. Glied namentlich beim ♂ erweitert. Bohrer kurz vorstehend.

Die ausser den bekannten *E. circumflexum* angeführten Arten bedürfen noch recht einer kritischen Feststellung. Szepilgeti (Ann. Mus. National. Hungar. Vol. III 1905 p. 508) gibt die folgende Uebersicht:

1. Schildchen gelb (nur bei sehr seltenen Varietäten schwarz oder rötlich). 2.  
Schildchen schwarz. 3.
2. Kleinere, immerhin ansehnliche Art. Thoraxseiten nicht rot gefärbt. Schildchen flach gewölbt. Nervulus postfurcal und schief.

1. **circumflexum** L.

Grosse Art. Thoraxseiten rot gefleckt. Schildchen hoch gewölbt, meist mit schwacher Furche. Nervulus interstitial oder postfurcal.

2. **giganteum** Grav.

3. Kopf und Thorax lang und dicht behaart. Fühlergeissel schwarz.

3. **signatum** Grav. ♂.

Kopf und Thorax nicht auffallend behaart. Fühlergeissel rot.

4. **brevicorne** Grav.

1. **E. circumflexum** L. 1758 *Ichneumon circumflexus* Linné, Syst. Nat. Ed. 10 I p. 566 | 1798 *Ophion circumflexum* Fabricius, Suppl. entom. Syst. p. 236 | 1829 *Anomalon circumflexum* Gravenhorst, *Ichneumon*. Eur. III p. 643 | 1849 *Exochilum circumflexum* Wesmael, Bullet. Acad. Sc. Belgique XVI p. 122.

Schwarz, Fühler mit Ausnahme der 2 oder 3 ersten Glieder gelbrot, Schaft meist unten gelb gefleckt. Gesicht in der Regel mit 3 gelben Längsstreifen, welche unten verschmelzen, beim ♂ oft ganz gelb. Thorax schwarz, das Schildchen gelb. Die Varietät mit schwarzem Schildchen ist mir nie vorgekommen. Nach Holmgren soll auch eine

Varietät vorkommen, bei welcher die Schildchenspitze rötlich ist. Flügel stark gelblich getrübt, Stigma und Tegulä rötlich. Beine rot, die vorderen zum Teil gelblich; Hüften und die Spitzen der hinteren Schenkel und Schienen schwarz; die hintersten Tarsen gelblich, der Metatarsus mit rötlicher Basis. Hinterleib rot, der Rücken des 2. Segmentes und die Endsegmente schwarz.

L. 15—25 mm.

Weit verbreitet und häufig. Ich fand die Art in Nordafrika und Palästina.

Hauptsächlich aus *Lasiocampa pini*; von Brischke aus *Euplexia lucipara* gezogen. Aus der Häufigkeit des Tieres lässt sich auf eine weit grössere Zahl von Wirtstieren schliessen.

2. **E. giganteum** Grav. 1829 *Anomalon giganteum* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 647 ♀♂ | 1895 *Exochilum pyramdatum* Thomson, Opusc. Entom. XIX p. 2118 ♀♂.

Zwischen dieser und der vorhergehenden Art existiert eigentlich kein scharfer Unterschied, sodass man die vorliegende Art auch nur als grössere Form von *E. circumflexum* auffassen kann.

Schwarz; Palpen, eine Makel der Mandibeln, Oberlippe, Clypeus, die inneren und äusseren Augenränder und eine Makel oder ein Längsstreif in der Mitte des Gesichts gelb. Fühler rot, die beiden Basalglieder schwarz. Schildchen und ein Fleck des Hinterschildchens gelb; vor den Mittel- und Hinterhüften eine rötlichgelbe Makel. Flügel und Beine wie bei *E. circumflexum*. Hinterleib rot, das 1. Segment mit schwarzem Petiolus, das 2. Segment mit schwarzem Rücken bis über die Mitte, das 3. bis 5. mit schwarzen Seitenlinien, das 6. und 7. schwarz, das 6. zuweilen unten und an den Seiten rot gefleckt. Beim ♂ das ganze Gesicht gelb.

Länge bis 30 mm.

Scheint mehr im Süden vorzukommen. — Als Wirt gibt Gravenhorst *Bombyx trifolii* an.

3. **E. signatum** Grav. 1829 *Anomalon signatum* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 661 ♂.

Kopf und Thorax auffallend dicht und lang behaart, wie kaum bei einer anderen Anomalinen-Art. — Schwarz, Gesicht nur mit gelber Makel. Thorax bucklig, dicht punktiert. Flügel bräunlich getrübt, Stigma und Tegulä rötlich. Vorderbeine rötlichgelb, Hüften schwarz, Trochantern und Schenkel zum Teil rostrot; Mittelschenkel am Ende gelb, in der Mitte mit schwarzem Fleck; an den hintersten Beinen die Hüften schwarz, Trochantern rostrot, Schenkel

schwarz mit roter Basis, Schienen gelb, an der Spitze schwarz, die Tarsen sehr breit, der Metatarsus rostrot mit gelblicher Basis, das 2. rostrot mit gelblicher Spitze, die übrigen ganz gelb. Hinterleib kaum doppelt so lang wie Kopf und Thorax zusammen, rot; das 2. Segment auf dem Rücken und die Endsegmente vom 4. an rot, das 4. an den Seiten rot gefleckt.

L. 16 mm. — ♀ unbekannt.

Das Gravenhorst'sche Exemplar stammte von Berlin. Nach Szepligeti kommt die Art auch in Ungarn vor.

4. **E. brevicorne** Grav. 1829 *Anomalon brevicorne* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 656 ♀♂.

♀ Schwarz; zwischen Fühlern und Augen ein gelber Punktfleck; ein Wangenfleck trüb rot; Fühler kurz, so lang wie Kopf und Thorax, gelbrot, die 3 ersten Glieder schwarz. Flügel gelblich getrübt, Stigma und Tegulä rötlich. Beine rot, Hüften und zum Teil die Trochantern schwarz, die hintersten Schenkel und Schienenspitzen schwarz, die Schenkel an der Basis rot; die hintersten Tarsen verbreitert, rötlichgelb, die Endglieder verdunkelt. Hinterleib rot, der Rücken des 2. Segmentes und die Endsegmente, vom Endrande des 4. an, schwarz.

♂ Gesicht und Wangen gelb, meist auch ein gelblicher Scheitelpunkt beiderseits vorhanden. Fühlerschaft unten gelb. Die vorderen Schenkel und Schienen gelblich, die Schenkel aussen rötlich; die hintersten Tarsen braun, der Metatarsus gelblich.

L. 18—20 mm.

Deutschland, Ungarn.— Mir ist diese wie auch die vorige Art nie vorgekommen.

#### 4. Gen. **Trichomma** Wesm.

1849 *Trichomma* Wesmael, Bullet. Acad. Sc. Belgique XVI p. 119.

1868 *Therium* (Curtis) Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 145.

Kopf hinter den Augen schwach zugerundet, etwas verschmälert; Augen gross, unten breiter als oben, innen deutlich ausgerandet, mit ziemlich langen Haaren besetzt; Fühler etwa  $\frac{3}{4}$  so lang als der Körper, Schaft am Ende abgestutzt, kaum ausgerandet; Gesicht nach unten verschmälert; Clypeus in der Mitte des Vorderrandes mit Zähnen. Mesonotum mit schwachen Parapsidenfurchen; Schildchen fast flach bis stark gewölbt und dann zweihöckerig, an den Seiten gerandet; Metathorax weit über die Wurzel der Hinterhüften verlängert. Nervulus schief und postfurcal; Brachialzelle nach aussen

kaum erweitert, nervus parallelus in oder über der Mitte entspringend; Discocubitalnerv gekrümmt; Nervellus nicht oder über der Mitte schwach gebrochen. Beine schlank, Vorder-schienen kurz, das 1. Glied der hinteren Trochantern über doppelt so lang als das zweite; Sporn der Hinterschienen kaum länger als die Breite des Schienenendes; Hintertarsen schwach verdickt, der Metatarsus mindestens so lang wie die 4 folgenden Glieder zusammen; Fussklauen gekämmt. Hinterleib stark seitlich zusammengedrückt; Bohrer im Vergleich mit anderen Anomalinen lang.

#### Uebersicht der paläarktischen Arten.

1. Sehr kleine Art von nur 5 mm Länge. Schildchen schwarz. Augen nur ganz schwach behaart.

##### 4. **minutum** Bridgm.

Mittelgrosse Arten von mindestens 9 mm Länge. Schildchen gelb oder rot gezeichnet, nur in sehr seltenen Fällen schwarz. Augen deutlich behaart. 2.

2. Mittelbrustseiten längsstreifig. Nervellus nicht gebrochen. Schildchen ziemlich flach, nur mit Andeutung einer Längsfurche. Kleinere Art von 9—12 mm.

##### 1. **enecator** Rossi.

Mittelbrustseiten punktiert. Nervellus deutlich, wenn auch nur schwach gebrochen. Grössere Arten. 3.

3. Mittelbrustseiten unten ziemlich fein und zerstreut punktiert, oben runzlig mit grossem glänzenden Spiegel. Stirn mit einem seitlich zusammengedrückten dreieckigen Horn. Schildchen, nur mit Längsfurche.

##### 2. **intermedium** Krieger.

Mittelbrustseiten wenig glänzend, dicht und ziemlich grob punktiert, Spiegel nur angedeutet. Stirn ohne Horn. Schildchen stark zweihöckerig. Grösser als die vorhergehende Art.

##### 3. **fulvidens** Wesm.

1. **T. enecator** Rossi. 1790 Ichneumon enecator Rossi, Fauna Etrusca II p. 48 | 1829 Anomalon enecator Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 641 ♀♂ | 1849 Trichomma enecator Wesm., Bullet. Acad. Sc. Belgique XVI p. 137 ♀♂ | 1860 Trichomma ruficoxis Förster, Verh. naturh. Verh. preuss. Rheinl. XVII p. 149.

Kopf hinter den Augen ziemlich lang; Scheitel zwischen den vorderen und hinteren Ocellen schräg gestreift, Stirn mit Querstreifen. Gesicht nach unten stark verschmälert, fein und zerstreut punktiert; Clypeus vorn nur mit kleinem Endzähnen; Schläfen glatt und glänzend. Schildchen

etwas erhöht, leicht ausgerandet. Mittelbrustseiten längsgestreift. Nervus parallelus fast aus der Mitte der Brachialzelle, Nervellus nicht gebrochen. — Schwarz, Mund, Clypeus, Gesicht, Teil der Augenränder, Schaft unten, Seiten des Thorax, Linien vor den Flügeln und Schildchen gelb; letzteres zuweilen schwarz mit rötlichgelben Flecken, höchst selten ganz schwarz. Flügel leicht getrübt, Stigma bräunlich. Vorderbeine rotgelb mit gelben Hüften, die hintersten Beine rot, beim ♂ die Hüften gelb, beim ♀ rot und mehr oder weniger schwarz gefleckt, zuweilen ganz schwarz; Spitze der hintersten Schienen schwärzlich. Hinterleib rot, auf dem Rücken mehr oder weniger ausgedehnt schwarz.

L. 9—12 mm.

Verbreitet über einen grossen Teil von Europa aber nicht gerade häufig; hier in Thüringen selten. Von Brischke aus *Earias chlorana* L., von Bridgman aus *Tortrix*-Arten gezogen. Krieger erhielt sie aus einem Brombeerwickler.

2. **T. intermedium** Krieger. 1904 *Trichomma intermedia* Krieger, Zeitschr. Hym. Dipt. p. 168 ♀.

Kopf hinter den Augen ziemlich lang und nur wenig rundlich verschmälert; Scheitel zwischen und hinter den Ocellen matt, dicht und grob runzlig punktiert, sonst glänzend und zerstreut grob punktiert; auf der grob gerunzelten Stirn vor dem vorderen Punktauge ein seitlich zusammengedrücktes Horn; Gesicht dicht punktiert; Clypeus in eine deutliche Spitze vorgezogen; Schläfen glänzend, ziemlich grob punktiert. Mesonotum matt, dicht runzlig punktiert; Mittelbrustseiten glänzend, ziemlich fein und zerstreut punktiert, mit grossem, poliertem Speculum. Schildchen vorn steil abfallend, hinten mit breiter aber seichter Längsrinne; Metathorax netzgrubig, mit seichter Längsfurche. Nervellus weit über der Mitte gebrochen, der ausgehende Nerv an der Basis undeutlich. Hintertarsen mässig stark verdickt. — Schwarz; Mund, Clypeus, Gesicht, die äusseren Orbiten, eine Linie vor den Flügeln und 2 Makeln des Schildchens gelb. Die gelbe Farbe des Gesichts setzt sich zu beiden Seiten der Fühlerwurzeln nach oben fort. Scheitel zuweilen mit gelben Seitenfleckchen. Fühler dunkel braun, unten etwas heller, die Grundglieder fast schwarz, Schaft unten gelb. Flügel etwas getrübt, Tegulä und Stigma rötlich. Vorderbeine rötlich, Hüften und Trochantern gelb. Die hintersten Beine rot, die Hüften gegen das Ende und die Schenkel am Grunde gebräunt; Schienen rotgelb, an der äussersten Basis und im letzten Drittel braunschwarz; Schiensporen und Tarsen gelb, der Meta-



tarsus an der Basis rötlich. Hinterleib rot, auf dem Rücken grösstenteils schwärzlich.

L. 13—15 mm.

Bisher nur aus dem Königreich Sachsen bekannt.

3. **T. fulvidens** Wesm. 1849 *Trichomma fulvidens* Wesmael, Bullet. Acad. Sc. Belgique XVI p. 138 ♀♂ | 1902 *T. bituberculatum* Schmiedeknecht, Zeitschr. Hym. Dipt. II p. 365 ♂.

Scheitel und Stirn unregelmässig und grob gerunzelt; Gesicht ziemlich grob und dicht punktiert, Fühler ziemlich kräftig, fast von Körperlänge; Clypeus vorn stark vorgezogen, mit grossem Zahn in der Mitte. Mittelbrust an den Seiten grob und dicht punktiert, über dem nur angedeuteten Spiegel zwischen den Punkten fein längsstreifig. Schildchen stark erhaben, vorn punktiert, hinten ziemlich glatt und glänzend, der Länge nach tief eingesattelt und dadurch stark zweihöckerig; die Längsrinne wird an den Seiten von einer hohen Leiste begrenzt. Nervus parallelus kurz über der Mitte der Brachialzelle; Nervellus postfurcal, deutlich über der Mitte gebrochen, der ausgehende Nerv an der Basis schwach. Legebohrer so lang wie der hinterste Metatarsus. — Fühler, Kopf und Thorax schwarz, Clypeus und Fleck der Mandibeln rötlichgelb, Seiten des Gesichtes, Scheitelfleck und zum Teil die hinteren Augenränder, sowie die Unterseite des Schaftes gelb. Ein Fleck vor, eine Linie unter den Flügeln und Schildchen rötlich. Flügel leicht getrübt, Stigma rötlichgelb. Beine mit Hüften rot, Vorderschienen mehr gelb; an den hintersten Beinen die Hüften gegen das Ende schwarz gefleckt, die Schenkel am Ende gebräunt, die Schienen an der Basis gelb, dann rot, die Spitzen breit schwarz, die Tarsen gelb, Basalhälfte des 1. Gliedes rot. Hinterleib rot, Basis des 1. Segmentes, Rücken des 2. und die letzten grösstenteils schwarz.

L. bis 20 mm.

*T. fulvidens* ist bis jetzt aus Belgien, England und Deutschland (Thüringen, Kgr. Sachsen) nachgewiesen. Auffallend ist das frühe Erscheinen dieser Anomaline. Hier bei Blankenburg fliegt die Art schon Ende März und Anfang April; ich habe sie aber auch wie Krieger noch Ende Mai angetroffen. Im Frühjahr habe ich sie mit Vorliebe um Brombeer-Schösslinge fliegen sehen.

4. **T. minutum** Bridgm. 1884 *Anomalon minutum* Bridgman, Trans. Ent. Soc. London p. 425 ♀♂.

Der Autor nennt das Tier ein Mittelglied zwischen *Trichomma* und *Agrypon*. Wegen der wenn auch nur dünn

behaarten Augen und des nach unten verschmälerten Gesichtes stelle ich dasselbe zur Gattung *Trichomma*. — Kopf und Thorax sehr grob punktiert; Augen dünn behaart. Kopf etwas breiter als der Thorax, hinter den Augen nicht erweitert; Gesicht nach unten verschmälert, glatt und glänzend, oben zerstreut und grob punktiert; Clypeus am Ende abgerundet, undeutlich vom Gesicht getrennt; Fühler von  $\frac{2}{3}$  Körperlänge. Schildchen in der Mitte niedergedrückt; Metathorax gerunzelt, ohne Leisten. Rücklaufender Nerv nicht interstitial; Nervellus nicht gebrochen. Beine schlank, Hintertarsen schwach verdickt, der hinterste Metatarsus 4 mal so lang wie breit. Hinterleib lang und schlank, das 1. und 2. Segment linear, von gleicher Länge; Bohrer kürzer als das 1. Segment. — Kopf und Thorax schwarz, Mund, der untere Teil der Wangen und 2 Scheitelpunkte gelb; Fühler unten rötlich. Stigma im Vorderflügel bräunlich. Beine rot, Hinterhüften schwarz; die hintersten Schienen am Ende dunkelbraun. Beim ♂ die vorderen Hüften und Trochantern gelb, Hinterleib rot, der Rücken aller Segmente und die Seiten der Endsegmente schwärzlich.

L. 5 mm.

Die bisher nur aus England nachgewiesene Art wurde aus *Chrysocoris festaliella* gezogen.

Bridgman gibt leider gar nicht an, in welchen Punkten die Art von *Trichomma enecator* abweicht, die geringe Grösse und das dunkle Schildchen sind nicht genügende Unterschiede.

### 5. Gen. **Habronyx** Först.

1860 Habronyx Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII p. 145.

Kopf ziemlich aufgetrieben, aber hinter den Augen nicht erweitert; Stirn runzlig, in der Mitte mit feinem Längskiel; Clypeus deutlich vom Gesicht getrennt, am Ende mit feinem Zähnchen; Fühler von etwa  $\frac{2}{3}$  Körperlänge. Mesonotum wie der Kopf punktiert, mit schwachem Glanz; Parapsidenfurchen deutlich, crenuliert; Brustseiten dicht runzlig - punktiert; Schildchen flach oder gewölbt; Metathorax grob gerunzelt, in der Mitte mit breiter Längsfurche, die Luftlöcher oval. Der 2. rücklaufende Nerv kurz hinter dem Cubitalquernerv mündend, Nervulus mehr oder weniger postfurcal, Nervus parallelus etwas unter der Mitte der Brachialzelle, Nervellus etwas über der Mitte gebrochen. Trochanter doppelt so lang als der Trochantellus; Sporn der hintersten Schienen etwas länger als die Breite des Schienenendes; die hintersten Tarsen nur

schwach verbreitert, beim ♂ fast schlanker als beim ♀; Klauen an der Basis gekämmt.

Die beiden hierher gehörenden Arten zeichnen sich schon durch ihre Grösse aus, von den verwandten Arten überdies noch durch das ziemlich glänzende Mesonotum und die tiefen, namentlich hinten crenulierten Parapsidenfurchen.

Schildchen flach, stark gerunzelt, an den Seiten mehr oder weniger deutlich gerandet.

1. **heros** Wesm.

Schildchen einen deutlichen Höcker bildend. Etwas grösser als die vorhergehende Art.

2. **gigas** Kriechb.

1. **H. heros** Wesm. 1849 *Anomalon heros* Wesm., Bull. Acad. Sc. Belgique XVI p. 155 ♀ | 1860 *Habronyx heros* Förster, l. c. p. 149 | 1892 H. h. Thomson, Opusc. Entom. XVI p. 1759.

Kopf und Thorax schwarz, Gesicht, Wangen und Augenträger zum Teil gelb; Fühler rot, an der Basis oben schwarz, beim ♂ der Schaft ausgedehnt gelb. Spitze des Metathorax, meist auch die Suturen der Brustseiten rot. Flügel gelblich getrübt, Stigma und Tegulae rötlich, Beine rot, die vorderen Hüften und Trochanter beim ♂ gelb, die hintersten Hüften an der Basis, die hintersten Schienen an der Spitze breit schwarz. Hinterleib rot, gegen das Ende dunkler, Rücken des 2. Segmentes schwarz.

L. 30—35 mm.

Nord- und Mitteleuropa; überall selten. — Wurde erzogen aus *Lasiocampa pini* und *dryophaga*, sowie aus *Deilephila galii*.

2. **H. gigas** Kriechb. 1880 *Habronyx gigas* Kriechbaumer, Entom. Nachr. VI p. 75 | 1895 H. *oti* Kriechbaumer, Sitzb. Naturf. Ges. Leipzig, p. 129, nota | ? 1860 *Habronyx Gravenhorsti* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII p. 148 ♀♂.

Schwarz; Mund, Gesicht, Augenträger zum grössten Teil und Schaft unten gelb; Fühler gegen das Ende rotgelb; Suturen der Brustseiten, Hinterleib und Beine rot, das 2. Segment oben und das Endsegment zum Teil schwarz; Vorderschienen und Tarsen gelb, die hintersten Schienen an der Spitze schwarz. Metathorax netzartig gerunzelt, der Länge nach vertieft. Flügel getrübt.

Der Hauptunterschied von *H. heros* liegt nach dem Autor in der Beschaffenheit des Schildchens; bei *heros* ist dasselbe stark gerunzelt, niedergedrückt, zuweilen fast gefurcht, an den Seiten mehr oder weniger deutlich gerandet; bei *gigas* bildet das Schildchen einen sehr deutlichen,

vorne steil, hinten schräg abfallenden Höcker. — Ob sich dieser Unterschied nun constant erweist, ist bei der Seltenheit der beiden Arten schwer zu sagen.

L. bis 37 mm.

Diese Art oder Form scheint mehr im Süden, namentlich im Südosten vorzukommen. Kriechbaumer's Exemplar stammte aus Dalmatien.

Anmerk. Die Stellung des *H. Gravenhorstii* Förster l. c. p. 148 ist unklar. Dalla Torre hält ihn für identisch mit *H. gigas*, Szepligeti dagegen stellt ihn zu als Synonym zu *H. heros* Wesm.

## 6. Gen. **Aphanistes** Först.

1868 *Aphanistes* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 145.

Fühler kürzer als der Körper; Geißel meist ganz oder grösstenteils rot. Stirn mit scharfer Leiste, welche von oben betrachtet als spitzes Zähnchen vortritt. Gesicht gelb. Clypeus in der Mitte des Endrandes zugespitzt. Mesonotum dicht runzlig-punktiert, matt, vorn quer niedergedrückt, ohne oder mit ganz schwachen Parapsidenfurchen. Schildchen auf der Scheibe eingedrückt, an den Seiten nicht oder kaum gerandet. Im Vorderflügel die obere Seite der Discoidalzelle viel länger als die der Brachialzelle, der zweite rücklaufende Nerv hinter dem Cubitalquernerv, Nervus parallelus etwas unter der Mitte der Brachialzelle, Nervulus postfurcal. Nervellus meist tief unter der Mitte gebrochen. Sporn der hintersten Schienen länger als die Breite des Schienenendes; die hintersten Tarsen ziemlich schlank, der Metatarsus etwas mehr als 2 mal so lang als das folgende Glied; Klauen mehr oder weniger deutlich gekämmt. Das 2. Hinterleibssegment ist auf dem Rücken schwarz. Mittelgrosse Arten.

Uebersicht der paläarktischen Arten.

1. Thorax rot, Mesonotum, Mittelbrust, Basis des Metathorax und das Schildchen schwarz. Kopf schwarz, Clypeus, Gesicht und teilweise Augenränder gelb. Schildchen erhaben, nicht gerandet.

### 4. **thoracicus** Brischke.

Thorax schwarz, höchstens die Spitze des Metathorax rötlich. 2.

2. Fühler fast so lang wie der Körper, ganz rot. Schildchen, namentlich bei grösseren Exemplaren, längs vertieft und an den Seiten fein gerandet.

### 1. **ruficornis** Grav.

Fühler kurz, kaum länger als der halbe Körper, nicht ganz rot. Schildchen gewölbt, nicht gerandet. 3.

3. Basalglieder der Fühler ganz oder wenigstens auf der Oberseite schwarz. Hinterleibsende breit schwarz. Die hintersten Hüften fast ganz und Spitzen der hintersten Schienen schwarz. Schildchen ziemlich stark gewölbt.

2. **armatus** Wesm.

Schaft ganz rotgelb. Nur Segment 6 und 7 oben schwarz. Schildchen weniger stark gewölbt.

3. **bellicosus** Wesm.

1. **A. ruficornis** Grav. 1829 *Anomalon ruficorne* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 655 ♀♂ | 1892 *Aphanistes ruficornis* Thomson, Opusc. Entom. XVI p. 1762 ♀♂ | 1854 *Anomalon Wesmaeli* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV p. 25 ♀♂ | 1880 *Aphanistes Wesmaeli* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig, N. F. IV p. 135 ♀♂.

Kopf nach hinten fast etwas verschmälert, dicht punktiert, kurz behaart; Scheitel tief ausgerandet; Fühler fast von Körperlänge. Thorax etwas schmaler als der Kopf, Mesonotum dicht punktiert; Schildchen gegen das Ende flach und mehr oder weniger längsvertieft, namentlich bei grösseren Exemplaren; Metathorax netzförmig gerunzelt, der Länge nach vertieft. — Schwarz, Gesicht, Ende der Wangen und Scheitelpunkte neben den Augen gelb. Fühler ganz rotgelb, beim ♂ der Schaft unten gelb. Spitze des Metathorax zuweilen rötlich. Flügel gelblich getrübt, Stigma und Tegulä rötlich. Beine rot, Vorderbeine zum Teil gelb, die hintersten Hüften an der Basis oder ganz, sowie die Spitze der hintersten Schienen schwarz; die hintersten Tarsen gelb, Basis des Metatarsus rot. Hinterleib rot, Postpetiolus zum Teil, Rücken des 2. Segmentes und Segment 5—7 oder 6 und 7 oben schwarz.

L. 15—20 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten; — Als Wirte werden *Gastropacha piniperda* (Hartig) und *Sphinx pinastri* (Szepilgeti) angeführt.

2. **A. armatus** Wesm. 1849 *Anomalon armatum* Wesmael, Bullet. Acad. Sc. Belgique XVI p. 122 ♀♂ | 1892 *Aphanistes armatus* Thomson, Opusc. Ent. XVI p. 1761 ♀ | ? 1781 *Ichneumon xanthopus* Schrank, Enum. Insect. Austr. p. 370 | 1829 *Anomalon xanthopus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 652 ♂ (excl. ♀) | 1858 *Anomalon xanthopus* Holmgren, Oefvers-Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 17 ♀♂.

Anmerk. Was für eine Art Schrank unter seinem *Ichneumon xanthopus* verstanden hat, lässt sich aus der kurzen Beschreibung nicht ersehen; jedenfalls ist diese Bezeichnung für eine der so schwer unterscheidbaren *Aphanistes*-Arten nicht zu verwenden. Gravenhorst's *Anomalon xanthopus* scheint eine Mischart zu sein, dagegen halte ich *Anomalon xanthopus* Holmgr. für identisch mit *Aphanistes armatus* Wesm.

Fühler wenig länger als der halbe Körper. Schildchen convex, an den Seiten nicht gerandet. Nervellus weit unter der Mitte gebrochen. — Kopf und Thorax schwarz, Ende der Wangen, Clypeus und Gesicht, sowie Scheitelpunkte neben den Augen gelb. Basalglieder der Fühler schwarz, Schaft unten gelb, die übrigen Geisselglieder heller oder dunkler rot. Suturen und Spitze des Metathorax zuweilen rötlich. Beine rot, die vorderen Hüften und Trochantern, auch die Aussenseite der Vorderschienen und die Tarsen gelblich; die hintersten Hüften ganz oder grösstenteils und die Spitzen der hintersten Schienen schwärzlich; Tarsen gelb, der Metatarsus an der Basis rötlich. Hinterleib rot, der Rücken des 2. Segmentes und die Endsegmente schwarz; der Rücken der vorhergehenden Segmente verdunkelt, beim ♀ meist schon vom 3. Segment an.

L. 15 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten. — Wurde aus *Panolis piniperda* gezogen.

3. **A. bellicosus** Wesm. 1849 *Anomalon bellicosum* Wesmael, Bullet. Acad. Sc. Belgique XVI p. 124 ♀♂ | 1880 *Aphanistes bellicosus* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 135 ♀♂ | 1880 *Aphanistes Wesmaeli* Brischke, l. c. p. 135 ♀♂ [non Holmgren].

Von der vorhergehenden Art eigentlich nur durch die Färbung verschieden, denn die Angabe, dass das Schildchen weniger stark gewölbt sei als bei *A. armatus*, will nicht viel sagen. — Kopf und Thorax schwarz, Palpen, Mandibeln, Clypeus, Wangen, Gesicht und Scheitelpunkte neben den Augen gelb. Fühler braun, unten rötlich, Schaft im Gegensatz zur vorigen Art ganz gelb oder oben rötlichgelb. Suturen der Brustseiten und die Spitze des Metathorax, zuweilen auch der ganze Metathorax rot. Flügel gelblich getrübt, Stigma und Tegulä rötlich. Beine rot, die vorderen Hüften und Trochantern gelb; der grösste Teil der hintersten Hüften, die Basis der Trochantern und Spitze der hintersten Schienen schwarz; die hintersten Tarsen gelb, Basis des Metatarsus rötlich. Hinterleib rot, Segment 2, 6 und 7 auf dem Rücken schwarz; die schwarze Färbung ist also weit weniger ausgedehnt als bei *A. armatus*.

Das ♂ hat ganz schwarzen Thorax, sonst stimmt es mit dem ♀ fast ganz überein.

Durchschnittlich etwas kleiner als *A. armatus*.

Nord- und Mitteleuropa; nicht häufig. — Als Wirt wird von Mocsary *Sphinx pinastri* angegeben.

4. **A. thoracicus** Brischke 1880 *Anomalon thoracicum* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 136 ♀ ♂ | 1902 *Aphanistes thoracicus* Schmiedeknecht, Zeitschr. Hym. Dipt. p. 367 ♀ ♂.

Thorax rot, Mesonotum, Mittelbrust, Basis des Metathorax und das Schildchen schwarz. Kopf schwarz, Clypeus, Gesicht und zum Teil die Augenränder gelb; Schläfen beim ♀ rot. Fühler fast von Körperlänge, beim ♀ rotbraun, Schaft unten gelb, beim ♂ die Fühler mehr schwarz. Beine rot, Vorderhüften, Trochantern und Hintertarsen gelb, letztere wenig verbreitert; Hinterhüften und Spitze der Hinterschienen schwarz. Hinterleib rot, nur der Rücken des 2. Segmentes schwarz. Schildchen erhaben, nicht gerandet.

L. 13 mm.

Deutschland.

Nach Brischke selbst vielleicht nur eine Varietät von *A. ruficornis* Grav.

## 7. Gen. **Anomalon** Jur.

1807 *Anomalon* Jurine, Nouv. Méth. Class. Hymén. p. 114 (partim).

Die Gattung ist hier im engeren Sinne aufgefasst; sie stimmt mit *Aphanistes* überein und unterscheidet sich nur durch die folgenden Merkmale: Stirn ohne zahnartige Leiste; Mesonotum mit Ausnahme von *A. biguttatum* vorn nicht niedergedrückt und abgestutzt; Schildchen mehr oder weniger gewölbt, dicht punktiert, an den Seiten meist deutlich gerandet; Geißel in der Regel schwarz.

Von den früheren Autoren sind verschiedene ganz zweifelhafte Arten unter *Anomalon* beschrieben worden; sie sind nicht weiter berücksichtigt worden.

### Uebersicht der Arten.

1. Der hinterste Metatarsus des ♂ aussen in einen breitgedrückten Fortsatz verlängert. Der ganze Körper blassgelb mit spärlicher schwarzer und rötlicher Zeichnung.

#### 9. **paradoxum** Schmiedekn.

Der hinterste Metatarsus des ♂ ohne diese auffallende Bildung. Körper nicht fast durchweg blassgelb gefärbt. 2.

2. Hinter- oder Vordertarsen in der Mitte weiss.

cf. Gattung **Erigorgus**.

Tarsen nicht weiss gezeichnet. 3.

3. Fühlergeißel rot; auch das 1. Segment und die Schenkel ganz rot. 4.

Fühlergeißel schwarz; das 1. Segment an der Basis oft schwarz. 6.

4. Schildchen ungerandet, gelb, höchst selten schwarz. Fühlerbasis oben schwarz. Gesicht gelb. Beine und Hinterleib rot, Spitzen der hintersten Schienen, Rücken des 2. Segmentes und Hinterleibsspitze schwarz. Hüften grösstenteils schwarz.

1. **biguttatum** Grav.

Schildchen deutlich gerandet, schwarz. Fühler rot, die Basalglieder unten gelb. 5.

5. Hüften rot, die hintersten höchstens an der Basis schwarz. Rücklaufender Nerv dicht hinter dem Cubitalquernerv oder fast interstitial.

2. **procerum** Grav.

Hinterhüften und Trochantern schwarz. Rücklaufender Nerv wie bei der vorigen Art fast interstitial.

3. **ruficorne** Szepl.

6. Das 1. Segment beim ♀ an der Basis, beim ♂ fast ganz schwarz. Beim ♀ die Seiten des Gesichtes, beim ♂ auch ein Mittelstreif oder Mittelfleck, selten das ganze Gesicht gelb. Hüften, Basalhälfte der hintersten Schenkel, zuweilen fast die ganzen Schenkel und die Spitzen der hintersten Schienen schwarz. Kopf und Thorax stark behaart.

4. **latro** Schrank.

Das 1. Segment ganz rot. Meist das ganze Gesicht gelb. 7.

7. Nur die Gesichtsseiten gelb. Beine gelbbrot, Hüften, Spitze der hintersten Schienen und die hintersten Schenkel mit Ausnahme der Spitze schwarz. Rücken des 2. Segmentes und Hinterleibsende schwarz. Nur das ♀ bekannt.

4. **latro** var. **orbitale** Thoms.

Gesicht auch beim ♀ ganz gelb. 8.

8. Auch die Hinterschenkel ganz rot. Kopf hinter den Augen erweitert, viel breiter als der Thorax.

5. **nugale** Tosqu.

Die hintersten Schenkel wenigstens an der Basis schwarz. 9.

9. Schläfen oben mit rotem Fleck. Fühlergeissel in der Mitte rot.

6. **propugnator** Först.

Schläfen nicht rot gezeichnet. 10.

10. Die hintersten Schenkel schwarz, nur an der Spitze hell. Schildchen schwarz. Wangen runzlig. Clypeus vorn mit deutlicher Spitze.

7. **cerinops** Grav.



Die hintersten Schenkel nur an der Basalhälfte schwarz. Schildchen in der Mitte rot. Wangen nicht runzlig. Clypeus fast unbewehrt.

### 8. *lapponicum* Thoms.

1. **A. biguttatum** Grav. 1829 *Anomalon biguttatum* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 642 ♀ | 1858 A. b. Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 19 ♀♂ | 1892 *Aphanistes biguttatus* Thomson, Opusc. Ent. XVI p. 1760 ♀ | 1903 *Anomalon biguttatum* Schmiedeknecht, Zeitschr. Hym. Dipt. Heft 1 p. 1.

Diese Art bildet ein Zwischenglied zwischen *Aphanistes* und *Anomalon*. Das Mesonotum ist wie bei der ersteren Gattung vorn quer niedergedrückt, dagegen fehlt die charakteristische zahnartige Leiste auf der Stirn. Aus dem letzteren Grunde ziehe ich vor, die Art zu *Anomalon* zu stellen. Flüchtig betrachtet hat die Art wegen des gelben Schildchens einige Aehnlichkeit mit *Exochilum circumflexum*, unterscheidet sich aber leicht durch die andere Flügelnervatur.

Kopf hinter den Augen etwas verschmälert; Stirn flach, runzlig, nur mit erhabener Linie; Fühler von  $\frac{3}{4}$  Körperlänge. Thorax etwas schmaler als der Kopf, punktiert, schwach glänzend, kurz und nicht dicht behaart; Schildchen convex, nicht gerandet; Metathorax grob gerunzelt. Nervellus etwa in der Mitte gebrochen. Die hintersten Tarsen mässig erweitert. Hinterleib ziemlich glatt. — Kopf schwarz, Palpen, Mandibeln mit Ausnahme der Zähne, Clypeus, Wangen, Gesicht und Scheitelmakeln neben den Augen gelb. Fühler gelbrot, die Basalglieder oben schwarz. Thorax schwarz, ein Punkt unter den Flügeln, die beiden Schildchen und Flecken am Ende des Metathorax gelb. Flügel deutlich gelblich getrübt, Stigma und Tegulä rötlich gelb. Beine rot, Vorderbeine zum Teil und Tarsen gelblich: Spitzen der hintersten Schienen, Vorderhüften an der Basis, die hintersten ganz schwarz. Hinterleib rot, Rücken des 2. Segmentes und die Endsegmente vom 5. an schwarz.

Beim ♂ sind die Vorderhüften ganz gelb.

Holmgren erwähnt eine Varietät des ♀ mit ganz schwarzem Schildchen, Brischke eine solche mit rot und gelb gezeichnetem Metathorax und mit roten Hinterhüften.

L. 18—20 mm.

Nördliches und mittleres Europa; selten. — Wurde erzogen aus *Bupalus piniarius*, *Lasiocampa pini* und *Panolis piniperda*.

2. **A. procerum** Grav. 1829 *Anomalon procerum* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 651 ♀ | 1858 A. p. Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 21 ♀.

Kopf hinter den Augen etwas verschmälert; Stirn flach, runzlig, mit erhabener Linie; Fühler kaum länger als der halbe Körper. Thorax fast schmaler als der Kopf, dicht und ziemlich grob punktiert; Schildchen deutlich gerandet. Nervellus ungefähr in der Mitte gebrochen. Beine schlank, die hintersten Tarsen schwach erweitert. Hinterleib ziemlich glatt. — Kopf schwarz, Palpen, Mandibeln mit Ausnahme der Endzähne, Clypeus und Gesicht gelb; Scheitelpunkte beiderseits und die äusseren Orbiten rötlich. Fühler trüb rot, gegen das Ende verdunkelt, das 2. und 3. Glied oben braun, das 1. und 2. unten gelb. Thorax schwarz, die Suturen und die Spitze des Metathorax rötlich. Flügel bräunlichgelb getrübt, Stigma und Tegulä rötlich. Beine rot, Hüften an der Basis gebräunt, Vorderschienen und alle Tarsen gelb, Basis des hintersten Metatarsus rötlich; die hintersten Schienen am Ende schwarz. Hinterleib rot, Rücken des 2. und die Endsegmente vom 5. an schwärzlich.

L. 18—20 mm. — ♂ unbekannt.

Verbreitung wie bei der vorigen Art; sehr selten. Mir ist die Art nie vorgekommen.

3. **A. ruficorne** Szepl. 1899 *Erigorgus ruficornis* Szepligeti, Termés. Füzet. XXII p. 213 und 231 ♂ | 1905 *Anomalon ruficorne* Szepligeti, Ann. Mus. Nat. Hungar. III p. 511 ♀♂.

♂ Kopf und Thorax mit ziemlich langen, gelblichen Haaren bedeckt. Kopf quer, hinten breit ausgebuchtet und gerandet; Clypeus in der Mitte des Endrandes mit Zähnen; Oberkopf und Stirn runzlig-punktiert; Fühler von halber Körperlänge. Mesonotum grob punktiert, beinahe matt, ohne Parapsidenfurchen; Schildchen convex, grob punktiert, behaart, nur an der Basis gerandet; Metathorax grob netzartig gerunzelt. Nervulus postfurcal; rücklaufender Nerv beim ♀ hinter dem Cubitalquernerv, beim ♂ interstitial; Nervellus in der Mitte gebrochen, der ausgehende Nerv deutlich. Hintertarsen verdickt, der Metatarsus etwa 3 mal so lang wie das folgende Glied. — Schwarz, wenig glänzend. Fühler rot, Schaft unten weisslich, oben braun. Gesicht und Mund gelb. Der hintere Augenrand von den Wangen bis zum Scheitel schmal rot. Flügel gelblich, Nervatur und Stigma gelb, Tegulä rot. Beine rot, Vorderbeine zum Teil gelb; die mittleren Hüften aussen, die hintersten ganz schwarz, ebenso die Spitzen der hintersten Schienen; Tarsen gelb. Hinterleib rot; der Rücken des 2. Segmentes und das 6. und 7. Segment ganz schwarz.

L. 17 mm.

Budapest.

Vom ♀ sagt der Autor nur, dass der rücklaufende Nerv hinter dem Cubitalquernerv mündet. Aus diesem Grunde stelle ich die Art auch zu *Anomalon*.

4. **A. latro** Schrank. 1781 *Ichneumon latro* Schrank, Enum. Insect. Austr. p. 360 ♀ | 1829 *Anomalon latro* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 677 ♀♂.

Wie die vorige Art bildet auch diese einen Uebergang zu *Erigorgus*.

Kopf und Thorax dicht behaart, schwarz, Seiten des Gesichtes, oft auch ein Fleck oder Längsstreif in der Mitte, beim ♂ zuweilen das ganze Gesicht gelb. Fühlerschaft beim ♂ unten gelb. Flügel leicht getrübt, Stigma und Tegulä rötlich. Beine rot, alle Hüften, Basalhälfte der hintersten Schenkel, zuweilen fast die ganzen Schenkel und die Spitzen der hintersten Schienen schwarz; beim ♂ die vorderen Schienen und Tarsen gelblich. Hinterleib rot; beim ♀ die Basis des 1. Segmentes verdunkelt, Rücken des 2., meist die Unterseite des 3. und 4. und die folgenden Segmente fast ganz schwarz. Beim ♂ ist das 1. Segment fast ganz schwarz, der Hinterleib überhaupt dunkler gefärbt.

Var. 1 ♂. Hinterschenkel und Schienen ganz schwarz.

Var. 2 ♂. *vicinum* Först. *Anomalon vicinum* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XII (1855) p. 232. Wie die vorhergehende Varietät, aber Gesicht ganz gelb.

Var. 3 ♂. Die hintersten Schenkel und Schienen nicht ganz schwarz. Gesicht ganz gelb.

Var. 4 ♀. *orbitale* Thoms. *Anomalon orbitale* Thomson, Opusc. Entom XVI (1892) p. 1764 ♀. Das 1. Segment ganz rot. Nur die Gesichtsseiten gelb. Beine gelbbrot, Hüften, Spitze der hintersten Schienen und die hintersten Schenkel mit Ausnahme der Spitzen schwarz. Kleiner als die Stammart. Südliches Schweden.

L. 20 mm.

Verbreitet in Europa, aber überall selten. — Aus *Diloba coeruleocephala* und *Perigrapha cincta*.

5. **A. nugale** Tosqu. 1889 *Anomalon nugale* Tosquinet, Ann. Soc. Ent. Belgique XXXIII p. 18 ♀ | 1902 A. n. Schmiedeknecht, Zeitschr. Hym. Dipt. p. 2 ♀.

Ausgezeichnet durch den breiten Kopf und die ganz roten Hinterschenkel.

Kopf hinter den Augen erweitert, viel breiter als der Thorax; Fühler wenig länger als der halbe Körper. Mesonotum matt, dicht punktiert, Schildchen schwach glänzend, zerstreut punktiert, oben flach. — Kopf und Thorax schwarz, Fühler schwarzbraun, unten rötlich, Schaft unten gelb. Metathorax beiderseits rot gefleckt. Beine rot, Vorderbeine zum Teil gelb, die hintersten Hüften oben und die Spitze der hintersten Schienen schwarz, die hintersten Tarsen erweitert, gelb, an der Basis rot. Das 1. Segment ganz rot, die folgenden auf dem Rücken verdunkelt.

L. 17 mm. — Nur das ♀ bekannt.

Amurland.

6. **A. propugnator** Först. 1855 *Anomalon propugnator* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XII p. 233 ♀ | 1895 *Anomalon variicorne* Thomson, Opusc. Entom. XIX p. 2119 ♀♂.

Die Art stimmt ganz mit dem häufigen *Anomalon cerinops* überein und unterscheidet sich nur durch die folgenden Merkmale: Schläfen mit rotem Fleck, Fühlergeißel rot, an der Basis und Spitze schwarz, Schenkel nur an der Basalhälfte schwarz.

L. 20 mm.

Nördliches und mittleres Europa; scheint sehr selten zu sein.

7. **A. cerinops** Grav. 1829 *Anomalon cerinops* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 658 ♀♂ | 1807 *Ophion flavifrons* Gravenhorst, Uebers. zool. System. p. 267.

Anmerk. Gravenhorst selbst hat den Namen umgeändert, da der *Ophion flavifrons* F. nichts mit der vorliegenden Art zu tun hat.

Kopf dicht punktiert, hinter den Augen schwach erweitert, wie der Thorax stark behaart; Stirn leicht eingedrückt, runzlig, mit erhabener Längslinie; Clypeus am Ende nur ganz schwach gezähnt; Fühler kaum länger als der halbe Körper. Thorax ebenfalls dicht punktiert, vorn schwach dreilappig; Schildchen convex; Metathorax grob gerunzelt. Nervus parallelus ungefähr aus der Mitte der Brachialzelle. Beine schlank, die hintersten Tarsen in beiden Geschlechtern schwach erweitert. — Kopf und Thorax schwarz, Gesicht und Clypeus gelb; meist rötliche Scheitelmakeln vorhanden; Fühler schwarz, Schaft meist unten gelb. Flügel gelblich, Stigma rötlichgelb. Vorderbeine gelbrot mit schwarzen Hüften, die hintersten Beine schwarz, Spitze der Schenkel, Basis der Schienen und Tarsen gelb. Rücken des 2. Segmentes und Hinterleibsende breit schwarz.

L. 15--25 mm.

Ueber ganz Europa verbreitet und eine der häufigsten Anomalinen. — Als Wirte werden angeführt: *Calocampa vetusta* und *exoleta*, *Diloba coeruleocephala* und *Orthosia gracilis*.

8. **A. lapponicum** Thoms. 1892 *Anomalon lapponicum* Thomson, Opusc. Entom. XVI p. 1763 ♀.

Kopf und Thorax schwarz, Clypeus und Gesicht gelb. Beine gelbrot, Hüften, Basalhälfte der Schenkel und die Spitze der hintersten Schienen schwarz. Rücken des 2. Segmentes und Hinterleibsspitze breit schwarz.

Dem *A. cerinops* sehr ähnlich, aber Wangen nicht gerunzelt, Clypeus am Ende fast ungezähnt, die hintersten Schenkel nicht ganz schwarz, sondern an der Endhälfte rot, das 4. Segment mit dunklem Endrand und Schildchen in der Mitte rot.

L. 16—18 mm.

Lapland.

9. **A. paradoxum** Schmiedeknecht. 1900 *Anomalon paradoxum* Schmiedeknecht, Termes. Füzet. XXIII p. 241 ♂ und 1902 Zeitschr. Hym. Dipt. p. 368 ♂.

Kopf und Thorax schwach glänzend, zerstreut grob aber nicht tief punktiert; Kopf hinten tief ausgerandet; Endrand des Clypeus in der Mitte winklig vortretend; Fühler kurz, borstenförmig, das Ende des Thorax nicht überragend. Nervus parallelus aus der Mitte der Brachialzelle; Nervulus weit hinter der Gabel; Nervellus unterhalb der Mitte gebrochen und einen deutlichen Nerv aussendend. Die hintersten Beine stark verdickt, die Sporen so lang wie die Schienen am Ende breit. Die hintersten Metatarsen am Ende aussen in einen seitlich zusammengedrückten Fortsatz verlängert, welcher am Ende abgestutzt ist. Das 1. und 2. Hinterleibssegment sehr lang und dünn. — Schaft und das 1. Geisselglied blassgelb, oben schwarz; Geissel rostrot, gegen das Ende deutlich zugespitzt, die Geisselglieder so lang als breit. Kopf und Thorax hellgelb; hinter den Fühlern und um die Ocellen schwarze Linien. Vorn auf dem Mesonotum zwei schwache Längsstriche dicht neben einander, die sich nach hinten undeutlich verlängern. Hinten auf dem Mesonotum je ein schwarzer Seitenpunkt; Metathorax mit einer schwarzen Querlinie an der Basis und einer solchen Längslinie. Flügel hyalin, Stigma rötlichgelb, Nerven schwärzlich. Beine blassgelb, die hintersten grösstenteils rostrot. Hinterleib blassgelb,

oben rötlich, das 2. Segment auf dem Rücken zum Teil schwärzlich.

L. 16 mm.

Diese ausgezeichnete Art, von der ich leider nur ein ♂ besitze, ist schon an der hellgelben Färbung leicht kenntlich; dazu kommt die merkwürdige Bildung des hintersten Metatarsus, die aber wahrscheinlich nur dem ♂ zukommt. — Ich fing das beschriebene Exemplar im Mai 1895 in der Oase Tiut bei Ain-Sefra im Süden der Provinz Oran.

### 8. Gen. **Blaptocampus** Thoms.

1892 *Blaptocampus* Thomson, *Opusc. Entom.* XVI p. 1765.

Scheitel nicht breit. Mesonotum mit deutlichen Parapsidenfurchen. Flügelnervatur etwa wie bei *Anomalon*. Nervus parallelus aus der Mitte der Brachialzelle; Nervellus weit unter der Mitte gebrochen und einen unscheinbaren Nerven ausendend. Beine ziemlich kräftig, die vordersten Hüften mit Querkiel; die hintersten Sporen kaum länger als die Breite des Schienenendes; die hintersten Tarsen stark verdickt.

Scheitel ohne gelbe Punkte neben den Augen. Segment 5—7 schwarz gezeichnet.

#### 1. **nigricornis** Wesm.

Scheitel mit gelben Seitenpunkten. Nur Segment 6 und 7 schwarz gezeichnet.

#### 2. **perspicuus** Wesm.

1. **B. nigricornis** Wesm. 1849 *Anomalon nigricorne* Wesmael, *Bullet. Acad. Sc. Belgique* XVI p. 126 ♀♂ | 1858 A. n. Holmgren, *Svensk. Vet.-Akad. Handl.* II p. 22 ♀♂ | 1892 *Blaptocampus* n. Thomson, *Opusc. Entom.* XVI p. 1766 ♀♂.

Kopf nach hinten nicht erweitert, hinten tief ausgerandet; Gesicht nach unten deutlich verschmälert; Clypeus vorn mit kurzem Zähnchen; Fühler ungefähr von halber Körperlänge. Mesonotum punktiert, vorn fast dreilappig; Brustseiten in der Mitte ziemlich glatt; Schildchen convex, an den Seiten gerandet; Metathorax grob gerunzelt, mit schwachem Längseindruck. Hinterleib ziemlich glatt. — Kopf und Thorax schwarz; Mandibeln ausser den Endzähnen, Clypeus, Gesicht und Spitze der Wangen gelb. Eine gelbe Scheitelmakel beiderseits neben den Augen fehlt. Fühlerschaft unten gelb, Geissel an der Basis zuweilen rötlich. Flügel schwach getrübt; Stigma und Tegulä gelblich. Beine gelbrot, Vorderbeine mehr gelb, die hintersten

Hüften und Schienenspitzen schwarz, die Tarsen gelb, der Metatarsus mit Ausnahme der Spitze bräunlich oder trüb rostrot. Hinterleib rot, das 2. Segment oben, das 5. bis 7. auf dem Rücken und an den Seiten schwarz; Bohrerklappen gelblich.

L. 12—15 mm.

Nord- und Mitteleuropa. Scheint im Norden häufiger zu sein.

2. **B. perspicuus** Wesm. 1849 *Anomalon perspicuum* Wesmael, *Bullet. Acad. Sc. Belgique* XVI p. 127 ♀♂ | 1858 A. p. Holmgren, *Svensk. Vet.-Akad. Handl.* II p. 22 ♀♂ | 1892 *Blaptocampus* p. Thomson, *Opusc. Entom.* XVI p. 1766 ♀.

Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehenden hauptsächlich durch das Vorhandensein von gelben Scheitelpunkten beiderseits neben den Augen, welche bei *B. nigricornis* fehlen. Ferner ist hier nur das 6. und 7. Hinterleibsegment auf dem Rücken und an den Seiten schwarz, während bei *B. nigricornis* auch das 5. Segment schwarz gezeichnet ist. Im Uebrigen stimmen beide Arten überein und könnte man sie wohl auch vereinigen.

Wesmael erwähnt eine Varietät des ♂, bei welcher die Schildchenmitte und die Spitze der hintersten Hüften rot gefärbt ist.

Die Art hat denselben Verbreitungskreis wie die vorige, scheint aber noch seltener zu sein. — Als Wirt wird *Cleora lichenaria* angeführt, aber es ist sehr die Frage, ob die Art richtig erkannt worden ist.

Thomson führt als Synonym von *B. nigricornis* das *Anomalon canaliculatum* Holmgren an. Als Autor dieser Art wird Ratzeburg von Holmgren bezeichnet. Die von Ratzeburg (*Ichneum d. Forstins.* I 1844 p. 90) beschriebene Art ist nicht sicher zu deuten; ich halte sie für *Agrypon flaveolatum*. Dagegen glaube ich, dass das *Anomalon canaliculatum* Holmgr. zu der Gattung *Blaptocampus* gehört. Ich gebe im Folgenden die ausführliche Beschreibung:

**Anomalon** (*Blaptocampus*) **canaliculatum** Holmgr. 1858 A. c. Holmgren, *Svensk. Vet.-Akad. Handl.* II p. 23 ♀♂.

Dem *Agrypon flaveolatum* und *Labrorychus clandestinus* sehr ähnlich. Kopf nicht so aufgetrieben wie bei *flaveolatum*, hinter den Augen nicht erweitert; Stirn flach, runzlig; Gesicht seidenartig behaart, nach unten verengt; Clypeus wie bei *flaveolatum*; Fühler etwas länger als der halbe Körper. Thorax etwas schmaler als der Kopf; Mesonotum stark und tief punktiert, ziemlich glänzend, vorn dreilappig; Brustseiten in der Mitte zerstreut punktiert, ziemlich

glänzend; Schildchen niedergedrückt, gegen das Ende etwas ausgehöhlt, mit namentlich hinter der Mitte stark erhabenen Seitenleisten; Metathorax grob gerunzelt, mit seichter Längsvertiefung. Nervus parallelus aus der Mitte der Brachialzelle; Nervellus weit unter der Mitte gebrochen und einen schwachen Nerv aussendend. Beine ziemlich schlank, die beiden Glieder der hintersten Trochantern an Länge unten gleich; die hintersten Tarsen nur schwach verdickt. Hinterleib ziemlich glatt und glänzend. — Kopf und Thorax schwarz; Palpen, Mandibeln mit Ausnahme der Endzähne, Clypeus, Ende der Wangen und Gesicht gelb; Scheitel ohne gelbe Seitenmakeln; Fühler schwarzbraun, Schaft unten gelb. Flügel schwach gelblich getrübt, Tegulä und Stigma rötlichgelb. Beine rot, beim ♂ die Vorderbeine mehr gelb, Spitze der hintersten Schienen schwarz; die hintersten Hüften und Trochantern beim ♀ meistens ganz rot, beim ♂ gewöhnlich schwarz; Tarsen gelb. Hinterleib rot, auf dem Rücken mehr oder weniger ausgedehnt schwarz; das 1. Segment meist ganz rot.

L. 12—14 mm.

Südliches Schweden.

Die Art würde sich also besonders durch die Form des Schildchens von den beiden vorhergehenden Arten unterscheiden; auch die bei dem ♀ meist rot gefärbten Hinterhüften wären ein Merkmal. — *Brischke* (Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. 1880 p. 137) führt bei Erwähnung des *Anomalon canaliculatum* an, dass die Art gelbe Scheitelmakeln besitze. Er zog sie aus *Hylophila prasinana* und *Hyponomeuta evonymella*. Vielleicht gehören seine Exemplare zu *Blaptocampus perspicuus*.

## 9. Gen. *Erigorgus* Först.

1868 *Erigorgus* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 146.

1905 *Anomalon Szepligeti*, Gen. Ins. Fasc. XXXIV p. 11.

Die Gattung stimmt im Grossen und Ganzen mit *Anomalon* überein und unterscheidet sich hauptsächlich durch den interstitialen 2. rücklaufenden Nerven. Man kann also die Gattung mit *Anomalon* vereinigen; dann müssten freilich auch die übrigen Untergattungen eingezogen werden. Einen Nutzen hätte das nun auch nicht, denn die Merkmale, die zur Unterscheidung der Gattungen dienen, würden dann wieder zur Unterscheidung der Arten benutzt werden müssen.

Clypeus am Vorderrande nur schwach winklig vorgezogen. Fühler im Verhältnis kurz, kaum länger als der halbe Körper.



Mesonotum ziemlich glatt und glänzend. Nervus parallelus in oder unter der Brachialzelle entspringend.

Die Synonymie in dieser Gattung ist eine sehr schwierige. Es sind in letzter Zeit meist auf geringfügige Färbungsunterschiede hin eine Reihe von Arten aufgestellt worden, die ich bereits in meiner Bearbeitung der Anomalinen in der „Zeitschrift für Hymenopterologie und Dipterologie 1902“ zum grössten Teil eingezogen habe.

#### Uebersicht der paläarktischen Arten.

1. Hintertarsen, zuweilen auch gleichzeitig die Vordertarsen in der Mitte weiss. Fühler schwarz. 2.  
Hintertarsen nicht weiss geringelt. 3.

2. Gesicht des ♀ schwarz, des ♂ an den Seiten und auf der Mitte gelblich weiss. Die hinteren Schenkel und Schienen fast ganz schwarz. Hinterleib rot, das 1. Segment fast ganz, das 2. auf dem Rücken und die Endsegmente schwarz.

##### 1. **fibulator** Grav.

Gesicht beim ♀ und ♂ gelblichweiss. Beine und Hinterleib rot, Hüften, Trochantern, Ende der hintersten Schienen und Hinterleibsspitze schwarz.

##### 2. **leucopus** Szepl.

3. Vorder- und Mitteltarsen mit weissem Ring. Die hintersten Beine ganz schwarz. Meist nur die Gesichtsseiten, gewöhnlich auch eine kleine Gesichtsmakel weisslichgelb.

##### 1. **fibulator** Grav. var ♂.

Vorder- und Mitteltarsen ohne weissen Ring. Die hintersten Schienen meist nur an der Spitze schwarz. 4.

4. Gesicht bei ♀ und ♂ schwarz oder rostrot. Beine rot, Hüften und Spitzen der hintersten Schienen schwarz. 5.  
Gesicht ganz oder zum Teil weisslichgelb oder die hintersten Schenkel ausgedehnt schwarz. 6.

5. Gesicht bei beiden Geschlechtern schwarz, die inneren Augentränder kaum rötlich. Kopf und Thorax dicht behaart. Beine rotgelb, Hüften und Trochantern und die hintersten Schienen am Ende schwarz. Flügel gelblich.

##### 3. **villosus** Grav.

Gesicht trüb rostrot. Fühlerschaft unten rötlich, Glied 2 und 3 schwarz, die folgenden rostrot, die Endglieder schwärzlich. Beine rot, Hüften schwarz, Vorderbeine zum Teil gelb, ebenso die Basis des hintersten Metatarsus. Rücken des 2. Segmentes und Endsegmente schwärzlich.

##### 4. **ferrugator** Grav.

6. Fühler rot; Flügel gelblich; Gesicht gelb, hinterer Augenrand zum grössten Teil schmal rot. Kopf und Thorax lang gelblich behaart.

cf. **Anomalon ruficorne** Szepl.

Fühler schwarz; Flügel nur schwach gelblich; Gesicht mehr weisslichgelb gezeichnet. 7.

7. Hintertarsen gelbrot. Gesichtszeichnung sehr veränderlich, beim ♀ der Stammform ganz schwarz.

5. **melanops** Först. ♀.

Hintertarsen rot und schwarz oder braun. Gesicht mit veränderlicher weisslichgelber Zeichnung, nie ganz schwarz.

6. **melanobatus** Grav.

1. **E. fibulator** Grav. 1829 *Anomalon fibulator* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 681 ♀♂ | 1858 A. f. Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 21 ♀♂ | 1892 *Anomalon annulitarse* Thomson, Opusc. Entom. XVI p. 1764 ♀♂.

Kopf und Thorax stark behaart, schwarz, ersterer zumal beim ♂ nach hinten erweitert. Beim ♀ die Augenränder innen und aussen zum Teil rot, beim ♂ Gesichtsseiten und Makel auf der Mitte, Clypeus ganz oder grösstenteils weisslichgelb, Scheitelmakeln und meist äussere Augenränder zum Teil rötlich. Fühler schwarz, Schaft beim ♂ unten gelb gefleckt. Flügel ziemlich stark getrübt, Stigma rötlich, Tegulä braun oder schwarz. Beine schwarz, Vorderbeine beim ♀ grösstenteils rot, beim ♂ mehr gelb, bei letzterem auch die Vordertarsen gelblich weiss. An den hintersten Tarsen sind Glied 2—4, beim ♀ auch die Endhälfte des 1. Gliedes, beim ♂ meist nur Glied 3 und 4 weiss. Hinterleib rot. Das 1. Segment fast ganz, das 2. auf dem Rücken und die Endsegmente schwarz.

Var. ♂. Nur die Vorder- und Mitteltarsen mit weissem Ring; die hintersten Beine ganz schwarz. Gesichtsseiten und meist auch eine kleine Gesichtsmakel weisslichgelb.

L. 15—20 mm.

Zerstreut im nördlichen und mittleren Europa. — Als Wirte werden von Giraud *Diloba coeruleocephala* und *Bombyx castrensis* angegeben.

2. **E. leucopus** Szepl. 1905 *Anomalon leucopus* Szepliget, Ann. Mus. Nat. Hungar. III p. 513 ♀♂.

„Kopf und Thorax punktiert und glänzend. Metanotum runzlig. Clypeus schwach zugespitzt. Fühler etwas länger als der halbe Körper. Mesonotum ohne Parapsidenfurchen; Schildchen gerandet. Rücklaufender Nerv etwas hinter

dem Cubitalquernerv; Nervus parallelus etwas unter der Mitte der Brachialzelle; Nervulus postfurcal, Nervellus in der Mitte gebrochen. Schiensporen lang, Tarsen cylindrisch. — Schwarz; Mandibeln, Clypeus, Gesicht und Schaft unten gelb. Beine und Hinterleib rot; Hüften, Trochantern, Ende der hintersten Schienen und Hinterleibsspitze schwarz; Tarsenglieder 2—4 und Ende des 1. Gliedes weiss. Flügel gelblich, Stigma gelb, Nerven braun.

L. 15—18 mm.

Fundort unbekannt.“

3. **E. villosus** Grav. 1829 *Anomalon villosum* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 676 ♀♂ | 1895 *Anomalon flavipenne* Brauns, Termes. Füzet. XVIII p. 46 ♀.

Kopf und Thorax stark runzlig-punktiert, dicht behaart. Schildchen an den Seiten gerandet. Mesopleuren grob punktiert. — Kopf und Thorax bei beiden Geschlechtern schwarz, die inneren Augenränder kaum rötlich; Palpen blassgelb, Mandibeln in der Mitte gelb. Flügel gelblich getrübt, Stigma rötlichgelb, Tegulä schwärzlich, mit rötlichem Aussenrand. Beine rotgelb, Hüften und Trochantern schwarz, Schienen und Tarsen namentlich beim ♂ mehr gelb, die hintersten Schienen am Ende schwarz. Hinterleib rot, das 1. Segment an der Basis oft schwarz, das 2. Segment oben und die Endsegmente vom 5. an schwarz, das 5. an der Basis und den Seiten gewöhnlich rot.

Nach Brauns ist der rücklaufende Nerv nicht immer interstitial; die dunkle Färbung des Gesichtes weist die Art zu *Erigorgus*.

L. 18—20 mm.

Zerstreut und selten im mittleren Europa. Gravenhorst's Exemplar stammte von Berlin.

4. **E. ferrugator** Grav. 1829 *Anomalon ferrugator* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 663 ♀ | 1903 *Erigorgus ferrugator* Schmiedeknecht, Zeitschr. Hym. Dipt. p. 5.

Kopf schwarz, Palpen und Mitte der Mandibeln gelb, Gesicht und Scheitelrand der Augen dunkel rostrot. Fühler dunkelbraun, Schaft unten rötlich, Glied 2 und 3 schwarz, die übrigen rostrot, die Endglieder schwärzlich. Flügel getrübt, Stigma rötlich, Tegulä schwarzbraun. Beine rot, Hüften schwarz, Vorderbeine zum Teil gelb, ebenso die Basis des hintersten Metatarsus; die hintersten Schienen am Ende schwarz. Hinterleib rot, Rücken des 2. Segmentes, die Endsegmente unten, das 5. auch oben schwarz.

L. 15 mm.

Gravenhorst beschrieb die Art nach einem ♀ von Berlin; ich finde sie sonst nirgends weiter erwähnt; vielleicht ist sie nur eine Färbung des *E. melanobatus*.

5. **E. melanops** Först. 1855 *Anomalon melanops* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XII p. 234 ♀ | 1895 *Anomalon varians* Brauns, Termes. Füzet. XVIII p. 47 ♀.

Diese und die folgende Art war nach der Färbung des Gesichtes und der Hinterbeine, wohl auch des Hinterleibes, in eine Menge Arten zerlegt worden, die ich grösstenteils eingezogen habe. Mit Szepligeti nehme ich nur 2 Arten an, die freilich auch nur auf den Färbungsunterschied der Hinter-tarsen, also sehr schwach begründet sind. Wollte man also noch weiter vereinigen, dann würde bloss noch der *E. melanobatus* übrig bleiben, zu dem, wie bereits gesagt, auch das *Anomalon ferrugator* zu ziehen wäre.

Kopf und Thorax stark behaart; Kopf runzlig-punktiert; hinter den Augen etwas verschmälert; Fühler etwas länger als Kopf und Thorax. Mesonotum fein punktiert und ziemlich glänzend; Prothorax und Brustseiten grob runzlig-punktiert, Speculum nur schwach angedeutet; Metathorax runzlig-punktiert, ohne Längsvertiefung. Nervus parallelus unterhalb der Mitte der Brachialzelle; Nervellus unter der Mitte gebrochen. — Kopf und Thorax schwarz, Mandibeln mit Ausnahme der Zähne gelb, Orbiten an den Schläfen rot, Gesicht ganz schwarz oder an den Seiten, zuweilen auch ein Fleck in der Mitte gelb; Fühler schwarz. Stigma rötlich, Tegulä schwarz. Beine rot, Hüften, Basis der Trochantern, die hintersten Schenkel zum grössten Teil und die Spitze der hintersten Schienen schwarz; Tarsen rötlichgelb, die hintersten am Ende kaum verdunkelt. Beim ♂ die Vorderbeine zum Teil gelb. Hinterleib rot, das 1. Segment an der Basis schmal schwarz, das 2. Segment auf dem Rücken, die Endsegmente vom 5. an schwarz.

L. 10—16 mm.

Zerstreut im mittleren und südlichen Europa.

Zu *E. melanops* stellt Szepligeti (Ann. Mus. Nat. Hungar. III 1905 p. 511) die folgenden Arten und Varietäten. Es bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten, diese Verteilung auf ihre Richtigkeit zu prüfen und weitere Klärung zu schaffen.

Nervulus interstitial:

1. ♂. Gesicht neben den Augen weiss. Hinterschenkel und das 1. Segment rot. (Exemplare aus Italien.)
2. ♂. Gesicht weiss, mit 2 schwarzen Streifen. Hinterschenkel und das 1. Segment an der Basis schwarz.

— *E. interstitialis* Szepl. Termes. Füzet. XXII, 1899 p. 214 u. 231.

3. ♂. Gesicht weiss, mit 2 schwarzen Streifen. Das 1. Segment und die Hinterschenkel ganz, die Vorder- und Mittelschenkel aussen schwarz.

Nervulus postfurcal:

4. ♂. Gesicht mit 2 schwarzen Streifen. Hinterschenkel und das 1. Segment rot.
5. ♀♂. Seiten des Gesichts und oft auch ein Fleck in der Mitte weisslich. Hinterschenkel fast ganz, das 1. Segment an der Basis (selten beim ♂ ganz) schwarz.

= *E. flavimanus* Szepl. l. c. p. 214 und 232.

6. ♂. Gesicht ganz weiss. Hinterschenkel fast ganz und das 1. Segment an der Basis schwarz.

Hierher gehören ferner noch:

*E. purpuratae* Kriechbaumer, Ent. Nachr. XXVI (1900) p. 172 ♀♂: Schwarz, Clypeus, Gesicht, Augenränder zum Teil, Segment 2 und 3 oder 2—4, Rücken von 2 oder 2 und 3 ausgenommen, Schenkel, Schienen und Tarsen rot, die hintersten Schienen am Ende breit schwarz, die hintersten Tarsen gelb. — Wurde aus *Arctia purpurata* gezogen.

*E. apollinis* Kriechbaumer, Ent. Nachr. XXVI (1900) p. 174 ♀♂: Beim ♀ die Gesichtsseiten, beim ♂ nur ein Fleck im Gesicht weisslichgelb. Basis der Hinterschenkel und das 1. Segment fast ganz schwarz. — Aus *Parnassius apollo*.

6. ***E. melanobatus*** Grav. 1829 *Anomalon melanobatum* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 662 ♂ | 1892 *Anomalon claripenne* Thomson, Opusc. Entom. XVI p. 1764 ♀♂ | 1899 *Erigorgus similis* Szepligeti, Termes. Füzet. XXII p. 214 u. 232.

Kopf und Thorax schwarz; Gesicht gelblichweiss, selten mit 2 schwarzen Streifen oder nur an den Seiten und in der Mitte weiss; beim ♂ die Augenränder am Scheitel zuweilen rötlich. Fühler schwarz, Schaft beim ♂ unten gelb. Flügel nur schwach getrübt, Stigma rötlich, Tegulä schwarz. Beine rot, Hüften, Trochantern zum Teil, Streifen der Vorderschenkel und die hintersten Schenkel fast ganz schwarz. Die hintersten Schienen trüb rot, am Ende breit schwarz, die hintersten Tarsen rötlich, die Basalglieder am Ende, die Endglieder ganz schwarz. Beim ♂ die Vorderbeine zum Teil gelb. Hinterleib rot, das 1. Segment meist mit Ausnahme des Endrandes schwarz, der Rücken des 2. Segmentes und die Endsegmente mehr oder weniger ausgedehnt schwarz.

Var. 1. ♀. Gesichtsseiten weisslichgelb. Hinterschenkel und das 1. Segment rot.

= *Anomalon brevicorne* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XII (1855) p. 236 ♀ (non Gravenhorst).

Var. 2. ♀. Wie Var. 1, aber das 1. Segment schwarz.

L. 15—20 mm.

Zerstreut durch einen grossen Teil von Europa.

## 10. Gen. **Acanthostoma** Kriechb.

1894 *Acanthostoma* Kriechbaumer, Ber. Naturf. Ges. Leipzig p. 129.

Kopf quer, hinter den Augen erweitert; Clypeus in der Mitte des Endrandes mit spitzem Zahn; Fühler schlank borstenförmig, wenig kürzer als der Körper. Mesonotum dreilappig, der mittlere Lappen mit Längseindruck; Metathorax netzförmig gerunzelt, der Länge nach ausgehöhlt; Schildchen kurz, erhaben, mit Längseindruck. Rücklaufender Nerv interstitial; Nervellus weit unter der Mitte gebrochen. Beine schlank, die hintersten Tarsen beim ♂ schwach erweitert, der hinterste Metatarsus mehr als doppelt so lang als das folgende Glied; Klauen einfach.

Schliesst sich an die Gattung *Erigorgus* an, unterscheidet sich am besten durch die langen Fühler, auch durch die auffallende Grösse.

**A. japonicum** Kriechb. 1849 A. j. Kriechbaumer, l. c. p. 130 ♀ ♂.

Kopf und Thorax runzlig-punktiert, schwarz; Mitte der Mandibeln, Clypeus, Gesicht und Wangen gelb; Fühler mit Ausnahme der Basis rötlich. Flügel schwach gelblich-getrübt, mit rötlichem Stigma. Beine rot, Vorderbeine zum Teil gelb, an den hintersten Beinen die Hüften, Oberseite der Schenkel und Spitze der Schienen schwarz; die hintersten Tarsen gelb, an der Basis rot. Hinterleib schwärzlich, Basis des 1. Segmentes, Bauchsegmente 2—6 und Segment 2 und 3 an den Seiten rot. Bohrer vorstehend.

Beim ♂ sind die Fühler etwas länger, Vorderhüften gelb.

L. 28—31 mm.

Japan (Jokohama).

## 11. Gen. **Hadromanus** Szepl.

1905 *Hadromanus* Szepligeti, Gen. Insect. XXXIV p. 14.

Kopf namentlich beim ♂ hinter den Augen erweitert, wie der Thorax dicht und grob punktiert, dabei ziemlich glänzend;

Fühler halb so lang wie der Körper; Clypeus am Endrand etwas zurückgebogen und in der Mitte desselben mit Zähnchen. Parapsiden nicht ausgebildet; Schildchen gewölbt und nicht gerandet. Metathorax punktiert, hinten quergerunzelt. Discoidalzelle länger als die Brachialzelle; 2. rücklaufender Nerv deutlich hinter dem Cubitalquernerv; Nervulus etwas postfurcal; Nervus parallelus über der Mitte der Brachialzelle; Nervellus kurz über der Mitte gebrochen und einen Nerv aussendend. Beine gedrunken, Hüften unten glatt und glänzend, Trochanter länger als Trochantellus, Sporn kaum länger als die Breite des Schienenendes, Tarsen etwas erweitert, Metatarsus so lang wie die folgenden Glieder zusammen und mehr als 3 mal länger als das zweite, fast quadratische Tarsenglied.

**H. laevicoxis** Schmiedekn. 1900 *Anomalon* (Labrorychus) *laevicoxe* Schmiedeknecht, Termes. Füzet. XXIII p. 241 ♀♂ | 1903 *Labrorychus laevicoxis* Schmiedeknecht, Zeitschr. Hym. Dipt. p. 79 ♀♂.

Kopf und Thorax grau behaart. Kopf bei ♀ und ♂ ganz schwarz, nur eine grosse braunrote Makel oben hinter den Augen. Fühler schwarz. Thorax schwarz. Flügel schwach getrübt, mit schwärzlichen Nerven und gelblichem Stigma. Beine rot, Hüften schwarz, die hintersten Schienen und Tarsen dunkelbraun; beim ♂ die Vorderschienen gelb, die hintersten nur an der Spitze braun. Hinterleib rot, das 2. und die Endsegmente auf dem Rücken schwarz.

L. 18–20 mm.

Die Art wurde von mir in ganz Algerien und Tunesien gefunden.

## 12. Gen. **Labrorychus** Först.

1868 *Labrorychus* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 146.

Nervus parallelus deutlich über der Mitte der Brachialzelle entspringend. Nervellus gebrochen und einen deutlichen Nerv aussendend. Der hinterste Metatarsus nur 2 mal so lang als das folgende Tarsenglied. Fühler dünn, wenig kürzer oder so lang wie der Körper. Im Uebrigen mit *Hadromanus* übereinstimmend.

Uebersicht der paläarktischen Arten:

1. Schläfen rot oder rot gefleckt. 2.

Schläfen schwarz; auch die Hüften schwarz. 9.

2. Metathorax in der Mitte der Länge nach tief ausgehöhlt. Fühler kräftig, etwas kürzer als der Körper. Beine rot, Hüften, Basis der Hinterschenkel und Basis und Spitze der hintersten Schienen schwärzlich, die Hintertarsen rötlich.

1. **polyxenae** Szepl.

Metathorax nicht oder nur schwach ausgehöhlt. 3.

3. Der ganze Körper rot mit gelber Zeichnung. Fühler und Beine fast ganz rot. Das 2. Segment oben schwarz.

2. **amabilis** Tosqu.

Kopf und Thorax grösstenteils schwarz. 4.

4. Fühler von Körperlänge oder nur wenig kürzer. 5.

Fühler kaum länger als der halbe Körper. 7.

5. Metathorax deutlich der Länge nach vertieft. Nervellus nur schwach gebrochen und keinen deutlichen Nerven ausendend. Grössere Art von 16—18 mm.

cf. 1. **polyxenae** Szepl.

Metathorax nicht oder nur schwach der Länge nach vertieft. Nervellus meist deutlich gebrochen. 6.

6. Kopf hinten deutlich erweitert. Fühler deutlich so lang wie der Körper. Hinterhüften meist schwarz, die Spitzen der hintersten Schienen meist nicht deutlich verdunkelt. Hinterleibsende schwarz.

3. **tenuicornis** Grav.

Kopf nach hinten verschmälert. Fühler eher etwas kürzer als der Körper. Beine rot, Vorderhüften gelb, Spitzen der hintersten Schienen und die Tarsen schwarzbraun. Hinterleib rot, meist nur der Rücken des 2. Segmentes schwarz.

4. **debilis** Wesm.

7. Gesicht, namentlich beim ♂, vortretend wie bei der Gattung *Exochus*, gelb. Die hintersten Schenkel beim ♀ mit schwarzem Streif, beim ♂ fast ganz schwarzbraun. Die hintersten Schienen braun, an der Basis weisslich. Die hintersten Tarsen schwarz, nicht verbreitert.

5. **exquisitus** Tosqu.

Gesicht nicht vortretend. Hinterschinkel mit anderer Zeichnung. 8.

8. Schildchen buckelig, beiderseits rot gefleckt. Die hintersten Schenkel an Basis und Spitze schwarz. Clypeus und Gesicht gelb. Die vordersten Beine gelb, Schenkel hinten rot, die hintersten Hüften und Schienenspitzen schwarz.

6. **paradoxus** Brauns.

Schildchen schwarz. Hinterschinkel rot. Clypeus und Gesicht gelb.

cf. 8. **clandestinus** Grav.



9. Kopf bei ♀ und ♂ ganz schwarz, nur eine braunrote Makel oben hinter den Augen. Die hintersten Schienen und Tarsen dunkelbraun.

cf. **Hadromanus laevicoxis** Schmiedekn.

Innere Augenränder oder das ganze Gesicht gelb. Scheitel mit kleinen gelben Seitenflecken. 10.

10. Gesicht des ♀ schwarz, neben den Augen meist ein feiner weisslicher Streif; beim ♀ Gesichtsseiten und ein Längsfleck oder Streif in der Mitte blassgelb. Segment 2—4 in der Regel ganz rot.

7. **delarvatus** Grav.

Gesicht bei ♀ und ♂ ganz gelblichweiss. Die mittleren Segmente, namentlich das 2., auf dem Rücken schwarz.

8. **clandestinus** Grav.

1. **L. polyxenae** Szepl. 1899 Labrorychus polyxenae Szepligeti, Termes. Füzet. XXII p. 234 ♂.

Fühler kräftig, etwas kürzer als der Körper. Schildchen ganz gerandet. Metathorax grob netzartig gerunzelt, längs der Mitte tief ausgehöhlt, an der Basis mit 2 Seitenfeldern, welche glatter als die Umgebung sind. Nervellus tief unten gebrochen, zuweilen fast ungebrochen, der ausgehende Nerv undeutlich oder fehlend. — Kopf und Thorax schwarz, Gesicht und Mandibeln gelb, letztere an der Spitze schwarz; Scheitelflecke rotbraun; Fühlergeissel unten rötlich. Flügel gelblich, Nervatur schwarz, Stigma gelblich, Tegulä rotbraun. Beine rot, Hüften, die hinteren Trochantern, Basis der Hinterschenkel und Basis und Spitze der Hinterschienen schwarz, Hintertarsen rötlich.

L. 16—18 mm.

Ungarn.

Die Grösse und der tief der Länge nach gefurchte Metathorax charakterisieren diese Art; von *L. tenuicornis* ist sie ausserdem durch die kürzeren und stärkeren Fühler verschieden — Der Autor hat vergessen, die Färbung des Hinterleibes anzuführen.

Die Art wurde aus *Doritis apollinus* und *Thais Polyxena* gezogen.

2. **L. amabilis** Tosqu. 1899 Anomalon amabile Tosquinet. Ann. Soc. Entom. Belgique p. 171 ♀ | 1903 *L. transcaspicus* Kokujev, Revue Russe Entomol. VI, p. 389 ♀.

Körper schlank, dicht runzlig-punktiert. Kopf hinter den Augen etwas erweitert; Fühler borstenförmig, kaum länger als Kopf und Thorax. Kopf und Thorax kurz weisslich

behaart; Mesonotum und Brustseiten stark punktiert; Schildchen dicht punktiert, glänzend, in der Mitte mit Längseindruck; Metathorax grob runzlig - punktiert, mit schwacher Längsfurche. Flügel kurz, Nervulus postfurcal, Nervellus unter der Mitte gebrochen, der ausgehende Nerv deutlich. Beine lang und schlank, Tarsen wenig erweitert, der hinterste Metatarsus  $2\frac{1}{2}$  mal so lang als das folgende Glied. Hinterleib fast 3 mal so lang als Kopf und Thorax zusammen, glatt und glänzend. — Der ganze Körper rot mit gelber Zeichnung. Gesicht und Clypeus, Streifen auf dem Mesonotum, Schildchen, Hinterschildchen, Flecken auf den Brustseiten und Metathorax gelb. Fühler rot, an der Basis schwarz. Flügel hyalin, Stigma gelblich. Vorderbeine gelb, Hinterbeine gelbrot, die hintersten Schienen braun, an der Basis weisslich, am Ende schwarz; Tarsen rötlich, gegen das Ende braun. Hinterleib gelbrot, das 2. Segment oben schwarz.

L. 15 mm. — Nur das ♀ bekannt.

Sarepta in Südrussland. Transkaspien.

3. **L. tenuicornis** Grav. 1829 *Anomalon tenuicorne* Gravenhorst, *Ichneum. Eur.* III p. 671 ♀♂ | 1892 *Agrypon tenuicorne* Thomson, *Opusc. Entom.* XVI p. 1769 ♀♂.

Kopf hinter den Augen verbreitert; Scheitel tief ausgerandet; Gesicht nach unten deutlich verengt, punktiert. Schläfen dicht punktiert; Wangen mit lamellenartigem Rand. Fühler mindestens so lang wie der Körper, eher etwas länger. Mesonotum ziemlich zerstreut punktiert, ohne deutliche Parapsidenfurchen; Schildchen an den Seiten gerandet; Metathorax flach, runzlig. Nervellus unter der Mitte gebrochen, der ausgehende Nerv ziemlich schwach. Beine schlank, die vordersten Hüften mit Querkel die hintersten Tarsen bei beiden Geschlechtern nicht erweitert. Hinterleib schlank. — Kopf und Thorax schwarz, ziemlich reichlich behaart. Clypeus, Gesicht, beim ♀ auch die Wangen, gelb. Schläfen mit roter Makel oder ganz rot. Fühler schwarz, Schaft unten gelb, Geissel an der Basis unten rötlich. Flügel leicht getrübt, Stigma trüb rot, Tegula rötlichgelb. Beine rötlichgelb, beim ♂ die Vorderbeine zum Teil gelb. Hüften bei grösseren Exemplaren gewöhnlich ausgedehnt rot, bei kleineren meist schwarz; beim ♂ sind die Vorderhüften grösstenteils gelb. Die hintersten Schenkel an der Basis zuweilen braun, die hintersten Schienenenden gewöhnlich nicht verdunkelt, die hintersten Tarsen rot, gegen das Ende braun. Hinterleib rot, am Ende und auf dem Rücken braun.

Var. ♀ *anaitidis* Szepl. 1899 *Labrorychus anaitidis* Szepligeti, Termes. Füzet. XXII p. 233 ♀. Hinterbeine fast ganz schwarz, Schenkel unten rotbraun. 12 mm. Ungarn.— Aus *Anaitis plagiata*.

L. 12—16 mm.

Ueber ganz Europa verbreitet und eine der häufigsten Arten. Aus *Hyponometa padella*, *malinella* und *evonymella*, *Anisopteryx aescularia* und *Thais polyxena*.

4. **L. debilis** Wesm. 1849 *Anomalon debile* Wesmael, Bull. Acad. Sc. Belgique XVI p. 133 ♀♂ | 1899 *Labrorychus variegatus* Szepligeti, Termes. Füzet. XXII p. 216 und 234 ♀.

Diese Art unterscheidet sich von dem verwandten *L. tenuicornis* hauptsächlich durch den nach hinten verschmälerten Kopf. Nach Wesmael ist der Schaft gelbrot und die Schläfen ganz schwarz; nach Szepligeti ist der Schaft nur unten gelb und die Schläfen sind rot. Gesicht und Wangen gelb. Fühler nahe von Körperlänge. Beine rot, die vorderen Hüften und Trochantern gelb; die hintersten Trochantern, die Spitzen der hintersten Schienen und des Metatarsus und die übrigen Tarsenglieder schwärzlich. Hinterleib rot, der Rücken des 2. Segmentes braun. Die Bohrerklappen sind nach Wesmael schwarz, nach Szepligeti gelblich.

Grösse von *L. tenuicornis*.

Mittleres Europa.

Krieger (Zeitschr. Hym. Dipt. 1904 p. 173) hält *L. debilis* für eine gute Art. Mir ist sie nie vorgekommen. Ob der *L. variegatus*, den der Autor selbst neuerdings zu *debilis* stellt, wirklich mit dieser Art identisch ist, scheint mir sehr fraglich.

5. **L. exquisitus** Tosqu. 1889 *Anomalon exquisitum* Tosquinet, Ann. Soc. Entom. Belgique XXXIII p. 20.

Gesicht, zumal beim ♂, vortretend wie bei der Gattung *Exochus*. Die hintersten Schenkel beim ♀ mit schwarzem Streif, beim ♂ fast ganz schwarzbraun. Beine sonst rot, Vorderhüften an der Basis schwarz, die hintersten Schienen fast ganz schwarz; die hintersten Schienen braun, an der Basis weisslich, die hintersten Tarsen schwarz, bei ♀ und ♂ nicht verbreitert. Gesicht gelb, Schläfen rot, Thorax schwarz, Prothorax beim ♀ unten rot. Tegulä gelb. Hinterleib rot, das 1. Segment an der Basis, das 2. auf dem Rücken schwarz, die übrigen Segmente oben verdunkelt, beim ♂ die Endsegmente ganz schwarz.

L. 11—22 mm.

Ost-Sibirien.

6. **L. paradoxus** Brauns. 1895 *Anomalon paradoxum* Brauns, Termes. Füzet. XVIII p. 45 ♀ | 1903 *Laphyctes paradoxus* Schmiedeknecht, Zeitschr. Hym. Dipt. p. 74 ♀.

Kopf und Thorax ziemlich behaart, ersterer nach hinten nicht verschmälert; Scheitel ziemlich breit; Gesicht fein punktiert, Schläfen glänzend, zerstreut punktiert; Fühler etwas länger als der halbe Körper. Thorax namentlich an den Seiten dicht punktiert; Schildchen convex, stark punktiert, an den Seiten kaum gerandet; Metathorax runzlig, an den Seiten fast netzartig. Nervellus unter der Mitte gebrochen; rücklaufender Nerv hinter dem Cubitalquernerv. — Kopf und Thorax schwarz, Mandibeln mit Ausnahme der Spitze, Clypeus und Gesicht gelb; Schläfen mit grosser roter Makel; Schaft unten gelb, Geissel namentlich unten bräunlich oder rötlich. Prothorax an den Seitenwinkeln unten rot, Schulterbeulen gelblich, Schildchen mit roten Seitenflecken. Flügel gelblich getrübt, Stigma rötlich, Tegulä gelb. Beine rot, die vordersten gelb, die Schenkel hinten rötlich. Mittel- und Hinterhüften und zum Teil Trochantern schwarz, Mittelhüften am Ende gelb. An den hintersten Beinen die Schenkel an Basis und Spitze schwarz, die Schienen aussen gelb, innen und am Ende schwarz; die Tarsen dunkel, die Basis der Glieder, namentlich das Metatarsus rötlichgelb.

L. 17 mm.

Mehadia in Südungarn.

7. **L. delarvatus** Grav. 1829 *Anomalon delarvatum* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 678 ♀♂ | 1899 *Anomalon guttiger* Szepligeti, Termes. Füzet. XXII p. 215 und 233 ♂ | 1899 *Labrorychus nigrifrons* Szepligeti, l. c. p. 217 u. 234 ♀ | 1904 *Labrorychus delarvatus* Krieger, Zeitschr. Hym. Dipt. Heft 3, p. 174 ♀♂.

Kopf und Thorax graulich behaart, dicht runzlig punktiert, schwach glänzend. Kopf etwas breiter als der Thorax, nach hinten deutlich verschmälert, Gesicht nach unten ziemlich stark verengt; Fühler wenig kürzer als der Körper. Brustseiten ziemlich zerstreut punktiert und deshalb ziemlich glänzend; Schildchen und Metathorax stark gerunzelt, matt, der Metathorax der Länge nach nur schwach vertieft. Der rücklaufende Nerv mündet ziemlich weit hinter dem Cubitalquernerv; Nervus parallelus nur wenig über der Mitte der Brachialzelle, also tiefer als bei den übrigen *Labrorychus*-Arten. Nervellus bei allen meinen Exemplaren etwa in der Mitte stark gebrochen und einen deutlichen Nerven aussendend. Beine schlank, Vorderhüften mit Querleiste, die hintersten Tarsen deutlich verdickt, der Metatarsus fast doppelt so lang als das folgende Glied. Hinterleib

fast 3 mal so lang als Kopf und Thorax zusammen. — Kopf und Thorax schwarz; beim ♀ das Gesicht an den Seiten in der Regel mit feinem weisslichen Streif, seltener ganz schwarz; beim ♂ sind die Gesichtsseiten und ein Streif in der Mitte blassgelb; diese 3 Streifen verschmelzen gewöhnlich unten; ausserdem sind die Mandibeln oben gelb gestreift. Scheitel bei beiden Geschlechtern mit gelben Seitenpunkten. Fühler schwarz, die Geissel mit Ausnahme der Basalglieder unten rötlich; Schaft beim ♂ unten gelb. Flügel fast hyalin, Stigma in der Mitte gelblich. Beine rot, Hüften und Trochantern schwarz, die hintersten Schienen bräunlich, gegen das Ende schwarz, die hintersten Tarsen bräunlichgelb. Beim ♂ sind die vordersten Schienen und Tarsen gelblich, auch die Trochantern hell. Charakteristisch für diese Art ist die Hinterleibsfärbung, indem Segment 2—4 ganz rot sind, das 2. Segment also auf dem Rücken nicht schwarz ist; das 1. Segment ist an der Basalhälfte schwarz, sonst rot.

L. 12—16 mm.

Verbreitet im mittleren und südlichen Europa. Hier in Thüringen im Spätsommer die häufigste *Anomalini*-Art.

8. **L. clandestinus** Grav. 1829 *Anomalon clandestinum* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 670 ♀♂ | 1857 A. affine Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Forh. XIV p. 181 ♀♂ | 1858 A. c. Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 26 ♀♂.

Körper schlank. Kopf und Thorax dünn und kurz graulich behaart, fein runzlig - punktiert und ziemlich glänzend. Kopf etwas breiter als der Thorax, nach hinten schwach verschmälert; Fühler wenig kürzer als der Körper. Mesonotum mit deutlichen Parapsidenfurchen, Brustseiten in der Mitte glatt und glänzend; Schildchen niedergedrückt, gerunzelt; Metathorax grob gerunzelt, an der Basis mit Spur von glatteren Seitenfeldern. Nervulus postfurcal; Nervus parallelus weit über der Mitte der Brachialzelle; Nervellus unter der Mitte gebrochen, der ausgehende Nerv schwach. Die hintersten Beine verdickt, Trochanter und Trochantellus unten von gleicher Länge; an den schwach verdickten Tarsen der Metatarsus so lang wie die folgenden Glieder zusammen. Hinterleib 3 mal so lang als Kopf und Thorax zusammen. — Kopf und Thorax schwarz, Mandibeln mit Ausnahme der Zähne, Clypeus, Wangen und Gesicht blassgelb; Fühlerschaft unten gelb; Basalglieder der Geissel schwarz, die folgenden unten rötlich. Schulterbeulen gelb. Beine rot, die vorderen Hüften und Trochantern gelb, die Hüften an der Basis hinten zum Teil schwärzlich. An den

hintersten Beinen die Hüften mit Ausnahme der Spitze und der Trochanter schwarz; Basis der Schenkel, Spitze der Schienen und die Tarsen gebräunt. Bei dem ♂ sind die Vorderbeine reicher gelb, auch die hintersten Schienen ausgedehnt gelblich, die hintersten Tarsen heller, mehr rötlich. Hinterleib gelbbrot, Basis des 1. Segmentes schwarz, die folgenden Segmente auf dem Rücken gebräunt. Bei meinen zahlreichen Stücken sind die Endsegmente bei ♀ und ♂ nur auf dem Rücken verdunkelt.

Var. *affinis* Holmgr. (*Anomalon affine* Holmgr.) Wie die Stammart, aber grösser und die hintersten Hüften rot.

L. 10—13 mm.

Zerstreut in ganz Europa. Hier in Thüringen ist die Art mir nie vorgekommen, dagegen erhielt ich zahlreiche Stücke durch den bekannten Lepidopterologen, Amtsgerichtsrat Püngeler in Aachen vom Canigou in den Pyrenäen aus einer Höhe von 2000 m. Sie waren aus *Veratraria*-Puppen geschlüpft, viele erst nach zweimaliger Ueberwinterung.

### 13. Gen. **Barylypa** Först.

1868 *Barylypa* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 146.  
Incl.:

1868 *Laphyctes* Förster, ibidem, p. 146 (non Stal)  
= *Sarntheinia* Dalla-Torre, Catal. Hymen. Vol. III (1901) p. 161.

Ich folge dem Vorschlage Kriegers und ziehe *Laphyctes* mit *Barylypa* zusammen, da der Unterschied in der Bildung des Clypeusrandes zu wenig hervortritt.

Clypeus am Vorderrande mehr oder weniger zugerundet, zuweilen mit Andeutung einer Spitze (*Laphyctes*). Parapsidenfurchen fehlen. Der 2. rücklaufende Nerv interstitial. Nervus parallelus über der Mitte der Brachialzelle entspringend (bei *Erigorgus* in oder unter Mitte). Nervellus gebrochen. Die hintersten Tarsen wenig oder nicht verbreitert.

#### Uebersicht der paläarktischen Arten.

1. Schildchen ganz oder zum Teil gelb oder rot. Thorax nur ausnahmsweise ganz schwarz. 2.  
Schildchen mit dem übrigen Thorax ganz schwarz. 5.
2. Grosse Arten von 16—24 mm. Schildchen gelb. 3.  
Kleine Arten von 10—12 mm. Schildchen rot. 4.

3. Kopf aufgetrieben; Clypeus in der Mitte des Endrandes winklig vorspringend. Thorax beim ♀ schwarz und rot, beim ♂ schwarz mit gelben Flecken. Schildchen mit grossen gelben Seitenmakeln, die beim ♀ meist rot gerandet sind. Grosse Art von 20—24 mm.

1. **formosa** Schmiedekn.

Kopf nach hinten nicht erweitert; Clypeus am Ende abgerundet. Färbung von Kopf und Thorax sehr verschieden. Schildchen gelb. Mittelgrosse Art von 16—18 mm.

2. **humeralis** Brauns.

4. Fühler etwa von halber Körperlänge; Schaft rot. Thorax ausgedehnt rot gefärbt. Hinterleib rot, Rücken des 2. Segmentes und Hinterleibsende schwarz.

3. **rufa** Holmgr. ♀.

Fühler fast so lang wie der Körper; Schaft oben schwarz. Hinterleib rot, Segment 2—4 oben schwarz.

4. **rubricator** Szepl.

5. Fühler fast von Körperlänge. 6.

Fühler deutlich kürzer als der Körper. Die hintersten Schienen meist nur an der äussersten Basis hell. 7.

6. Beine grösstenteils schwarz; Vorderschenkel an der Spitze, Schienen und Tarsen rot. Gesicht grösstenteils gelb. Nur das ♀ bekannt.

5. **longicornis** Brauns.

Beine grösstenteils rot und gelb. Mittelhüften an der Basis, die hintersten ganz, Hinterschenkel oben und die hintersten Schienen an der Spitze schwarz. Clypeus und Gesicht gelb.

6. **carinata** Brischke.

7. Gesicht nicht ganz gelb; entweder mit gelber Längsmakel oder an den Seiten und in der Mitte gelb. 8.

Gesicht ganz gelb. 9.

8. Gesicht nur mit gelber Längsmakel in der Mitte. Hinterleib fast ganz schwarz, nur Segment 2—4 verloschen braunrot. Beine grösstenteils schwarz.

7. **uniguttata** Grav. ♀ ♂.

Gesicht gelb mit 2 schwarzen Längsstreifen oder schwarz mit 3 gelben Längsstreifen. Die rote Färbung des Hinterleibs ausgedehnter.

3. **rufa** Holmgr. ♂.

Anmerk. Man vergleiche auch *B. perspicillator*.

9. Hinter den Augen ein roter Fleck. Beine rot, Hüften ganz oder zum grössten Teil, Oberseite der Hinterschenkel und die Spitzen der hintersten Schienen schwarz. Hinterleib rot, der Rücken des 2. Segmentes und die Endsegmente schwarz.

8. **insidiator** Först. ♀♂.

Hinter den Augen kein roter Fleck. Die hintersten Schienen dunkel, nur an der Basis etwas heller. 10.

10. Grössere Art von 18—20 mm. Beine dunkel gefärbt; alle Hüften schwarz; die vordersten Schenkel rötlich, Mittelschenkel schwarz, an der Spitze rot; die hintersten Beine fast ganz schwarz. Beim ♂ Vorder- und Mittelschenkel oben mit schwarzer Linie.

9. **perspicillator** Grav. ♀♂.

Kleinere Art von etwa 15 mm. Vorderbeine rotgelb, Hüften an der Basis oder ganz schwarz. An den hintersten Beinen die Hüften schwarz, die Schenkel an Basis und Spitze oder oben ganz schwarzbraun, Schienen und Tarsen schwärzlich, die ersteren an der Basis schmal blassgelb. Nur das ♂ bekannt.

10. **pallida** Grav.

1. **B. formosa** Schmiedeknecht. 1900 *Anomalon* (Laphyctes) *formosum* Schmiedeknecht, *Termes. Füzet.* XXIII p. 239 ♀♂ | 1903 *Laphyctes formosus* Schmiedeknecht, *Zeitschr. Hym. Dipt.* Heft 3, p. 75 ♀♂.

Kopf aufgetrieben, dicht und grob punktiert, ziemlich behaart; Fühler kaum länger als der halbe Körper; Clypeus in der Mitte des Endrandes winklig vortretend. Thorax schwach glänzend; Mesonotum zerstreut punktiert; Metathorax dicht runzlig, matt. Nervus parallelus weit über der Mitte der Brachialzelle; Nervellus in der Mitte gebrochen und einen deutlichen Nerven aussendend. Beine schlank, die hintersten Tarsen kaum verdickt. — Kopf rot, oben schwarz; Clypeus, Gesicht und Unterseite des Schaftes gelb; Fühler trüb rot, an der Basis schwarz. Rot sind am Thorax des ♀ der grösste Teil des Prothorax, Hakenflecken vorn auf dem Mesonotum, ein grosser Querfleck hinter der Mitte, Seitenflecke der Brust und des Metathorax; Schildchen mit gelben, innen rötlich eingefassten Seitenflecken. Flügel fast hyalin, Stigma rötlichgelb, Tegulä weisslichgelb. Beine rot, alle Hüften braun gefleckt; Vorderschienen zum Teil gelb; die hintersten Schienen an der Aussenseite und Spitze und die hintersten Tarsen braun, die Schienen an der Basis weisslich. Hinterleib rot, Rückenstreif des 2. Segmentes und Endsegmente schwarz.



Beim ♂ ist die rote Färbung des Kopfes auf einen grossen Fleck hinter den Augen und die helle Thoraxfärbung auf einige gelbe Flecken beschränkt. Die gelben Seitenflecken des Schildchens sind so gross, dass in der Mitte nur ein schwarzer, meist nach vorn verbreiteter Längsstreif übrig bleibt. Vorderbeine blassgelb, die Schenkel hinten rot; an den hintersten Beinen sind die Schenkel rot, die Schienen an der Basis und Innenseite gelblich, die Hüften, Trochantern, Basis und Spitze der Schenkel und der grösste Teil der Schienen und Tarsen schwarz.

L. 20—24 mm.

Ich fand die Art zuerst bei Hammam-Bou-Hadjar südlich von Oran in Algerien; neuerdings fing ich einige Exemplare bei Syrakus auf Sizilien.

2. **B. humeralis** Brauns. 1895 *Anomalon humerale* Brauns, Termes. Füzet. XVIII p. 44 ♂ | 1903 *Barylypa humeralis* Schmiedeknecht, Zeitschr. Hym. Dipt. Heft 3, p. 7 ♂ | 1896 *Anomalon renidens* Tosquinet, Mem. Soc. Ent. Belgique V p. 397 ♀ | 1900 *Anomalon elegantulum* Schmiedeknecht, Termes. Füzet. XXIII p. 240 ♀.

Kopf hinter den Augen kaum erweitert; Gesicht stark punktiert, matt; Schläfen zerstreut punktiert und ziemlich glänzend; Fühler länger als der halbe Körper. Mesonotum fein punktiert, glänzend; Mesopleuren mit grober Punktierung und deutlichem Speculum; Schildchen convex, nur an der Basis seitlich gerandet; Metathorax grob gerunzelt, deutlich der Länge nach gefurcht. Nervus parallelus über der Mitte der Brachialzelle; rücklaufender Nerv interstitial; Nervellus oppositus, unter der Mitte gebrochen. — Kopf und Thorax rot, hier und da schwärzlich, mit gelber Zeichnung. Gelb sind die inneren Augenränder, Gesicht, Längsmakel beiderseits vorn auf dem Mesonotum und das Schildchen. Fühler rötlich, Schaft unten gelb. Brust in der Regel schwarz. Beine rot, die vorderen zum Teil gelb; die hintersten Schienen und Tarsen braunrot, die Schienen an der Basis weisslich. Hinterleib gelbrot, das 2. Segment oben mit dunklem Längsstreif.

Beim ♂ Kopf und Thorax schwarz, Mandibeln ausser der Spitze, Clypeus und Gesicht gelb, Wangen kaum gelb gezeichnet. Schläfen mit grosser braunroter Makel; Fühler bräunlich, Schaft unten gelb. Thorax mit gelblichem Schulterfleck, auch die Schulterbeulen, Makeln und Suturen des Prothorax gelblich. Schildchen gelb. Flügel hyalin, Tegulä und Stigma rötlichgelb. Vorderbeine grösstenteils gelb, die Schenkel hinten rot; die hintersten Beine rot, Hüften und Trochantern zum Teil schwarz,

Schenkel an Basis und Spitze und die Innenseite der hellen Schienen gebräunt, Spitze der letzteren schwarz, die Tarsen braun. Hinterleib rot, das 2. Segment oben, das 4. am Ende, 5—7 ganz schwarz.

Var. ♂. Kopf und Thorax ausgedehnter hell gezeichnet, indem der Prothorax, der vordere Teil der Mesopleuren, Linien des Mesonotums und die Spitze des Metathorax gelblich gefärbt sind. Auch die Beine sind reicher hell gezeichnet.

L. 14—18 mm.

Die Art findet sich in Nordafrika und Südeuropa und geht nördlich bis Ungarn. Ich fand sie in Algerien und Tunesien.

3. **B. rufa** Holmgr. 1857 *Anomalon rufum* Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIV p. 178 und 1858 Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 24 ♀ ♂ | 1903 *Laphyctes rufus* Schmiedeknecht, Zeitschr. Hym. Dipt. p.p. 75 und 76 ♀ ♂ | 1895 *Anomalon discrepans* Brauns, Termes. Füzet. XVIII p. 46 ♂.

Kopf hinter den Augen verbreitert; Stirn dicht punktiert, kaum runzlig, mit erhabener Längslinie; Schläfen ziemlich glatt; Clypeus in der Mitte des Endrandes mit schwachen Zähnen; Fühler ungefähr von halber Körperlänge. Thorax wenig schmaler als der Kopf; Mesonotum punktiert, ziemlich glänzend, ohne Parapsidenfurchen; Mesopleuren dicht punktiert, mit deutlichem Speculum; Schildchen convex; Metathorax runzlig, mit seichter Längsvertiefung. Nervus parallelus deutlich über der Mitte der Brachialzelle; Nervellus unter der Mitte gebrochen, der ausgehende Nerv schwach. Beine schlank; an den hintersten Beinen Trochanter und Trochantellus unten von gleicher Länge; die Tarsen nicht verdickt.

- ♀ Kopf rot, Raum zwischen den Nebenaugen schwarz; Spitze der Wangen, Clypeus und Gesicht gelb; Fühler rötlich, Schaft oben rot, unten gelb. Thorax rot; Mesonotum mit Spuren von 3 dunklen Längsstreifen; Brust beiderseits mit grosser schwarzer Makel; Metathorax oben fast ganz schwarz. Flügel schwach getrübt, Stigma bräunlichgelb, Tegulä gelblich. Vorderbeine rot, die Spitze der mittleren Hüften und das 1. Glied der Trochantern schwärzlich; die hintersten Beine schwärzlich, Hüften und Schenkel rot, letztere an der äussersten Basis und Spitze verdunkelt; die Schienen an der Basis schmal weisslich, die Tarsen an der Basis rostrot. Hinterleib rot, das 2. Segment oben schwarz, das 5. an der Spitze, das 6. und 7. fast ganz schwarz.

♂ Kopf schwarz, Clypeus und die Seiten und ein Mittelstreif des Gesichtes (möglicherweise das ganze Gesicht) gelb. Hinter den Augen ein roter Fleck. Fühler schwarz, Schaft unten mit kleinem gelben Fleck. Thorax schwarz. Vorderbeine rot und gelb, die mittleren Hüften zum Teil schwarz; die Mittelschenkel nur an der äussersten Basis braun; an den hintersten Beinen Hüften, Trochantern und Schenkel schwarzbraun, die letzteren unten zum Teil rot; Schienen schwärzlich, an der äussersten Basis hell; die Tarsen rot, die 3 Endglieder braun. Hinterleib wie beim ♀, das 1. Segment an der Basis schmal schwarz.

L. 12—16 mm.

Die Art scheint sehr selten zu sein; sie wurde von Holmgren nach schwedischen Exemplaren aufgestellt. *Anomalon discrepans* wurde bei Budapest gefunden.

Szepligeti bezweifelt, dass das ♂ zu dem ♀ gehöre. Dagegen sagt Holmgren, dass kein Zweifel sein könne, dass die beiden Geschlechter zusammengehören. — Eine zweite Schwierigkeit ist die Frage, ob nicht *B. rufa* Holmgr. ♂ mit dem nur im männlichen Geschlecht beschriebenen *Anomalon perspicillator* Grav. identisch ist. Ein Unterschied liegt nur in der Färbung der Mittelschenkel, indem dieselben bei *perspicillator* nur an der äussersten Spitze rötlichgelb sind.

4. **B. rubricator** Szepl. 1899 *Laphyctes rubricator* Szepligeti, Termes. Füzet. XXII p. 215 und 232 ♀ | 1905 *Barylypa rubricator* Szepligeti, Ann. Mus. Nat. Hungar. III p. 514 ♀.

Ich hatte in der „Zeitschrift f. Hymenopterologie und Dipterologie 1903 p. 75“ die Meinung aufgestellt, dass *B. rubricator* mit *rufa* identisch sei. Szepligeti betrachtet sie jedoch als eigene Art und fügt der ersten Beschreibung ein neues Merkmal hinzu, indem er die Fühler als fast körperlang angibt. Gleichzeitig führt er an, dass die Oberseite des Schaftes und die Spitzen der hintersten Schienen schwarz sind.

Gesicht, Wangen unter den Augen gelb; Schläfen ganz rot; Scheitel und Stirne schwarz; Basalhälfte der Fühlergeissel rotbraun. Mesothorax rot; Mesonotum, die hinteren Thoraxseiten und die Basis des Metathorax schwarz. Flügel hyalin, Nervatur braun, Tegulä gelb, Stigma gelblich; Nervulus fast interstitial. Beine rot; Vorder- und Mittelhüften vorne gelb, an den Hinterbeinen die Aussenseite der Hüften, Trochantern und Basis der Schenkel schwarz, Schienen an der Spitze und Wurzel

schwärzlich; Hintertarsen braun. Hinterleib rot; Segment 2—4 oben schwarz.

L. 10 mm.

Ungarn.

5. **B. longicornis** Brauns. 1895 *Anomalon* (*Barylypa*) *longicornis* Brauns, Termes. Füzet. XVIII p. 46 ♀ | 1903 *Barylypa* l. Schmiedeknecht, Zeitschr. Hym. Dipt. p. 7 ♀.

Durch die fast körperlangen Fühler dem *L. tenuicornis* ähnlich, aber mit anderer Flügelnervatur, dunklen Beinen u. s. w. Kopf nach hinten nicht erweitert; Stirn runzlig; Gesicht, Wangen und Schläfen punktiert, letztere glänzend. Mesonotum sparsam punktiert, glänzend; Mesopleuren stark runzlig-punktiert, mit deutlichem Speculum; Schildchen gerandet; Metathorax netzförmig gerunzelt, mit breitem und tiefem Längseindruck. Rücklaufender Nerv interstitial, Nervus parallelus über der Mitte der Brachialzelle; Nervellus postfurcal, über der Mitte gebrochen. Der hinterste Trochanter unten fast doppelt so lang als der Trochantellus. — Gesicht fast ganz, Mandibeln und eine Makel der Wangen gelb; Schläfen mit grosser roter Makel. Thorax ganz schwarz. Tegulä schwarz, Hüften schwarz, Vorderschenkel an der Spitze, Schienen und Tarsen, letztere am Ende verdunkelt. Die hintersten Beine fast ganz schwarz, Schienen an der Basis rötlich, die Tarsen dunkelbraun, Metatarsus an der Basis rot. Hinterleib schwarz, Ende des 1. Segmentes und 2—4 rot, das 2. oben schwarz.

L. 18 mm. — Nur das ♀ bekannt.

Budapest. — Wurde aus *Phalera bucephala* gezogen.

6. **B. carinata** Brischke. 1880 *Anomalon* (*Erigorgus*?) *carinatum* Brischke, Schrift. Naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 136 ♂.

Gesicht nach unten verschmälert, Wangen breit, Stirn gerunzelt, mit scharfem Mittelkiele, Fühler fast körperlang, Schildchen flach, in der Mitte etwas vertieft. Nervus parallelus über der Mitte der Brachialzelle, Nervellus fast in der Mitte gebrochen, Hintertarsen nicht verdickt. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeus, Wangenspitze und Gesicht gelb; Schläfen rot; Fühlerschaft unten gelb. Stigma im Vorderflügel gelbbraun, Tegulä gelb mit schwarzem Fleck. Vorderbeine gelb mit roten Schenkeln, Mittelhüften mit schwarzer Basis, Hinterbeine rot, Hüften und Trochantern schwarz, letztere mit gelber Spitze, Schenkel oben und Schienen an der Spitze schwarz, Tarsen oben bräunlich. Hinterleib rot, Basis des 1., Rücken des 2. und die Segmente 6 und 7 schwarz.

L. 15 mm.

Mittel- und Südeuropa. — Nach Szepligeti aus *Arctinia caesarea*.

Die Art bedarf noch sehr der Klärung. Szepligeti ist geneigt, sie zu *B. longicornis* zu ziehen. Krieger bringt sie mit *B. insidiator* zusammen, welche letztere Art wieder von Szepligeti mit *B. pallida* vereinigt wird.

7. **B. uniguttata** Grav. 1829 *Anomalon uniguttatum* Gravenhorst, *Ichneum. Eur.* III p. 685 ♀♂ | 1878 *Laphyctes uniguttatus* Förster, *Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl.* XXXV p. 75 | 1895 *Barylypa uniguttata* Thomson, *Opusc. Entom.* XIX p. 2119 ♀♂.

Erinnert im Habitus an *Labrorychus delarvatus* und *tenuicornis*. Leicht zu erkennen durch den gelblichen Längsfleck in der Gesichtsmitte.

Kopf runzlig-punktiert, schwarz; Mandibeln in der Mitte rötlichgelb; Fühler etwa von halber Körperlänge. Gesicht in der Mitte mit einem kleinen, blassgelben Längsfleck. Thorax ganz schwarz. Flügel kaum getrübt, Stigma bräunlich, Tegula gelblich. Beine schlank, schwarz, nur die vorderen Schienen und Schenkel zum Teil gelb. Hinterleib sehr gestreckt, fast ganz schwarz, nur auf dem 2. bis 4. Segmente verloschen rötlich gezeichnet.

L. 12—15 mm.

Mittleres und südliches Europa. Ich besitze die Art aus den Tiroler Alpen.

8. **B. insidiator** Först. 1878 *Laphyctes insidiator* Förster, *Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl.* XXXV p. 73 ♂ | 1884 *Anomalon cylindricum* Bridgman, *Trans. Entom. Soc. London*, p. 424 ♀ | 1903 *Laphyctes cylindricus* Schmiedeknecht, *Zeitschr. Hym. Dipt.* Heft 3 p. 76 ♀ | 1904 *Laphyctes insidiator* Krieger, *Zeitschr. Hym. Dipt.* Heft 3 p. 173.

Szepligeti zieht neuerdings *B. insidiator* zu *B. pallida*. Darüber mögen weitere Untersuchungen entscheiden; die Unterschiede zwischen beiden, ebenso von *B. perspicillator* sind in der Tabelle angegeben. Nach Krieger gehört auch *B. carinata* hierher.

Kopf hinter den Augen nicht erweitert; Gesicht ziemlich dicht punktiert; Stirn runzlig-punktiert, mit feinem Längs-kiel; Fühler kürzer als der Körper. Mesonotum fein punktiert; Schildchen an den Seiten gerandet; Metathorax mit deutlicher Längsfurche. Nervus parallelus über der Mitte der Brachialzelle; Nervellus kurz über der Mitte gebrochen. Beine schlank, die hintersten Tarsen kaum verbreitert.

- ♀ Gesicht und Mund gelb; hinter den Augen ein rötlicher Fleck; Fühler schwarz. Thorax schwarz, Flügel namentlich an der Basis gelblich getrübt; Stigma rötlich. Vorder- und Mittelbeine rotgelb, die Hüften schwarzbraun;

die hintersten Beine braunrot, Hüften und Trochantern schwarzbraun; Oberseite der Schenkel und Schienenenenden schwärzlich, Hinterleib rot, der Rücken des 2. Segmentes und die Endsegmente vom 5. an schwarz.

Beim ♂ ist der Fühlerschaft unten gelb. Ausser dem Gesicht auch eine Makel der Schläfen gelb; wie beim ♀ ein roter Fleck hinter den Augen. Beine rotgelb, Vorderhüften an der Basis, Hinterhüften ganz, Oberseite der Hinterschinkel und Spitze der Hinterschienen schwarz. Das 1. Segment bis über die Mitte, der Rücken des 2., das 5. am Hinterrand und die folgenden ganz schwarz.

L. 13—16 mm.

Deutschland, England. — Nach Bridgman aus *Euchelia jacobaeae*.

9. **B. perspicillator** Grav. 1829 *Anomalon perspicillator* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 683 ♂ | ? 1878 *Laphyctes mesozonus* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXV p. 72 ♂ | 1892 *Barylypa genalis* Thomson, Opusc. Entom. XVI p. 1767 ♀.

Diese Art würde sich von den verwandten schon durch ihre Grösse auszeichnen.

Kopf hinter den Augen ziemlich aufgetrieben; Fühler wenig länger als Kopf und Thorax; Gesicht punktiert; Stirn runzlig, mit feinem Längskiel. Thorax ziemlich stark behaart, punktiert; Schildchen gerandet, ziemlich flach; Metathorax runzlig-punktiert, mit seichter Längsfurche. — Gesicht und Wangen gelblichweiss. Thorax schwarz. Flügel etwas getrübt, Stigma bräunlichgelb, Nerven schwärzlich. Alle Hüften schwarz, die vordersten Schenkel ganz, die mittleren nur an der Spitze rötlich; Vorder- und Mittelschienen gelb, die letzteren innen dunkel; die hintersten Beine fast ganz schwarz. Hinterleib rot, Segment 1 an der Basis, 2 auf dem Rücken, 5—7 fast ganz schwarz.

- ♂. Gesichtsseiten und ein kleiner Mittelfleck blassgelb, neben den Augen auf dem Scheitel ein braunroter Fleck. Fühler kaum länger als der halbe Körper, Flügel schwach getrübt, Stigma rötlich, Tegulae braun. Beine schwarz, die vordersten Schenkel unten, die Mittelschenkel nur an der äussersten Spitze gelb; Vorder- und Mittelschienen unten gelb, die vordersten Tarsen unten, Mitteltarsen an der Basis gelb, die hintersten ganz schwärzlich. Das 1. Segment schwarz, am Ende rot, 2 auf dem Rücken schwarz, 3 und 4 rot, 5—7 schwarz. (Gravenhorst.)

Die Beschreibung des *Laphyctes mesozonus* Först. ♂, den Szepligeti mit zu *perspicillator* zieht, weicht in verschiedenen Punkten ab. Als 3. fragliche Art kommt dann *B. rufa* Holmgr. ♂ hinzu, wie bereits bei dieser Art erwähnt wurde.

Es ist hier also noch Mancherlei aufzuklären, am besten durch Zuchtergebnisse.

L. 16—19 mm.

Wie es scheint über ganz Europa verbreitet, aber nur wenig beobachtet. — Als Wirte gibt Szepligeti *Bombyx neustria* und *Bombyx castrensis* an.

10. **B. pallida** Grav. 1829 *Anomalum pallidum* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 675 ♂ | ? 1879 *Anomalon melanocneme* Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XXI p. 168 ♀ | 1892 *Barylypa laticeps* Thomson, Opusc. Entom. XVI p. 1766 ♂.

Anmerk. Szepligeti zieht zu dieser Art auch die *B. insidiator*.

- ♂. In Bau und Statur mit der vorhergehenden Art übereinstimmend, aber kleiner.

Kopf schwarz; Gesicht und Clypeus gelb; die hinteren Augenränder zum Teil braunrot, nach Thomson auch gelbe Scheitelmakeln vorhanden; Fühler rostrot, Schaft schwarz, unten gelb; die nächsten beiden Glieder schwarz. Thorax schwarz, ziemlich dicht behaart, an der Flügelwurzel und an der Spitze des Metathorax zuweilen braunrot. Flügel kaum getrübt. Stigma und Tegulä gelblich. Vorderbeine gelb, Schenkel oben mehr rötlich, Tarsen bräunlich; an den hintersten Beinen die Hüften und Trochantern schwarz, die Schenkel rot, oben gebräunt, die Schienen schwarzbraun, an der äussersten Basis weisslich, die Tarsen schwärzlich. Hinterleib rötlich, das 1. Segment fast ganz, das 2. auf dem Rücken, das 5. am Ende und die folgenden ganz schwarzbraun. — Nach Thomson sind die vordersten Hüften an der Basis oder ganz schwarz.

L. 13—15 mm.

Ueber das Vorkommen dieser Art gilt dieselbe Bemerkung wie bei der vorigen.

#### 14. Gen. **Agrypon** Först.

1868 *Agrypon* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. p. 151.

Clypeus in der Mitte des Vorderrandes in eine Spitze vorgezogen. Mesonotum mit verschiedener Skulptur, punktiert und ziemlich glänzend oder mehr runzlig und matt; Parapsidenfurchen mehr oder weniger ausgeprägt. Brachialzelle weit kürzer oben als die nach aussen davon liegende Discoidalzelle; Nervus parallelus deutlich über der Mitte der Brachialzelle entspringend, aber nicht interstitial; 2. rücklaufender Nerv hinter dem Cubitalquernerv; Nervellus nicht gebrochen. Sporen der Hinterschienen kurz; die hintersten Tarsen meist verdickt.

Von der verwandten Gattung *Labrorychus* leicht durch den nicht gebrochenen Nervellus zu unterscheiden.

Uebersicht der paläarktischen Arten.

1. Gesicht nicht ganz gelb. Fühler etwa von halber Körperlänge. Schläfen und Hüften schwarz. 2.  
Gesicht ganz gelb. 3.
2. Kopf bei ♀ und ♂ ganz schwarz. Das 1. Hinterleibssegment rot, mit schwarzer Basis, das 2. rot, mit schwarzem Rücken, beim ♂ nur an der Basis schwarz, 3 und 4 ganz rot, 5—7 schwarz. Hinterbeine schwarz.

1. **tenuitarsum** Grav.

Seiten des Gesichtes, beim ♂ meist auch ein Fleck in der Mitte gelb. Der ganze Hinterleibsrücken schwarz. Die hintersten Schenkel beim ♀ nur an der Basis, beim ♂ mit Ausnahme der Spitze schwarz.

2. **anomelas** Grav.

3. Fühler von Körperlänge. Hinterhüften meist rot. 4.  
Fühler deutlich kürzer als der Körper. 8.
4. Thorax ganz rot oder mit reicher roter Zeichnung. 5.  
Thorax ganz oder fast ganz schwarz. 6.
5. Kopf und Thorax rot, Scheitel und Mesonotum schwarz. Schildchen und Metathorax gelbrot.

3. **insigne** Tosqu.

Thorax ausgedehnter schwarz. Schildchen gelbrot. Metathorax beim ♀ grösstenteils rot, beim ♂ schwarz mit einer roten Querbinde hinter dem Schildchen.

3. **insigne** var. **hilare** Tosqu.

6. Schaft ganz gelbrot; Geissel rot, gegen die Spitze braun. Kopf hinter den Augen verschmälert. Beine rot, Vorderhüften gelb, Spitzen der Hinterschienen braun; die hintersten Tarsen verbreitert, gelb.

4. **brevicollis** Wesm.

Schaft oben schwarz. Kopf hinter den Augen erweitert. Die hintersten Tarsen nicht oder nur wenig verbreitert. 7.

7. Nervus parallelus weit über der Mitte der Brachialzelle entspringend. Fühlergeissel schwarz, selten rötlich. Hinterleibsrücken zum grössten Teil schwarz. Beine teilweise schwarz gezeichnet, wenigstens die Spitze der Hinterschienen schwarz.

5. **variitarsum** Wesm.



Nervus parallelus wenig über der Mitte der Brachialzelle entspringend. Fühlergeissel rot. Hinterleib und Beine rot, Vorderbeine zum Teil und Hintertarsen vom Ende des 1. Gliedes an gelb.

6. **faciale** Szepl.

8. Sehr kleine Art von 5 mm Länge mit schwachbehaarten Augen. Kopf und Thorax sehr grob punktiert; Fühler von etwa zwei Drittel der Körperlänge, Hintertarsen schwach verbreitert. Der ganze Hinterleibsrücken schwarz.  
cf. **Trichomma minutum** Bridgm.

Grössere Arten. Augen nicht behaart. 9.

9. Thorax mehr oder weniger rot gefärbt. 10.

Thorax nicht rot gezeichnet. Hinterleib und Beine meist mit schwarzer Zeichnung. 11.

10. Die hintersten Schienenspitzen, meist auch die hintersten Hüften zum Teil schwarz. Rücken des 2. Segmentes schwarz.

7. **flaveolatum** Grav. var.

Beine fast ganz rotgelb. Hinterleib nur am Ende oben dunkel. Fühlerbasis rot. Kopf vorne gelb, hinten rot, Scheitel schwarz.

cf. **Atrometus arquatus** Grav.

11. Schildchen flach, die Seitenkanten stark erhaben. Hinterleibsrücken verdunkelt. Beine rot, die vorderen mehr gelb; Spitzen der hintersten Schienen, meist auch die Hüften ganz oder zum Teil schwarz.

cf. **Blaptocampus canaliculatus** Rtzb.

Schildchen mehr oder weniger gewölbt; die Seitenleisten nicht scharf vortretend. 12.

12. Mesonotum punktiert, ziemlich glänzend. Die hintersten Tarsen selten verbreitert. Wangen und Schläfen hell gezeichnet. 13.

Mesonotum runzlig-punktiert, matt. Die hintersten Tarsen selten verbreitert. 14.

13. Die hintersten Beine grösstenteils rot. Hinterleib rot, das 2., zuweilen auch das 3. bis 5. Segment auf dem Rücken, die Endsegmente fast ganz schwarz. Kopf hinten deutlich verbreitert.

7. **flaveolatum** Grav.

Die hintersten Beine grösstenteils schwarzbraun. Hinterleib rot, auf dem Rücken und am Ende breit schwarz. Kopf hinter den Augen kaum erweitert.

8. **septentrionale** Holmgr.

14. Kopf rotgelb, Stirn und Scheitel schwarz. Thorax schwarz. Vorderbeine gelbrot, die hintersten rot, Schienenspitzen schwarz. Hinterleib sehr gestreckt, rot, Rücken des 2. Segmentes und die Endsegmente schwärzlich.

9. **segne** Tosqu.

Kopf ausgedehnt schwarz gezeichnet. 15.

15. Die vordersten Hüften mit Querleiste. Die hintersten Schienen an der Basis eingeschnürt, die hintersten Tarsen wenig verbreitert. Vorderbeine rot, an der Basis gelb; die hintersten Hüften, Trochantern, Schienenspitzen und Schenkelbasis schwarz.

10. **anxium** Wesm.

Die vordersten Hüften ohne Querleiste. Die hintersten Schienen an der Basis nicht eingeschnürt, die Tarsen verbreitert. Hinterleib rot, Rücken des 2. Segmentes schwarz. Beine schlank, rot, die hintersten Schienen an der Spitze breit schwarz.

11. **stenostigma** Thoms.

1. **A. tenuitarsum** Grav. 1829 *Anomalon tenuitarsum* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 683 ♀♂ | 1903 *Agrypon tenuitarse* Schmiedeknecht, Zeitschr. Hym. Dipt. p. 174 ♀♂.

Diese Art ist dadurch ausgezeichnet, dass bei ♀ und ♂ der Kopf ganz schwarz ist. Die Fühler sind nach Gravenhorst eher etwas kürzer als der halbe Körper. Die Tarsen sind nicht verdickt.

Flügel schwach getrübt, Stigma und Tegulä schwärzlich. Die vordersten Beine rötlichgelb, Hüften, Trochantern und Basis der Schenkel schwarz; die mittleren Beine schwarz, Spitze der Schenkel und die Schienen rötlichgelb; die hintersten Beine ganz schwarz. Das 1. Hinterleibssegment rot, an der Basis schwarz; das 2. rot, beim ♀ auf dem Rücken, beim ♂ nur an der Basis schwarz, das 3. und 4. rot, die folgenden schwarz.

L. 12—15 mm.

Mittleres Europa. Die Art bedarf noch sehr weiterer Beobachtungen.

2. **A. anomelas** Grav. 1829 *Anomalon anomelas* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 680 ♀ | 1858 *Anomalon trochanteratum* Holmgr. Svensk. Vet. Akad. Handl. II p. 25 ♂ | 1904 *Anomalon trochanteratum* Krieger, Zeitschr. Hym. Dipt. Heft 3, p. 174.

Diese Art ist ausgezeichnet durch die charakteristische Gesichtszeichnung, welche an *Labrorychus delarvatus* erinnert. Letztere Art unterscheidet sich abgesehen von dem

anderen Nervellus besonders noch durch die Hinterleibszeichnung. Es ist kaum zu zweifeln, dass *Anomalon anomelas* Grav. identisch mit *A. trochanteratum* Holmgr. ist.

Kopf hinter den Augen kaum erweitert; Stirn runzlig mit erhabener Linie, Schläfen breit, ziemlich glatt; Gesicht nach unten wenig verschmälert; Fühler ziemlich kräftig, wenig länger als der halbe Körper. Mesonotum punktiert, ziemlich glänzend; Schildchen convex, runzlig; Metathorax netzartig gerunzelt, kaum der Länge nach vertieft. Flügel kurz. Die hintersten Beine kräftig, der Trochanter deutlich länger als der Trochantellus; die Tarsen stark verdickt. — Kopf schwarz, Mitte der Mandibeln rötlich, Seiten und meist eine Makel in der Mitte des Gesichtes gelb; Fühler schwarz, Schaft unten meist rötlich, die beiden ersten Geisselglieder schwarz, die folgenden unten rötlich. Thorax schwarz. Flügel kaum getrübt, Stigma gelblich, Tegulä schwärzlich. Beine rot, Hüften und Trochantern schwarz; Vorderschenkel zuweilen an der äussersten Basis schwarz; an den hintersten Beinen die Basis der Schenkel und die Schienen schwarz, letztere gegen die Basis rötlich; Tarsen rotbraun, gegen das Ende dunkler. Hinterleib rot, das 2. Segment auf dem Rücken schwarz, das 3. und 4. braunrot, oben schwärzlich, die folgenden ganz schwarz.

Beim ♂ sind die Fühler ganz schwarz. Die vorderen Schenkel und Schienen mehr rötlichgelb, an den hintersten Schenkeln reicht die schwarze Färbung bis fast zur Spitze; die hintersten Tarsen sind gelb, das Endglied braun. Das 1. Segment ist fast ganz schwarz.

Gravenhorst erwähnt eine Varietät des ♂ mit ganz schwarzem Kopfe. Es ist eine grosse Frage, ob dasselbe hierher gehört.

L. 12–15 mm.

Nord- und Mitteleuropa.

3. **A. insigne** Tosqu. 1889 *Anomalon insigne* Tosquinet, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXXIII p. 22 | 1903 *Agrypon insigne* Schmiedeknecht, Zeitschr. Hym. Dipt. p. 80.

Diese Art ist ausgezeichnet durch die ausgedehnte rote Körperfärbung und die körperlangen Fühler.

Kopf und Thorax rot, Mandibeln in der Mitte, Clypeus und Gesicht gelb, Scheitel und Mesonotum schwarz. Fühler rot, gegen das Ende braun; Schaft unten gelb. Schildchen und Metathorax rötlichgelb. Flügel hyalin, Stigma und Tegulä gelblich. Beine und Hinterleib gelbrot, der Rücken vom 2. Segmente an dunkel.

Var. *hilare* Tosqu. 1889 *Anomalon hilare* Tosquinet, l. c. p. 24 | 1903 *Agrypon hilare* Schmiedeknecht, l. c. p. 80.

Thorax ausgedehnter schwarz. Schildchen gelbrot. Metathorax beim ♀ grösstenteils rot, beim ♂ hinter dem Schildchen eine rote Querbinde. Etwas grösser als die Stammform.

L. 14—16 mm.

Ost-Sibirien.

4. **A. brevicolle** Wesm. 1849 *Anomalon brevicolle* Wesmael, Bullet. Acad. Sc. Belgique XVI p. 136 ♀ | 1880 *Anomalon flavitarsum* Brischke, Schriftl. naturf. Ges. Danzig, N. F. IV p. 137 ♀♂.

Dem *Labrorychus tenuicornis* ähnlich. Kopf hinter den Augen nicht verbreitert. Fühler von Körperlänge. Stirn grob und dicht punktiert, ebenso der Thorax; Schildchen oben flach. Nervus parallelus deutlich über der Mitte der Brachialzelle; Nervellus gerade, ohne Längsnerv. Hintertarsen verbreitert. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeus Gesicht und Wangen gelb, Schläfen, bei den ♀ breit, Augenränder am Scheitel, Fühler, Tegulä, Stigma und Beine rot, die vorderen Hüften und Trochantern, sowie die Hintertarsen gelb; Spitzen der Hinterschienen braun. Hinterleib rot, nur der Rücken des 2. Segmentes schwarz.

L. 12 mm.

Mittleres Europa; selten und wenig bekannt.

5. **A. variitarsum** Wesm. 1849 *Anomalon varitarsum* Wesmael, Bullet. Acad. Sc. Belgique XVI p. 131 ♀♂ | 1858 *Anomalon varitarse* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 29 ♀♂ | 1892 *Agrypon varitarse* Thomson, Opus. Ent. XVI p. 1769 ♀♂.

Dem *Labrorychus tenuicornis* sehr ähnlich, aber Nervellus nicht gebrochen und keinen Nerv aussendend, Kopf hinter den Augen nicht erweitert, sondern rundlich verschmälert, Schläfen ohne rote Makel, Mesonotum feiner und zerstreuter punktiert, mit deutlicheren Parapsidenfurchen. — Kopf und Thorax schwarz, Mitte der Mandibeln, Gesicht, Wangen und ein Scheitelpunkt beiderseits neben den Augen gelb. Fühlerschaft unten gelblich. Schulterbeulen und zuweilen die Suturen zwischen Flügelbasis und Prothorax gelb. Schildchen beiderseits an der Basis und Spitze des Metathorax oft rötlich. Flügel fast hyalin, Stigma bräunlich, Tegulä gelb. Beine rot, Vorderbeine mehr rötlichgelb, die Hüften, Trochantern, und Aussenseite der Schienen beim ♂ gelb; die hintersten Hüften an der Basis zuweilen schwarz, in seltenen Fällen ganz schwarz; die hintersten Schienen am Ende, meist auch die Schenkel an

der äussersten Basis schwarz; die hintersten Tarsen verschiedenfarbig, meist rot, die mittleren Glieder gelb. Hinterleib rot, das 1. Segment an der Basis schwarz, die folgenden Segmente auf dem Rücken, die Endsegmente fast ganz schwarz.

Var. *ruficoxis* Szepligeti, Termes Füzet. XXII p. 232 ♀♂. (Als Art.) Die gelben Scheitelpunkte fehlen.

L. 12—15 mm.

Nord- und Mitteleuropa; nicht häufig.

6. **A. faciale** Szepl. 1905 *Agrypon faciale* Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hungar. III p. 517 ♀.

„Kopf schwach punktiert, hinter den Augen erweitert; Clypeus mit Spitze. Fühler so lang wie der Körper. Mesonotum glänzend, punktiert; Parapsidenfurchen vorhanden; Schildchen flach; Mesopleuren schwach punktiert; Metathorax runzlig. Trochanter und Trochantellus von gleicher Länge. Tarsen wenig verdickt. — Kopf und Thorax schwarz; Mandibeln, Clypeus, Gesicht, Stirnränder der Augen und Scheitelflecke beiderseits, sowie Unterseite des Schaftes gelb. Fühlergeissel rötlich. Flügel gelblich, Stigma und Tegulä rötlich. Beine rot, Vorderbeine, Schienen und Tarsen der Mittelbeine und Hintertarsen vom Ende des 1. Gliedes an gelblich. Hinterleib rot, Rücken des 2. Segmentes und Hinterleibsspitze oben schwarz.

L. 15 mm.

Ungarn (Budapest).“

7. **A. flaveolatum** Grav. 1807 *Ophion flaveolatum* Gravenhorst, Vergl. Uebers. zool. Syst. p. 268 | 1829 *Anomalon flaveolatum* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 664 ♀♂ | 1860 *Agrypon flaveolatum* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII p. 152.

Kopf aufgetrieben, hinter den Augen verbreitert; Hinterkopf tief ausgerandet; Stirn ziemlich eben, runzlig, eine erhabene Mittellinie kaum vorhanden; Gesicht seidenartig weiss behaart; Wangen breit; Clypeus mit deutlichen Endzähnen, Fühler etwas länger als der halbe Körper. Mesonotum fein punktiert, glänzend, Parapsidenfurchen vorn deutlich; Brustseiten glänzend, in der Mitte sehr zerstreut punktiert; Schildchen etwas niedergedrückt, nicht gerandet; Metathorax runzlig. Beine schlank, Trochanter und Trochantellus der Hinterbeine unten von gleicher Länge; die hintersten Tarsen stark verbreitert, zumal beim ♂. — Kopf und Thorax schwarz, Mandibeln mit Ausnahme der Zähne, Wangen, Gesicht und Scheitelpunkte beiderseits

gelb; Schläfen grösstenteils gelbrot; Fühlerschaft unten gelb, die nächsten 2 oder 3 Geisselglieder ganz schwarz; die folgenden unten rötlich. Die Suturen der Brustseiten und das Ende des Metathorax meist rötlich. Flügel gelblich getrübt, Stigma und Tegulä rötlichgelb. Beine rot, die vordersten Hüften gelb, die Trochantern zum Teil schwarz; die hintersten Schienen am Ende gebräunt; die Tarsen gelb, der Metatarsus ganz oder an der Basis rot. Hinterleib rot, das 2. Segment auf dem Rücken braun, zuweilen auch das 3. bis 5., das 6. und 7. grösstenteils schwärzlich.

Beim ♂ fehlt gewöhnlich der rote Schläfenfleck; die vordersten Beine sind grösstenteils gelb.

Var. Thorax auf dem Rücken und an den Seiten mehr oder weniger ausgedehnt rot.

L. 12—14 mm.

Ueber ganz Europa verbreitet und eine der häufigsten Anomalinen-Arten. Jedenfalls hat sie zahlreiche Wirte; angegeben werden: *Earias chlorana*, *Hibernia defoliaria*, *Taeniocampa miniosa*.

8. **A. septentrionale** Holmgr. 1857 *Anomalon septentrionale*, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIV p. 181 ♀ | 1880 *Anomalon flaveolatum* var. Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig, N. F. IV p. 137 ♀♂.

Brischke und Thomson halten diese Art für eine Varietät von *A. flaveolatum*.

Kopf nach hinten kaum erweitert. Mesonotum stärker punktiert als bei *A. flaveolatum*. — Kopf schwarz; Mund, Clypeus, Augenränder, Spitze der Wangen, Gesicht, Scheitelmakeln beiderseits und Unterseite des Schaftes gelb. Thorax schwarz, Schulterbeulen rötlich. Vorderbeine rötlichgelb, Hüften und Trochantern gelb; die hintersten Hüften und Trochantern schwarz; Schenkel schwärzlich, am Ende rötlich, Schienen rot, an der Endhälfte schwarz; Tarsen gelb, Metatarsus braun mit gelblicher Spitze, das Endglied schwärzlich. Segment 1 und 2 rot, letzteres mit dunklem Rücken, 3 und 4 schwärzlich mit roten Seiten, die folgenden schwarz.

L. 10—12 mm.

Scheint mehr im Norden vorzukommen. — Brischke zog die Art aus *Eupithecia actaeata*.

9. **A. segne** Tosqu. 1896 *Anomalon segne* Tosquinet, Mem. Soc. Entom. Belgique V p. 399 ♀. | 1903 *Agrypon segne* Schmiedeknecht, Zeitschr. Hym. Dipt. p. 173 ♀.

Kopf aufgetrieben, hinter den Augen erweitert; Hinterkopf tief ausgeschnitten, Stirn runzlig-gestreift, mit er-

habener Längslinie; Gesicht spärlich punktiert; Fühler kürzer als der Körper; Clypeus in der Mitte des Endrandes etwas winklig vorspringend. Mesonotum runzlig-punktiert, matt; Schildchen niedergedrückt, dicht und stark punktiert; Metathorax grob runzlig. Die hintersten Tarsen wenig verbreitert. — Kopf rotgelb, Gesicht mehr gelb; Hinterkopf, Scheitel und Stirn schwarz; Fühler braunrot. Thorax schwarz. Flügel schwach gelblich getrübt, Stigma und Tegulä gelb. Vorderbeine gelbrot, die hintersten rot, Schienenspitzen schwarz, die Tarsen gelb, Metatarsus rötlich, letzterer 3 mal so lang als das folgende Glied. Hinterleib sehr gestreckt, 3 mal so lang als Kopf und Thorax zusammen, gelbrot, das 2. Segment auf dem Rücken verdunkelt, das 5. und 6. grösstenteils braun, das 7. rötlich.

L. 17 mm. — Nur das ♀ bekannt.

Die Art wurde bei Blidah in Algerien gefunden.

10. **A. anxium** Wesm. 1849 *Anomalon anxium* Wesmael, *Bullet. Acad. Sc. Belgique* XVI p. 130 ♀ | 1892 *Agrypon anxium* Thomson, *Opusc. Entom.* XVI p. 1770 ♀ | 1880 *Anomalon anxium* Brischke, *Schrift. naturf. Ges. Danzig, N. F.* IV p. 137 ♂ | 1895 *Agrypon rugifer* Thomson, *Opusc. Ent.* XIX p. 2119.

Verwandt mit *A. flaveolatum*, aber Mesonotum runzlig-punktiert, matt; die vordersten Hüften mit Querleiste, welche bei *flaveolatum* fehlt und die hintersten Tarsen wenig verbreitert. — Der hinterste Trochanter unten kaum länger als der Trochantellus; die hintersten Schienen an der Basis eingeschnürt. — Kopf schwarz; Gesicht, Wangen und Scheitelmakel beiderseits gelb; Schläfen rot. Thorax schwarz. Vorderbeine rot, an der Basis gelb; die hintersten Hüften, Trochantern, Schenkelbasis und Schienenspitzen schwarz. Hinterleib rot, das 2. Segment oben und die Endsegmente verdunkelt.

Beim ♂ sind die Schläfen schwarz; die gelben Scheitelmakeln sind vorhanden.

L. 12—14 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

Szepligeti zieht *A. rugiferum* Thoms. zu *A. anxium*. Thomson gibt die folgende Beschreibung: In Bezug auf Grösse, Färbung, mattes Mesonotum und Fühlerlänge dem *A. stenostigma* ähnlich, aber Thorax stärker punktiert, Brustseiten runzlig punktiert, die vordersten Hüften mit Querkiel, die hintersten Tarsen schmal. Auch *A. anxium* ähnlich, aber Fühler länger, rot, gegen das Ende braun; Thorax mit gröberer Skulptur und Hinterleib

rot. — *A. rugiferum* wurde in Schweden gefunden. Ich überlasse es weiteren Untersuchungen, die Frage zu entscheiden, ob beide Arten zusammengehören.

- II. **A. stenostigma** Thoms. 1892 *Agrypon stenostigma* Thomson, Opusc. Entom. XVI p. 1771 ♀♂.

Mesonotum runzlig-punktiert, matt. Stigma im Vorderflügel schmal, bräunlichgelb. Die vordersten Hüften ohne Querkiel; der hinterste Trochanter nicht länger als der Trochantellus; die hintersten Schienen an der Basis nicht eingeschnürt. — Kopf und Thorax schwarz; Gesicht, Spitze der Wangen und Scheitelmakel beiderseits gelb; beim ♀ die Schläfen rot; Beine schlank, rot; die hintersten Schienen am Ende breit schwarz. Hinterleib rot; das 2. Segment auf dem Rücken schwarz. Sehr ähnlich der vorigen Art, aber Fühler wenig kürzer als der Körper, die vordersten Hüften ohne Querkiel, die hintersten Schienen an der Basis nicht eingeschnürt und die hintersten Tarsen mehr verdickt. — Von *A. flaveolatum* verschieden durch das rauhe und matte Mesonotum und das schmalere, mehr bräunliche Stigma.

L. 15 mm.

Schweden. — Thomson hält seine Art für möglicherweise identisch mit *Anomalon* (*Atrometus*) *arquatatum* Grav.

## 15. Gen. **Atrometus** Först.

1868 *Atrometus* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 146.

Stimmt in den Hauptmerkmalen mit der vorigen Gattung überein, aber der Nervus parallelus ist interstitial d. h. er entspringt ganz oben im Endwinkel der Brachialzelle. Parapsidenfurchen fehlen oder sind undeutlich. Die hintersten Schenkel sind kurz und ziemlich dick, die Schienen breit, an der Basis eingeschnürt; die Hintertarsen sind meist verbreitert, namentlich der Metatarsus der ♂.

### Uebersicht der paläarktischen Arten.

1. Thorax schwarz. Fühler kürzer als der Körper. Gesicht auch beim ♀ gelb. 2. Thorax mit roter Zeichnung. Fühler zuweilen so lang wie der Körper, wenigstens auf der Unterseite rot. 3.
2. Kopf nach hinten erweitert. Fühler schwärzlich, Schaft unten gelb. Hinterleib rot, das 1. Segment oft an der



Basis schwarz, die übrigen auf dem Rücken schwarz.  
Kleinere Art von 7—10 mm.

1. **geniculatus** Holmgr.

Kopf nach hinten verschmälert. Fühler unten rötlich.  
Das 2. Segment an der Basis, das 3. und 4. ganz rot.  
Grössere Art von 12—15 mm.

4. **insignis** var. **melanosoma** Szepl.

3. Thorax schwarz, mit roter Zeichnung. Fühler so lang wie der Körper. Metathorax an der Basis mit 3 kleinen Feldern. Der 2. Abschnitt des Radius im Hinterflügel ziemlich deutlich. Tarsen schlank. 4.

Thorax oben grösstenteils rot. Fühler deutlich kürzer als der Körper. Metathorax grob netzartig gerunzelt. Der 2. Abschnitt des Radius im Hinterflügel fehlt gänzlich. Hintertarsen verbreitert. 5.

4. Schildchen rötlich. Beine rötlichgelb, die vordersten gelb; die hintersten Schienen am Ende braunrot; die hintersten Tarsen gelb, der Metatarsus dunkel rostrot. Hinterleib rotgelb, beim ♀ Segment 5—7 auf dem Rücken und an den Seiten dunkler.

2. **arquatus** Grav.

Schildchen schwarz oder nur an den Seiten rot. Hinterhüften schwarz gefleckt, Spitze der Hinterschienen und die 4 letzten Tarsenglieder schwärzlich. Rücken des Hinterleibes vom 2. Segment an und Segment 6 und 7 an den Seiten schwärzlich.

3. **areolatus** Szepl.

5. Kopf beim ♀ schwarz, mit roten Schläfen; beim ♂ Gesicht, Clypeus, Wangen und Schläfen gelb. Thorax schwarz, nur Mesonotum und Schildchen rot.

4. **insignis** Först.

Körper grösstenteils rot, Kopf und Thorax wenig schwarz gezeichnet; Gesicht und Stirnränder gelb.

5. **rubricatus** Först.

- I. **A. geniculatus** Holmgr. 1857 *Anomalon geniculatum* Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Forh. XIV p. 182 ♀♂ | 1892 *Atrometus geniculatus* Thomson, Opusc. Entom. XVI, p. 1768 ♀♂.

Kopf hinter den Augen erweitert; Hinterhaupt tief ausgerandet; Stirn runzlig, ohne erhabene Linie; Gesicht nach unten stark verschmälert; Clypeus mit kurzem Endzähnnchen; Fühler etwa von halber Körperlänge. Mesonotum stark punktiert, ohne deutliche Parapsidenfurchen; Brustseiten in der Mitte zerstreut punktiert; Schildchen

niedergedrückt, an den Seiten gerandet; Metathorax grob gerunzelt, ohne Seitenfelder an der Basis. Der hinterste Trochanter länger als der Trochantellus; die hintersten Schienen kräftig, an der Basis verdünnt; der Metatarsus bei ♀ und ♂ verdickt. — Kopf und Thorax schwarz; Mandibeln mit Ausnahme der Spitze, Clypeus, Gesicht, Spitze der Wangen und die äusseren Augenränder gelb; Fühler schwärzlich, Schaft unten gelb. Vor der Flügelbasis ein gelber Punkt oder Streif. Flügel fast hyalin, Stigma braun, Tegulä braun bis gelblich. Vorderbeine rötlichgelb; die hintersten Beine rot; Hüften, Basis der Trochantern, Basis und Spitze der Schenkel und Spitze der Schienen und Tarsen schwärzlich. Das 1. Hinterleibssegment rot oder an der Basis schwarz; das 2. fast ganz braun, die folgenden auf dem Rücken schwarzbraun.

L. 7—10 mm.

Zerstreut in Nord- und Mitteleuropa.

2. **A. arquatus** Grav. 1829 *Anomalon arquatum* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 668 ♀♂ | 1905 *Atrometus arquatus* Szepligeti, Gen. Ins. XXXIV p. 15.

Habitus von *Labrorychus tenuicornis*, aber Fühler dicker und etwas kürzer als der Körper.

Kopf rot; Gesicht gelb; Hinterkopf und Scheitel schwarz; Fühlerschaft oben rötlich, unten gelb; Geissel rostrot, die beiden ersten Glieder oben schwarz, die Endglieder fast ganz dunkelbraun. Thorax trüb rot, Flecken des Prothorax, die Gegend um das Schildchen, ein Längsstreif des Metathorax, sowie Flecken an den Seiten des Thorax und der Brust schwärzlich. Beim ♂ wiegt die schwarze Färbung vor. Flügel schwach getrübt, Stigma und Tegulä gelblich. Beine rötlich, die vorderen mehr gelb; die hintersten Schienen mit bräunlichen Spitzen; die Tarsen gelb, der Metatarsus rostrot. Hinterleib rötlich, beim ♀ Segment 5—7 auf dem Rücken und an den Seiten verdunkelt.

L. 12—15 mm.

Im mittleren Europa. Noch wenig beobachtet und noch nicht genügend klargestellt.

3. **A. areolatus** Szepl. 1899 *Atrometus areolatus* Szepligeti, Termes. Füzet. XXII p. 218 und 235 ♀.

Fühler von Körperlänge. Mesonotum ohne Parapsidenfurchen; Schildchen flach, an den Seiten undeutlich gerandet; Metathorax an der Basis mit 3 glatten Feldern. Der hinterste Trochanter länger als der Trochantellus. — Kopf schwarz; Mandibeln mit Ausnahme der Zähne, Ge-

sicht, Wangen und Schläfen gelb, letztere oben rot. Schaft unten und Geißel mit Ausnahme der Spitze rötlich. Vorderbrust gelb; die Nähte der Thoraxseiten, die Seiten des Schildchens, die Nähte hinter denselben und die Spitze des Metathorax sind rot. Flügel fast hyalin, das sehr schmale Stigma gelbbraun; Tegulä rot. Beine rot; die vorderen Hüften und Trochantern gelb, die Hinterhüften schwarz gefleckt, die Spitze der Hinterschienen und die Tarsen vom 2. Gliede an schwärzlich. Der Rücken des Hinterleibs vom 2. Segmente an und die Segmente 6 und 7 an den Seiten schwärzlich.

L. 12 mm.

Ungarn.

4. **A. insignis** Först. 1878 *Atrometus insignis* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXV p. 77 ♀♂ | *Anomalon trachynotus* Brauns, Termes. Füzet. XVIII p. 42 ♀♂.

Kopf nach hinten erweitert; Wangen und Schläfen glänzend, sehr zerstreut punktiert; Gesicht nach unten stark verschmälert; Clypeus mit Spitze in der Mitte des Endrandes. Mesonotum runzlig-punktiert, ohne Parapsidenfurchen; Mesopleuren runzlig-rauh, das Speculum undeutlich; Metathorax grob netzförmig gerunzelt. Nervus parallelus fast interstitial; Nervellus nicht gebrochen. — Kopf schwarz; Schläfen rötlichgelb; Mandibeln rötlich, am Ende schwarz; Fühler zum Teil braunrot. Thorax schwarz; Flecken des Prothorax, Seiten des Mesonotums und Schildchens rot. Stigma im Vorderflügel bräunlich, Tegulä rot. Vorderbeine rot, Hüften und Trochantern schwarz; die hintersten Beine schwarz, mit rötlichen Tarsen.

Beim ♂ sind Clypeus, Mandibeln, Wangen, Schläfen und Gesicht gelb; Fühler rötlich, Schaft oben braun, unten gelb. Thorax fast ganz schwarz, ein Streif vor den Flügeln und die Seiten des Schildchens rötlich. Beine rot, Vorderbeine mit den Hüften gelblich; die hintersten Hüften mit Ausnahme der Spitze schwarz; die hintersten Schenkel wie beim ♀ fast keulenförmig; die Tarsen sehr breit, der Metatarsus fast so lang wie die beiden folgenden Glieder zusammen. — Es steht nicht fest, ob beide Geschlechter zusammengehören.

L. 12—13 mm.

Südliches Europa (Frankreich, Ungarn). -- Aus *Zygaena laeta* und *carniolica*.

5. **A. rubricatus** Först. *Atrometus rubricatus* Förster, Verh. naturf. Ver. preuss. Rheinl. XXXV p. 79 ♂.

Die Art ist nur im männlichen Geschlecht bekannt und es ist mit solchen nach einem einzelnen ♂ aufgestellten Arten nichts anzufangen. Die vorwiegend rote Färbung der vorliegenden Art gibt auch kein besonderes Merkmal ab, denn sie tritt bei fast allen südlichen Arten und Exemplaren mehr oder weniger auf.

Skulptur wie bei *A. insignis*. Rostrot, Gesicht und Stirnränder gelb. Thorax nur wenig schwarz gefleckt. Beine rot, die hintersten Hüften und Trochantern, sowie die hintersten Tarsen schwarz. Der Rücken des 2. Segmentes, das 6. am Hinterrande, das 7. ganz schwarz.

L. 15 mm. — ♀ unbekannt.

Granada in Spanien.

### 5. Tribus **Campoplegini**.

1868 *Campoplegoidae*, Familie 8, Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. p. 141 und 150.

1887 *Campoplegina*, Tribus, Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1049.

1894 *Campoplegini*, Tribe VIII, Ashmead, Proc. Ent. Soc. Washington, III p. 277.

Im Habitus der vorigen Tribus ähnlich, hauptsächlich verschieden durch die folgenden Merkmale: Mesonotum ohne oder mit ganz undeutlichen Parapsidenfurchen, meist auch mit viel feinerer Skulptur als bei den *Anomalinen*; Metathorax bei der grossen Mehrzahl der Gattungen mit runden Luftlöchern. Die hintersten Tarsen mit ganz wenigen Ausnahmen nicht verdickt. Hinterleib nur in ganz seltenen Fällen kantig zusammengedrückt, meist oben gerundet.

Die hierher gehörenden zahlreichen Schlupfwespen - Arten sind fast durchweg mittelgrosse bis kleine Tiere. Ihre Färbung ist in den meisten Fällen ganz schwarz, nur die Hinterleibsmitte ist in vielen Fällen rot, seltener gelb. Die Unterscheidung der Gattungen und Arten ist ungemein schwierig. Selbst die grösseren Repräsentanten, wie z. B. die Arten von *Campoplex* machen viel Kopfzerbrechen. Die alte Gattung *Limmeria* vereinigte eine lange Reihe durch ihre Monotonie höchst schwierig unterscheidbarer Arten. Bereits durch Thomson ist durch Verteilung derselben in eine Anzahl von Förster aufgestellter Untergattungen einige Abwechslung geschaffen worden und ich selbst habe weiter versucht, namentlich mit Hilfe der von Förster hinterlassenen schriftlichen Notizen die Förster'schen

Gattungen zu umgrenzen und neue einzufügen. Eine Reihe von Gattungen habe ich ganz ausgeschaltet, weil sie nicht zu deuten sind. Das Resultat habe ich bereits in meinem jüngst erschienenen Werke „Die Hymenopteren Mitteleuropas“ niedergelegt.

Ich wiederhole, dass viel Ausdauer und Geduld nötig ist, sich in dieses Gebiet einzuarbeiten, weil die Unterschiede selten scharf ausgeprägt sind; so ist es, um nur ein Beispiel anzuführen, für den Anfänger sehr schwierig darüber klar zu werden, ob der Nervellus als gebrochen oder nicht gebrochen anzusehen ist.

#### Uebersicht der Gattungen.

1. Luftlöcher des Metathorax linear oder oval. Membran (die weiche Haut an der Bauchseite) des 1. Segmentes nicht über die Mitte des Postpetiolus hinausgehend. Die Seitenkanten (Epipleuren) des 3. Segmentes nicht bis zur Spitze. Flügel nur bei Charops ohne Areola. Meist grössere Arten. 2. Luftlöcher des Metathorax rund, selten oval oder gestreckt (Rhimphoctona); dann die Seitenkanten des 3. Segmentes bis zur Spitze. Mittelmässige oder kleine Arten. 8.

2. Metathorax von der Basis an abschüssig und zwischen den Hüften stark verlängert. Schenkel dünn. Das 2. Hinterleibssegment länger als das erste. Schildchen flach. Nervellus nicht gebrochen. — Die einzige auf Neu-Guinea vorkommende, nur im männlichen Geschlecht bekannte Art, *N. novoguineensis* Szep. ist schwarz, Fühlerbasis, Segment 1—3 und Beine gelbrot, Petiolus und 2. Segment oben schwarz. Flügel hellbraun. L. 14 mm.

#### **Nothanomalon** Szep.

(Gen. Insect. XXXIV. 1905, p. 39.)

Metathorax nicht oder nur unbedeutend verlängert. Schenkel dick. 2. Segment kürzer als das erste. 3.

3. Schildchen flach, an den Seiten mit scharfen Kielen. Metathorax in der Mitte mit breitem Längseindruck, mit Längskielen, welche an den Seiten Felder bilden; area superomedia hinten offen. Areola im Flügel kurz gestielt. Schienen und Tarsen mit feinen Dörnchen besetzt. Hinterleibsstiel lang und schlank, glatt. — Die einzige Art, *D. cariniscutis* Cam., wurde bei Darjeeling im nördlichen Vorderindien gefunden. Sie ist schwarz, Segment 3—5 hellrot, Schienen zum Teil gelblich. L. 12 mm.

#### **Delopia** Cam.

(Zeitschr. Hym. Dipt. III (1903) p. 304 u. 337).

Schildchen-Seiten nicht scharf gekielt, selten flach. 4.

4. Das 2. und die folgenden Segmente von der Seite stark zusammengedrückt. Meist grosse Arten mit roter Hinterleibsmitte. 5.

Hinterleib vom 2. Segment an nicht stark seitlich zusammengedrückt. 7.

5. Areola im Flügel klein. Klauen einfach, nicht gekämmt. Augen innen ausgerandet. Schildchen convex. Metathorax ohne Leisten, fein quergestreift. Petiolus lang, Postpetiolus wenig erweitert. Bohrer weit vorragend. — Die einzige Art, *D. stramineipes* Cam., kommt auf Neuseeland vor. Sie ist schwarz, die vorderen Schenkel und Schienen und die Basis der hintersten Schienen breit gelb. Flügel hyalin. L. 10—11 mm.

**Dusona** Cam.

(Trans. New Zealand Institute XXXIII (1900) p. 107.)

Areola im Flügel gross oder ganz fehlend. Klauen mehr oder weniger deutlich gekämmt. 6.

6. Flügel mit Areola. Postpetiolus meist schwarz.

1. **Cämpoplex** Grav. s. str.

Flügel ohne Areola. Postpetiolus rot. Schildchen niedergedrückt, fast quadratisch.

2. **Charops** Holmgr.

7. Schiensporen sehr lang, kaum kürzer als der Metatarsus.

3. **Echthronomas** Först.

Schiensporen deutlich kürzer als der Metatarsus.

4. **Zachresta** Först.

8. Clypeus in der Mitte des Endrandes mit spitzem Zähnchen. Petiolus niedergedrückt, Postpetiolus deutlich abgesetzt. Areola regelmässig, gestielt; Nervellus gebrochen. Schaft schwarz.

5. **Sagaritis** Holmgr.

Clypeus in der Mitte des Endrandes ohne Zähnchen. 9.

9. Gesicht des ♀ nach unten stark verschmälert. Augen mehr oder weniger deutlich behaart. Hinterleib ohne Basalgrube, meist mit roten Gürteln. 10.

Gesicht des ♀ nach unten nicht oder nur schwach verschmälert. Augen nicht behaart. 12.

10. Flügel ohne Areola. Das 1. Segment gestreift, nur an der Basis glatt. Bohrerklappen in der Mitte verdickt. Fühler des ♀ dreifarbig.

cf. Tryphoninengattung **Thymaris** Först.

Flügel mit Areola. 11.

11. Körper schlank. Postpetiolus flach. Radialzelle gestreckt; Endhälfte des Radius nur schwach gekrümmt.

6. **Cymodusa** Holmgr.

Körper klein, kurz und gedrunken. Postpetiolus an der Biegungsstelle stark bucklig. Radialzelle kurz; Endhälfte des Radius stark gekrümmt. Hinterleibsmittle rot.

7. **Thersitia** Schmiedekne.

12. Augen innen deutlich ausgerandet. Hinterleib nach hinten meist keulenförmig verdickt, selten am Ende seitlich zusammengedrückt. 13.

Augen innen nicht oder nur unmerklich ausgerandet. Hinterleib nicht keulenförmig. 16.

13. Flügel ohne Areola. Clypeus weder oben noch an den Seiten vom Gesicht getrennt. Klauen mit steifen Borsten innen besetzt. Fühler von Körperlänge. Metathorax mit einer doppelten Reihe scharf abgesetzter Felder an der Basis. Schildchen schwach erhaben, hinten abgerundet und deutlich gerandet. Petiolus lang und schlank. Bohrer kurz. 2 Arten aus Indien bekannt.

**Hymenobosmina** Dalla-Torre.

Flügel mit Areola. Clypeus wenigstens an den Seiten mit deutlichen Eindrücken. 14.

14. Metathorax gefeldert, area superomedia durch Leisten vollständig geschlossen.

8. **Rhythmonotus** Förster.

Area superomedia nicht durch Leisten vollständig geschlossen. Metathorax meist der Länge nach tief eingedrückt. 15.

15. Hinterleib nach hinten keulenförmig; Bohrer versteckt.

9. **Casinaria** Holmgr.

Hinterleib am Ende zusammengedrückt, wie bei der Gattung Campoplex; von dieser verschieden durch die rundlichen Luftlöcher des Metathorax.

10. **Trophocampa** Schmiedekne.

16. Flügel ohne Areola. 17.

Flügel mit Areola. 28.

17. Flügel ohne Stigma; Nervus parallelus interstitial; Nervellus nicht gebrochen. Schildchen durch eine Längsfurche geteilt. Schiensporen so lang wie der Durchmesser des Schienenendes; Metatarsus etwas mehr als 2 mal so lang

wie das 2. Tarsenglied. Hinterleib sehr gestreckt. — Die wenigen Arten der Gattung kommen in Nord- und Südamerika vor.

**Podogaster** Brullé.

Flügel mit deutlichem Stigma; Nervus parallelus nicht interstitial. 18.

18. Der hinterste Metatarsus verkürzt, nur ein Drittel der Schienenslänge betragend und deutlich dicker als die folgenden Glieder.

**11. Eripternus** Först.

Der hinterste Metatarsus nicht verkürzt, mehr als ein Drittel der Schienenslänge betragend und nicht deutlich dicker als die folgenden Glieder. 19.

19. Clypeus mit grossen und tiefen Seitengruben. 20. Clypeus mit kleinen Seitengruben. 21.
20. Hinterleib wenigstens beim ♀ gegen das Ende keulenförmig; Bohrer nicht vorragend. Schildchen fein runzlig punktiert, nicht gestreift. Area superomedia vorn offen. Ziemlich kleine, einfärbig schwarze Art.

**12. Nepiesta** Först.

Hinterleib lang, seitlich zusammengedrückt; Bohrer weit vorragend. Schildchen an den Seiten und am Ende grob gestreift. Klauen gekämmt. Die einzige Art, *T. striata* Cam., kommt in Indien vor.

**Trathala** Cam.

21. Bohrer fast so lang wie der Körper; dieser gelb, Hinterleib mehr rot. Stigma gross und breit; rücklaufender Nerv interstitial. Metathorax gefeldert. Der hinterste Metatarsus mehr als halb so lang wie die Schiene, so lang wie die 3 folgenden Glieder zusammen. Die einzige Art, *P. trilineata* Cam., erinnert sehr an eine *Pimpline*. Der gelbe Thorax oben mit 3 grossen schwarzen Flecken. L. 12 mm. Die Art kommt in Transvaal vor.

**Pimplomorpha** Cam.

(Ann. South Afric. Mus. V (1906) p. 95 ♀.)

- Bohrer höchstens so lang wie der Hinterleib. Körper schwarz, Hinterleibsmittle zuweilen rot. 22.
22. Kopf hinter den Augen nicht verengt, fast kubisch. Nervellus nicht gebrochen. Bohrer ziemlich weit vorragend. Bei der einzigen bekannten Art Beine und Hinterleibsmittle rot.

**13. Zaporus** Först.

Kopf nicht kubisch, hinter den Augen mehr oder weniger verengt; nur bei *Nythobia* kaum verschmälert. 23.



23. Nervellus gebrochen. 24.

Nervellus nicht gebrochen. 25.

24. Nervellus unter der Mitte gebrochen. Discocubitalnerv ohne Nervenast. Das 3. Glied der Maxillarpalpen nicht länger als das vierte. Körper schwarz.

14. **Gonotypus** Först.

Nervellus in der Mitte gebrochen. Discocubitalnerv mit Nervenast. Das 3. Glied der Maxillarpalpen länger als das vierte.

15. **Dioratica** Först.

25. Bohrer über die Spitze des Hinterleibs deutlich hinausragend. 26.

Bohrer nicht über die Spitze des Hinterleibs hinausragend. 27.

26. Radialzelle sehr breit; der Winkel, welchen die beiden Abschnitte des Radius mit einander bilden, fast gleich einem rechten.

16. **Phaedroctonus** Först.

Radialzelle nicht sehr breit; der Winkel, welchen die beiden Abschnitte des Radius mit einander bilden, stumpf.

17. **Diocetes** Först.

27. Area supero-externa und dentipara vollständig von einander getrennt. Die beiden hierher gehörenden Arten ziemlich robuste Tiere mit zum Teil rotem Hinterleib.

18. **Eriborus** Först.

Area supero-externa und dentipara nicht getrennt. Kopf nach hinten kaum verschmälert. Die einzige hierher gehörende Art sehr klein, mit an den Seiten gelb geflecktem 3. Segmente.

19. **Nythobia** Först.

28. Radius gebogen, kaum winklig gebrochen. 29.

Radius deutlich winklig gebrochen. 30.

29. Fussklauen nicht gekämmt. Kopf mehr oder weniger kubisch, hinter den Augen nicht verschmälert. Bei der hierher gehörenden Art Hinterleibsmittle und Beine grösstenteils rot.

20. **Diadegma** Först.

Fussklauen gekämmt. Kopf quer, hinter den Augen stark verschmälert. Metathorax fast ungefeldert, nur die vordere Querleiste angedeutet. Die einzige bekannte Art ist schwarz; Beine einfarbig rötlichgelb, die hintersten Hüften schwärzlich.

21. **Sinophorus** Först.

30. Metathorax der Länge nach deutlich ausgehöhlt. Nervellus nicht schief und nicht gebrochen. Kopf hinten nicht verschmälert. Hinterleib schwarz; Bohrer weit vorstehend. Meist ziemlich robuste Arten.

22. **Eulimneria** Schmiedekn.

Metathorax nicht ausgehöhlt, oder wenn dieses der Fall ist (bei Arten von *Omorgus*), dann der Nervellus gebrochen und meist schräg nach vorn und der Kopf nach hinten verschmälert. 31.

31. Kopf fast kubisch. Petiolus mit deutlichen Glymmen (seitlichen Längsgruben). Bohrer vorstehend. Nervellus schief, deutlich gebrochen und einen starken Nerv auswendend. Klauen und Klauenglied kräftig. Durchweg robuste Arten. 32.

Kopf nicht kubisch oder Nervellus nicht schief und nicht gebrochen. 33.

32. Fussklauen an der Basis ohne Kammzähne. Luftlöcher des Metathorax rund. Die beiden Seitenfelder des Metathorax nicht durch eine Querleiste von einander getrennt. Clypeus vorn zugerundet oder in der Mitte schwach eckig vortretend.

23. **Pyracmon** Holmgr.

Fussklauen an der Basis mit einigen Kammzähnen. Luftlöcher des Metathorax gestreckt. Die beiden Seitenfelder des Metathorax durch eine Querleiste von einander getrennt. Clypeus vorn in der Mitte stumpf zahnartig vortretend.

24. **Rhimphoctona** Först.

33. Luftlöcher des 2. Segmentes hinter der Mitte. 34.  
Luftlöcher des 2. Segmentes in oder vor der Mitte. 36.
34. Metathorax grob runzlig, oben ohne Leisten. Bohrer wenig über die Hinterleibsspitze vorragend.

25. **Anempheres** Först.

Metathorax nicht grob runzlig, mit deutlichen Leisten; die beiden Seitenfelder scharf von einander getrennt. Bohrer weit vorragend. 35.

35. Nervus parallelus aus oder unter der Mitte der Brachialzelle entspringend. Der grössere Sporn der Hinterschienen länger als das 2. Tarsenglied.

26. **Idechthis** Först.

Nervus parallelus deutlich über der Mitte der Brachialzelle entspringend. Der grössere Sporn der Hinterschienen nicht so lang wie das 2. Tarsenglied.

27. **Lathrostizus** Först.

36. Clypeus mit grossen und tiefen Seitengruben. 37.  
Clypeus mit kleinen und mehr seichten Seitengruben. 39.
37. Stigma sehr gross. Nervulus und Nervellus sehr schief.  
Die beiden Abschnitte des Radius bilden fast einen rechten Winkel. Fühler schlank, Schaft schwarz. Metathorax gefeldert. Bohrer etwa so lang wie der halbe Hinterleib. Kleine Arten.

28. **Synetaeris** Först.

- Stigma nicht auffallend gross. Nervulus und Nervellus nicht oder wenig schief. Basalnerv fast vertikal. 38.
38. Areola gestielt. Petiolus lang und dünn. Bohrer kaum vorstehend. Nervellus deutlich gebrochen und einen Nerv aussendend. Die einzige bekannte Art mit weisslichen Segmenträndern.

29. **Biolysia** Schmiedekn.

Areola fünfseitig und sitzend, nur bei einer Art kurz gestielt. Petiolus niedergedrückt. Kleine bis sehr kleine Arten von gedrungener Gestalt mit meist rötlich gerandetem 2. Segmente.

30. **Canidia** Holmgr.

39. Metathorax über die Hüften hinaus verlängert. Area superomedia sehr lang. Costula vor der Mitte. Postpetiolus nicht abgegrenzt. Das 2. Segment lang. Bohrer dünn, weit vorragend. Klauen und Klauenglied sehr klein. Körper schlank.

31. **Nemeritis** Holmgr.

Metathorax nicht über die Hüften hinaus verlängert. Körper weniger schlank. 40.

40. Nervellus gebrochen, meist antefurcal. In manchen Fällen ist die Brechung weit unten und ziemlich schwach, dann auch der ausgehende Nerv ziemlich undeutlich, wie z. B. bei Arten von *Omorgus*. 41.

Nervellus nicht gebrochen, mehr oder weniger senkrecht zum unteren Längsnerv stehend. 49.

41. Nervulus und Nervellus sehr schief. 42.

Nervulus nicht oder nur sehr wenig schief. 44.

42. Stigma sehr gross. Metathorax gefeldert. Bohrer ungefähr von halber Hinterleibslänge.

cf. 28. **Synetaeris** Först.

Stigma nicht auffallend gross. 43.

43. Metathorax mit deutlicher Felderung. Der 2. Abschnitt des Radius lang, mit dem 1. fast einen rechten Winkel bildend. Das 2. Segment kurz; Bohrer fast versteckt. Unterseite des Schaftes und der Hinterrand eines oder mehrerer Segmente meist hell gefärbt.

32. **Phobocampe** Först.

Metathorax nicht gefeldert. Hinterleibsstiel lang und schmal; Bohrer vorstehend.

33. **Spudastica** Först.

44. Der 2. Abschnitt des Radius kaum länger als der erste. Areola klein, gestielt, den rücklaufenden Nerv vor der Mitte aufnehmend. Postpetiolus abgegrenzt und niedergedrückt. Luftlöcher des 1. Segmentes vorspringend. Basalglieder der Geissel deutlich. Im Habitus mit Sagaritis ziemlich übereinstimmend.

34. **Ecphoropsis** Ashm.

Der zweite Abschnitt des Radius deutlich länger als der erste. 45.

45. Petiolus ohne Seitengruben (Glymmen). 46.

Petiolus mit Seitengruben. Bohrer vorstehend. 48.

46. Bohrer weit vorstehend. Postpetiolus verbreitert, an den Seiten gerundet. Metathorax bei einigen Arten der Länge nach ausgehöhlt.

35. **Omorgus** Först.

Bohrer kurz oder versteckt. Postpetiolus wenig oder nicht verbreitert. 47.

47. Bohrer etwas vorstehend. Area superomedia lang, Costula vor der Mitte. Areola unregelmässig, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend. Geissel und Schienen dick.

36. **Lathroplex** Först.

Bohrer versteckt. Area superomedia quer, Costula kräftig. Areola gross, rhombisch, den rücklaufenden Nerv vor der Mitte aufnehmend. Fühler des ♀ mit weissem Ring.

37. **Callidora** Först.

48. Das 2. Segment länger als breit, die Luftlöcher desselben etwas hinter der Mitte. Schulterbeulen vor den Flügeln und die Endränder von Segment 2—7 breit weisslich. Bohrer kurz.

38. **Nepiera** Först.

Das 2. Segment nicht länger als breit; die Luftlöcher desselben etwas vor der Mitte; Bohrer dick. Thorax etwas bucklig.

39. **Tranosema** Först.

49. Kopf mehr oder weniger kubisch, hinter den Augen nicht verengt. 50.

Kopf nicht kubisch. Zähne der Mandibeln gleich. 51.

50. Der untere Zahn der Mandibeln länger als der obere. Klauen stark, gekämmt. Bohrer versteckt. Hinterleibsmittle meist rot und Schaft unten hell.

40. **Olesicampe** Först.

Zähne der Mandibeln gleich. Bohrer meist ziemlich weit vorstehend. Beine grösstenteils rot.

41. **Meloboris** (Holmgr.) Thoms.

51. Mittelbrust (Mesosternum) vor den Mittelhüften mit einem zweiteiligen Zahn oder Fortsatz. Nervus parallelus über der Mitte der Brachialzelle entspringend. Klauen kräftig stark gekämmt. 2. Segment kurz, Bohrer vorstehend.

cf. 27. **Lathrostizus** Först.

Mittelbrust unbewehrt. Nervus parallelus meist aus der Mitte der Brachialzelle entspringend. 52.

52. Basalnerv fast senkrecht aufsteigend; Stigma mehr oder weniger breit. Hinterleib meist schwarz; Bohrer in der Regel weit vorstehend.

42. **Angitia** (Holmgr.) Thoms.

Basalnerv mehr oder weniger schräg nach aussen. Bohrer nicht oder wenig vorstehend. Hinterleib oft rot gezeichnet. 53.

53. Kopf hinter den Augen verengt. Schaft meist schwarz Hinterleib gewöhnlich mit rotem Gürtel. Augen innen etwas ausgerandet.

43. **Anilastus** Först.

Kopf hinter den Augen nicht oder wenig verengt. Postpetiolus viel breiter als der Petiolus. Schaft meist unten hell. Bohrer kaum vorragend. Hinterleib selten mit rotem Gürtel, meist an den Seiten rot.

44. **Holocremnus** Först.

## 1. Gen. **Campoplex** Grav. s. str.

1829 Campoplex Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 453.

Kopf quer, nach hinten in der Regel mehr oder weniger verschmälert, selten etwas aufgetrieben; Augen innen oberhalb der Fühlereinklenkung deutlich ausgerandet; Fühler kürzer als der Körper. Metathorax gestreckt, selten mit Andeutung von

Felderung, in der Regel der Länge nach mehr oder weniger vertieft; Luftlöcher eine Längsspalte bildend oder gestreckt oval. Areola im Vorderflügel gross, meist pentagonal, die Seitennerven zuweilen oben zusammenlaufend. Stigma schmal, Radius meist vor der Mitte desselben entspringend. Nervellus unten, höchst selten in der Mitte gebrochen, die Brechung oft sehr undeutlich. Von Wichtigkeit für die Unterscheidung der Arten ist das Längenverhältnis zwischen dem rücklaufenden Nerven und der Abscissula im Unterflügel. Der rücklaufende Nerv ist der obere Quernerv, die Abscissula der Basalteil des Radius vom Vorderrand des Hinterflügels bis zum rücklaufenden Nerv. Beine schlank; die hintersten Schenkel in der Regel schwarz gefärbt; Klauen mehr oder weniger deutlich gekämmt. Hinterleib stark von der Seite zusammengedrückt, mit kurzem Bohrer, Hinterleibsmittle stets rot gefärbt, selten auch der Postpetiolus zum Teil rot gefärbt; letzterer bei einer Anzahl grösserer Arten deutlich comprimiert, bei der Mehrzahl der Arten mehr flach. Luftlöcher des 2. Segmentes meist in der Mitte; das 3. Segment an den Seiten mit scharfer, meist als schwarze Linie vortretender Kante, die nicht bis zum Segmentende reicht. Von grosser Wichtigkeit ist die Membran des 1. und 2. Bauchsegmentes; die des 1. Segmentes reicht nach vorn nicht über die Mitte des Postpetiolus hinaus.

Die Gattung *Campoplex* gehört mit zu den schwierigsten Ichneumoniden - Gattungen. Die älteren Autoren vereinigten die zahlreichen Gattungen und Arten sämtlich unter *Campoplex* und da sie fast nur Farbenskizzen liefern, haben ihre Beschreibungen nicht den geringsten Wert. Erst Holmgren suchte durch Aufstellung einer Reihe von Gattungen eine Uebersicht zu schaffen, gleichwohl verstand er nicht die mittelgrossen und kleinen Arten von *Campoplex* von einander zu trennen. Förster in seiner Monographie der Gattung *Campoplex* (Verhandl. der zool. bot. Ges. Wien, 1868) verstand es auch hier durch Auffindung neuer Unterscheidungsmerkmale Licht zu schaffen, geht aber auch bei dieser Gattung in der Zersplitterung zu weit. Die letzte höchst wertvolle Bearbeitung stammt von Thomson, der das ganze 11. Heft der *Opuscula Entomologica* der Gattung *Campoplex* (im weiten Sinne) widmet.

#### Uebersicht der paläarktischen Arten.

1. Hinterleib glatt und glänzend, höchstens ganz fein und zerstreut punktiert oder ganz fein nadelrissig. 2.

Hinterleib mit ziemlich groben und tief eingestochenen Punkten oder grob gerunzelt. 89.

2. Membran des 1. Segmentes nicht oder nur wenig länger als die des 2. Segmentes, die Mitte des Postpetiolus erreichend. Abscissula im Unterflügel lang. Körper gross oder mittelgross. 3.

Membran des 1. Segmentes lang, doppelt so lang als die des 2., nach vorn nicht bis zur Mitte des Postpetiolus, nach hinten bis zu den Spirakeln des 2. Segmentes reichend; die letzteren weit hinter der Mitte. Abscissula nicht viel länger als der rücklaufende Nerv. Körper mittelgross oder klein. 36.

3. Postpetiolus comprimiert, wenig breiter als der Petiolus Hinterleibsmittle stark comprimiert, gelb oder rotgelb. Hinterschienen auch beim ♀ blassgelb. 4.

Postpetiolus schwach comprimiert, deutlich breiter als der Petiolus. Hinterleibsmittle stumpf zusammengedrückt, rot. Tegulä, besonders beim ♀, meist schwarz. Die helle Zeichnung der Hinterschienen rot. 16.

4. Hinterleibsmittle dunkelgelb. Wangenleiste vorn nicht lamellenartig erhaben. 5.

Hinterleibsmittle und Beine grösstenteils hell zitronengelb. Wangenleiste vorn lamellenartig. Areola sitzend. Metathorax hinten quergestreift. 13.

5. Stirn mit scharfem Kiel. Petiolus ohne Seitengruben. Nervulus bei der einen Art schief. 6.

Stirn ohne Kiel, höchstens mit erhabener Linie. Petiolus mit tiefen Seitengruben. Nervulus nicht schief. 7.

6. Speculum der Mesopleuren fast matt. Rücklaufender Nerv in der Mitte der Areola; Nervulus schief; Nervellus wenig unter der Mitte gebrochen. Schildchen in der Mitte glänzend, sparsam punktiert. Das 5. Segment grösstenteils gelb. 16—20 mm.

#### 1. **carinifrons** Holmgr.

Speculum der Mesopleuren glänzend, fast glatt. Rücklaufender Nerv vor der Mitte; Nervulus wenig schief; Nervellus ziemlich weit unterhalb der Mitte gebrochen. Schildchen matt, dicht punktiert. Hinterleibsmittle dunkler gelb, das 5. Segment grösstenteils schwarz. Etwas kleinere Art, bis 16 mm.

#### 2. **rugulosus** Först.

7. Die schwarze Seitenlinie des 3. Segmentes liegt über dem Seitenrande. Klauen kaum gekämmt. Stirn über den Fühlern deutlich eingedrückt; Fühlergruben fast ohrartig.

Palpen und Mandibeln schwärzlich, letztere in der Mitte gelb. 18—20 mm.

3. **mactator** Först.

Die schwarze Seitenlinie des 3. Segmentes fehlt oder bildet den Seitenrand selbst. Klauen deutlich gekämmt. 8.

8. Das 3. Segment vorn mit kurzer schwarzer Seitenlinie, das 5. Segment schwarz. 9.

Das 3. Segment ohne schwarze Seitenlinie. Stirn über den Fühlern eingedrückt. 11.

9. Stirn über den Fühlern nicht eingedrückt, mit erhabener Linie. Die hintersten Schenkel ganz schwarz. 16 mm.

4. **rugifer** Först.

Stirn über den Fühlern deutlich eingedrückt. 10.

10. Hinterschenkel an der Spitze rot. Stirn über den Fühlern nicht mit groben Längsrünzeln. 12—16 mm.

5. **canaliculatus** Först.

Hinterschenkel ganz schwarz. Stirn über den Fühlern mit groben Längsrünzeln. 12—16 mm.

6. **infestus** Först.

11. Die hintersten Schienen ganz gelb. Vor dem Speculum wenige aber deutliche Streifen. 16—20 mm.

7. **falcator** F.

Die hintersten Schienen am Ende rostrot oder schwarz. Der Raum vor dem Speculum dicht und fein gestreift. 12.

12. Die hintersten Schienen am Ende rostrot. Postpetiolus schwarz. Grössere Art von 14—16 mm.

8. **obliteratus** Holmgr.

Die hintersten Schienen am Ende schwarz. Postpetiolus zum Teil rot. Kleinere Art von 12—14 mm.

9. **consimilis** n. sp.

13. Schaft ganz blassgelb, ebenso Tegulä und Beine; die hintersten Hüften, Trochantern und Schenkel schwarz, die Tarsen braun. ♀ unbekannt. 9 mm.

13. **flaviscapus** Thoms.

Schaft schwarz. 14.

14. Fast die ganze Endhälfte der hintersten Schienen schwarz. Kopf hinter den Augen verengt. 7—8 mm.

11. **calceatus** Brauns.

Die hintersten Schienen ganz gelb, höchstens an der Spitze etwas verdunkelt. 15.



15. Kopf hinter den Augen kaum verengt. Grössere Art von 12—14 mm.

10. **oxyacanthae** Boie.

Kopf hinter den Augen deutlich verengt. Kleinere Art von 8—10 mm.

12. **angustatus** Thoms.

16. Sehr grosse Art von 19 mm Länge. Die hintersten Schenkel an der Spitze rot.

14. **femorator** Bridgm.

Kleinere Arten. Die hintersten Schenkel meist ganz schwarz. 17.

17. Basalglieder der Fühlergeissel deutlich von einander abgesetzt; das 1. Glied um die Hälfte länger als das 2., letzteres kaum länger als breit. Stirn über den Fühlern nicht eingedrückt. Klauen oft den Pulvillus deutlich überragend. Das 3. Segment mit langer schwarzer Seitenlinie. 18.

Basalglieder der Geissel nicht oder kaum von einander abgesetzt und deshalb schwer unterscheidbar. Wangen in der Regel sehr kurz. Klauen den Pulvillus nicht oder kaum überragend. 23.

18. Wangen lang, nicht oder kaum kürzer als die Breite der Mandibelbasis. Thorax mit kurzer aber deutlicher Basalzelle. Der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle ein rechter. Klauen lang aber wenig gekämmt, den Pulvillus überragend. Hinterleibssegment 2 am Ende, 3 und 4 ganz rot. 19.

Wangen sehr kurz. Der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle ziemlich spitz. Hinterleib glatt und glänzend, mit undeutlichem, braunroten Gürtel, zuweilen ganz schwarz. 21.

19. Mittelschenkel bis über die Mitte hinaus schwarz. Die hintersten Schienen an Basis und Ende schwarz. Bohrer lang, länger als der Postpetiolus. 10—14 mm.

15. **terebrator** Först.

Mittelschenkel ganz rot. Die hintersten Schienen nur am Ende schwarz. Bohrer kurz. 20.

20. Das 2. Segment nur am Endrand rot. Die schwarze Seitenlinie des 3. Segmentes am Ende nicht geteilt. 12—14 mm.

16. **nitidulator** Holmgr.

Das 2. Segment hinten zur Hälfte rot. Die schwarze Seitenlinie des 3. Segmentes am Ende gegabelt. 14 mm.

17. **bifidus** Thoms.

21. Hinterleib ganz schwarz. Schiensporen klein und gekrümmt. Die hintersten Schienen rötlichgelb, an der Basis schmal, am Ende breit schwarz, die Tarsen gelblich. 10—12 mm.

18. **nobilitatus** Holmgr.

Hinterleib mit braunrotem Gürtel. Die hintersten Schienen rot, nur an der Basis schwärzlich. 22.

22. Hinterleibsende rot, Segment 6 und 7 oben mit schwarzem Streif. Schenkel und Schienen rotbraun. 12 mm.

19. **castaneipes** Thoms.

Nur die Hinterleibsmittle schmal rot. Die hintersten Schenkel schwarz, am Ende rot. 12 mm.

20. **splendens** Thoms.

23. Hinterleib nur mit schmalen braunroten Ring; das 3. Segment hinten mehr oder weniger ausgedehnt schwarz. Die hintersten Schenkel am Ende rot. Die hintersten Schienen bei der einen Art gelblich. 24.

Das 3. Hinterleibsegment ganz rot. Die hintersten Schienen des ♀ rot oder rotbraun. 25.

24. Schienen des ♀ gelblich, deutlich gedorn. Pronotum an den Seiten unten gestreift. 12—16 mm.

21. **cultrator** Grav.

Schienen des ♀ rot, die hintersten an Basis und Spitze schwärzlich. Pronotum an den Seiten unten nicht gestreift. 14—16 mm.

22. **latungula** Thoms.

25. Das 4. Segment, wenigstens beim ♀, ganz rot. Die schwarze Seitenlinie des 3. Segmentes bis über die Mitte. Das 2. Segment schwarz, an den Seiten und am Ende rot. 26.

Das 4. Segment am Ende schwarz, oder die schwarze Seitenlinie des 3. Segmentes sehr kurz. 30.

26. Das 5. Segment ganz oder grösstenteils rot. 27.

Das 5. Segment schwarz, höchstens an der Basis schmal rot. 28.

27. Stirn beiderseits in der Augenausrandung mit einem erhabenen Punkte, ähnlich einem Nebenaugen. Metathorax nicht stark und regelmässig quergestreift. 10—12 mm.

23. **pugillator** L.

Stirn ohne diese Punkte an den Seiten. Metathorax grob und regelmässig quergestreift. 12—13 mm.

24. **transversostriatus** n. sp.

28. Beim ♀ die Tegulä und vorderen Schenkel rot; beim ♂ alle Trochantern, Unterseite der Vorderhüften und Tegulä hellgelb. 10—12 mm.

25. **subaequalis** Först.

Beim ♀ die Tegulä und Basalhälfte der Mittelschenkel schwarz; beim ♂ Hüften und Trochantern nicht hellgelb gefärbt. 29.

29. Stirn schwach gekielt. Schildchen flach, rauh punktiert. Nervellus wenig unter der Mitte gebrochen. Hinterleibsende schwarz. 12—14 mm.

26. **stragifex** Först.

Stirn scharf gekielt. Schildchen gewölbt, an der Basis und Spitze abfallend, mit feinerer Skulptur. Nervellus tief unter der Mitte gebrochen. Hinterleibsende meist blauschwarz. 14—15 mm.

27. **adjunctus** Först.

30. Der aufgebogene Seitenrand des 3. Segmentes ziemlich lang und dementsprechend auch die schwarze Seitenlinie lang. Das 4. Segment schwarz mit rotem Seitenrand. Nervus recurrens vor der Mitte der Areola. 31.

Der aufgebogene Seitenrand des 3. Segmentes kurz, zuweilen ganz fehlend, auch die schwarze Seitenlinie des 3. Segmentes meist kurz, zuweilen noch eine 2. Seitenlinie aus dem Vorderwinkel. Nervus recurrens meist hinter der Mitte der Areola. 34.

31. Speculum matt. Metathorax fast vollständig gefeldert, mit Spuren von Seitenzähnen. 13 mm.

28. **areolatus** Brauns.

Speculum poliert. Metathorax höchstens mit Spuren von Felderung. 32.

32. Hinterleibsstiel an den Seiten mit grossen und tiefen Gruben (Glymmen). Hinterleib glänzend. Die hintersten Schienen an Basis und Spitze breit schwarz. Rücklaufender Nerv weit vor der Mitte der Areola. 10—12 mm.

29. **foveolatus** Först.

Hinterleibsstiel mit kleinen oder kaum merkbaren Seiten gruben. Hinterleib weniger glänzend. 33.

33. Mittelbrustseiten punktiert, mit glatten und glänzenden Zwischenräumen, Speculum sehr gross. Stiel des 1. Segmentes oben gewölbt. 12 mm.

30. **flavipalpis** Först.

Mittelbrustseiten punktiert, mit lederartigen, matten Zwischenräumen. Seitengruben des Hinterleibsstieles fast ganz fehlend, letztere ziemlich flach. 8—10 mm.

31. **contumax** Först.

34. Das 4. Segment hinten schwarz, das 3. mit schwarzer Seitenlinie. Rücklaufender Nerv in oder hinter der Mitte der Areola. 10—12 mm.

32. **insignitus** Först.

Das 4. Segment ganz rot. 35.

35. Das 3. Segment mit langer schwarzer Linie unter den Spirakeln. Rücklaufender Nerv fast vor der Mitte. Wangen sehr kurz. Speculum ziemlich matt. Grössere Art von 12—14 mm.

33. **vigilator** Först.

Das 3. Segment nur mit kurzer schwarzer Seitenlinie. Rücklaufender Nerv eher hinter der Mitte. Wangen ziemlich lang. Kleine Art von etwa 9 mm.

34. **genalis** Thoms.

36. Körper ganz schwarz; die vorderen Schenkel und Schienen rötlichgelb, die hintersten Schienen blassgelb, an Basis und Spitze breit schwarz.

cf. **Trophoctona vidua** Grav.

Hinterleibsmittle rot gezeichnet. 37.

37. Nervellus über der Mitte gebrochen. Der breite Endrand des 2. Segmentes, das 3. und 4. ganz rot. Beine schwarz, die vordersten Schenkel, die Mittelschenkel an der Spitze und die Schienen rot; die hintersten Schienen an Basis und Spitze schwarz. 10—11 mm.

35. **xenocamptus** Först.

Nervellus unter der Mitte gebrochen. 38.

38. Stirn über den Fühlern eingedrückt; Fühlergruben ohrförmig. Die schwarze Seitenlinie des 3. Segmentes lang. 39. Stirn über den Fühlern nicht oder kaum eingedrückt. Fühlergruben einfach. 41.

39. Das 2. Segment rot mit schwarzer Makel an der Basis. Areola gestielt. Beim ♂ die Beine zum grossen Teil gelb. 8—10 mm.

36. **anceps** Holmgr.

Das 2. Segment schwarz, nur am Endrande hell. Grössere Arten. 40.

40. Tegulä in beiden Geschlechtern schwarz. Mittelschenkel nur an der Spitze gelb. 14 mm.

37. **pineticola** Holmgr.

Tegulä braungelb, am Ende braun. Die Endhälfte der Mittelschenkel gelb. Flügel stark gebräunt. 13 mm.

38. **auritus** Kriechb.

41. Postpetiolus beiderseits rot gezeichnet. 42.

Postpetiolus nicht rot gezeichnet. 43.

42. Palpen braun. Mesopleuren matt, dicht punktiert. Rücklaufender Nerv hinter der Mitte. 10—13 mm.

39. **confusus** Först.

Palpen rötlichgelb. Mesopleuren glänzend, zerstreut und ziemlich grob punktiert. Rücklaufender Nerv fast in der Mitte. 13—15 mm.

40. **signator** Brauns.

43. Kopf hinter den Augen nicht verschmälert, fast kubisch. Das 3. Segment ohne oder mit ganz kurzer schwarzer Seitenlinie. Stigma meist dunkelbraun. Beine grösstenteils schwarz. 44.

Kopf quer. 48.

44. Beine, auch die Schienen, schwarz, nur die vordersten etwas heller. 45.

Schienen, zum Teil auch die Vorderschenkel zum Teil rot. 47.

45. Rücklaufender Nerv vor der Mitte. Das 3. Segment hellrot, deutlich kürzer als das zweite. Hinterleib stark zusammengedrückt. Bohrer lang. 9 mm.

41. **lapponicus** Holmgr.

Rücklaufender Nerv eher hinter der Mitte. 46.

46. Mesonotum ziemlich glänzend, nicht dicht punktiert. Segment 3 mit kurzer schwarzer Seitenlinie. Beim ♂ Hüften und Trochantern oben gelb gestreift. 10—12 mm.

42. **bucculentus** Holmgr.

Mesonotum fast matt, sehr dicht punktiert. Die schwarze Seitenlinie des 3. Segmentes bis über die Luftlöcher hinaus reichend. Hüften und Trochantern des ♂ nicht gelb gestreift. 10 mm.

43. **stygius** Först.

47. Beine ziemlich schlank, die hintersten Schienen an der Basis schwarz; Vorder- und Mittelschenkel am Ende hell. Endrand des 2. Segmentes, des 3. und des 4. mit Ausnahme des schwarzen Endrandes braunrot. 10 mm.

44. **opacus** Thoms.

Beine, besonders die Schenkel, kräftig. Die mittleren Kniee und Schienen braun. Rücklaufender Nerv hinter der Mitte. Die hintere Hälfte des 2. Segmentes rot. 11 mm.

45. **crassipes** Thoms.

48. Stirn mit deutlicher Leiste oder Kiel. Metathorax schwach eingedrückt. Die hintersten Schenkel schwach. 49.  
Stirn ohne oder mit nur ganz schwacher Leiste. 56.

49. Hinterschenkel rot. Das 3. Segment ohne schwarze Seitenlinie. 7–9 mm.

46. **juvenilis** Först.

Hinterschenkel schwarz. 50.

50. Zwischen den Nebenaugen ein eingedrückter Punkt oder ein kleines Grübchen. Areola sitzend. 8 mm.

47. **humilis** Först.

Zwischen den Nebenaugen kein eingedrückter Punkt oder ein Grübchen oder Areola gestielt. 51.

51. Von der Fühlergrube gehen radienförmig 5–6 Kiele nach oben aus. Beine grösstenteils gelb. 11 mm.

48. **costulatus** Bridgm.

Stirn ohne radienförmig gestellte Kiele oder Leisten. 52.

52. Nur die ♂♂ bekannt. 53.

Nur die ♀♀ bekannt. 54.

53. Metathorax der Länge nach nur bis über die Mitte schwach eingedrückt, ohne Querrunzeln. Hinterleib grösstenteils rot, am Ende oben schwarz. Analklappen gelb. 9 mm.

49. **subimpressus** Först.

Metathorax der ganzen Länge nach eingedrückt, der Eindruck bis an das Ende grob querrunzlig. Segment 2 an den Seiten und 3 und 4 rot, das 3. jedoch an der Basis oben schwarz. Analklappen dunkel. 9 mm.

50. **circumcinctus** Först.

54. Das 3. Segment am Seitenrande breit ausgebuchtet, die Ausbuchtung schwarz gerandet. Das 3. Segment rot mit schwarzer Rückenlinie. Schienen grösstenteils gelb. 13 mm.

51. **perditor** Först.

Das 3. Segment ohne Ausrandung an der Seite. 55.

55. Seiten des Pronotums unten runzlig. Das 2. Segment fast um die Hälfte länger als das dritte. Tegulä blassgelb. Rücklaufender Nerv vor der Mitte. 8–9 mm.

52. **subcinctus** Först.

Seiten des Pronotums unten glänzend, gestreift. Das 2. Segment nur wenig länger als das dritte. Tegulä braun. Rücklaufender Nerv in der Mitte. 10—11 mm.

53. **spinipes** Thoms.

56. Hinterleib sehr schlank, Petiolus linear und fast gerade, das 3. Segment an den Seiten bis fast zum Ende schwarz gerandet. Metathorax kaum eingedrückt, mit deutlichen Spuren von Felderung. Endrand des 2. Segmentes, das 3. und 4. und der Vorderrand des 5. rot. Rücklaufender Nerv hinter der Mitte der Areola. Nervulus interstitial. 9 mm.

54. **leptogaster** Holmgr.

Das 3. Segment nicht oder nur an der Basis gerandet. Petiolus nicht linear. Metathorax der Länge nach vertieft. 57.

57. Die hintersten Schienen des ♀ schwarz oder in der Mitte trüb rot. Die Acetabula hinter den Vorderhüften (die Leiste am Vorderrand der Mittelbrust) in der Regel stark erhaben, meist zweilappig. Tegulä schwarz. Hinterleibsspitze oft blauschwarz. 58.

Die hintersten Schienen des ♀ in der Mitte rot oder gelb. 64.

58. Stigma braun bis schwarzbraun. Hinterbeine ganz schwarz. 59. Stigma rötlichgelb. 60.

59. Mesopleuren mit glatten Zwischenräumen. Das 3. und 4. Segment rot, das 3. an der Basis braun, das 4. mit dunklem Längsstreif. Rücklaufender Nerv vor der Mitte der Areola. 9—10 mm.

55. **punctatus** Bridgm.

Mesopleuren matt. Das 3. und 4. Segment ganz rot. Rücklaufender Nerv etwas jenseits (hinter) der Mitte der Areola. 8 mm.

56. **incompletus** Bridgm.

60. Hinterleibsende blauschwarz. Nervulus ganz oder fast ganz interstitial. 61.

Hinterleibsende schwarz. Nervulus ziemlich weit hinter der Gabel. Areola gestielt. 63.

61. Areola im Vorderflügel breit sitzend, pentagonal. Segment 2—4 rot, das 2. mit schwarzer Basalhälfte. Beine ziemlich dick, schwarz, die vordersten Schenkel an der Spitze und die Vorderschienen rötlich. Grössere Art von 10—12 mm.

57. **dubiosus** Först.

Areola im Vorderflügel gestielt. Kleinere Arten. 62.

62. *Acetabula* zweilappig. Hinterleib beim ♀ rot, Segment 1 und der grösste Teil von 2 schwarz, selten 6—8 mit schwarzem Rücken; beim ♂ ist Segment 6—8 schwarz. 8—9 mm.

58. **erythrogaster** Först.

*Acetabula* stark leistenartig, aber nicht zweilappig. Segment 2—4 rot, 2 an der Basis schwarz. 9 mm.

59. **aversus** Först.

63. Fühler nicht auffallend lang. Metathorax nicht oder wenig quergestreift. Areola kurz gestielt. Nervulus ziemlich weit hinter der Gabel. Endrand von Segment 2 und 3 und 4 ganz rot. 7—9 mm.

60. **notabilis** Först.

Sehr ähnlich der vorigen Art aber Fühler länger und gegen das Ende mehr verdünnt, Mittelfurche des Metathorax dicht quergestreift und Beine schlanker. 9 mm.

61. **heterocerus** Först.

64. *Acetabula* (die Leiste am Vorderrande der Mittelbrust) in der Mitte zweilappig. Metathorax zum Teil gefeldert. Fühler kurz und dick, gegen das Ende nicht verdünnt. Endabschnitt des Radius gerade, kaum länger als der Basalabschnitt. Nervulus etwas hinter der Gabel. Rücklaufender Nerv hinter der Mitte der Areola. Das 2. Segment schwarz, nur der Endrand rot. 65.

*Acetabula* einfach, nicht zweilappig. Metathorax nicht oder kaum gefeldert. 71.

65. Hinterleibsende blauschwarz. Bauchfalte braun. Bohrer kurz. Areola mehr oder weniger sitzend. Tegulä hell. Segment 2 am Endrande, 3 ganz, 4 zum Teil rot. 6—8 mm.

62. **obreptans** Först.

Hinterleibsende schwarz. 66.

66. ♀. 67.

♂. 70.

67. Bohrer ziemlich lang. 68.

Bohrer kurz. 69.

68. Tegulä schwarz. Hüften, Trochantern, Mandibeln und Palpen schwarz. 6—7 mm.

63. **alticola** Grav. ♀.

Tegulä hell. Auch die vorderen Hüften und Trochantern zum Teil hell. Hinterleib ziemlich glatt und glänzend. 6—7 mm.

64. **monozonus** Först. ♀.



69. Bohrerklappen sehr breit, an der Basis stark verschmälert, an der Spitze blass gefärbt. Das 2. Segment an der Spitze und das 3. ganz rot. 7—8 mm.

65. **stenogaster** Först. ♀.

Bohrerklappen weniger breit, an der Spitze nicht blasser. Das 2. Segment am Ende, das 3. ganz, das 4. an den Seiten mehr oder weniger rot. 8 mm.

66. **disclusus** Först. ♀.

70. Mandibeln, Palpen, Hüften, Trochantern und Tegulä schwarz.

63. **alticola** Grav. ♂.

Tegulä und Mund gelb, teilweise auch die Unterseite der vorderen Hüften und Trochantern. Die areae superoexternae von einer scharfen Leiste rings umgeben.

64. **monozonus** Först. ♂.

71. Vorderbrustseiten tief unten mit scharfen Querrunzeln. Tegulä rot oder rotgelb. 72.

Vorderbrustseiten unten ohne scharfe Querrunzeln oder Tegulä schwarz. 73.

72. Areola im Vorderflügel sitzend. Postpetiolus zwischen den Spirakeln am breitesten, hinter denselben nach der Spitze hin allmählich verschmälert. Nur das ♂ bekannt. 10 mm.

67. **proximus** Först.

Areola im Vorderflügel gestielt. Postpetiolus zwischen den Spirakeln nicht breiter als an der Spitze. Nur das ♂ bekannt. Kleiner als die vorhergehende Art, 8 mm.

68. **anxius** Först.

73. Das 2. Segment nur am äussersten Rande hell. Hintersehenkel schwarz. Radius am Ende meist gerade. 74.

Das 2. Segment am Ende breit rot. Radius am Ende meist gebogen. 77.

74. Pronotumseiten unten nicht glänzend. Areola gestielt, der rücklaufende Nerv weit hinter der Mitte. Die hintersten Schienen gelb, an Basis und Spitze schwarz. 8 mm.

69. **angustifrons** Först.

Pronotumseiten unten glänzend. Areola von anderer Form. 75.

75. Zwischen den Nebenaugen ein eingedrückter Punkt oder ein kleines Grübchen. Areola sitzend. 8 mm.

cf. 47. **humilis** Först.

Zwischen den Nebenaugen kein eingedrückter Punkt. 76.

76. Das 3. Segment ganz rot, das 4. mehr oder weniger ausgedehnt schwarz. Die hintersten Schenkel schwarz. 5—7 mm.

70. **zonellus** Först.

Das 3. und 4. Segment ganz, das 5. zum Teil rot. Gesicht schmaler als bei *zonellus*, quadratisch. 6 mm.

71. **stenocarus** Thoms.

77. Augen kaum ausgerandet. Radiusende gekrümmt. Discoidalzelle mit stumpfem unteren Aussenwinkel. 78.

Augen deutlich ausgerandet. Der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle ein rechter. 79.

78. Hinterschenkel ganz schwarz. Segment 3 und 4 ganz rot. 6 mm.

72. **circumspectans** Först.

Hinterschenkel an der Spitze in ziemlicher Ausdehnung und zum Teil auch an der Basis rotgelb. Die hintere Hälfte des 4. Segmentes schwarz. 6—7 mm.

73. **Habermehli** Kriechb.

79. Das 2. Segment wenig länger als das dritte. Die hintersten Schenkel meist schwarz. 80.

Das 2. Segment deutlich länger als das dritte; das 5. Segment zum Teil rotgelb. Beine schlank mit gelben Schenkeln. Kopf hinter den Augen verschmälert. Fühler lang und dünn. Metathorax dicht weiss behaart, fast ohne Leisten. 86.

80. Mesopleuren grob aber nicht dicht punktiert. Wangenleiste vorn lamellenartig vorstehend. Scheitel breit. Rücklaufender Nerv in der Mitte der Areola. Metathorax dicht quergestreift. Gesicht stark punktiert. Radialnerv am Ende kaum gebogen. Endhälfte von Segment 2 und 3 und 4 rot. 8—9 mm.

74. **sobolicida** Först.

Mesopleuren nicht grob punktiert. Wangenleiste nicht lamellenartig erhaben. 81.

81. Segment 2—4 rotgelb, das 2. mit langer schwarzer Rückenmakel. Endabschnitt des Radius kaum gekrümmt, wenig länger als die Basis. Nervulus weit hinter der Gabel. 8—9 mm.

75. **remotus** Först.

Das 2. Segment anders gezeichnet. Radiusende meist gekrümmt. 82.

82. Radius am Ende gerade. Nervulus nicht weit hinter der Gabel. Segment 2 an der Endhälfte und 3 und 4 rotgelb. Die vordersten Schenkel ganz, die mittelsten am Ende rot;

Schienen gelblich, die hintersten an Basis und Spitze schwarzbraun. 8—9 mm.

76. **rectus** Thoms.

Radius am Ende ziemlich stark gekrümmt. 83.

83. Kopf hinter den Augen deutlich verschmälert. Segment 2 am Ende, 3 ganz, 4 ganz oder an der Basis gelbrot. Tegulä und Bauchfalte gelb. 84.

Kopf nach hinten wenig verengt. Hinterleibsmittle rot. Beim ♂ die Vorderhüften am Ende gelb. Tegulä schwärzlich. Bauchfalte braun. 85.

84. Das 1. Segment seitlich vor den Luftlöchern mit einem deutlichen Grübchen. Das 4. Segment ganz rotgelb. 9—10 mm.

77. **inermis** Först.

Das 1. Segment seitlich vor den Luftlöchern ohne Grübchen. Das 4. Segment nur an der Basis rotgelb. 8 mm. Nur das ♂ bekannt.

78. **peraffinis** Först.

85. Das 2. Segment nur am Endrand rot. Nervulus kurz hinter der Gabel. 7—9 mm.

79. **tenuis** Först.

Das 2. Segment an der ganzen Endhälfte rot. Nervulus weit hinter der Gabel. Areola fast sitzend. Der rücklaufende Nerv etwas hinter der Mitte. 7 mm.

80. **debilis** Först.

86. Beine ganz gelb, nur Hüften und Trochantern schwarz. Segment 2 rot, an der Basis mit dunkler Makel, welche nicht bis zur Mitte reicht; das 5. Segment fast ganz schwarz. Tegulä und Mandibeln schwarz. 7 mm.

81. **luteipes** Thoms.

Beine mehr oder weniger dunkel gezeichnet. 87.

87. Der rücklaufende Nerv mündet in die Mitte der Areola. Hüften und Trochantern am Ende gelb. Pronotum-Seiten unten glänzend. 6—7 mm.

**Mariae D. T.**

Der rücklaufende Nerv mündet hinter der Mitte der Areola. 88.

88. Das 3. Segment ohne lange schwarze Seitenlinie. Der rücklaufende Nerv nicht weit hinter der Mitte der Areola. Das 2. Segment hinten breit, das 3. und 4. ganz, das 5. an der Basis und Unterseite hellrot. 7—8 mm.

83. **limnobioides** Thoms.

Das 3. Segment mit langer schwarzer Seitenlinie. Der rücklaufende Nerv weit hinter der Mitte der Areola; letztere gross und breit, gestielt. 7—9 mm.

84. **annexus** Först.

89. Das 3. Segment mit umgeschlagenem Seitenrand, dieser selbst mit schwarzer Seitenlinie.

85. **punctus** Kriechb.

Das 3. Segment mit glattem, nicht umgeschlagenem Seitenrand. 90.

90. Das 3. Segment mit kurzer schwarzer Seitenlinie an der Basis; Segment 5—7 grob netzartig gerunzelt.

86. **lacunosus** Kriechb.

Das 3. Segment ohne schwarze Seitenlinie. Hinterleib vom 2. Segment an oben punktiert.

87. **limiventris** Kriechb.

**I. Section.** Das 1. Hinterleibssegment in der Mitte höher als breit, Postpetiolus ziemlich stark seitlich zusammengedrückt, wenig breiter als der Petiolus; die Membran des 1. Segmentes ungefähr so lang wie die des 2., nach vorn bis zur Mitte des Postpetiolus reichend; Segment 3—5—6 dunkelgelb, selten citrongelb, stark seitlich zusammengedrückt. Die hintersten Schienen auch beim ♀ hellgelb. Luftlöcher des Metathorax langgestreckt, gross. Abscissula im Hinterflügel lang, Klauen lang. Körper gross oder mittelgross.

1. **C. carinifrons** Holmgr. 1829 *C. mixtus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 601 (partim) | 1858 *C. carinifrons* Holmgren, Ophionider (K. Vet.-Akad. Handl. II) p. 34 ♀ | 1868 *C. minas* Förster, Monogr. Campoplex (Verh. zool. bot. Ges. Wien) p. 795 ♀.

Kopf quer, hinter den Augen wenig verschmälert; Stirn schwach eingedrückt, in der Mitte mit deutlichem Längskiel. Metathorax quergestreift; Mesopleuren stark punktiert, glänzend, Speculum mit schwachem Glanz; Metapleuren dicht punktiert, fast matt; Schildchen in der Mitte glänzend, zerstreut punktiert, an den Seiten bis über die Mitte hinaus gerandet. Der rücklaufende Nerv mündet in die Mitte der Areola; Nervellus etwas unterhalb der Mitte gebrochen. Hinterleibsstiel ohne Glymmen (Seitengrübchen). -- Schwarz, graulich behaart; Mandibeln und die vordersten Beine gelb, Hüften und Trochantern mehr oder weniger schwarz; Hinterbeine dunkelgelb, Hüften, Trochantern und die breite Basis der Schenkel schwärzlich, Tarsen braunrötlich. Flügel

schwach getrübt, Stigma rötlichgelb; Tegulä braun. Endrand von Segment 2 und Segment 3—5 ganz dunkelgelb; das 3. Segment mit kurzem schwarzen Seitenstreif.

L. 16—20 mm.

Verbreitet über das nördliche und mittlere Europa, aber nirgends häufig.

2. **C. rugulosus** Först. 1868 *C. rugulosus* Förster, Monogr. Campoplex, p. 798 ♀ | 1887 *C. r.* Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1057 ♀.

In Gestalt, Habitus und Färbung der vorhergehenden Art sehr ähnlich, aber etwas kleiner und gedrungener; Metathorax kürzer aber durchaus fein quergestreift; Speculum glänzend, fast glatt; Areola im Vorderflügel breiter, den rücklaufenden Nerv vor der Mitte aufnehmend; Nervellus tiefer unter der Mitte gebrochen. Schildchen sehr dicht punktiert, matt. Beine rot, alle Hüften, die hinteren Trochanteren und die Hinterschenkel schwarz, letztere an der Spitze meist rot. Hinterleib schwarz, das 2. Segment an den Seiten und an der Spitze, das 3. und 4. fast ganz, das 5. und 6. an der Seite rot; das 3. und 4. auf dem Rücken schwärzlich.

L. 16 mm.

Von Förster bei Aachen entdeckt.

3. **C. mactator** Först. 1868 *C. mactator* Förster, Monogr. Campoplex, p. 861 ♀ | 1872 *C. similatorius*, Holmgren, Svensk. Vet. Akad. Handl. I p. 47 ♀ | 1887 *C. mactator* Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1059 ♀♂.

Nach Thomson ist die Art, welche dem *C. canaliculatus* sehr ähnlich ist, dadurch ausgezeichnet, dass der schwarze Seitenstreif des 3. Segmentes nicht am Seitenrand selbst verläuft, sondern etwas höher liegt.

Stirn völlig matt, über den Fühlern eingedrückt und hier mit erhabener Linie. Mittelbrustseiten stark punktiert. Schildchen stark convex, punktiert. Metathorax der Länge nach eingedrückt, der Eindruck mit Querrunzeln, die nach hinten deutlicher werden. Flügel ziemlich getrübt, Tegulä gelblich; Areola gestielt, der rücklaufende Nerv in der Mitte. Beine rötlichgelb, Hüften, Trochantern, Mittelschenkel bis über die Mitte und Hinterschenkel ganz schwarz; Basis und Spitze der Hinterschienen braun. Endrand des 2. Segmentes, das 3. und 4. ganz und das 5. Segment am Seitenrande rotgelb.

L. nach Förster 16, nach Thomson 18—20 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

4. **C. rugifer** Först. 1868 *C. rugifer* Förster, Monogr. Campoplex p. 825 ♂ | 1887 *C. r.* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1059 ♀.

Stirn über den Fühlern nicht eingedrückt, mit erhabener Linie. Schildchen fast eben, dicht und grob punktiert. Areola im Vorderflügel sitzend, der rücklaufende Nerv ungefähr in der Mitte. Beine rotgelb, Hüften, Trochantern, Basis der Mittelschenkel und die Hinterschenkel schwarz, Hinterschienen mit brauner Spitze. Seitengruben des 1. Segmentes deutlich, nach hinten als Furche bis an die Spitze des Postpetiolus verlängert. Spitze und Seiten des 2. Segmentes, das 3. und 4. ganz rotgelb, der Endrand des 4. Segmentes meist schwärzlich. Das 3. Segment mit schwarzem Seitenstreif bis ungefähr zur Mitte.

L. 11—16 mm.

Selten in Nord- und Mitteleuropa.

5. **C. canaliculatus** Först. 1868 *C. canaliculatus* Förster, Monogr. Campoplex p. 807 ♂ | 1887 *C. c.* Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1058 ♀ ♂ | ? 1773 *Ichneumon cantator* Degeer, Mém. serv. hist. insect. VII p. 594 | 1872 *C. cantator* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I p. 22 ♀ ♂ (partim).

Stirn deutlich eingedrückt; von dem mittleren Nebenaugen geht eine deutliche Rinne abwärts. Nach Thomson der Metathorax hinten nicht quergestreift; dagegen sagt Förster: der Eindruck der vereinigten Area supero- und postero-media mit schärferen Querrunzeln als bei *C. mixtus* versehen. Areola gestielt, der rücklaufende Nerv etwas vor der Mitte; Nervellus unter der Mitte stark gebrochen. Segment 2 am Ende, 3 und 4 ganz, das 5. nur vorn an den Seiten rot, beim ♂ die folgenden Segmente mit hellem Hinterrande. Das 3. Segment an der Seite mit kurzer schwarzer Linie. Beine rotgelb, Hüften, Trochantern, Mittelschenkel an der Basis und Hinterschenkel schwarz, letztere an der Basis und an der Spitze rot.

L. 12—16 mm.

Im nördlichen und mittleren Europa.

6. **C. infestus** Först. 1868 *C. infestus* Förster, Monogr. Campoplex p. 824 ♀ ♂ | 1868 *C. terrificus* Förster, l. c. p. 806 ♂ | 1872 *C. cantator* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I p. 22 ♀ ♂ (partim).

Der vorhergehenden Art in Gestalt, Grösse und Färbung ähnlich und verwandt, aber Stirn oberhalb der Fühlerwurzel mit scharfen Längsrünzeln und die hintersten Schenkel ganz schwarz. Der eingedrückte Längsraum des Metathorax von der Basis bis zur Spitze mit dichten Querrunzeln bedeckt.

Grösse und Verbreitung wie bei der vorhergehenden Art.

7. **C. falcator** F. 1775 *Ichneumon falcator* Fabricius, Syst. entom. p. 339 | 1781 *Ichneumon surratus* Schrank, Enum. Insect. Austr. p. 362 ♂ | 1829 *Campoplex mixtus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 601 ♀♂ (partim) | 1868 *Campoplex mixtus* Förster, Monogr. Campoplex p. 863 ♀♂ | 1887 *C. falcator* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1060 ♀♂.

Diese grosse und ziemlich häufige Art ist durch folgende Merkmale ausgezeichnet: Klauen deutlich und bis zur Spitze gekämmt; Mesopleuren stark aber nicht dicht punktiert, vor dem Speculum mit wenigen aber deutlichen gebogenen Streifen, das 3. Segment ohne schwarzen Seitenstreif, die hintersten Schienen weder an der Basis noch am Ende verdunkelt. Palpen schwärzlich.

Der ganze Körper ist grau behaart. Flügel gelblich getrübt, Tegula und Stigma rötlich. Beine rotgelb, Hüften, Trochantern, Mittelschenkel an der Basis, Hinterschenkel bis fast zur Spitze schwarz. Vorderhüften und Trochantern zum Teil gelb. Mittelschenkel beim ♂ nur an der Unterseite zum Teil schwarz. Segment 2–4 rötlichgelb, das 2. auf dem Rücken bis über die Mitte hinaus verdunkelt.

L. 15–20 mm.

Im nördlichen und mittleren Europa.

8. **C. obliteratus** Holmgr. 1872 *C. obliteratus* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I p. 59 ♀♂ | 1887 *C. obliteratus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1060 ♀♂ | ? 1838 *C. falcator* Zetterstedt, Insect. Lappon. I p. 393 ♀♂.

Schwarz, Hinterleibsmittle und Beine grösstenteils rötlichgelb, die hintersten Schienen an der Spitze rostrot, Palpen bräunlichgelb.

Dem *C. falcator* sehr ähnlich aber meistens etwas kleiner, die hintersten Schenkel an der Spitze breiter rötlichgelb, die hintersten Schienen an der Spitze rostrot, die Streifen vor dem fast matten Speculum dichter und feiner und die Palpen heller.

L. 12–16 mm.

Nördliches und mittleres Europa.

9. **C. consimilis** n. sp.

Kopf und Thorax fein runzlig-punktiert, ohne allen Glanz. Kopf etwas schmaler als der Thorax, kurz, nach hinten stark verschmälert; Stirn eingedrückt, mit erhabener Längslinie; Fühler wenig kürzer als der Körper, Basalglieder der Geissel nicht von einander abgesetzt. Schildchen bis zur Mitte seitlich gerandet; Metathorax der Länge nach stark eingedrückt, vorn mit Bogenleiste, der Längseindruck querunzlig, an den Seiten gerandet. Brustseiten matt, ohne

**Speculum.** Areola im Vorderflügel ganz schmal sitzend bis ganz kurz gestielt; Nervulus weit hinter der Gabel; der Aussenwinkel der Discoidalzelle fast ein rechter; Nervellus unter der Mitte gebrochen. Fussklauen klein, den Pulvillus nicht überragend. Hinterleib matt, stark seitlich zusammengedrückt. — Schwarz, Vorderschenkel rostrot, die mittleren an der Basalhälfte schwarz, die hintersten Schenkel schwarz, das Enddrittel rostrot; Schienen dunkelgelb, die Spitze der hintersten, sowie die Mittel- und Hintertarsen schwärzlich. Endhälfte des Postpetiolus, Segment 2—4 und Basis von 5 rostgelb; das 3. Segment ohne schwarze Seitenlinie. Tegulä rostrot.

L. 12—14 mm.

Mehrere ♀ aus Thüringen.

10. **C. oxyacanthae** Boie. 1855 *C. oxyacanthae* Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI p. 104 ♂ | 1868 *C. mesoxanthus* Förster, Monogr. Campoplex p. 791 ♀ ♂ | 1887 *C. oxyacanthae* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1060 ♀ ♂.

Bei dieser und den 3 folgenden Arten ist die Hinterleibsmitte und der grösste Teil der Beine hell citrongelb gefärbt.

Kopf nach hinten kaum verschmälert; Gesicht gelblich behaart, Stirn mit Kiel; Palpen und Mitte der Mandibeln rotgelb. Tegulä gelb. Mesopleuren stark punktiert, mit glatten, stark glänzenden Zwischenräumen; der Längseindruck des Metathorax mit scharfen Querrunzeln. Flügel etwas getrübt, Areola sitzend, beim ♂ zuweilen ganz kurz gestielt, rücklaufender Nerv in oder kurz vor der Mitte. Beine hellgelb, Hüften, Trochantern, Basis der Mittelschenkel und die Hinterschenkel schwarz; die vorderen Hüften und Trochantern zum Teil gelb, beim ♂ ausgedehnter als beim ♀. Hinterleibsstiel statt der Seitengrübchen nur mit eingedrückten Linien. Das 1. Segment schwarz, in der Regel mit gelbrotem Hinterrand, Segment 2—4 gelb, das 2. auf dem Rücken bis über die Mitte hinaus schwarz, das 4. mit schwarzem Hinterrande; beim ♂ auch das 5. Segment meist an den Seiten gelb.

L. 12—14 mm.

Nördliches und mittleres Europa.

11. **C. calceatus** Brauns. 1895 *C. calceatus* Brauns, Termes. Füzet. XVIII p. 47 ♀.

Dem *C. oxyacanthae* ähnlich aber viel kleiner. Kopf nach hinten verschmälert, mit breitem Scheitel. Kopf und Thorax runzlig-punktiert, matt; Tegulä schwarz; Metathorax ohne alle Felder, der Länge nach flach vertieft, hinten mit Querstreifen. Mesopleuren ziemlich dicht punktiert, glänzend,



Speculum poliert, der Raum davor mit deutlichen Streifen. Stigma rötlichgelb, Areola ziemlich gross, ganz kurz gestielt, der rücklaufende Nerv in der Mitte. Die vordersten Schenkel unten an der Basis, die mittelsten mit Ausnahme der Spitze, die hintersten ganz schwarz; die vordersten Schienen und Tarsen rötlichgelb, die hinteren gelb, an den hintersten Schienen fast die ganze Endhälfte schwarz; die hintersten Tarsen braun. Segment 1 und 2 schwarz, das 2. Segment mit kaum gelb gefärbtem Endrand, das 3. gelb, ohne schwarze Seitenlinie, das 4. an der Basis kaum gelb gezeichnet. Bohrer kurz.

L. 7—8 mm.

Die Art wurde in mehreren Exemplaren bei Budapest gefunden.

12. **C. angustatus** Thoms. 1887 *C. angustatus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1061.

Kopf nach hinten stark verschmälert. Schwarz, Hinterleibsmittle und Beine grösstenteils hellgelb. — Stimmt in Gestalt und Färbung mit *C. oxyacanthae* überein, auch sind die hintersten Schienen durchaus gelb gefärbt, aber der Kopf ist nach hinten stark verengt und der Scheitel ist schmal. Die Tegulä sind zuweilen schwarz.

L. 8—10 mm.

Nördliches und mittleres Europa; selten.

13. **C. flaviscapus** Thoms. 1887 *C. flaviscapus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1061 ♂.

♂ Schwarz, Hinterleibsmittle, Beine grösstenteils und Fühlerschaft hellgelb. — An dem blassgelben Fühlerschaft leicht zu erkennen. In Habitus und Punktierung sehr ähnlich dem *C. angustatus*, aber im Durchschnitt etwas kleiner. Tegulä und Beine sind gelb, die hintersten Hüften, Trochanteren und Schenkel schwarz; die hintersten Tarsen braun.

L. 9 mm.

Südfrankreich.

**II. Section.** Membran des 1. Segmentes nach vorn die Mitte des Postpetiolus erreichend, nicht länger als die des 2. Segmentes. Postpetiolus nicht zusammengedrückt, deutlich breiter als der Petiolus. Die mittleren Segmente auf dem Rücken nicht scharfkantig, sondern stumpf zusammengedrückt; Hinterleibsmittle nicht gelb sondern rot; das 3. Segment mit schwarzer Seitenlinie. Metathorax fast stets

an den Seiten, namentlich an der Basis mit Spuren von Felderung, die Luftlöcher länglich oder oval; der vertiefte Längsraum des Metathorax nicht oder nur hinten quergestreift. Tegulä meist schwarz. Hinterschienen meist ausgedehnt rot. Abscissula im Unterflügel um die Hälfte länger als der rücklaufende Nerv. Grosse oder mittelgrosse Arten.

14. **C. femorator** Bridgm. 1885 *C. femorator* Bridgman, Entomologist, XVIII p. 17 ♀♂ und 1886 Trans. Entom. Soc. London p. 347.

Kopf und Thorax runzlig - punktiert, matt; Stirn mit erhabener Längslinie. Schildchen nur an der Basis seitlich gerandet. Metathorax ziemlich glänzend, der Länge nach eingedrückt. Areola im Vorderflügel ziemlich lang gestielt; Nervulus hinter der Gabel; Nervellus unter der Mitte gebrochen. Hinterleib ziemlich glatt und glänzend. — Schwarz; beim ♀ die vorderen Schenkel und Schienen rostrot, Mittelschenkel an der Basis schwarz; die hintersten Beine schwärzlich, Kniee und Mitte der Schienen braunrot. Endrand des 2. Segmentes, das 3. und die Seiten des 4. an der Basis braunrot. Beim ♀ Vorder- und Mittelbeine gelb, Basis der Hüften schwarz, Schenkel grösstenteils rötlich. Die hintersten Beine schwarz, Endhälfte der Schenkel rot, Schienen gelb, am Ende wie die Tarsen verdunkelt. Endhälfte des 2. Segmentes, das 3. ganz und die Basalhälfte des 4. rot. Das 2. und 3. Segment mit schwarzem Seitenstreif. Tegulä beim ♀ schwarz, beim ♂ gelb.

L. 19 mm.

England.

15. **C. terebrator** Först. 1868 *C. terebrator* Förster, Monogr. Campoplex p. 810 ♀♂ | 1887 C. t. Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1062 ♀♂.

Basalglieder der Geissel deutlich von einander abgesetzt, das 1. Glied um die Hälfte länger als das 2., letzteres kaum länger als breit. Stirn über den Fühlern nicht eingedrückt. Das 3. Segment mit langer schwarzer Seitenlinie. Wangen lang. Der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle ein rechter. Klauen lang, aber wenig gekämmt, den Pulvillus überragend.

Kopf nach hinten verschmälert; Mandibeln, Palpen und Tegulä schwarz. Brustseiten dicht punktiert, Speculum fast matt. Stigma hell, Areola gestielt oder sitzend, rücklaufender Nerv fast vor der Mitte. Beine vorherrschend rot, Hüften, Trochanteren, Mittelschenkel bis über die Mitte hinaus und die Hinterschenkel ganz schwarz; Hinterschienen an Basis und Spitze und die Hintertarsen braun. Beim ♂ Mittel-

und Hinterschienen mehr rotgelb. Hinterleib schwarz, das 2. Segment halb, das 3. und 4. ganz rot. Bohrer so lang wie das 2. Segment.

L. 10—14 mm.

Ziemlich häufig im nördlichen und mittleren Europa.

16. **C. nitidulator** Holmgr. 1854 *C. nitidulator* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV p. 9 ♀♂ | 1868 *C. vindex* Förster, Monogr. Campoplex p. 808 ♂ | 1868 *C. circumscriptus* Förster. ibidem p. 819 ♂ | 1868 *C. martialis* Förster, ibidem p. 821 ♀♂ | 1887 *C. nitidulator* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1062 ♀♂.

Stimmt in den Hauptmerkmalen mit *C. terebrator* überein. Augen auf der Innenseite wenig ausgerandet. Mandibeln schwarz oder in der Mitte trüb rot. Thorax oben weniger dicht punktiert, ziemlich glänzend; Metathorax mit deutlicher Basalzelle; die Längsaushöhlung des Metathorax weniger tief und ohne Querstreifen. Das 1. Hinterleibssegment mit tiefen Seitengruben; das 2. Segment am Endrand, das 3. und 4. ganz rot. Vorderschenkel und die Schienen rot, letztere beim ♂ gelb, die hintersten mit schwärzlicher Spitze. Bohrer weit kürzer als bei *C. terebrator*.

L. 12—14 mm.

Ziemlich häufig im nördlichen und mittleren Europa.

17. **C. bifidus** Thoms. 1887 *C. bifidus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1063 ♀.

Schwarz, Hinterleibsmittle und Beine zum Teil rot, die hintersten Schienen an der Basis nicht schwarz; Mesopleuren grob und dicht lederartig punktiert. Bohrer kurz.

Die Art sieht der vorhergehenden täuschend ähnlich. Die Mandibeln ganz schwarz, Palpen braun. Das 2. Segment ist fast bis zur Hälfte hinten rot. Die schwarze Seitenlinie des 3. Segmentes erscheint hinten wie geteilt, der obere Ast erstreckt sich fast bis zum Rande.

L. 14 mm.

Nur ein Exemplar aus Böhmen bekannt.

18. **C. nobilitatus** Holmgr. 1872 *C. nobilitatus* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 19 ♀ | 1887 *C. nobilitatus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1064 ♀.

Ausgezeichnet durch den glänzend schwarzen, nicht hell gezeichneten Hinterleib. Wangen sehr kurz. Hinterleibsstiel mit kleinen und flachen Seitengruben; Postpetiolus breit. Stigma gelb, Flügelnervatur schwärzlich. Beine rötlichgelb, Hüften, Trochantern und die hintersten Schenkel schwarz, Hinterschienen gelb, an der Basis schmal, am Ende ziemlich breit schwärzlich; der Aussensporn kurz und ge-

krümmt. Bauchfalte an der Basis gelblich. Aussenwinkel der Diskoidalzelle ziemlich spitz. Bohrer kurz.

Beim ♂ Unterseite des Schaftes rötlichgelb; Gesicht dicht weiss behaart; Mandibeln rötlichgelb. Tegulä und die hintersten Schienen blassgelb, letztere an Basis und Spitze breit schwarz.

L. 12—14 mm.

Nördliches und mittleres Europa. Hier in Thüringen sehr selten.

19. **C. castaneipes** Thoms. 1887 *C. castanipes* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1063 ♀.

Kopf nach hinten wenig verschmälert, Wangen sehr kurz. Thoraxseiten ziemlich glänzend, ziemlich zerstreut punktiert, Speculum poliert. Metathorax mit flachem, nicht quergezunzeltem Längseindruck. Rücklaufender Nerv vor der Mitte der Areola; der Aussenwinkel der Discoidalzelle ziemlich spitz. Hinterleib ziemlich glänzend. Bohrer kurz. — Schwarz, Schenkel und Schienen braunrot, die hintersten Schienen an der Basis schwärzlich. Stigma im Vorderflügel dunkel. Hinterleib braunrot, Segment 1, Basalhälfte von 2 und eine Längsbinde auf 6 und 7 schwarz.

L. 12 mm.

In Böhmen entdeckt. Von mir auch in Thüringen gefunden.

20. **C. splendens** Thoms. 1887 *C. splendens* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1064 ♀.

Wie die beiden vorhergehenden Arten ausgezeichnet durch den glatten und glänzenden Hinterleib, die abgesetzten Basalglieder der Geissel, die sehr kurzen Wangen und den kurzen Bohrer. Im Habitus erinnert die Art sehr an *C. nobilitatus*, stimmt auch mit dieser in den kleinen und nicht tiefen Seitengruben des Hinterleibsstieles überein, unterscheidet sich aber leicht durch den roten Hinterleibsgürtel. Thoraxseiten ziemlich glänzend, fein punktiert, Speculum nicht poliert. Längseindruck des Metathorax ziemlich flach. — Schwarz, die vordersten Schenkel ganz, die mittleren mit Ausnahme der Basis und die hintersten an der Spitze rot; Schienen rostgelb, die hintersten an der Basis schwärzlich. Tegulä schwarz, Stigma rötlich, Areola ziemlich breit, mit dem rücklaufenden Nerv in der Mitte. Endhälfte des 2. Segmentes und das 3. rot. Bauchfalte an der Basis braun.

L. 12—13 mm.

Schweden; auch hier in Thüringen in einigen Exemplaren von mir gefunden.

21. **C. cultrator** Grav. 1829 *C. cultrator* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 616 ♀♂ | 1868 *C. cultrator* Förster, Monogr. Campoplex p. 776 ♀ | 1887 *C. cultrator* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1065 ♀♂.

Basalglieder der Geißel nicht von einander abgesetzt. Wangen sehr kurz. Klauen den Pulvillus nicht oder kaum überragend. Gestalt gedrungen. Kopf und Thorax matt, gelblichgrau pubeszent. Clypeus am Ende schwach ausgerandet. Pronotum an den Seiten unten gestreift. Metathorax breit und tief der Länge nach ausgehöhlt. Seitenrücken des 1. Segmentes tief. — Schwarz, Schenkel und Schienen rot, die Hinterschenkel an der Basis meist mehr oder weniger ausgedehnt schwarz; beim ♀ die Schienen gelblich, deutlich gedornet. Hinterleib nur mit schmalen, braunrotem Gürtel, in der Regel ist das 1. Segment hinten und das 2. Segment an der Basis rot.

L. 12—16 mm.

Die Art ist weit verbreitet und gehört mit zu den häufigeren.

22. **C. latungula** Thoms. 1887 *C. latungula* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1065 ♀.

In der Färbung dem *C. cultrator* sehr ähnlich, von diesem durch folgende Merkmale unterschieden: Pronotum an den Seiten unten nicht gestreift, Mesosternum zerstreut und schwach punktiert, Speculum poliert; Metathorax ziemlich glänzend, das letzte Glied der Tarsen breiter als das vorhergehende, Hinterleib stärker zusammengedrückt und glänzender, die Seitengruben des 1. Segmentes schwächer, Postpetiolus mit stärker gerundeten Seiten; Beine schwarz, Schenkel rot, die mittleren an der Basis, die hintersten schwarz mit braunroter Spitze; Schienen rot, die hintersten an Basis und Spitze schwarz; Stigma rötlich, mit dem rücklaufenden Nerv in der Mitte.

L. 14 mm.

Norddeutschland.

23. **C. pugillator** (L.) Först. 1758 *Ichneumon pugillator* Linné, Syst. Nat. Ed. 10. p. 565 (partim) | 1829 *Campoplex pugillator* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 606 ♀♂ (partim) | 1858 *C. pugillator* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 34 ♀♂ (partim) | 1868 *C. pugillator* Förster, Monogr. Campoplex p. 816 ♀ | 1887 *C. pugillator* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1066 ♀.

Die älteren Autoren bis Holmgren begreifen unter *C. pugillator* eine ganze Reihe von Arten. Die Art, wie sie hier im Sinne Försters und Thomsons aufgefasst ist, ist ausgezeichnet durch die grosse Ausdehnung der roten Hinterleibsfärbung, indem auch das 5. Segment ganz oder grösstenteils rot ist. Selten kommen Exemplare vor, wo

das 5. Segment nur zum kleinen Teile rot ist. Ein zweites Merkmal ist das Vorhandensein von einem erhabenen, ocellenartigen Punkte beiderseits in der Augenausrandung. Auf dieses sehr charakteristische Kennzeichen hat zuerst Thomson aufmerksam gemacht. — Kopf und Thorax lederartig, mit feiner Punktierung, matt; Basalglieder der Fühlergeissel nicht von einander abgesetzt; Stirn mit feinem Längskiel; Schildchen feiner punktiert, an den Seiten bis zur Mitte gerandet; Metathorax nur schwach der Länge nach vertieft, nicht stark und regelmässig quergestreift (Unterschied von der folgenden Art). Fussklauen den Pulvillus nicht überragend. Seitengrübchen des 1. Segmentes vor den Luftlöchern tief. Bohrer sehr kurz. — Schwarz; Stigma im Vorderflügel rötlich, Tegulä schwarz; Beine schwarz, Vorderschenkel grösstenteils, Mittelschenkel am Ende rotgelb; Hinterschienen in der Mitte rötlich. Segment 2—5 dunkelrot, 2 an der Basis schwarz.

L. 10—12 mm.

Verbreitet über den grössten Teil von Europa und eine der häufigeren Arten. Als Wirte werden eine ganze Reihe von Schmetterlingen, namentlich Eulen und Spanner angeführt. Es ist noch festzustellen, welche davon für die Art im engeren Sinne in Betracht kommen.

24. **C. transversostriatus** n. sp.

Diese Art ähnelt im Habitus und in der Färbung sehr der vorhergehenden. Es fehlen jedoch die charakteristischen punktförmigen Erhebungen zwischen der Augenausrandung und der Fühlerbasis; auch die erhabene Längslinie der Stirn ist kaum angedeutet. Ferner ist der Metathorax breit und tief der Länge nach ausgehöhlt, dieser Raum deutlich quergestreift und an den Seiten gerandet. Beim ♂ sind die hintersten Schenkel am Ende schmal rötlich, die Schienen gelblich, die hintersten an Basis und Ende braun.

L. 12—13 mm.

Von mir in mehreren Exemplaren in Thüringen gefangen.

25. **C. subaequalis** Först. 1868 *C. subaequalis* Förster, Monogr. Campoplex p. 822 ♂ | 1872 *C. subaequalis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 33 ♀♂ | 1887 *C. subaequalis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1067 ♀♂.

Kopf und Thorax lederartig punktiert, matt; Stirn mit erhabener Längslinie, fein gerunzelt; Basalglieder der Fühlergeissel nicht von einander abgesetzt. Seiten des Pronotums unten mit parallelen Querrunzeln. Mittelbrustseiten dicht punktiert, mit lederartigen Zwischenräumen,

matt. Schildchen stark punktiert, seitlich kaum bis zur Mitte gerandet; Metathorax der Länge nach ziemlich tief eingedrückt, in dem Eindrucke überall grob verworren runzlig. Areola im Vorderflügel meist kurz gestielt, der rücklaufende Nerv in der Regel etwas vor der Mitte. Bohrer ziemlich lang. — Schwarz, Segment 2 am Ende und 3 und 4 rot. Tegulä ganz oder grösstenteils, Vorder- und Mittelschenkel und Schienen rot; Mittelschenkel an der äussersten Basis meist schwarz. Die schwarze Seitenlinie des 3. Segmentes bis über die Mitte hinaus.

Beim ♂ sind Mandibeln und Palpen hellgelb, Tegulä und die Beine vorherrschend rotgelb, an den Vorderbeinen die Unterseite der Hüften, alle Trochantern, Schienen und Tarsen gelb, an den Hinterbeinen Hüften, Trochantern und Schenkel schwarz, Schienen rotgelb, an der äussersten Basis und Spitze wie die Tarsen braun.

L. 10—12 mm.

Weit verbreitet und meist nicht selten.

26. **O. stragifex** Först. 1868 *C. stragifex* Förster, Monogr. Campoplex p. 811 ♀♂ | 1872 *C. stragifex* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. p. 31 ♀♂ | 1887 *C. stragifex* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1066 ♀♂.

Topf und Thorax lederartig, matt; Gesicht dicht punktiert, Stirn schwach eingedrückt, mit erhabener Längslinie; Seiten des Pronotums unten mit scharfen Querrunzeln; Mittelbrustseiten stark und dicht punktiert, dazwischen lederartig; Speculum nur schwach glänzend; Schildchen flach, rauh punktiert; Metathorax der Länge nach eingedrückt, ziemlich grob gerunzelt, gegen das Ende querrunzlig. Seitengrübchen des 1. Segmentes tief; das 2. Segment so lang wie das 3. Bohrer ziemlich weit vorragend. — Schwarz, das 2. Segment am Ende, das 3. und 4. ganz rot; der schwarze Strich an den Seiten des 3. Segmentes bis über die Mitte hinaus. Stigma im Vorderflügel rötlich. Beine rotgelb, Hüften, Trochantern, Mittelschenkel an der Basis und die Hinterschenkel ganz schwarz; Hinterschienen an Basis und Spitze, ferner Mittel- und Hintertarsen bräunlich.

L. 12—14 mm.

Weit verbreitet und nicht selten. In Thüringen eine der häufigsten Arten.

27. **C. adjunctus** Först. 1868 *C. adjunctus* Förster, Monogr. Campoplex p. 815 ♀ | 1887 *C. adjunctus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1066 ♀♂.

Diese Art ist dem *C. stragifex* ausserordentlich ähnlich, sie unterscheidet sich durch folgende Merkmale: Schildchen gewölbt, an Basis und Spitze abfallend, mit feinerer Skulptur;

Hinterleib mehr verlängert und stärker seitlich zusammengedrückt, die mittleren Segmente stärker pubeszent, die Endsegmente blauschwarz; Nervellus tiefer unter der Mitte gebrochen.

L. 14 mm.

Selten im nördlichen und mittleren Europa.

28. **C. areolatus** Brauns. 1895 *C. areolatus* Brauns, Termés. Füzet. XVIII p. 48 ♀.

Kopf und Thorax lederartig, punktiert, matt; Kopf nach hinten verschmälert, stärker punktiert als der Thorax. Speculum matt. Metathorax fast vollständig gefeldert, hinten mit schwachen Seitenzähnen. Areola im Vorderflügel breit, gestielt, mit dem rücklaufenden Nerv vor der Mitte. Das 1. Hinterleibssegment mit deutlichen Seitengrübchen. — Schwarz, Palpen und Mandibeln rötlichgelb. Tegulä schwarz, Stigma im Vorderflügel braun. Schenkel und Schienen rötlich, auch die Spitze der vordersten Hüften; Mittelschenkel an der Basis, Hinterschenkel ganz schwarz, die hintersten Schienen am Ende gebräunt. Hinterleib schwarz, das 2. Segment am Ende, das 3. ganz, das 4. an der Basis schmal, an den Seiten etwas ausgedehnter rot; die schwarze Seitenlinie des 3. Segmentes erstreckt sich bis über die Mitte hinaus.

L. 13 mm.

Aus der Umgebung von Budapest.

29. **C. foveolatus** Först. 1868 *C. foveolatus* Förster, Monogr. Campoplex p. 818 ♀ | 1872 *C. trisculptus* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I p. 39 ♀♂ | 1887 *C. foveolatus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1068 ♀ und XVII (1892) p. 1863 ♂.

In der Gestalt dem *C. pugillator* sehr ähnlich, aber Mesopleuren ziemlich glänzend, weniger dicht punktiert, mit poliertem Speculum; Stigma im Vorderflügel gelblich, Areola gross und breit, der rücklaufende Nerv deutlich vor der Mitte; Hinterleib mehr glänzend, das 1. Segment mit grossen und tiefen Seitengruben; Metathorax hinten querunzig. — Beine rotgelb, Hüften, Trochanteren, Mittelschenkel bis über die Mitte hinaus und die Hinterschenkel ganz schwarz; Hinterschienen an Basis und Spitze, Mittel- und Hintertarsen braun. Das 2. Segment an der Basis und Seite, das 3. ganz und das 4. vorherrschend rot, das letztere auf dem Rücken fast der ganzen Länge nach schwarz. Beim ♂ sind die Spitzen der Vorderhüften, sowie die vorderen Trochanteren, Schienen und Tarsen gelb; die hintersten Schenkel sind schwarz mit roter Spitze, die



hintersten Schienen gelb, an Basis und Spitze braunrot. Der Hinterleib ist weniger glänzend als beim ♀.

L. 10—12 mm.

Verbreitet aber nicht häufig.

30. **C. flavipalpis** Först. 1868 *C. flavipalpis* Förster, Monogr. Campoplex p. 785 ♂ | 1868 *C. spoliator* Förster, ibidem p. 787 ♀ | 1887 *C. flavipalpis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1067 ♀♂.

Diese, dem *C. subaequalis* nahe stehende Art weicht hauptsächlich durch folgende Merkmale ab: Mandibeln und Palpen gelb; Mesopleuren feiner und zerstreuter punktiert, mit glatten Zwischenräumen und poliertem Speculum; Kopf beim ♀ hinter den Augen nur schwach verschmälert; Tegulä braun, Stigma gelblich, Areola breit, mit dem rücklaufenden Nerv vor der Mitte; Seitengrübchen des 1. Segmentes klein aber deutlich, die folgenden Segmente ziemlich glatt und wenig pubeszent, die Endhälfte des 2. Segmentes und das 3. rot, das 4. schwarz, an der Basis schmal, an den Seiten etwas ausgedehnter rot; die vordersten Hüften und Trochanteren zum Teil rot, Vordersehenkel gelbrot, Mittelschenkel an der Basis breit schwarz, die hintersten Schenkel schwarz, an der Spitze braunrot; Schienen rot, die hintersten an der äussersten Basis und an der Spitze gebräunt, die hintersten Tarsen rot.

Beim ♂ Tegulä, Mund und Beine gelb, Vorderhüften an der Basis, die hintersten ganz und die Hinterschenkel schwarz, letztere am Ende rot; die hintersten Schienen am Ende schwach verdunkelt, die hintersten Tarsen braun.

L. 12 mm.

Die typischen Exemplare stammen von Aachen.

31. **C. contumax** Först. 1868 *C. contumax* Förster, Monogr. Campoplex p. 814 ♀ | 1868 *C. prominulus* Förster, ibidem p. 826 ♂ | 1887 *C. prominulus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1068 ♀♂.

Kopf nach hinten wenig verschmälert; Stirn unten mit schwachem Kiel. Mittelbrustseiten punktiert, mit lederartigen, matten Zwischenräumen, Speculum fast poliert; Schildchen seitlich bis zur Mitte gerandet; Metathorax nur schwach gefeldert, der Längseindruck nicht tief, hinten mit Spuren von Querrunzeln. Seitengrübchen des Hinterleibsstieles fast ganz fehlend; Postpetiolus ziemlich breit. Rücklaufender Nerv vor der Mitte der Areola mündend. — Schwarz; Stigma rötlichgelb; Beine gelbrot, Hüften, Trochanteren, Mittelschenkel bis über die Mitte und Hinterschenkel ganz schwarz, Hinterschienen an Basis und Spitze und Hintertarsen braun. Hinterhälfte des 2. Segmentes, das 3. ganz, das 4. an der Seite, das 5. bloß am

Seitenrände rot; der schwarze Seitenstrich des 3. Segmentes bis über die Mitte hinaus. — Beim ♂ sind die Seitengrübchen des 1. Segmentes nach Förster deutlich. Hinterschienen gelb, an Basis und Spitze rötlichbraun.

L. 8—10 mm.

Zerstreut im nördlichen und mittleren Europa.

32. **C. insignitus** Först. 1868 *C. insignitus* Förster, Monogr. Campoplex p. 844 ♀ | 1872 *C. bistrigosus* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I p. 37 ♀♂ | 1887 *C. insignitus* Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1069 ♀♂.

Stirn nicht gekielt; Gesicht dicht punktiert, kaum gerunzelt. Mittelbrustseiten nicht dicht punktiert, lederartig, matt; hinten ohne Speculum; Schildchen seitlich nicht gerandet, polsterförmig, fast glatt und ziemlich glänzend; Metathorax der Länge nach eingedrückt, der Eindruck ziemlich glatt, bloß an der Spitze mit einigen Querrunzeln. Areola im Vorderflügel kurz gestielt, rücklaufender Nerv in oder etwas hinter der Mitte. Hinterleibsstiel mit tiefen Seitengrübchen und vor denselben deutlich gekerbt; Postpetiolus ziemlich breit und mit einem flachen Rückengrübchen. Bohrer kurz. — Schwarz, Mandibeln in der Mitte rotgelb. Stigma im Vorderflügel rötlich. Beine rotgelb, Hüften, Trochanteren, Basis der Mittelschenkel und die Hinterschenkel ganz schwarz; Hinterschienen an Basis und Spitze und Hintertarsen braun. Das 1. Segment am Ende, das 2. ganz, das 3. an der Basis mehr oder weniger rot. Das 3. Segment mit kurzem schwarzen Seitenstrich; die Luftlöcher von diesem ziemlich weit abstehend; zuweilen noch ein zweiter schwarzer Seitenstrich angedeutet.

L. 10—12 mm.

Zerstreut im nördlichen und mittleren Europa. — Nach Mocsary aus *Hylophila bicolorana*.

33. **C. vigilator** Först. 1868 *C. vigilator* Förster, Monogr. Campoplex p. 855 ♂ | 1887 *C. vigilator* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1069 ♀♂.

Im Habitus sehr an *C. pugillator* erinnernd, von diesem und den verwandten Arten namentlich durch den nach hinten deutlich verschmälerten Kopf und die sehr kurzen Wangen verschieden. Mesopleuren dicht punktiert, Speculum ziemlich matt; Metathorax dicht runzlig-punktiert, der Länge nach breit eingedrückt, an der Basis mit deutlichen Spuren von Felderung. Areola im Vorderflügel gestielt, ziemlich schmal, mit dem rücklaufenden Nerv fast vor der Mitte. Hinterleibsstiel mit ziemlich tiefen Seitengrübchen, das 3. Segment nur mit kurzem aufgebogenen Seitenrand, aber mit ziemlich langem schwarzen Seitenstrich. Beim

♂ ist nach Förster der Seitenrand des 3. Segmentes bis über die Mitte hinaus schwach aufgebogen und weit ausgeschweift oder ausgebuchtet. — Schwarz; Stigma im Vorderflügel braunrot, beim ♂ heller. Beine schwarz, die vordersten Schenkel rot, an der Basis unten schwarz; Mittelschenkel an der Spitze und die Schienen rot, die hintersten Schienen an Basis und Spitze nur wenig verdunkelt. Beim ♂ sind die Mittelschenkel ausgedehnter rot, die Hinterschienen an Basis und Spitze deutlich gebräunt. Endrand des 2. Segmentes, das 3. und 4. ganz rot. Beim ♂ die beiden letzteren Segmente zum Teil schwarz.

L. 12—14 mm.

Nördliches und mittleres Europa; selten.

34. **C. genalis** Thoms. 1887 *C. genalis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1070 ♀.

Im Habitus und in der Grösse sehr mit *C. contumax* verwandt; von dieser und den nächstehenden Arten hauptsächlich durch folgende Merkmale verschieden: Fühler und Wangen länger; Augen innen wenig ausgerandet; Mandibeln fast ganz schwarz; Mittelbrustseiten ziemlich dicht aber fein punktiert, schwach glänzend; Metathorax ziemlich flach eingedrückt, nicht runzlig-punktiert, Felderung nur schwach angedeutet; Stigma im Vorderflügel rötlich; Areola ziemlich klein und fast sitzend, mit dem rücklaufenden Nerv eher hinter der Mitte; Hinterleibsstiel mit kleinen Seitengrübchen; das 2. Segment an der Basis breit schwarz; Seitenrand des 3. Segmentes nur an der Basis deutlich und hier mit kurzem schwarzen Strich; das 4. Segment rot; die vordersten Schenkel rot, mit schwarzer Basis, die Mittelschenkel nur am Ende rot, die hintersten ganz schwarz; Schienen rotgelb, die hintersten an der Basis kaum, am Ende ziemlich breit schwärzlich.

L. 9 mm.

Die Art wurde in Schlesien gefunden.

**III. Section.** Membran des 1. Segmentes lang, doppelt so lang als die des 2., nach vorn nicht bis zur Mitte des Postpetiolus, nach hinten bis zu den Spirakeln des 2. Segmentes reichend; die letzteren weit hinter der Mitte. Seitengrübchen des Hinterleibsstieles meist klein, zuweilen ganz fehlend. Der Seitenrand des 3. Segmentes nur an der Basis aufgebogen, in der Regel mit schwarzem Strich. Rücklaufender Nerv oft hinter der Mitte der Areola

mündend; Abseissula im Hinterflügel nicht viel länger als der rücklaufende Nerv. Körper mittelgross oder klein. Die Arten sind schwer zu unterscheiden.

35. **C. xenocamptus** Först. 1868 *C. xenocamptus* Förster, Monogr. Campoplex p. 804 ♀ | 1872 *C. xenocamptus* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I p. 67 ♀♂ | 1887 *C. xenocamptus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1071 ♀♂.

Die vorliegende Art ist leicht kenntlich durch schwach postfurcalen, deutlich über der Mitte gebrochenen Nervellus. Stirn schwach gekielt. Pronotum unten gestreift; Brustseiten dicht aber nicht stark punktiert, lederartig, matt. Metathorax fast ohne alle Leisten; der Längseindruck hinten quergestreift; Luftlöcher gestreckt. Areola im Vorderflügel gestielt, den rücklaufenden Nerv fast vor der Mitte aufnehmend. Fussklauen kurz. Hinterleibsstiel mit kleinen aber deutlichen Seitengrübchen. Bohrer ziemlich kurz, die Klappen schmal und an der Spitze kaum heller gefärbt. — Schwarz; Stigma gelbrot; Beine rotgelb, schwarz sind die Hüften, Trochanteren, Mittelschenkel mit Ausnahme der Spitze und die Hinterschenkel; Hinterschienen an Basis und Spitze wie die Hintertarsen braun. Das 2. Segment an der Spitze breit, das 3. und 4. ganz rot, meist auch der Postpetiolus hinten mit rotem Saum. Das 3. Segment ohne aufgebogenen Seitenrand, aber mit kurzem schwarzen Strich.

L. 10—11 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

36. **C. anceps** Holmgr. 1858 *C. pugillator* var. *anceps* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 35 ♀ | 1868 *C. disparilis* Förster, Monogr. Campoplex p. 790 ♂ | 1868 *C. auriculatus* Förster, ibidem p. 840 ♀ | 1872 *C. anceps* Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I p. 42 ♀♂ | 1887 *C. auriculatus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1071 ♀♂.

Diese Art ist ausgezeichnet durch die über den Fühlern ziemlich stark eingedrückte Stirn, die ohrförmigen Fühlergruben, die lange schwarze Seitenlinie des 3. und die ausgedehnte rote Färbung des 2. Segmentes. — Mittelbrustseiten stark punktiert, fein lederartig, schwach glänzend; Metathorax wenig ausgehöhlt, ziemlich dicht grau pubescent, die Felderung an der Basis sehr undeutlich. Areola im Vorderflügel schmal, kurz gestielt, der rücklaufende Nerv in oder etwas vor der Mitte. Seitengrübchen des 1. Segmentes klein aber deutlich. Bohrer kurz, mit schmalen Klappen. — Schwarz; an den Vorderbeinen die Endhälfte der Schenkel, die Schienen und Tarsen rotgelb; an den Mittelbeinen nur die Spitze der Schenkel und teilweise die Schienen rotgelb. Segment 2—4 rot, das 2. mit schwarzer Makel an der Basis;

das 3. mit ziemlich langem schwarzen Seitenstrich. Beim ♂ die Beine vorherrschend gelb, Basis der Vorder- und Mittelhüften, Hinterhüften und Trochantern schwarz; Hinterschienen an der Basis und Spitze braun. Hinterleibsfärbung rotgelb.

L. 8—10 mm.

Nord- und Mitteleuropa.

37. **C. pineticola** Holmgr. 1872 *C. pineticola* Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I p. 44 ♀♂ | 1887 *C. pineticola* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1072 ♀♂.

Durch die eingedrückte Stirn und die ohrförmigen Fühlergruben der vorigen Art sehr ähnlich, aber grösser, das 2. Segment schwarz, nur am Endrande rötlich, Segment 3, 4 und Basis von 5 gelbrot; Scheitel breiter; Pronotum unten nicht gestreift; Tegulä in beiden Geschlechtern schwarz; Beine schwarz, die vordersten Hüften zum Teil, Vorderseite der Schenkel, die Spitze der Mittelschenkel und die Schienen, sowie die Mitte der hintersten Schienen rötlichgelb.

L. 14 mm.

Nordeuropa; selten.

38. **C. auritus** Kriechb. 1883 *C. auritus* Kriechbaumer, Correspl. zool. min. Ver. Regensburg XXXVII p. 108 ♀.

Durch die ausgehöhlte Stirn und die Bildung der Fühlergruben eng mit *C. anceps* und *pineticola* verwandt. — Kopf hinter den Augen stark und in einem sehr flachen Bogen verschmälert; Gesicht mit Clypeus fast quadratisch, stark runzlig-punktiert; Augen ziemlich tief ausgerandet; Stirn über den Fühlern tief ausgehöhlt und mit deutlichem Kiele; der Rand der Fühlergruben ohrförmig erweitert. Mesonotum und Schildchen runzlig-punktiert, matt; Mittelbrustseiten punktiert, mit lederartigen Zwischenräumen, etwas glänzend; Speculum sehr fein gerieft; Schildchenseiten bis über die Mitte hinaus gerandet; Metathorax mässig tief eingedrückt, mit Querrunzeln, vorn mit ange deuteter Felderung. Radialzelle langgestreckt, Radius gegen das Ende geschwungen; Areola kurz gestielt, der rücklaufende Nerv hinter der Mitte mündend. Das 3. Segment an den Seiten nicht gerandet, aber mit schwarzem Seitenstrich; Bohrer ziemlich kurz. — Schwarz; Mandibeln grösstenteils rotgelb, Palpen braunrot. Flügel stark gebräunt, mit schwarzbraunen Nerven und hellbraunem Stigma; Tegulä braungelb. Vorderbeine mit Ausnahme der Hüften rotgelb, Trochanteren und Basis der Schenkel braun gefleckt. Mittel- und Hinterbeine schwarz, an den ersteren die äussere

Hälfte der Schenkel, die Schienen und Basis der Tarsen rotgelb; Mitte der hintersten Schienen breit gelb. Segment 2 am Ende, 3 und 4 fast ganz rot.

L. 13 mm.

Das einzige ♀ wurde in der Nähe von München gefangen.

39. **C. confusus** Först. 1868 *C. confusus* Förster, Monogr. Campoplex p. 841 ♀♂ | 1872 *C. confusus* Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I p. 62 ♀♂ | 1887 *C. confusus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1072 ♀♂.

Von den drei vorhergehenden Arten durch die nur schwach eingedrückte Stirn und die einfachen Fühlergruben unterschieden. — Kopf nach hinten verschmälert. Prothorax unten gestreift; Mesopleuren matt, dicht punktiert, mit lederartigen Zwischenräumen; Schildchen an der Basis mit scharfem Seitenrand; Metathorax ziemlich flach eingedrückt, die Felderung an der Basis meist undeutlich. Areola im Vorderflügel hoch und schmal, meist kurz gestielt, der rücklaufende Nerv etwas hinter der Mitte. — Schwarz, Palpen und Tegulä braun. Stigma rötlich. Beine rotgelb, Hüften, Trochanteren, Mittelschenkel bis über die Mitte und Hinterschenkel schwarz, letztere an der Spitze mehr oder weniger breit rotgelb; Spitze der hintersten Schienen und Hintertarsen schwarzbraun. Beim ♂ Vorder- und Mittelhüften gelb gefleckt, die hintersten Schienen auch an der Basis braun. Segment 2 auf der Endhälfte und 3 und 4 rot; auch der Postpetiolus hinten rot. Durch das letztere Merkmal unterscheidet sich die Art von allen folgenden, nur *C. signator* stimmt mit darin überein.

L. 10—13 mm.

Nord- und Mitteleuropa.

40. **C. signator** Brauns. 1895 *C. signator* Brauns, Termes. Füzet. XVIII p. 48 ♀.

Dem *C. confusus* durch den hinten beiderseits rot gezeichneten Postpetiolus ähnlich und besonders durch die glänzenden, zerstreuter aber gröber punktierten Mesopleuren verschieden. — Der ganze Körper ziemlich stark weisslich behaart. Kopf nach hinten verschmälert; Mandibeln und Palpen rotgelb; Stirn etwas eingedrückt, mit Mittelkiel; Pronotum unten grob quergestreift; Schildchenseiten bis zur Mitte gerandet; Metathorax wie das Schildchen weisslich behaart, nur schwach vertieft, der Eindruck am Ende deutlich quergestreift. Stigma braun, Areola gross und sitzend, der rücklaufende Nerv in der Mitte mündend. Vorderbeine rotgelb, Hüften an der Basis schwarz; an den Mittelbeinen Hüften und Trochantern, Basis der Mittel-

schenkel, die hintersten fast ganz schwarz; Schienen gelb, die mittleren am Ende, die hintersten an der Basis und am Ende, ebenso die Tarsen braun. Hinterleib stark seitlich zusammengedrückt; Postpetiolus hinten beiderseits, das 2. Segment an den Seiten, das 3. und 4. Segment rot, auf dem Rücken schwarz. Das 3. Segment mit ziemlich langem schwarzen Seitenstrich.

L. 13—15 mm.

Heimat das nördliche Ungarn.

41. **C. lapponicus** Holmgr. 1858 *C. lapponicus* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 37 ♀♂ | 1868 *C. callizonus* Förster, Monogr. Campoplex p. 803 ♀ | 1868 *C. lapponicus* Förster, ibidem p. 872 ♀♂ | 1887 *C. lapponicus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1073 ♀♂ | 1891 *C. lapponicus* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VII p. 65 ♀.

Kopf nach hinten kaum verschmälert, Scheitel breit; Wangen deutlich und ziemlich aufgetrieben; Stirn runzlig; Augen tief ausgerandet. Brustseiten etwas glänzend; Schildchen ziemlich grob punktiert, an den Seiten bis über die Mitte gerandet; Metathorax gerunzelt, der Längseindruck nicht tief. Flügel hyalin, mit schwärzlichem Stigma; Areola kurz gestielt, der rücklaufende Nerv vor der Mitte mündend; Radius an Basis und Spitze geschwungen. Hinterleib stark zusammengedrückt, das 1. Segment ohne Seitengrübchen, das 2. Segment deutlich länger als das 3.; Bohrer lang. — Schwarz; Vorderbeine zum Teil gelb; die hintersten Schienen in der Mitte rötlich. Das 3. Segment rot; der schwarze Seitenstrich kurz oder ganz fehlend.

L. 9 mm.

Nördliches und mittleres Europa. — Von Bridgman aus *Melanippe hastata* gezogen.

42. **C. bucculentus** Holmgr. 1858 *C. bucculentus* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 36 ♀♂ | 1868 *C. melampus* Förster, Monogr. Campoplex p. 783 ♀♂ | 1868 *C. bucculentus* Förster, ibidem, p. 871 ♀♂ | 1880 *C. bucculentus* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 140 ♀♂ | 1887 *C. bucculentus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1073 ♀♂.

Kopf nach hinten kaum verschmälert, Scheitel und Wangen breit; Pronotum nicht gestreift; Mesonotum ziemlich glänzend, nicht dicht punktiert. Schildchen und Metathorax wie bei voriger Art. Areola im Vorderflügel fast sitzend, der rücklaufende Nerv etwas hinter der Mitte mündend. Beine kräftig, Klauen den Pulvillus überragend, bis fast an die Spitze deutlich gekämmt. Das 1. Segment ohne Seitengrübchen; Bohrer lang. — Schwarz; auch die Mundteile dunkel. Stigma im Vorderflügel schwärzlich. Die

vordersten Beine zum Teil rostrot; die hintersten Schienen in der Mitte kaum heller. Das 2. Segment am Endrand und das 3. und 4. rot; das 3. mit kurzem schwarzen Seitenstrich. Beim ♂ Hüften und Trochantern oben gelb gestreift.

L. 10—12 mm.

Nördliches und mittleres Europa; eine der häufigeren Arten. Wurde erzogen aus *Chariclea umbra*, *Heliothis dipsacea*, *Gonodontis bidentata*, *Abraxas marginata*.

43. **C. stygius** Först. 1868 *C. stygius* Förster, *Monogr. Campoplex* p. 845 ♂ | 1887 *C. stygius* Thomson, *Opusc. Entom.* XI p. 1074 ♂.

Diese nur im männlichen Geschlecht bekannte Art gleicht ausserordentlich der vorhergehenden Art und unterscheidet sich besonders durch folgende Merkmale: Mesonotum fast matt, sehr dicht punktiert; auch das Speculum matt. Das 2. Segment ist hinten breiter rot, der schwarze Seitenstrich ist weit länger als bei *C. bucculentus*, indem er über die Luftlöcher hinausgeht. Hüften und Trochantern sind nicht gelb gestreift.

L. 10 mm.

Selten in Mitteleuropa.

44. **C. opacus** Thoms. 1887 *C. opacus* Thomson, *Opusc. Entom.* XI p. 1074 ♀.

Dem *C. stygius* sehr ähnlich und hauptsächlich durch folgende Merkmale verschieden: Scheitel weniger breit, hinter den Augen etwas verschmälert; Stigma im Vorderflügel rötlich; Areola schmaler, gestielt; das 1. Hinterleibsegment breiter, Segment 2—4 auf dem Rücken nur wenig comprimiert; Endrand des 2. Segmentes, das 3. ganz und das 4. mit Ausnahme des schwarzen Endrandes braunrot. Beine ziemlich schlank, Schienen rot, die hintersten an der Basis schwarz; Vorder- und Mittelschenkel am Ende hell.

L. 10 mm.

Die Art wurde im Harz gefunden.

45. **C. crassipes** Thoms. 1887 *C. crassipes* Thomson, *Opusc. Entom.* XI p. 1075 ♀.

Eng mit *C. opacus* verwandt, aber etwas grösser, Scheitel sichtlich breiter, der rücklaufende Nerv hinter der Mitte der Areola mündend; Mesopleuren ziemlich glänzend und zerstreuter punktiert; Beine, namentlich die Schenkel kräftiger; die vordersten Schenkel mit Ausnahme der Basis und die Schienen rot; die mittleren Kniee und die Schienen braun.



Beim 2. Segment ist nicht nur der Endrand, sondern die Endhälfte rot.

L. 11 mm.

Wie die vorige wurde auch diese Art im Harz entdeckt.

46. **C. juvenilis** Först. C. juvenilis Förster, Monogr. Campoplex p. 779 ♀ ♂ | 1885 C. juvenilis Bridgman u. Fitch, Entomologist XVIII p. 16 ♀ ♂.

Kopf quer, nach hinten verschmälert; Stirn mit deutlichem Kiel. Mittelbrustseiten fein und dicht punktiert, mit lederartigen Zwischenräumen; Längseindruck des Metathorax von der Mitte bis zum Ende mit scharfen Querrunzeln. Areola im Vorderflügel gestielt; Nervellus kaum gebrochen. 3. Hinterleibssegment ohne aufgebogenen Seitenrand. — Schwarz, Mandibeln und Palpen gelb. Tegulä rotgelb. Beine mit Ausschluss der Hüften und Trochantern rotgelb, Hinterschenkel zuweilen an Basis und Spitze verdunkelt; Hintertarsen braun. Beim ♂ die vorderen Hüften und Trochantern zum Teil gelb. Das 2. Segment am Ende, das 3. ganz, das 4. an den Seiten rotgelb; das 3. Segment ohne oder mit undeutlicher schwarzer Seitenlinie.

L. 7—9 mm.

Deutschland, England. — Nach Bignell aus Eupithecia nanata.

Anmerk. Diese Art gehört vielleicht mit *C. disseptus* zusammen und beide wiederum könnten vielleicht als Varietäten von *C. monozonus* mit roten Hinterschenkeln aufgefasst werden.

47. **C. humilis** Först. 1868 C. humilis Förster, Monogr. Campoplex p. 849 ♀ ♂ | 1880 C. humilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 140 ♂.

Kopf quer, nach hinten verschmälert; Stirn mit Kiel; zwischen den Nebenaugen ein kleines Grübchen. Vorderbrustseiten unten quergestreift; Mittelbrustseiten zerstreut punktiert, mit lederartigen Zwischenräumen; Schildchen seitlich bis zur Mitte gerandet; Metathorax der Länge nach eingedrückt, der Eindruck ohne Querrunzeln. Areola im Vorderflügel sitzend. — Schwarz, Mandibeln zum Teil gelb. Stigma gelbbrot. Beine gelbbrot, Hüften, Trochantern, Vorderschenkel an der Basis, Mittelschenkel mit Ausnahme der Spitze und die Hinterschenkel ganz schwarz; Hinterschienen an Basis und Spitze und Hintertarsen braun. Hinterleibssegment 2 am Endrand, 3 und 4 ganz rot; das 3. Segment mit schwarzem Seitenstrich.

L. 8 mm.

Deutschland.

48. **C. costulatus** Bridgm. 1886 *C. costulatus* Bridgman, Trans. Entom. Soc. London p. 346 ♂.

Kopf quer, nach hinten verschmälert; Stirn mit Kiel; von der Fühlergrube strahlen 5 bis 6 Kiele radienförmig nach oben aus. Mesonotum fein runzlig-punktiert; Schildchen seitlich bis zum Ende gerandet, punktiert; der Eindruck des Metathorax hinten mit Querstreifen. Areola im Vorderflügel kurz gestielt; Nervellus nur ganz schwach gebrochen. — Schwarz; Mandibeln gelb, Palpen rot. Tegulä rotgelb, Stigma bräunlichrot. Beine gelb, Basis der Vorder- und Mittelhüften braunrot, Vorder- und Mittelschenkel rot; die hintersten Hüften, Trochanteren und Schenkel schwarz; Basis und Ende der hintersten Schienen und Hintertarsen braun. Das 2. Segment rot, an der Spitze oben und ein Seitenstreif schwarz; das 3. Segment rot mit schwarzem Seitenstrich; das 4. rot mit schwarzem Endrand.

L. 11 mm. — Nur das ♂ bekannt.

England.

49. **C. subimpressus** Först. 1868 *C. subimpressus* Förster, Monogr. Campoplex p. 838 ♂ | 1887 *C. subimpressus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1076 ♂.

Diese Art, von welcher uns nur das ♂ bekannt ist, ist ausgezeichnet durch die gelben Analklappen und den grösstenteils rot gezeichneten Hinterleib.

Kopf nach hinten verschmälert; Stirn mit deutlichem Kiel. Vorderbrustseiten mit unregelmässigen Querrunzeln; Mittelbrustseiten stark punktiert, lederartig, matt; Metathorax der Länge nach sehr schwach eingedrückt, an der Basis fein, am Ende grob runzlig. Areola im Vorderflügel kurz gestielt. Hinterleibsstiel ohne Seitengrübchen, Postpetiolus schmal, fein lederartig. — Schwarz; Mandibeln, Palpen und Tegulä gelb; Stigma im Vorderflügel rötlich. Beine gelb, Vorder- und Mittelhüften an der Basis, die hintersten Hüften, Trochanteren und Schenkel schwarz. Hinterschienen an Basis und Spitze und Hintertarsen schwärzlich. Segment 2 an der Seite und 3–5 rotgelb, das 3. und 5. auf dem Rücken zum Teil schwarz; das 6. und 7. mit rotem Seitenrand; das 3. mit undeutlichem schwarzen Seitenstrich. Analklappen rotgelb.

L. 10–11 mm. — ♀ unbekannt.

Südfrankreich.

50. **C. circumcinctus** Först. 1868 *C. circumcinctus* Förster, Monogr. Campoplex p. 831 ♂.

Kopf nach hinten verschmälert; Stirn scharf gekielt; Stirngruben breit, glatt und glänzend; Fühler lang, die 6

vorletzten Glieder deutlich länger als breit. Seiten der Vorderbrust weit über die Mitte hinauf mit scharfen Querrunzeln; Seiten der Mittelbrust dicht und stark punktiert, unten mit lederartigen, oben mit ziemlich glatten Zwischenräumen. Der Längseindruck des Metathorax durchaus grob querrunzlig. Areola kurz gestielt, der rücklaufende Nerv vor der Mitte. Das 1. Hinterleibssegment sehr lang und schmal, der Postpetiolus kaum breiter als der Petiolus; das 2. Segment sehr stark zusammengedrückt, oben schmaler als der Postpetiolus. — Schwarz; Mandibeln in der Mitte und Palpen rotgelb. Beine gelbrot, Hüften, Trochanteren, Mittelschenkel unten bis zur Mitte und Hinterschenkel schwarz, Vorderhüften unten gelb; Hinterschienen nur an der Basis etwas verdunkelt. Das 2. Segment an den Seiten und das 3. und 4. rot, das 3. oben an der Basis schwarz, an den Seiten mit schwarzem Strich.

L. 9 mm. — ♀ unbekannt.

Wurde bei Aachen gefunden.

51. **C. perditor** Först. 1868 *C. perditor* Förster, Monogr. Campoplex p. 796 ♀ | 1883 *C. perditor* Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXVIII p. 113 ♀ | 1887 *C. perditor* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1077 ♀.

Kopf nach hinten verschmälert; Stirn mit Mittelkiel. Thorax braun behaart, Pronotum nur unten quergestreift; Schildchen stark convex; Mittelbrustseiten stark punktiert und ziemlich glänzend; Längseindruck des Metathorax ziemlich tief, mit ziemlich groben, etwas unregelmässigen Querrunzeln. Areola gestielt, der rücklaufende Nerv in der Mitte mündend, Nervulus ziemlich weit hinter der Gabel. Beine schlank. Hinterleib stark zusammengedrückt. Das 1. Segment lang, die Seitengrübchen schwach, die Luftlöcher vorragend; der Seitenrand des 3. Segmentes ziemlich lang aber nicht tief ausgebuchtet. — Schwarz; Mandibeln und Palpen zum Teil rötlich. Tegulä schwärzlich; Stigma bräunlichrot. Beine schwarz, die vordersten Schenkel gelb, unten bis zur Mitte schwarz; Mittelschenkel am Ende gelb; Schienen gelb, die hintersten an Basis und Spitze schwarzbraun. Das 2. Segment am Ende, das 3. und 4., mit Ausnahme eines schmalen Streifens auf dem Rücken, das 5. fast an der ganzen Basis und an der Seite, das 6. bloss an der Seite rotgelb; das 2. und 3. Segment mit schwarzen Seitenstrichen.

L. 13—14 mm.

Die Art findet sich in Mitteleuropa. — Nach Kriechbaumer und Mocsary Schmarotzer von *Hylophila bicolorana*.

52. **C. subcinctus** Först. 1868 *C. subcinctus* Förster, Monogr. Cam-poplex p. 792 ♀ | 1887 *C. subcinctus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1075 ♀.

Körper schlank. Kopf nach hinten stark verschmälert; Stirn mit Kiel; Wangen kurz, Seiten der Vorderbrust unten runzlig; Mittelbrustseiten stark punktiert, unten mit lederartigen, oben mit glatten und glänzenden Zwischenräumen; Metathorax an der Basis ziemlich deutlich gefeldert, der Längseindruck schwach, von der Basis bis zur Mitte lederartig, am Ende scharf querrunzlig. Areola kurz gestielt, der rücklaufende Nerv vor der Mitte mündend. Das 1. Hinterleibssegment sehr lang und fast gerade, schmal; Seitengrübchen flach; Postpetiolus gestreckt, kaum breiter als der Petiolus. Das 2. Segment fast um die Hälfte länger als das folgende. Bohrer ziemlich weit vorragend, mit schmalen Klappen. — Schwarz; Mandibeln, Palpen und Tegulä gelb, Stigma im Vorderflügel braunrot. Beine rotgelb; schwarz sind die Hüften, die mittleren und hinteren Trochantern, die Mittelschenkel mit Ausnahme der Spitze und die Hinterschenkel; die äusserste Basis und Spitze der Hinterschienen und die Hintertarsen braun. Das 2. Segment am äussersten Endrande und an der Seite, das 3. und 4. fast ganz rot; das 3. Segment an den Seiten mit schwarzem Strich; Bauch grösstenteils rot.

L. 9—10 mm.

Schweden, Deutschland. — Aus *Tischeria complanella*.

53. **C. spinipes** Thoms. 1887 *C. spinipes* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1076 ♀.

Dem *C. subcinctus* in der Färbung sehr ähnlich und besonders durch folgende Merkmale verschieden: Gesicht nach unten kaum verschmälert, quer; Pronotum unten glänzend, gestreift; Metathorax nur mit seichter Längsfurche; Nervulus weiter hinter der Gabel; Areola fast sitzend, mit dem rücklaufenden Nerv in der Mitte; das 2. Segment nur wenig länger als das 3., an den Seiten hinter den Luftlöchern rot; Mesopleuren glänzend, zerstreut und ziemlich grob punktiert; die vordersten Schenkel und Schienen rötlich, erstere unten an der Basis schwarz gestreift. Mittelschenkel an der Spitze breit rot, die hintersten Schenkel ganz schwarz, die Schienen trüb rötlich, fein gedörnelt.

L. 10—11 mm.

Norddeutschland.

54. **C. leptogaster** Holmgr. 1858 *C. leptogaster* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 38 ♀♂ | ? 1868 *C. macrostylus* Förster, Monogr. Campoplex p. 812 ♀ | 1868 *C. leptogaster* Förster, ibidem p. 872 ♀♂ | 1887 *C. leptogaster* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1078 ♀♂.

Körper sehr schlank. Kopf nach hinten verschmälert; Stirn mit ganz schwachem Kiel, ziemlich flach; Gesicht weisslich behaart. Thorax schmaler als der Kopf; Metathorax fast ohne Längseindruck, an der Basis mit Spuren von Felderung. Areola im Vorderflügel unregelmässig, klein, kurz gestielt; der rücklaufende Nerv hinter der Mitte mündend; Nervulus fast interstitial. Hinterleib sehr schlank, länger als Kopf und Thorax zusammen; das 1. Segment linear und fast gerade; Bohrer kurz. — Schwarz; Mandibeln und Palpen gelblich; Tegulä und Stigma bräunlich. Beine gelbrot, Hüften und Mittel- und Hinterschenkel schwarz; Mittelschenkel am Ende gelbrot; die hintersten Schienen an Basis und Ende schwärzlich. Beim ♂ Vorderbeine gelb, die Hüften nur an der Basis schwarz. Endrand von Segment 2, Segment 3 und 4 und Vorderrand von 5 rot; Seitenrand des 3. Segmentes fast bis zum Ende schwarz.

L. 9 mm.

Verbreitet in Mitteleuropa, aber nicht häufig. — Brischke zog die Art aus *Cabera pusaria*.

55. **C. punctatus** Bridgm. 1886 *C. punctatus* Bridgman, Trans. Entom. Soc. London p. 345 ♂.

Kopf nach hinten schräg verschmälert; Stirn fein körnig gerunzelt, ohne Kiel; Gesicht matt, fein punktiert und behaart. Mesopleuren punktiert, mit glatten Zwischenräumen, Schildchen seitlich bis zur Mitte gekielt; Metathorax ziemlich glänzend, oben netzartig gerunzelt, mit ziemlich deutlichen Basalfeldern. Areola im Vorderflügel gestielt, der rücklaufende Nerv vor der Mitte mündend. Hinterleib matt und fein pubescent; das 1. Segment schlank, seine Luftlöcher etwas vorspringend. — Schwarz; Mandibeln in der Mitte gelb; Palpen schwarz; Tegulä, Flügelbasis, Stigma und Nerven braun. Beine schwarz, die vordersten zum Teil rötlich; Mittelschienen braunrot. Endrand des 2. Segmentes, seltener die Endhälfte braunrot; das 3. und 4. rot, das 3. meist an der Basis, das 4. auf dem Rücken braun.

L. 9—10 mm. — Nur das ♂ bekannt.

England.

56. **C. incompletus** Bridgm. 1889 *C. incompletus* Bridgman, Trans. Entom. Soc. London p. 420 ♂.

Kopf quer, nach hinten nicht verschmälert; Stirn ohne Kiel. Thorax matt; Mesopleuren mit lederartigen Zwischen-

räumen, matt; Schildchen bis zur Mitte mit Seitenkielen; Metathorax matt, fein runzlig, ohne alle Spur von Leisten, nur mit seichtem Längseindruck, an den Seiten ziemlich dicht weiss behaart. Areola gestielt, mit dem rücklaufenden Nerv etwas hinter der Mitte; Nervellus nicht gebrochen. Luftlöcher des 1. Segmentes nicht vorragend. — Schwarz; Palpen braun; Tegulä schwarz; Stigma schwarzbraun. Vorderbeine rotgelb, mit schwarzen Hüften und Trochanteren; Mittelbeine schwarz; Spitze der Schenkel und die Schienen rotgelb; Hinterbeine schwarz. Ende des 2. Segmentes und das ganze 3. und 4. Segment rot.

L. 8 mm. — Nur das ♂ bekannt.

England.

57. **C. dubiosus** Först. 1868 *C. dubiosus* Förster, Monogr. Campoplex p. 802 ♂ | 1868 *C. fatigator* Förster, ibidem p. 827 ♀ | 1887 *C. fatigator* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1079 ♀♂.

Kopf quer, nach hinten wenig verschmälert. Stirn nach Förster gekielt, dagegen stellt Thomson, der die Typen eingesehen hat, die Art zu denen mit ungekielter Stirn. Mittelbrustseiten stark punktiert, die Zwischenräume fein lederartig; Acetabula hinter den Vorderhöften (die Leiste am Vorderrande der Mittelbrust) stark erhaben und fast zweilappig; Metathorax vorn fast ohne Leisten, der Längseindruck breit und tief, hinten quergestreift. Areola im Vorderflügel breit sitzend, pentagonal; Nervulus kurz hinter der Gabel; Nervellus fast postfurcal, wenig unter der Mitte gebrochen. Beine ziemlich dick. Hinterleib nicht sehr zusammengedrückt, das 1. Segment mit sehr kleinen Seitenrübchen; Bohrer kurz. — Schwarz; Mandibeln in der Mitte rotgelb; Taster bräunlich. Tegulä schwärzlich, Stigma rostgelb. Beine schwarz, nur an den vordersten sind die Schenkel an der Spitze und die Schienen rötlich. Segment 2—4 rot, das 2. mit schwarzer Basalhälfte, das 3. mit kurzem, oft sehr undeutlichem schwarzen Seitenstrich; Segment 5—7 blauschwarz; Bauchfalte braun.

L. 10—12 mm.

Südfrankreich.

58. **C. erythrogaster** Först. 1868 *C. erythrogaster* Förster, Monogr. Campoplex p. 836 ♀♂ | 1887 *C. erythrogaster* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1078 ♀♂ | ? 1868 *C. indefessus* Förster, Monogr. Campoplex p. 799 ♂.

Kopf quer, nach hinten wenig verschmälert; Stirngruben breit und glatt, stark glänzend; Wangen kurz. Seiten der Vorderbrust unten mit starken Querrunzeln; Seiten der

Mittelbrust dicht und fein punktiert, mit lederartigen Zwischenräumen; Speculum ziemlich glänzend; Acetabula zweilappig; Schildchen wenig gewölbt, seitlich bis zur Mitte gerandet. Areola kurz gestielt. Das 1. Hinterleibsegment mit linearen Seitengrübchen; Postpetiolus sehr schmal. — Schwarz; Mandibeln nur vor den Endzähnen rötlich; Palpen braun. Tegulä schwarz; Stigma rotgelb. Beine vorherrschend schwarz, Vorder- und Mittelschenkel an der Spitze und Vorderschienen und Tarsen rot. Beim ♂ die Vorderschenkel an der Spitze ausgedehnter rot und Vorderschienen mehr rotgelb. Hinterleib des ♀ rot mit bläulichem Schimmer, Segment 1 und der grösste Teil von 2 schwarz, Segment 6 und 7 auf dem Rücken meist blauschwarz; das 3. Segment mit schwarzem Seitenstrich. Beim ♂ ist Segment 6—8 in der Regel blauschwarz.

L. 8—9 mm.

Zerstreut in Nord- und Mitteleuropa; hier in Thüringen selten. — Als Wirte werden *Hibernia rupicaprarum* und *Lobophora polyommata* angegeben.

59. **C. aversus** Först. 1868 *C. aversus* Förster, Monogr. Campoplex p. 800 ♀ | 1872 *C. Tscheki* Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I p. 54 ♀ ♂ | 1887 *C. aversus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1079 ♀ ♂.

Der vorhergehenden Art in Gestalt und Grösse sehr ähnlich, aber Kopf nach hinten mehr verengt, Mesopleuren mit glatten und ziemlich glänzenden Zwischenräumen, Acetabula stärker erhaben, aber nicht zweilappig, die Seitengrübchen des 1. Segmentes ganz fehlend. — Beine schwarz, Vorder- und Mittelschenkel rot, auf der Unterseite bis über die Mitte schwarz, Vorderschienen rot, Mittelschienen mehr braunrot, Tarsen braun. Hinterleib schwarz, das 2. Segment mehr als zur Hälfte, das 3. und 4. ganz rot. Hinterleibsende blauschwarz. Bohrer sehr kurz, die Klappen ganz schwarz.

L. 9—11 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

60. **C. notabilis** Först. 1868 *C. notabilis* Förster, Monogr. Campoplex p. 856 ♀ ♂ | 1872 *C. notabilis* Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I p. 71 ♀ ♂ | 1887 *C. notabilis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1080 ♀ ♂.

Kopf quer, nach hinten verschmälert; Stirn mit Spur einer erhabenen Längslinie; Fühler nicht auffallend lang, die 10 vorletzten Glieder fast etwas breiter als lang. Mittelbrustseiten mässig dicht punktiert, fein lederartig, nur ganz schwach glänzend; Speculum kaum angedeutet; Metathorax der Länge nach eingedrückt, der Eindruck überall

unregelmässig runzlig, an der Spitze ohne Querrunzeln; Acetabula schwach zweilappig. Areola kurz gestielt oder fast sitzend; Nervulus ziemlich weit hinter der Gabel. Das 1. Hinterleibssegment mit kleinen Seitengrübchen; Postpetiolus schmal, mit fast parallelen Seiten; Bohrer kurz, mit schmalen Klappen. — Schwarz; Mandibeln zum Teil und Palpen rotgelb. Tegulä schwarz, Stigma rötlichgelb. Beine rotgelb, Hüften, Trochanteren, Mittelschenkel mit Ausnahme der Spitze und Hinterschenkel schwarz; Hinterschienen und Hintertarsen schwarzbraun, erstere in der Mitte mehr oder weniger braunrot. Endrand des 2. Segmentes, das 3. ganz, das 4. grösstenteils rot; dss 3. mit schwarzem Seitenstrich.

L. 7—9 mm.

In Nord- und Mitteleuropa verbreitet.

61. **C. heterocerus** Först. 1868 *C. heterocerus* Förster, Monogr. Campoplex p. 857 ♀ | 1887 *C. heterocerus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1080 ♀.

Diese Art gleicht ausserordentlich der vorhergehenden und unterscheidet sich hauptsächlich durch die längeren, gegen das Ende mehr verdünnten Fühler, bei denen alle Glieder länger als breit sind. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal besteht darin, dass fast der ganze Längseindruck des Metathorax im Grunde querrunzlig ist. Die Beine sind noch etwas schlanker als bei *C. notabilis*.

L. 9 mm.

Mittleres Europa; in Thüringen nicht selten.

62. **B. obreptans** Först. 1868 *C. obreptans* Förster, Monogr. Campoplex p. 778 ♀ | 1868 *C. aemulus* Förster, ibidem p. 794 ♀ | 1868 *C. parvulus* Förster, ibidem p. 865 ♀♂ | 1868 *C. discrepans* Förster, ibidem p. 867 ♀ | 1872 *C. filicornis* Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I p. 80 ♀ | 1885 *C. obreptans* Bridgman and Fitch, Entomologist XVIII p. 16 ♀♂ | 1887 *C. aemulus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1082 ♀♂.

Kopf nach hinten nur wenig verschmälert; Fühler ziemlich dick, kaum länger als der halbe Körper; Gesicht bräunlichgelb behaart. Pronotum an den Seiten unten glänzend und deutlich gestreift; Mesopleuren runzlig-punktiert; Acetabula in der Mitte zweilappig; Metathorax an der Basis mit deutlicher Felderung, der Längseindruck hinten breit und tief, grob runzlig. Radialzelle breit, Endabschnitt des Radius gerade, kaum länger als der Basalabschnitt; Nervulus etwas hinter der Gabel. Areola mehr oder weniger sitzend, der rücklaufende Nerv hinter der Mitte mündend. Hinterleibsstiel mit Seitengrübchen, Postpetiolus schmal; Bohrer kurz. — Schwarz; Mandibeln zum Teil



und Palpen rotgelb. Tegulä zum Teil und Stigma rötlich-gelb. Beine gelbrot, Hüften und Trochanteren schwarz; die hintersten Schienen an Basis und Spitze braun. Färbung der Hinterschenkel veränderlich, von ganz gelbrot bis schwarz. Diese Färbungen sind als verschiedene Arten beschrieben worden. Segment 2 am Endrand, 3 ganz, 4 zum Teil rot; Bauchfalte braun; Hinterleibsende blau-schwarz.

L. 6—8 mm.

Nord- und Mitteleuropa.

63. **C. alticola** Grav. 1829 *C. alticola* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 564 ♀ | 1887 *C. alticola* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1071 ♀♂ | ? *C. rufipes* Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I p. 81 ♀.

Kopf nach hinten schwach verschmälert; Fühler kaum länger als der halbe Körper, fast noch dicker als bei der vorhergehenden Art; die vorletzten Glieder deutlich breiter als lang; Mandibeln und Palpen schwarz. Stigma im Vorderflügel braun; Tegulä schwärzlich. Areola sitzend. Beine gelbrot, Hüften und Trochanteren schwarz; Spitzen der hintersten Schenkel und Schienen schwärzlich. Hinterleib schwarz, auch das Hinterleibsende; das 2. Segment am Ende und das 3. mit Ausnahme des Endrandes rot. Bohrer ziemlich lang.

L. 6—7 mm.

Mitteleuropa; nicht häufig.

64. **C. monozonus** Först. 1868 *C. monozonus* Förster, Monogr. Campoplex p. 833 ♀♂ | ? 1854 *C. floricola* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. p. 10 ♀♂ | ? 1868 *C. juvenilis* Förster, Monogr. Campoplex p. 779 ♀♂ | ? 1868 *C. disseptus* Förster, ibidem p. 781 ♂.

Diese Art stimmt mit den beiden vorhergehenden durch die kurzen Fühler und die Form der Acetabula überein; sie unterscheidet sich hauptsächlich durch den glatten und ziemlich glänzenden Hinterleib, auch durch die hellen Tegulä. Die Seiten der Vorderbrust sind unten glatt und stark glänzend, ohne Querrunzeln; die Mittelbrustseiten sind glanzlos; Schildchen matt, dicht lederartig; Metathorax an der Basis mit Andeutung von Felderung, der Längseindruck ziemlich tief, nach hinten deutlich querrunzlig. Areola kurz gestielt, der rücklaufende Nerv etwas hinter der Mitte; Radius am Ende kaum gekrümmt, der Endabschnitt wenig länger als der Basalabschnitt. Hinterleibsstiel mit kleinen Seitengrübchen; Postpetiolus sehr schmal, mit parallelen Seiten; Bohrer ziemlich lang. — Schwarz; Mandibeln in der Mitte und Palpen gelb. Tegulä und

Stigma rötlichgelb. Beine gelbrot, Hüften, Trochanteren und Hinterschenkel, zuweilen auch die Basis der Vorder-schenkel schwarz; Hinterschienen an Basis und Spitze und Hintertarsen braun. Beim ♂ die Unterseite der Vorderhüften gelb. Hinterleibsende nicht blauschwarz. Das 2. Segment am Ende und das 3. ganz oder grösstenteils, selten auch das 4. zum Teil rot.

L. 6–7 mm.

Gehört mit zu den häufigeren Arten.

65. **C. stenogaster** Först. 1868 *C. stenogaster* Förster, Monogr. Campoplex p. 834 ♀ | 1887 *C. stenogaster* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1082 ♀.

Diese Art gleicht fast ganz dem *C. monozonus* und unterscheidet sich hauptsächlich durch den kurzen Bohrer, dessen Klappen sehr breit, an der Basis stark verschmälert und an der Spitze blass gefärbt sind. Die Beine sind wie bei *C. monozonus* gefärbt; nach Thomson sollen die Schenkel etwas dicker und die Schiensporen etwas länger sein. Das 2. Segment ist am Ende und das 3. ganz rot.

L. 7–8 mm.

Die Art stammt aus der Umgegend von Aachen.

66. **C. disclusus** Först. 1868 *C. disclusus* Förster, Monogr. Campoplex p. 837 ♀ | 1887 *C. disclusus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1082 ♀.

Durch die kurzen Fühler und die Bildung der Acetabula schliesst sich diese Art eng an die vorhergehenden an. Den kurzen Bohrer hat sie mit *C. stenogaster* gemeinsam, von diesem unterscheidet sie sich hauptsächlich durch die weniger breiten, am Ende nicht hell gefärbten Bohrerklappen und die ausgedehntere rote Hinterleibsfärbung. An den Fühlern sind die 10 vorletzten Glieder breiter als lang. Vorderbrustseiten bis zur Mitte hinauf grob querrunzlig, Mittelbrustseiten ziemlich grob punktiert; Metathorax mit deutlicher Felderung an der Basis, der Länge nach eingedrückt, von der Basis bis zur Mitte netzartig, von da bis zur Spitze mit groben Querrunzeln. Beine gelbrot, Hüften, Trochanteren und Hinterschenkel schwarz; Hinterschienen an der Basis nur wenig, am Ende breit schwarzbraun; Hintertarsen braun. Das 2. Segment am Ende, das 3. ganz, das 4. seitlich mehr oder weniger rot; das 3. Segment mit schwarzem Seitenstrich.

L. 8 mm.

Mittleres Deutschland.

67. **C. proximus** Först. 1868 *C. proximus* Förster, Monogr. Campoplex p. 868 ♂.

Stirn punktiert-runzlig, schwach gekielt; Fühler lang, die 10 vorletzten Glieder länger als breit. Vorderbrustseiten unten grob, aber nicht dicht querrunzlig; Mittelbrustseiten lederartig, matt; Längseindruck des Metathorax im Grunde querrunzlig; Leisten an der Basis des Metathorax nur schwach. Areola sitzend, der rücklaufende Nerv in der Mitte. Hinterleibsstiel ohne Seitengrübchen, die Luftlöcher etwas vorspringend. Postpetiolus zwischen den Luftlöchern am breitesten, hinter denselben nach der Spitze hin allmählich verschmälert. — Schwarz, Mandibeln grösstenteils und Palpen gelblich. Tegulä rötlichgelb, Stigma bräunlichrot. Beine gelbrot, schwarz sind die Basis der Vorder- und Mittelhüften, die hintersten Hüften, Trochanteren und Schenkel; Hinterschienen an Basis und Spitze und Hintertarsen schwarzbraun. Das 2. Segment am Ende, das 3. ganz und das 4. vorherrschend rot; das 3. Segment mit schwarzem Seitenstrich bis zu den Luftlöchern.

L. 8—9 mm. — Nur das ♂ bekannt.

Wurde bei Aachen gefunden.

68. **C. anxius** Först. 1868 *C. anxius* Förster, Monogr. Campoplex p. 869 ♂.

Diese Art unterscheidet sich von der vorigen nur durch wenige, wie mir scheint geringfügige Merkmale. Da überdies nur die ♂♂ bekannt sind, so sind die beiden Arten recht zweifelhaft. Vorliegende Art ist durchschnittlich etwas kleiner als *C. proximus*. Die Areola ist gestielt, nicht wie bei der vorigen Art sitzend. Der Postpetiolus ist zwischen den Luftlöchern nicht breiter als an der Spitze.

L. 8 mm. — Nur das ♂ bekannt.

Auch diese Art wurde bei Aachen gefunden.

69. **C. angustifrons** Först. 1868 *C. angustifrons* Förster, Monogr. Campoplex p. 846 ♀ | 1887 *C. angustifrons* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1084 ♀.

Kopf nach hinten verschmälert; Stirn mit erhabener Linie; die 10 vorletzten Fühlerglieder etwas breiter als lang. Pronotumseiten matt, unten mit Spuren von Querrunzeln; Mittelbrustseiten punktiert, mit lederartigen Zwischenräumen; Metathorax an der Basis mit deutlichen Leisten, der Längseindruck unregelmässig gerunzelt. Areola ziemlich gross, kurz gestielt, der rücklaufende Nerv weit hinter der Mitte mündend. Hinterleibsstiel mit ziemlich tiefen Seitengrübchen; Bohrer kurz. — Schwarz, Mandibeln

kaum hell gezeichnet, Palpen bräunlich. Tegulā braun, Stigma braunrot. Beine gelbrot, Vorderschenkel an der äussersten Basis, Mittelschenkel mit Ausnahme der Spitze und Hinterschenkel schwarz; Hinterschienen an Basis und Spitze und Hintertarsen braun. Das 2. Segment am äussersten Hinterrande, das 3. ganz, das 4. vorherrschend rot; Bauchfalte braun. Das 3. Segment mit kurzem schwarzen Seitenstrich.

L. 8 mm. — Nur das ♀ bekannt.

Die Art stammt von Aachen.

70. **C. zonellus** Först. 1868 *C. zonellus* Förster, Monogr. Campoplex p. 850 ♀ | 1872 *C. eurynotus* Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I p. 75 ♀♂ | 1887 *C. zonellus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1083 ♀♂.

Kopt nach hinten verschmälert; Stirn mit erhabener Linie; Fühler ziemlich kurz, gegen das Ende kaum verschmälert, die 10 vorletzten Glieder fast etwas breiter als lang. Vorderbrustseiten unten ziemlich glänzend und mit Querrunzeln; Mittelbrustseiten dicht punktiert, lederartig, ganz matt; Acetabula einfach; Metathorax der Länge nach eingedrückt, der Eindruck bis zur Mitte lederartig, von da bis zur Spitze schwach querrunzlig. Areola gestielt, der rücklaufende Nerv hinter der Mitte mündend. Hinterleibsstiel mit Seitengrübchen; Bohrer kurz. — Schwarz; Mandibeln undeutlich rot gezeichnet, Palpen rotbraun. Tegulā schwärzlich, Stigma braunrot. Beine gelbrot, Hüften, Trochanteren, Vorderschenkel an der Basis, Mittelschenkel mit Ausnahme der Spitze und Hinterschenkel ganz schwarz; Hinterschienen an Basis und Spitze breit schwarzbraun. Der äusserste Hinterrand des 2. Segmentes, das 3. ganz, das 4. an den Seiten mehr oder weniger rot. Bohrerklappen am Erde nicht hell.

L. 5—7 mm.

Verbreitet in Nord- und Mitteleuropa und nicht selten.

71. **C. stenocarus** Thoms. 1887 *C. stenocarus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1083.

Diese Art ist dem *C. zonellus* täuschend ähnlich und unterscheidet sich nur durch das schmälere, fast quadratische Gesicht und die grössere Ausdehnung der roten Hinterleibsfärbung; es sind namentlich der Hinterrand des 2. Segmentes, das 3. und 4. Segment ganz, das 5. zum Teil rot.

L. 6 mm. — ♂ unbekannt.

Die Art kommt in Schweden vor.

72. **C. circumspectans** Först. 1868 *C. circumspectans* Förster, Monogr. Campoplex p. 842 ♂ | 1868 *C. vagulus* Förster, ibidem p. 864 ♂ | 1872 *C. parvulus* Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I p. 64 ♂ | 1887 *C. circumspectans* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1084 ♀♂.

Diese und die folgende Art sind ganz besonders durch die kaum ausgerandeten Arten ausgezeichnet. Die Fühler sind ziemlich lang und gegen das Ende verdünnt, die Endglieder kaum unterscheidbar; Wangen ziemlich lang. Metathorax hinten ziemlich grob runzlig aber ohne Querrunzeln, die Felderung an der Basis ziemlich deutlich. Areola gestielt; Radius am Ende geschwungen. Discoidalzelle mit stumpfem unteren Aussenwinkel. — Schwarz; Mandibeln kaum hell gezeichnet; Palpen bräunlich. Tegulä und Stigma rötlich. Beine gelbrot, Hüften, Trochanteren, Basis der Mittelschenkel und Hinterschenkel schwarz; Hinterschienen an Basis und Spitze und Hintertarsen braun. Das 2. Segment am Ende ziemlich breit, das 3. und 4. ganz rot.

L. 6 mm.

Zerstreut in Nord- und Mitteleuropa.

73. **C. Habermehli** Kriechb. 1898 *C. Habermehli* Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV p. 313 ♂.

Diese Art hat die grösste Aehnlichkeit mit der vorhergehenden; der Unterschied liegt hauptsächlich in der Färbung. Bei *C. circumspectans* sind die Beine etwas schlanker, die Mittelschenkel an der Basis in grösserer Ausdehnung, die Hinterschenkel ganz schwarz, während letztere bei *C. Habermehli* an der Spitze in ziemlicher Ausdehnung und ein wenig auch an der Basis rotgelb sind; die Basis des hintersten Metatarsus ist hier auch in grösserer Ausdehnung hell. Ferner ist bei *C. Habermehli* die Endhälfte des 4. Segmentes schwarz, während bei *C. circumspectans* Segment 3 und 4 ganz rot sind. Bei letzterem ist ferner der Basalnerv deutlich gebogen, bei *circumspectans* dagegen fast gerade.

L. 7 mm. — ♀ unbekannt.

Von Professor Habermehl bei Worms gefunden.

74. **C. sobolicida** Först. 1868 *C. sobolicida* Förster, Monogr. Campoplex p. 860 ♀ | 1872 *C. ulceratus* Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Acad. Handl. I p. 83 ♀♂ | 1887 *C. sobolicida* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1085 ♀♂.

Scheitel ziemlich breit, Stirn schwach gekielt, Wangenleiste vorn lamellenartig vorstehend, Fühler lang, gegen das Ende verdünnt, Gesicht kurz, ziemlich grob aber nicht tief punktiert, Augen innen deutlich ausgerandet, Wangen kurz.

Mittelbrustseiten grob, aber nicht dicht punktiert. Eindruck des Metathorax tief, überall mit regelmässigen, etwas gekrümmten Querleisten. Areola im Vorderflügel hoch, fast sitzend, rücklaufender Nerv in der Mitte; Radialzelle schmal, Radius am Ende kaum geschwungen; der untere Aussenwinkel der Diskoidalzelle ein rechter. Hinterschienen fein gedörnelt. Hinterleibsstiel mit kleinen Seitengrübchen, Postpetiolus schmal mit fast parallelen Seiten; das 2. Segment kaum länger als das dritte; Bohrer kurz. — Schwarz; Mandibeln zum Teil und Palpen braunrot. Beine gelbrot, Hüften, Trochanteren, Mittelschenkel bis über die Mitte hinaus und Hinterschenkel ganz schwarz; Hinterschienen an Basis und Spitze und Hintertarsen braun. Die Endhälfte des 2. Segmentes, das 3. und 4. ganz und der Seitenrand des 5. rot; Hinterleibsende blauschwarz.

L. 8—9 mm.

Nord- und Mitteleuropa; ziemlich häufig.

75. **C. remotus** Först. 1868 *C. remotus* Förster, Monogr. Campoplex p. 848 ♀ | 1868 *C. blandus* Förster, ibidem p. 854 ♀ | 1872 *C. Forsselli* Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I p. 73 ♀♂ | 1887 *C. blandus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1085 ♀♂.

Kopf nach hinten deutlich verschmälert; Wangenleiste nicht lamellenartig vortretend; Fühler lang und ziemlich dick, nach dem Ende zu verschmälert; Stirn mit erhabener Linie. Mesopleuren ziemlich fein und dicht punktiert, hinten ohne Spiegel. Metathorax an der Basis mit Andeutung von Felderung, der Längseindruck runzlig. Endabschnitt des Radius kaum gekrümmt, wenig länger als der Basalabschnitt; Areola gestielt, rücklaufender Nerv kurz hinter der Mitte; Nervulus ziemlich weit hinter der Gabel. Hinterleibsstiel mit grossen und tiefen Seitengrübchen; Postpetiolus schmal, mit geraden Seiten. — Schwarz; Mandibeln zum Teil und Palpen bräunlichgelb; Stigma rötlich. Beine gelbrot, Hüften, Trochanteren, Mittelschenkel bis über die Mitte hinaus und Hinterschenkel ganz schwarz; Hinterschienen an Basis und Spitze und Hintertarsen braun. Segment 2—4 rotgelb, das 2. auf dem Rücken von der Basis bis über die Mitte schwärzlich.

L. 8—9 mm.

Nord- und Mitteleuropa; ziemlich häufig.

76. **C. rectus** Thoms. *C. rectus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1086 ♀.

Diese Art stimmt im Grossen und Ganzen mit der vorhergehenden überein, besonders auch durch den am Ende geraden Radius; sie unterscheidet sich hauptsächlich durch

den kurz hinter der Gabel stehenden Nervulus und die Hinterleibsfärbung. Die Endhälfte von Segment 2, sowie Segment 3 und 4 sind rotgelb. Die vordersten Schenkel ganz, die mittelsten am Ende rot; Schienen gelblich; die hintersten an Basis und Spitze schwarzbraun.

L. 8—9 mm.

Norddeutschland.

77. **C. inermis** Först. 1868 *C. inermis* Förster, Monogr. Campoplex p. 828 ♀ | 1887 *C. inermis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1086 ♀.

Kopf nach hinten deutlich verschmälert; Stirn mit erhebener Linie. Pronotum unten mit Querrunzeln; Mittelbrustseiten dicht punktiert, lederartig; Metathorax fast ohne alle Leisten, der Längseindruck scharf aber nicht grob querrunzlig, dazwischen ziemlich glatt und glänzend. Radius am Ende ziemlich deutlich geschwungen; Areola ziemlich gross, kurz gestielt, der rücklaufende Nerv in der Mitte. Das 1. Segment mit Seitengrübchen, das 2. Segment wenig länger als das dritte; Bohrer kurz. — Schwarz; Mandibeln grösstenteils, Palpen, Tegulä und Stigma rotgelb. Beine gelbrot, Hüften, Trochanteren, Mittelschenkel bis über die Mitte, Hinterschenkel ganz schwarz; Hinterschienen an Basis und Spitze breit schwarzbraun; Hintertarsen braun, Metatarsus an der Basis gelblich. Segment 2 mit Ausnahme der Basis, 3 und 4 ganz, 5 seitwärts in den Vorderecken rotgelb. Nach Förster soll auch der Postpetiolus an der Spitze breit rotgelb sein. Das 3. Segment mit schwarzem Seitenstrich. Hinterleibsende blauschwarz.

L. 9—10 mm. — Nur das ♀ bekannt.

Mitteldeutschland; selten.

78. **C. peraffinis** Först. 1868 *C. peraffinis* Förster, Monogr. Campoplex p. 830 ♂.

Diese Art ähnelt ausserordentlich dem *C. inermis*, weicht aber doch zu sehr durch die Bildung des 1. Segmentes ab, als dass man sie als ♂ zu dieser Art stellen könnte. Das 1. Segment ohne Seitengrübchen vor den Luftlöchern; Postpetiolus schmal, seitlich breit eingedrückt aber ohne die scharf markierte, feine Seitenfurche, welche fast bei allen anderen Arten vorkommt. Färbung wie bei der vorigen Art, doch sind die Mittelschenkel kaum an der Basis schwarz gezeichnet. Das 2. Segment ist nur am Ende, das 3. ganz, das 4. an der Basis mehr oder weniger rotgelb.

Kleiner als die vorige Art, nur 8 mm.

Das beschriebene ♂ stammt von Aachen.

79. **C. tenuis** Först. 1868 *C. tenuis* Förster, Monogr. Campoplex p. 851 ♀ | 1868 *C. agnatus* Förster, ibidem p. 852 ♂ | 1872 *C. tenuis* Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I p. 69 ♀♂ | 1887 *C. tenuis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1087 ♀♂.

Scheitel nach hinten wenig verschmälert; Stirn mit erhabener Linie; Fühler ziemlich lang, die 10 vorletzten Glieder etwas länger als breit. Vorderbrustseiten unten querrunzlig; Mittelbrustseiten dicht punktiert, lederartig; Metathorax fast ohne alle Leisten, der Längseindruck tief und grösstenteils mit Querrunzeln. Radialzelle schmal, Radius am Ende stark geschwungen; Areola kurz gestielt, rücklaufender Nerv in oder kurz hinter der Mitte; Nervulus kurz hinter der Gabel. Hinterleibstiel im Durchschnitt rundlich, nach hinten allmählich in den Postpetiolus übergehend; Seitengrübchen kaum angedeutet; das 2. Segment wenig länger als das dritte; Bohrer sehr kurz. — Schwarz; Mandibeln zum Teil und Palpen braunrot. Tegulä schwarz, Stigma rötlich. Beine gelbrot, Hüften, Trochanteren, Mittelschenkel an der Basis, Hinterschenkel ganz schwarz; Hinterschienen braun, in der Mitte rötlich; Hintertarsen braun. Beim ♂ Vorderhüften zum Teil, zuweilen auch die Hinterschenkel unten rot. Hinterleibssegment 2 am Ende breit, 3 und 4 ganz rot; Bauchfalte braun. Beim ♂ das 4. Segment hinten gewöhnlich schwärzlich.

L. 7—9 mm.

Weit verbreitet und meist nicht selten.

80. **C. debilis** Först. 1868 *C. debilis* Förster, Monogr. Campoplex p. 859 ♀ | 1887 *C. debilis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1087 ♀.

Diese Art schliesst sich eng an die vorhergehende an; sie unterscheidet sich hauptsächlich durch folgende Merkmale: Der Längseindruck des Metathorax ist fein runzlig und zeigt nur von der Mitte bis zum Ende Spuren von feinen Querrunzeln; der Nervulus steht weiter hinter der Gabel, das Stigma ist breiter und die Areola sitzend, mit dem rücklaufenden Nerv hinter der Mitte; der Hinterleibstiel ist weniger rund, indem die Luftlöcher stärker hervortreten; das 2. Segment ist am Ende breiter rot.

L. 7 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

81. **C. luteipes** Thoms. 1887 *C. luteipes* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1089 ♀.

Kopf nach hinten deutlich verschmälert; Wangen sehr kurz; Fühler lang und dünn; Mandibeln klein. Metathorax fast ohne alle Leisten, dicht weisslich behaart. Radialzelle



schmal, Radius am Ende leicht geschwungen; Areola fast regelmässig; Nervulus ziemlich weit hinter der Gabel. Das 2. Hinterleibssegment deutlich länger als das dritte. — Schwarz, auch die Mandibeln und Tegulä. Die ganzen Beine rötlichgelb, nur Hüften und Trochanteren schwarz. Segment 2—4 und zum Teil auch 5 rotgelb, das 2. Segment an der Basis mit dunkler Makel nicht ganz bis zur Mitte.

L. 7 mm. — ♂ unbekannt.

Schweden.

82. **C. Mariae** D. T. 1901 *C. Mariae* Dalla-Torre, Catal. Hymen. III p. 146 ♀♂ | 1868 *C. annexus* Förster, Monogr. Campoplex p. 780 ♀ (excl. ♂) | 1872 *C. facialis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I p. 77 ♀♂ (non Boie) | 1887 *C. facialis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1088 ♀♂.

Kopf nach hinten verschmälert; Stirn mit erhabener Linie; Wangen sehr kurz; Fühler lang und dünn. Seiten des Pronotums unten glänzend, mit Querstreifung; Mesopleuren matt, deutlich wenn auch nicht dicht punktiert; Metathorax fast ohne Leisten, dicht weisslich behaart. Radialzelle schmal, Radius am Ende geschwungen; Areola gestielt, rücklaufender Nerv in der Mitte mündend. Das 2. Hinterleibssegment deutlich länger als das dritte; Bohrer kurz. — Schwarz; Mandibeln zum Teil und Palpen rötlichgelb. Tegulä rötlich bis schwarz. Beine rötlichgelb, Schenkel mehr rot, Hüften und Trochanteren schwarz, am Ende gelb; Hinterschienen an Basis und Spitze gebräunt. Das 2. Segment am Ende, das 3. und 4. ganz, das 5. an der Basis mehr oder weniger gelbrot, das 3. Segment mit schwarzem Seitenstrich bis zu den Luftlöchern.

L. 7—9 mm.

Verbreitet in Nord- und Mitteleuropa.

83. **C. limnobioides** Thoms. 1887 *C. limnobioides* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1088 ♀ | 1872 *C. obreptans* Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I p. 79 ♀ [non Förster].

Die Unterschiede dieser Art von der vorigen sind ausserordentlich gering. Die Mesopleuren sind feiner punktiert, die Areola im Vorderflügel ist weniger regelmässig und der rücklaufende Nerv mündet hinter der Mitte derselben. Das 2. Segment hinten breit, das 3. und 4. ganz, das 5. an Basis und Unterseite hellrot.

L. 7—8 mm.

Nord- und Mitteleuropa.

84. **C. annexus** Först. 1868 *C. annexus* Förster, Monogr. Campoplex p. 780 ♂ [excl. ♀] | 1887 *C. annexus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1088 ♂.

Diese Art schliesst sich namentlich durch die Färbung der Beine eng an die vorhergehenden an und ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet: Die Beine, besonders die hintersten Schenkel sind kräftiger; die Areola ist gross und breit und nimmt den rücklaufenden Nerv weit hinter der Mitte auf; ferner ist der schwarze Seitenstrich des 3. Segmentes auffallend lang. Die Beine sind mit Ausnahme der Hüften und Trochantern rötlichgelb, die Unterseite der Vorderhüften gelb; Hinterschienen an Basis und Spitze verdunkelt. Das 2. Segment am Ende, das 3. und 4. ganz, das 5. an der Basis mehr oder weniger gebroten.

L. 7—9 mm.

Deutschland.

**IV. Section.** Hinterleib mit ziemlich groben und tief eingestochenen Punkten oder grob gerunzelt.

85. **C. punctus** Kriechb. 1883 *C. punctus* Kriechbaumer, Correspl. zool. min. Ver. Regensburg XXXVII p. 101 ♂.

Kopf hinter den Augen ziemlich stark und fast geradlinig verschmälert; Stirne beiderseits ober den Fühlern schwach eingedrückt, in der Mitte mit einem deutlichen, an das mittlere Nebenauge stossenden und bis zur Höhe der Fühlerwurzel hinablaufenden Kiele versehen; Fühler beinahe von Körperlänge, lang und ziemlich stark zugespitzt. Der ganze Thorax ist mit Ausnahme des kleinen schwach glänzenden Speculums ohne allen Glanz; das Schildchen flach gewölbt und nur an der Basis gerandet, der scharfe Rand vor demselben in der Mitte etwas winkelig erweitert; die Vertiefung längs der Mitte des Hinterrückens ist breit und flach, an der Basis zwischen den beiden vorderen Leisten, die hier aneinander stark genähert sind und anfänglich mehr nach hinten als nach aussen, daher wenig auseinander laufen, ist ein ziemlich tiefes Grübchen vorhanden, die Leisten selbst sind mit Ausnahme des Anfanges jener beiden und der die unteren Seitenfelder einschliessenden schwach entwickelt, aber ziemlich vollständig vorhanden, so dass die verschiedenen Felder, wenn auch nur in schwachen Umrissen, ziemlich deutlich zu unterscheiden sind; die Oberfläche ist mit wenig hervortretenden, unregelmässig quer und schief laufenden Runzeln bedeckt. Hinterleib von der Seite gesehen lang gestreckt birnförmig, vom

2. Segmente an durchaus mit ziemlich dicht stehenden und starken, tief eingestochenen, teilweise in Runzeln zusammenfliessenden Punkten besetzt, aus denen sehr feine, kurze Härchen entspringen; Stiel gerade, oben längs der Mitte fast etwas kantig gewölbt, an den Seiten nadelrissig gefurcht, hinten ziemlich rasch in den fast parallel verlaufenden Hinterstiel erweitert; das 2. Segment ein wenig länger als das 3., von der Mitte gegen die Basis ziemlich stark verschmälert, das 3. beiderseits von der Basis weg etwas ausgebuchtet, bis über die Mitte deutlich gerandet, die Luftlöcher von der Basis und dem Seitenrande ziemlich gleichweit entfernt. In den Vorderflügeln ist das äussere Stück der Radialader kaum ein wenig geschwungen, die Basis der ersten Cubitalzelle ungefähr halb so breit als die der Discoidalzelle, die Areola kurz gestielt, die untere äussere Ecke ziemlich stark nach aussen vorgezogen, den wenig eingebogenen rücklaufenden Nerv vor der Mitte aufnehmend; Nervellus unter der Mitte nicht sehr stark gebrochen.

Schwarz; Palpen fast ganz weiss, nur an der Wurzel schwarz gefleckt, Mandibeln mit Ausnahme der braunen Spitze blassgelb, an den Rändern teilweise rötlich. Das 2. Segment oben am äussersten Hinterrande, seitlich vorne schmal, hinten breiter rot, der Seitenrand nicht ganz bis zur Spitze schwarz gestrichet; das 3. rot mit von der Basis bis etwas über die Mitte auffallend stark schwarz gestrichtem Seitenrande (dieser schwarzgestrichte Teil erscheint rinnenförmig ausgehöhlt, indem die schwarze Färbung über den nicht umgeschlagenen Teil des Seitenrandes sich verbreitet); das 4. rot mit kleinem schwarzen Rückenfleck vor dem Hinterrande, das 5. schwarz, seitlich weit hinauf rot, in dem Rot aber wieder mit vom Hinterrande sich hereinziehendem schwarzen Längsfleck; die übrigen schwarz; die ersten 5 Bauchringe (der 1. ist sehr schmal und kann leicht übersehen werden) und die Basis des 6. rot, die vorderen heller als die hinteren. An den Vorderbeinen sind die Hüften schwarz, vorne mit grossem, hinten mit kleinem gelblichweissen Endfleck, die Trochanteren blassgelb, der erste seitlich und oben braun gestrichet; der 2. unten mit braunem Fleck an der Basis, die Schenkel gelbrot, vorne blasser, unten mit rotbrauner Strieme längs des gewölbten Teiles, Schienen rötlichgelb, Tarsen weisslich; Mittelbeine ebenso, aber das Weiss der Hüften ins Gelbe gehend, die dunklen Zeichnungen etwas mehr entwickelt, namentlich das 2. Glied der Trochanteren vorne ganz schwarz und die Strieme an der Unterseite der Schenkel

mehr ausgebreitet, dunkler, fast schwarz, das letzte Tarsenglied braun; Hinterbeine schwarz, Schienen gelbrot, an der Basis und Spitze schwarzbraun, Sporne gelb, das erste Tarsenglied rotgelb mit braunem Rücken, Flügel fast wasserklar mit braunem, von dunkleren Nerven eingefassten Mal, blasser Wurzel und braunen am Hinterrande roten Schüppchen.

L. 13 mm. — Nur das ♂ bekannt.

München.

86. **C. lacunosus** Kriechb. 1883 *C. lacunosus* Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg, XXXVII p. 104 ♂.

Kopf hinter den Augen ziemlich stark und fast geradlinig verschmälert. Fühler beinahe von Körperlänge, lang und ziemlich stark zugespitzt. Mesonotum dicht und ziemlich fein runzelig punktiert, ohne allen Glanz, Mesopleuren fast ebenso, jedoch die Punkte weniger dicht, aber deutlich eingestochen, die Zwischenräume fein lederartig; Speculum durch äusserst feine Punktur matt, nur ganz unten mit einem kleinen glänzenden Fleck; Schildchen flach gewölbt, ziemlich fein, z. T. runzelig punktiert, an den Seiten bis über die Mitte gerandet, der scharfe Rand vor demselben in eine stumpfe Spitze erweitert; Hinterrücken ziemlich stark ausgehöhlt, die Randleiste, welche die oberen Seitenfelder von dem Luftlochfelde trennt, fast hahnenkammartig erscheinend; von der Mitte der Basis laufen 2 Leisten aus, die schräg nach aussen und zuletzt etwas verwischt an die Seitenkanten laufen, wodurch die beiden Basalfelder ziemlich vollständig eingeschlossen sind. Hinter diesen Leisten steht eine Reihe von Querfalten in ziemlicher Entfernung von einander, die besonders über den rinnenförmig vertieften Teil des Längseindrucks sowie die kleinen, innen unvollständig abgegrenzten Dornspitz- und die Luftlochfelder laufen, zu unterst aber in unregelmässige Runzeln übergehen; die unteren Seitenfelder sind oben und unten von scharf abgesetzten Leisten begrenzt, von denen die untere etwas lamellenartig absteht. Hinterleib von der Seite gesehen langgestreckt birnförmig, vom 2. bis 4. Segmente mit mehr oder minder dichtstehenden, kleineren und grösseren eingestochenen Punkten versehen, die vom 3. an rauhe Ränder zeigen und der Oberfläche ein etwas feilenartiges Aussehen geben; vom 5. bis 7. zeigt nur der untere Teil des Seitenrandes solche eingestochene Punkte, während der weitaus grössere obere von einem höchst unregelmässigen, wie zerrissenen Netze stark erhabener Längsrunzeln überzogen ist, in welches der punktierte Teil am

Hinterrande des 5. und der glatte des Vorderrandes des 6. Segmentes weit nach oben eindringt, eine Skulptur, von der nach dem einzigen Exemplare schwer zu sagen ist, ob sie als normal oder abnorm zu betrachten sei. Stiel gerade, mässig dick, oben gewölbt, seitlich ziemlich flach, in der Mitte mit einem Grübchen, das sich in eine bis in den Hinterstiel reichende flache Rinne fortsetzt; letzterer hinter der Mitte fast etwas eckig erweitert, nach vorne etwas mehr als nach hinten verschmälert, oben mit vereinzelten Nadelrissen und Punkten versehen; das 2. Segment ungefähr so lang wie das 3., nach hinten kaum etwas erweitert; das 3. mit glattem, von der Basis weg allmählich erweitertem, zuletzt abgerundetem Seitenrande, die Luftlöcher diesem kaum etwas näher liegend als der Basis. An den Vorderflügeln ist das äussere Stück der Radialader leicht geschwungen, die Basis der ersten Cubitalzelle um etwa  $\frac{1}{3}$  schmaler als die der Discoidalzelle, die Areola fast sitzend, ziemlich schmal, den rücklaufenden Nerv in oder kaum etwas hinter der Mitte aufnehmend; Nervellus nicht sehr weit unter der Mitte und wenig gebrochen.

Schwarz; Mandibeln in der Mitte rotgelb, teilweise gelb; Palpen braun, das letzte Glied der Maxillarpalpen gelb. Das 2. Segment rot, oben von der Basis bis fast zur Mitte schwarz, der Seitenrand mit Ausnahme der Basis und Spitze mit einer schwarzen Linie versehen; das 3. rot, an der Basis jederseits mit einer vom Seitenrande nicht weit entfernten kurzen schwarzen Linie; das 4. rot, am äussersten Hinterrande in der Mitte schwarz, das 5. schwarz mit breit roten Vorderecken; die ersten 5 Bauchringe rot. Der ganze Hinterleib ist ziemlich stark glänzend, das Rot desselben ein helles Braunrot. Vorderbeine gelbrot, vorne blasser, die Wurzel der Hüften, hinten in grösserer Ausdehnung als vorne, und das letzte Tarsenglied schwarz; Mittelbeine gelbrot, Hüften, Schenkelringe mit Ausnahme der Spitze, die Schenkel nächst der Basis in geringer Ausdehnung und der grösste Teil der Tarsen, wenigstens oben, schwarz oder braun, die Schienen vorne und an der Basis gelb; Hinterbeine schwarz, die Schenkel oben mit von der Spitze hereindringendem Braunrot, die Schienen gelb, an der obersten Basis vorn und hinten mit braunem Strichelchen, an der Spitze zuerst rötlich, dann, besonders hinten, ziemlich breit schwarz; Sporne gelbrot, Tarsen schwarz, die Basis unten heller.

L. 12 mm. — ♀ unbekannt.

Bayern. — Aus *Opisthograptis luteolata* (crataegata).

87. **C. limiventris** Kriechb. 1883 C. limiventris Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXVII p. 106 ♂.

Kopf hinter den Augen ziemlich stark und fast geradlinig verschmälert. Fühler beinahe von Körperlänge, lang und ziemlich stark zugespitzt. Thorax vorne mit kurzen, hinten und auf dem Schildchen mit längeren abstehenden weiss-grauen Haaren besetzt. Mesonotum punktiert - runzelig, kaum etwas glänzend; Mittelbrustseiten ziemlich fein und weitläufig punktiert, zwischen den Punkten äusserst fein lederartig oder schiefnadelrissig, etwas glänzend; Schildchen flach gewölbt, ziemlich grob, z. T. runzlig punktiert, an den Seiten mehr oder weniger weit über die Mitte hinaus gerandet, der scharfe Seitenrand vor demselben etwas eckig erweitert; Hinterrücken ziemlich grob und unregelmässig runzelig, längs der Mitte nicht sehr stark und etwas rinnenförmig ausgehöhlt; von der Mitte der Basis laufen zwei Leisten auseinander, die, kaum etwas gebogen, sich bald verlieren und die beiden Basalfelder daher nur nach innen und teilweise nach hinten abschliessen; die Grenze zwischen den Dornspitz- und Luftlochfeldern ist durch eine schwach entwickelte, unregelmässig und grob runzelige Kante angedeutet, die unteren Seitenfelder oben und unten von starken, hier fast lamellenartig erhabenen Leisten begrenzt. Hinterleib von der Seite gesehen lang gestreckt birnförmig, vom 2. Segmente an mit auf diesem tief eingestochenen und dichter stehenden, auf den hinteren mit zerstreuten, von etwas abstehenden Rändern begrenzten, haartragenden Punkten versehen, welche der Oberfläche ein etwas feilenartiges Aussehen geben; Stiel gerade, ziemlich lang und dick, oben gewölbt, seitlich ziemlich flach, glatt und glänzend und mit einer ansehnlichen, aber nicht scharf begrenzten Grube versehen, Hinterstiel ziemlich kurz, mit dem letzten Drittel des Stieles bis etwas über die Mitte erweitert und dann wieder bis zur Spitze ziemlich stark verschmälert; das 2. Segment kaum etwas länger als das dritte, von der Wurzel bis zur Spitze fast gleich breit; das 3. mit glattem, nach hinten stark und gerundet erweitertem Seitenrande, die Luftlöcher, welche wegen der rauhen Skulptur schwer wahrzunehmen sind, liegen weiter von der Basis als vom Seitenrande entfernt. An den Vorderflügeln ist das äussere Stück der Radialader leicht geschwungen, die Basis der ersten Cubitalzelle halb so breit als die der Discoidalzelle, die Areola fast sitzend, ziemlich gross, den rücklaufenden Nerv vor der Mitte aufnehmend, Nervellus nicht sehr weit unter der Mitte gebrochen.

Schwarz; Mandibeln und Palpen grösstenteils rotgelb. Das 2. Segment rot, auf dem Rücken bis fast zum äussersten Hinterrande schwarz, diese Farbe im letzten Drittel der Länge durch das weiter hinaufreichende Rot mehr verschmälert, ausserdem noch ein dicker schwarzer Strich am Seitenrande; das 3. und 4. Segment ganz, das 5. an den Seiten rot, die Grenze dieser Farbe oben vom Vorderrande schräg nach hinten und unten verlaufend; selbe dringt ausserdem noch auf dem Rücken in Form eines schmalen bis etwas über die Mitte reichenden und am Ende spitz zulaufenden Streifens in die schwarze Grundfarbe ein; die übrigen Segmente sind schwarz, die ersten 5 Bauchringe rot. Der Hinterleib ist trotz der rauhen Skulptur ziemlich glänzend, das Rot desselben ein helles Braunrot. Vorderbeine rotgelb, Schienen, Tarsen und Vorderseite der Schenkel und Schenkelringe blasser, die Hüften schwarz mit grossem gelben Endfleck auf der Vorderseite; Mittelbeine rotgelb, Hüften, Schenkelringe und innerste Basis der Schenkel schwarz, Schienen gelb, Tarsen mit Ausnahme des grössten Teiles des ersten Gliedes braun, Sporne blassgelb; Hinterbeine schwarz, innerste Schenkelwurzel hinten blass, Spitze der Schenkel ziemlich breit, sowie die oberste Basis und die Spitze der Schienen, wenigstens hinten, rot, letztere ausserdem rötlichgelb, Tarsen schwarzbraun, kaum das erste Glied auf der Unterseite teilweise heller. Flügel glashell, schwach bräunlich getrübt, mit schwarzbraunen Adern, ebensolchem, an der Basis schwarzem Mal mit hellerem Kern, braunroter Wurzel und solchen Schüppchen.

L. 16 mm. — ♀ unbekannt.

Bayern. — Aus *Cucullia scrophulariae*.

Anhangsweise führe ich eine Reihe namentlich von Brischke als neu beschriebener Arten an. Da Angaben über die von der neueren Systematik betonten Merkmale fehlen, so haben die Beschreibungen gerade bei dieser so schwierigen Gattung nicht viel Wert; zum Glück finden sich bei den meisten Angaben über die Zucht.

**C. affinis** Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. (1880) p. 140 ♀♂.

Fein lederartig, matt. Kopf hinter den Augen etwas verschmälert; Stirn flach; die 10 vorletzten Fühlerglieder quer; Mittelbrustseiten unter den Flügeln fein gestreift; Metathorax breit, fast gar nicht vertieft, nur die Basalfelder umleistet, der abschüssige Teil grob querunzlig. Areola kurz gestielt, Radius nur an der Spitze

etwas eingebogen, Nervellus tief unter der Mitte gebrochen, der ausgehende Nerv fast unsichtbar. Postpetiolus gewölbt; Bohrer etwa halb so lang wie das 1. Segment. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Flügelwurzel und Tegulä gelb. Beine rot, Hüften, hintere Trochanteren, Basis und Spitze der Hinterschienen und die Hintertarsen schwarz. Segment 2 an der Spitze mehr oder weniger breit, 3 ganz, 4 an der Basis rot, 3 mit feinem schwarzen Seitenstrich.

L. 7—8 mm.

Deutschland.

**C. rufoniger** Brischke, l. c. (1880) p. 141 ♀.

Stimmt in der Skulptur mit *C. inermis* Först. überein. Metathoraxfurche nicht glänzend; rücklaufender Nerv vor der Mitte der Areola mündend; Nervellus unter der Mitte gebrochen, der ausgehende Nerv sehr fein. Das 2. Segment mit tiefen Gastrocölen. — Schwarz; Palpen, Mandibeln und Tegulä gelblich; Stigma dunkelbraun. Vordere Beine blassgelb, Schenkel rotgelb; an den Mittelbeinen die Hüften, Trochanteren und Basis der Schenkel schwarz; Hinterbeine schwarz, Schienen braungelb mit schwarzer Basis; Segment 2 am Hinterrande, die folgenden an den Seiten rot, das 3. Segment mit schwarzem Seitenstrich; Bauchfalte gelblichrot.

L. 11 mm.

Deutschland. — Aus einer *Cucullia*-Raupe.

**C. petiolaris** Brischke, l. c. (1880) p. 141 ♀♂.

Kopf und Thorax lederartig, weisshaarig; Kopf nach hinten verengt, Fühler nach der Spitze hin allmählich verdünnt; Metathorax allmählich abschüssig, ohne Felder, nur beim ♀ die Basalfelder schwach umleitet; der Längseindruck nicht tief. Radius in der Mitte und am Ende eingebogen; Areola sitzend oder gestielt; Nervellus unter der Mitte gebrochen; mit feinem Längsnerv. Das 1. Segment mit scharfkantigem, glänzenden Petiolus, der breiter als hoch ist, der Postpetiolus nur wenig breiter, matter, hinter den Luftlöchern niedergedrückt. — Schwarz; Mitte der Mandibeln beim ♀ rot. Tegulä braun bis rötlich; Stigma schwarzbraun. Die vorderen Schenkel und Schienen rot, Mittelschenkel an der Basis schwarz; die hintersten Beine fast ganz schwarz, beim ♂ die Schienen in der Mitte rotgelb. Segment 2—4 rot, 2 mit schwarzer Basis.

L. 11 mm.

Deutschland. — Aus Raupen von *Chesias spartiata* und *Larentia rubidata*.



**C. brevicornis** Brischke, l. c. (1880) p. 141 ♀ ♂.

Kopf und Thorax fein lederartig, matt; Kopf hinter den Augen verschmälert; Stirn zuweilen gekielt; Fühler etwa 4 mm lang, beim ♂ etwas länger, gekrümmt, nach der Spitze hin etwas verdickt, die 10 vorletzten Glieder quer; Metathorax breit, nur die beiden Basalfelder fein umleistet, Längseindruck wenig tief, querrunzig. Areola gestielt; Radius am Ende eingebogen; Radialzelle kürzer als gewöhnlich; Nervellus tief unter der Mitte gebrochen, mit feinem Längsnerv. Das 1. Hinterleibssegment länger als die hintersten Hüften und Trochanteren, dünn und gerade; Postpetiolus wenig breiter als der Petiolus. — Schwarz; Palpen meist rot. Tegulä schwarz bis rot; Stigma braun. Beine rot, Hüften und hintere Trochanteren schwarz; an den Hinterbeinen ist zuweilen die Basis der Schenkel, die Spitze der Schienen und meistens die Tarsen schwarz, letztere mit roter Basis, zuweilen sind die Hinterschenkel fast ganz braunrot. Hinterrand von Segment 2, 3 ganz und die Basalseiten von 4 rot, Segment 3 mit feinem schwarzen Seitenstrich.

L. 7 mm.

Deutschland. — Aus Raupen von *Eupithecia pimpinellata*, *campanulata*, *innotata*, *centaureata*, *succenturiata*, *absynthiata* und *castigata*.

**C. tibialis** Brischke, l. c. (1880) p. 142 ♂.

Kopf und Thorax weisshaarig; Kopf nach hinten nicht verschmälert; Fühler fast von Körperlänge; Metathorax ohne Felder, der Längseindruck wenig tief. Areola gestielt; Endabschnitt des Radius doppelt geschwungen; Nervellus nicht gebrochen. Das 1. Segment gerade, Postpetiolus wenig breiter als der Petiolus. — Schwarz; Palpen, Mandibeln und Tegulä gelb. Stigma hellbraun. Vorder- und Mittelschenkel rot, letztere an der Basis schwarz; Schienen gelb, vordere unten rotgelb, Hinterschienen mit schwarzer Spitze. Segment 1 an der Spitze, 2 am Hinterrande, 3 ganz und 4 an der Basis oder auch ganz rot.

L. 6—7 mm.

Deutschland. — Aus Raupen von *Fidonia cebraria*.

**C. bicolor** Brischke, l. c. (1880) p. 142 ♀.

Lederartig, matt, kurz behaart; Kopf kurz, hinter den Augen etwas verengt; Fühler länger als der halbe Körper; Metathorax ziemlich breit, ohne Felder, die Längsvertiefung grob runzig. Radius am Ende eingebogen; Areola gestielt,

den rücklaufenden Nerv vor der Mitte aufnehmend; Nervellus unter der Mitte gebrochen. Das 1. Segment länger als die hintersten Hüften und Trochanteren, gerade; Postpetiolus gewölbt, länger als breit, Seiten nach der Spitze fast convergent; Stigmen vortretend; Bohrer kaum halb so lang wie das 1. Segment. — Schwarz; Stigma hellbraun. Spitze der vorderen Schenkel, die vorderen Schienen und Tarsen rot, Mitteltarsen braun; Hinterschienen mit rot-schimmernder Mitte. Hinterleib rot, Segment 1 und Basis von 2 schwarz, Segment 6 und 7 oben schwärzlich.

L. 6 mm.

Deutschland. — Aus einer Eupithecia-Raupe.

**C. sericeus** Brischke, l. c. (1880) p. 142 ♀♂.

Seidenhaarig; Kopf hinter den Augen verschmälert; Gesicht etwas länger als breit; Stirn dicht und fein punktiert; Brustseiten fein und dicht runzlig-punktiert, matt; Metathorax allmählich abschüssig, mit undeutlichen Feldern, der Länge nach vertieft. Areola gestielt bis sitzend; Nervellus nicht gebrochen. Das 1. Segment lang und dünn, Postpetiolus über doppelt so lang wie breit; das 2. Segment länger als breit, die folgenden seitlich zusammengedrückt; Bohrer etwa halb so lang als das 1. Segment. — Schwarz; Palpen, Mandibeln und Tegulä gelb. Stigma braun. Die vorderen Hüften, Trochanteren und Schenkel rotgelb; Schienen und Tarsen gelbweiss, Hinterschienen mit schwarzer Basis und Spitze, Hintertarsen schwarzbraun mit heller Basis; Schiensporen weiss.

L. 6—7 mm.

Deutschland.

Anmerk. Ich halte diese Art für weiter nichts als die gar nicht seltene *Trophocampa* (*Campoplex*) *vidua* Grav.

**C. spinulosus** Brischke, l. c. (1880) p. 143 ♀.

Matt; Kopf und Thorax kurz weisshaarig; Kopf hinter den Augen verschmälert; Stirn zwischen den Fühlern mit einem Grübchen; Fühler fast von Körperlänge, die 10 vorletzten Glieder quadratisch. Seiten des Prothorax glänzend; Metathorax wenig vertieft, querrunzlig, nur die beiden Basalfelder umleitet. Radiusende fast gerade; Areola gestielt, den rücklaufenden Nerv vor der Mitte aufnehmend; Nervellus unter der Mitte gebrochen. Das 1. Hinterleibssegment gerade, dünn; Postpetiolus hinter den etwas vortretenden Stigmen etwa doppelt so breit als der Petiolus. — Schwarz; Stigma im Vorderflügel gelb.

Vorderbeine mit roten Schenkeln, Schienen und Tarsen; Mittelschenkel nur an der Spitze rot; Mitte der hintersten Schienen rötlich. Segment 2—4 rot, Basis von 2 und Ende von 4 schwarz. Klappen des Bohrers mit helleren Spitzen.

L. 9 mm.

Deutschland.

**C. (Hypotherentes Först.?) exsculptus** Brischke, l. c. (1880) p. 143 ♀.

Matt, kurz weisshaarig; Kopf hinter den Augen wenig verschmälert; innerer Augenrand stark gebuchtet; Fühler länger als der halbe Körper. Thorax länger als hoch; Schildchen flach; Metathorax ziemlich kurz, gerundet, mit 5 sehr fein umleisteten Feldern; Area superomedia hinten breit offen, Area posteromedia leicht vertieft, fein gerunzelt. Radius am Ende gerade; Areola gestielt, den rücklaufenden Nerv vor der Mitte aufnehmend. Segment 1 fast gerade, glänzend, so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren, Petiolus scharfkantig, Postpetiolus flach, wenig breiter als der Petiolus, hinter den Stigmen in der Mitte mit tiefer Längsfurche; die folgenden Segmente seitlich zusammengedrückt; Segment 2 länger als breit, an der Basis niedergedrückt; Bohrer etwa halb so lang als das 1. Segment. — Schwarz; Palpen, Mandibeln zum Teil und Flügelwurzel rot; Stigma im Vorderflügel hellbraun. Vorderbeine rot, Hüften, Trochanteren und Basis der Mittelschenkel schwarz; die hintersten Schienen rot mit schwarzer Basis und Spitze. Segment 2—4 rot, 2 mit schwarzer Basis.

L. 7—8 mm.

Deutschland.

**C. lateralis** Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg 1883 p. III ♀.

Kopf hinter den Augen stark und fast geradlinig verschmälert; Stirne gekielt; Fühler kaum kürzer als der Körper, gegen die Spitze stark verschmälert. Mittelbrustseiten fein und oberflächlich punktiert, mit lederartigen Zwischenräumen, auch das Speculum fast glanzlos; Metathorax fein runzlig-rauh, mit Spuren von Felderung. Radiusende leicht geschwungen; Areola kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv vor der Mitte aufnehmend; Nervellus unter der Mitte schwach gebrochen. Hinterleibsstiel glatt und glänzend, in der Mitte mit langgestreckter Grube; Postpetiolus nicht scharf abgesetzt; Segment 2 und 3 von gleicher Länge. — Schwarz, Vorderrand der Mandibeln und Palpen zum Teil rötlich. Flügel fast hyalin; Tegulä

schwarzbraun; Stigma braun. Vorderbeine gelbrot, Hüften, Trochanteren grösstenteils, ein Längsstreif der Schenkel und das letzte Tarsenglied schwarz, die vorhergehenden Tarsenglieder braun; Mittelbeine schwarz, die innerste Basis und die Spitze der Schenkel und die Schienen teilweise rot; Hinterbeine schwarz, Schienen bis über die Mitte braunrot. Segment 3—5 an den Seiten rot, 3 mit schwarzem Seitenstrich, der nicht ganz bis unter die Luftlöcher reicht; das 6. Segment am untersten Seitenrande rot; Bauchsegmente rot, das 1. an der Basis gelb.

L. 10 mm.

Bayern.

**C. lateralis** Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig, N. F. VIII (1892) p. 44 ♂.

Aehnlich *C. mixtus*, aber Metathorax etwas länger, die 2 Basalfelder fein umleistet, Areola sitzend, den rücklaufenden Nerv vor der Mitte aufnehmend, Nervellus nicht gebrochen. — Schwarz, Palpen und Mandibeln gelb; Stigma schwärzlich. Vorderbeine gelb mit roten Schenkeln; alle Hüften und die hintersten Trochanteren schwarz; die mittleren Schenkel unten, die hintersten ganz schwarz; die hintersten Schienen braun, gegen das Ende mehr rot, die hintersten Tarsen schwarz, die beiden Endglieder rot. Seiten von 2—4 rot.

L. 12 mm. — ♀ unbekannt.

Westpreussen.

Anmerk. Eine wertlose Art, zumal sie nur nach dem ♂ aufgestellt ist. Brischke hat bei ihrer Aufstellung Thomson's Arbeit gar nicht gekannt; dass ihm der *C. lateralis* Kriechb. unbekannt war, ist eher verzeihlich. Es hat keinen Zweck, die Art umzutaufen.

## 2. Gen. **Charops** Holmgr.

1858 *Charops* Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV p. 324.

Kopf quer, nach hinten etwas verengt; Schläfen nicht aufgetrieben; Fühler dünn, etwa von halber Körperlänge; Augen innen tief ausgerandet; Clypeus nicht vom Gesicht getrennt. Thorax matt; Schildchen niedergedrückt, nach hinten kaum verschmälert; Metathorax ohne Felderung, oben kaum der Länge nach eingedrückt, mit 2 parallelen Leisten von der Basis bis über die Mitte; Luftlöcher langgestreckt. Flügel ohne Areola; Nervellus gekrümmt. Schienen fein gedörnelt, Klauen gekämmt. Hinterleib gestreckt, seitlich zusammengedrückt, das 1. Segment leicht aufwärts gebogen, Postpetiolus convex, mit gerundeten Seiten, Membran bis über die Mitte des Postpetiolus reichend, Bohrer kurz.

**Ch. decipiens** Grav. 1829 *Campoplex decipiens* Gravenhorst, *Ichneum.* Eur. III p. 596 ♀ | 1858 *Charops decipiens* Holmgren, *Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh.* XV p. 324 ♀♂ | 1887 *Ch. decipiens* Thomson, *Opusc. Entom.* XI p. 1090 ♀♂.

Durch die gestreckte Gestalt und die kurzen Fühler von den in der Färbung ähnlichen *Campoplex*-Arten verschieden. Schwarz, weisslich pubescent: Mandibeln und Palpen bräunlich. Tegulärschwarz; Stigma braunrot. Vorderbeine gelbrot, Hüften, Trochanteren und Basis der Schenkel schwarz; Mittelschenkel meist nur am Ende hell. Postpetiolus zum grössten Teil und Segment 2—4 rot, das 2. Segment auf dem Rücken ausgedehnt schwarz.

L. 10—12 mm.

Verbreitet über fast ganz Europa, aber nur einzeln. Die Art schmarotzt bei verschiedenen Zygänen, man findet sie deshalb fast nur an trockenen, sonnigen Orten, vorzugsweise Kalkbergen, im Spätsommer.

### 3. Gen. **Echthronomas** Först.

1868 *Echthronomas* Förster, *Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl.* XXV p. 151.

Der Charakteristik der Gattung, wie sie bereits in der Bestimmungstabelle angeführt ist, lässt sich weiter nichts hinzufügen. Auch in Förster's hinterlassenen Schriften findet sich sonst keine Notiz. Die Gattung würde sich also durch die gestreckten Luftlöcher des Metathorax eng an *Campoplex* oder *Charops* anschliessen und sich von diesen durch das weniger stark comprimierte 2. Segment und namentlich durch die langen Sporen der Hinterschienen unterscheiden. Das letztere Merkmal bildet denn auch den Unterschied von der folgenden Gattung.

Von allen aus dieser schwierigen Gruppe beschriebenen Arten passt bloss eine hierher, das ist die *Casinarina ochrostoma* Holmgr. Bereits Tschek hat diese Vermutung ausgesprochen.

**E. ochrostoma** Holmgr. 1858 *Casinarina ochrostoma* Holmgren, *Svensk. Vet.-Akad. Handl.* II p. 52 ♀ | 1871 *Casinarina* [?] *Echthronomas* *ochrostoma* Tschek, *Ver. zool. bot. Ges. Wien* XXI p. 59 | *Anilasta ochrostoma* Thomson, *Opusc. Entom.* XI p. 1174 ♀.

Durch die charakteristische Kopfzeichnung leicht erkennbar. — Kopf nach hinten deutlich verschmälert. Thorax bucklig, matt, fein behaart; Metathorax der Länge nach eingedrückt, Felderung fehlend oder ganz undeutlich, Luftlöcher oval. Radius am Ende ziemlich gerade, Radialzelle gestreckt, etwa 3 mal so lang als breit; Areola kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv etwas hinter der Mitte

aufnehmend; Nervellus schräg, nicht gebrochen. Beine ziemlich kräftig, namentlich die hintersten Schenkel ziemlich dick; der längere Sporn der hintersten Schienen beinahe so lang wie der Metatarsus; die hintersten Schienen und Tarsen gedörnt. Hinterleib gegen das Ende seitlich zusammengedrückt; das 1. Segment leicht gekrümmt, etwas kürzer als die hintersten Hüften und Trochanteren, Postpetiolus an den Seiten gerandet, leicht convex, doppelt so breit als der Petiolus; das 2. Segment kaum länger als breit, gegen die Basis leicht verschmälert; das 3. etwa so lang als breit; Bohrer kaum vorragend. — Schwarz, weisslichgrau pubescent. Palpen, Mitte der Mandibeln, Clypeus, Spitze der Wangen und Stirnseiten gelblich; Fühler bräunlich-schwarz, Schaft unten rötlichgelb. Flügel fast hyalin; Tegulä gelblich, Stigma braun. Vorderbeine rötlich, Hüften schwarz, Mittelschienen gegen die Basis gelblich; an den hintersten Beinen die Hüften schwarz; unten mit rötlicher Makel, die Schenkel rot, Schienen und Tarsen schwärzlich, die Schienen unterhalb der Basis mit breitem weisslichen Ring. Segment 1 am Ende, 2 und 3 ganz, 4 an der Basis breit rot.

Var. ♀♂. Clypeus nur mit 2 gelben Punkten.

Von Tschek in Oesterreich gefunden.

L. 6 mm.

Nord- und Mitteleuropa; sehr selten.

#### 4. Gen. **Zachresta** Först.

1868 Zachresta Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 151.

Ueber diese Gattung lässt sich ausser der in der Bestimmungstabelle der Gattungen angeführten Diagnose weiter nichts sagen. Von Woldstedt ist eine Art aus Russland beschrieben worden, zwei andere Arten sind aus Nordamerika bekannt. Die eine europäische Art ist an der auffallenden Kopfzeichnung leicht zu erkennen.

**Z. insignis** Woldst. 1877 Zachresta insignis Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXIII p. 436 ♀.

Kopf und Thorax punktiert, fein behaart. Kopf ziemlich aufgetrieben, hinter den Augen wenig verschmälert, Gesicht in der Mitte schwach erhöht; der untere Mandibelzahn länger als der obere; Clypeus am Ende niedergedrückt; Fühler fast fadenförmig, kürzer als der Körper. Thorax robust, etwas länger als hoch, Mesonotum matt, Brustseiten glänzend. Metathorax mit 5 ziemlich deutlichen Feldern,

Area superomedia am Ende verbreitert, offen. (Ueber die Luftlöcher des Metathorax sagt Woldstedt nichts; da er die Art zu Zachresta stellt, so ist anzunehmen, dass sie linear oder mindestens gestreckt oval sind.) Areola im Vorderflügel unregelmässig vierseitig, kurz gestielt; Nervellus fast in der Mitte gebrochen. Beine ziemlich kräftig, Klauen an der Basis gekämmt. Das 1. Hinterleibssegment ungefähr so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren, mit Längsfurche, Petiolus mit tiefen Seitengrübchen; das 2. und 3. Segment etwas länger als breit, die folgenden quer; Bohrer kaum länger als das 1. Segment. — Schwarz, Mund, Makeln des Clypeus, zwei annähernd dreieckige Gesichtsflecken neben den Augen und Scheitelpunkte gelb. Flügel leicht getrübt, Stigma braun, Tegulä rötlich. Spitzen der Schenkel und Vordertarsen rötlich; Schienen gelblich, Hinterschienen am Ende braun. Das 1. Segment am Ende bräunlich, das 2. und 3. rot, das 4. und 5. rotbraun, auf dem Rücken schwärzlich. Bohrer mit gelblicher Spitze.

L. 12 mm.

Das Exemplar wurde bei St. Petersburg gefunden.

## 5. Gen. *Sagaritis* Holmgr.

1858 *Sagaritis* Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV p. 325.

Kopf nach hinten verschmälert, selten etwas aufgetrieben; Augen nackt; Clypeus in der Mitte des Endrandes mit spitzem Zähnchen oder Dorn; Fühlerschaft immer mit schwarzer Unterseite. Tegulä meist weiss oder gelblich. Metathorax gefeldert, der Länge nach nicht ausgehöhlt, die Luftlöcher klein und rund. Areola im Vorderflügel klein und gestielt, rücklaufender Nerv in der Mitte, zuweilen etwas vor derselben; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle meist ein spitzer; Nervellus gebrochen. Fussklauen dünn, den Pulvillus überragend. Hinterleibsstiel mit kleinen Seitengrübchen, der Postpetiolus breit und deutlich abgesetzt; Bohrer kurz, selten mittellang. Hinterleib schwarz, seltener die Hinterleibsmittle rot gezeichnet.

Die Gattung *Sagaritis* besitzt in der Bildung des Clypeus ein ganz charakteristisches Merkmal, bei günstiger Beleuchtung ist das Zähnchen am Ende immer deutlich zu sehen. Im allgemeinen erinnern die Arten sehr an die Gattung *Angitia*; der gebrochene Nervellus und die durch die Einmündung des rücklaufenden Nerven mehr regelmässig erscheinende Areola lassen auch ohne Untersuchung des Clypeus *Sagaritis* bald erkennen.

## Uebersicht der paläarktischen Arten.

1. Bauchfalte an der Basis schwarz oder braun. Nervulus und Nervellus schief. Der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle fast ein rechter. Schenkel kräftig. 2.  
Bauchfalte gelb, ebenso Mandibeln und Tegulä. Fühler schlank. Der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitz. 5.
2. Hinterleibsmittle rot. Mandibeln, Tegulä und Hinterschenkel schwarz.  
1. **congesta** Holmgr.  
Hinterleib schwarz. Tegulä weisslich. 3.
3. Rücklaufender Nerv vor der Mitte. Das 2. Hinterleibssegment mit Quereindrücken.  
2. **incisa** Bridgm.  
Rücklaufender Nerv in oder etwas hinter der Mitte. Das 2. Hinterleibssegment ohne Quereindrücke. 4.
4. Schenkel und Schienen einfarbig rot, die hintersten Schienen an Basis und Spitze kaum verdunkelt. Fühler kurz und dick.  
3. **brachycera** Thoms.  
Die hintersten Schienen an Basis und Spitze, wie die Tarsen dunkelbraun. Fühler schlanker.  
4. **agilis** Holmgr.  
Anmerk. Handelt es sich um eine grosse Art von 9 mm Länge, so vergleiche man *S. ebenina*.
5. Hinterleibsmittle rot oder die mittleren und hinteren Segmente mit breiten roten Endrändern oder an den Seiten rot. 6.  
Hinterleib schwarz, höchstens die mittleren Segmente mit hellen Einschnitten. 17.
6. Alle Schenkel rot. 7.  
Hinterschenkel schwarz. 14.
7. Nervellus fast über der Mitte gebrochen. Der untere Aussenwinkel der Brachialzelle fast ein rechter. Die mittleren Segmente mit rotem Endrand. Die hintersten Schienen an der Spitze und die Kniee schwarz. Bohrer fast so lang wie das 1. Segment. Kleine Art.  
5. **mucronella** Thoms.  
Nervellus unter der Mitte gebrochen. Der untere Aussenwinkel der Brachialzelle spitz. 8.



8. Die mittleren Segmente, meist 2—5, ganz rot. 9.  
Die mittleren Segmente nur am Ende oder an den Seiten rot. 11.

9. Schenkel und Schienen einfarbig rot, die hintersten Schienen an Basis und Spitze nicht dunkel gezeichnet. Bohrer kürzer als das 1. Segment.

6. **erythropus** Thoms.

Die hintersten Schienen an Basis und Spitze dunkel gezeichnet. 10.

10. Bohrer fast so lang wie der halbe Hinterleib. Area supero-media lang, hinten nicht geschlossen. Kleine Art von 4 mm.

7. **raptor** (Zett.) Thoms.

Bohrer kürzer als das 1. Segment. Das 2. und 3. Segment an Länge fast gleich. Rücklaufender Nerv vor der Mitte der Areola. 6,5 mm.

8. **cognata** Tschek.

11. Rücklaufender Nerv deutlich vor der Mitte der Areola mündend. Bohrer kürzer als das 1. Segment. 12.

Rücklaufender Nerv in oder hinter der Mitte der Areola mündend. Hinterschienen in der Mitte weiss. 13.

12. Hinterschienen rot, an Basis und Spitze dunkel gezeichnet.

9. **zonata** (Grav.) Tschek.

Hinterschienen schwarz, in der Mitte und vor der Basis weiss.

10. **maculipes** Tschek.

(zonata Thoms.)

13. Bohrer kürzer als das 1. Segment. Die hintersten Schienen schwärzlich, in der Mitte breit weiss. Vorderhüften gelb.

11. **latrator** Grav. (mitis Holmgr.)

Bohrer so lang wie das 1. Segment. Die hintersten Schienen innen rot, aussen weiss (♀) oder rötlich weiss (♂), an Basis und Spitze braun. Vorderhüften schwärzlich.

12. **Holmgreni** Tschek.

(fasciata Bridgm. macroura Thoms.)

14. Segment 3 und 4 ganz oder fast ganz rot. Kopf hinten nicht verengt. Bohrer lang. 15.

Segment 3 und 4 nur mit roten Rändern oder an den Seiten rot. Tegulä hellgelb. 16.

15. Der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle fast ein rechter. Tegulä schwärzlich. 5 mm.

cf. 1. **congesta** Holmgr.

Der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle sehr spitz. Tegulä blassgelb.

cf. 13. **declinator** Grav. var.

16. Die hintersten Schienen rot, meist an Basis und Spitze etwas verdunkelt. Rücklaufender Nerv in der Mitte der Areola. 6—7 mm.

13. **declinator** Grav.

Die hintersten Schienen schwarz und weiss. Rücklaufender Nerv vor der Mitte der Areola.

cf. 10. **maculipes** Tschek var.

17. Sehr grosse Art von 8—9 mm Länge. Kopf nach hinten verschmälert. Die hintersten Schienen rot, an der Spitze und die Kniee schwarz.

14. **ebenina** (Grav.) Tschek.

Kleinere Arten. Kopf selten nach hinten verengt. 18.

18. Die hintersten Schienen rot, in der Mitte nicht weisslich. 19. Die hintersten Schienen schwärzlich, in der Mitte weisslich. 22.

19. Rücklaufender Nerv in der Mitte der Areola mündend. Das 3. Segment beim ♀ fast quer, beim ♂ fast quadratisch.

15. **crassicornis** Tschek.

Rücklaufender Nerv vor der Mitte der Areola mündend. 20.

20. Das 2. Segment vorn und hinten mit Quereindrücken; der hinterste am deutlichsten.

cf. 2. **incisa** Bridgm.

Das 2. Segment ohne Quereindrücke. 21.

21. Das 3. Segment nicht länger als breit.

16. **varians** Thoms.

Das 3. Segment länger als breit.

17. **postica** Bridgm.

22. Die hintersten Schenkel schwarz. 23.

Die hintersten Schenkel rot. 24.

23. Kopf hinter den Augen fast erweitert. Bohrer länger als das 1. Hinterleibssegment, fast so lang als der halbe Hinterleib. Die vorderen Hinterleibseinschnitte meist rötlich. 5 mm.

18. **femoralis** Grav. (laticollis Holmgr.)

Kopf hinter den Augen verschmälert. Bohrer kürzer als der halbe Hinterleib. 4—5 mm.

19. **annulata** Grav.

24. Kopf nach hinten fast erweitert. Bohrer länger als das 1. Segment.

18. **femoralis** Grav. var.

Kopf nach hinten verschmälert. 25.

25. Die vorderen Hüften und Trochanteren gelb. Stigma bräunlichgelb.

cf. 11. **latrator** Grav.

Hüften schwarz. Stigma mehr braun.

20. **punctata** Bridgm.

1. **S. congesta** Holmgr. 1858 *S. congesta* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 44 ♂ | 1871 *S. congesta* Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI p. 47 ♂ | 1887 *C. congesta* Thomson, Opusc. entom. XI p. 1091 ♀♂.

Vorliegende Art bildet mit den drei folgenden eine Gruppe, welche ausgezeichnet ist durch die dunkle Bauchfalte, die Schrägstellung von Nervulus und Nervellus und den nicht spitzen unteren Aussenwinkel der Discoidalzelle. Kopf nach hinten nicht verschmälert; Fühler etwas länger als der halbe Körper. Thorax wenig länger als hoch; Metathorax runzlig, Area superomedia quer. Rücklaufender Nerv kurz vor der Mitte der Areola mündend; Nervellus fast in der Mitte gebrochen. Postpetiolus kaum so lang als breit. Bohrer im Verhältnis lang, kaum kürzer als der halbe Hinterleib. — Schwarz; Palpen hell. Flügel ganz schwach getrübt, Stigma bräunlichgelb. Tegulä braunschwarz. Beine schwarz, die vordersten Schenkel und Schienen, an den Mittelbeinen die Spitzen der Schenkel und die Schienen, sowie die Mitte der hintersten Schienen rot. Das 2. Segment hinten, das 3. und 4. ganz und das 5. an der Basis schmal rot.

L. 5 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

2. **S. incisa** Bridgm. 1883 *S. incisa* Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, p. 165 ♀♂.

Kopf quer, nach hinten verschmälert, breiter als der Thorax; Fühler etwas kürzer als Thorax und Hinterleib. Mesonotum mit ziemlich deutlichen Parapsidenfurchen; Area superomedia hinten geschlossen oder offen; Seitenfelder undeutlich. Stigma im Vorderflügel lang und

schmal, rücklaufender Nerv vor der Mitte der Areola mündend; Nervulus interstitial, Nervellus unter der Mitte gebrochen, der ausgehende Nerv sehr undeutlich. Hinterleib ziemlich kurz und breit; Postpetiolus etwas länger als breit, mit parallelen Seiten und 3 Grübchen, eines in der Mitte und zwei an den Seiten; 2. Segment etwas länger als breit, kurz hinter der Basis mit breiter aber seichter, vor dem Ende mit tiefer und deutlicher Querfurche; das 3. und die folgenden Segmente quer; Bohrer so lang wie das halbe 1. Segment. — Schwarz; Palpen rötlich. Tegulä blassgelb. Beine rot, Hüften, Basis der vorderen und mittleren Trochanteren schwarz; Basis und Ende der hintersten Schienen und die hintersten Tarsen schwarzbraun.

L. 5 mm.

Bridgman sagt nichts über den unteren Aussenwinkel der Discoidalzelle und die Färbung der Bauchfalte; ich habe deshalb die Art in der Bestimmungstabelle zwei Mal angeführt.

Die Art wurde in England gefunden; sie lebt nach dem Autor in *Eupithecia campanulata*.

3. **S. brachycera** Thoms. 1887 *S. brachycera* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1091 ♀♂.

Ausgezeichnet durch die kurzen und dicken Fühler. Der Kopf ist nach hinten wenig verschmälert; Clypeus ziemlich convex, mit kurzem Enddorn. Mesopleuren glänzend, deutlich punktiert. Areola mit dem rücklaufenden Nerv etwas hinter der Mitte; Nervulus und Nervellus schräg; der Endabschnitt des Radius wenig länger als der Basalabschnitt; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle fast ein rechter. Schenkel, namentlich die hintersten ziemlich kräftig. Bohrer etwas kürzer als das 1. Segment. — Schwarz; Tegulä blassgelb. Beine mit Ausnahme der Hüften und Trochanteren rot, die hintersten Schienen kaum dunkel gezeichnet. Bauchfalte braun.

L. 4—5 mm.

Nord- und Mitteleuropa; hier in Thüringen eine der häufigeren Arten.

4. **S. agilis** Holmgr. 1858 *S. agilis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 47 ♀ | 1880 *S. agilis* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 147 ♂ | 1887 *S. agilis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1091 ♀♂.

Der vorhergehenden Art sehr ähnlich aber Fühler schlanker, länger als Kopf und Thorax und die Mesopleuren punktiert-lederartig. Was die Zeichnung betrifft, so sind die Mandibeln beim ♀ in der Mitte rötlichgelb,

beim ♂ fast ganz gelb, ferner sind die Spitzen der hintersten Schenkel namentlich beim ♂, und Basis und Spitze der hintersten Schienen dunkel gezeichnet; die Basis der hintersten Tarsenglieder ist gelblich.

L. 5 mm.

Nord- und Mitteleuropa; nicht häufig.

5. **S. mucronella** Thoms. 1887 *S. mucronella* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1095 ♀.

Kopf nach hinten deutlich verengt. Stigma schmal, der untere Aussenwinkel der Brachialzelle fast ein rechter; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle sehr spitz, Endabschnitt des Radius viel länger als der Basalabschnitt; Nervellus fast postfurcal, etwas über der Mitte gebrochen. Bohrer fast so lang wie das 1. Segment. — Schwarz; die mittleren Segmente am Ende, sowie Schenkel und Schienen rot; die hintersten Kniee und die Spitzen der hintersten Schienen schwärzlich. Bauchfalte hell.

L. 4–5 mm.

Schweden; selten.

6. **S. erythropus** Thoms. 1887 *S. erythropus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1093 ♀♂ | 1858 *S. raptor* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 44 ♀♂ (partim).

Kopf nach hinten verschmälert. Areola mit dem rücklaufenden Nerv in der Mitte. Das 2. Hinterleibssegment fast breiter als lang. Bohrer kürzer als das 1. Segment. — Schwarz, Hinterleibsmittle und Beine mit Ausnahme der Hüften und Trochanteren rot; auch die Tarsen vorwiegend rot.

Die Art ähnelt sehr der *S. raptor*, mit der sie auch Holmgren vermengt; sie unterscheidet sich durch den nicht zurückgebogenen Vorderrand der Mittelbrust, den kürzeren Bohrer und die einfarbig roten hintersten Schienen und Tarsen.

L. 4–5 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

7. **S. raptor** (Zett.) Thoms. 1838 *Porizon raptor* Zetterstedt, Insect. Lapon. I p. 395 ♀ | 1858 *Sagaritis raptor* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 44 ♀♂ (ex parte) | 1887 *S. raptor* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1093 ♀♂.

Kopf nach hinten verschmälert. Acetabula in der Mitte stark aufgebogen; Area superomedia ziemlich lang, hinten nicht geschlossen. Rücklaufender Nerv in der Mitte der Areola mündend; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitz. Bohrer fast so lang wie der halbe Hinterleib. — Schwarz; Mandibeln zum Teil und Palpen rötlichgelb.

Beine mit Ausnahme der Hüften und Trochanteren schwarz, die hintersten Schienen an Basis und Spitze schwärzlich. Hinterleibsmitte breit rot.

Mit der vorhergehenden Art eng verwandt, verschieden durch die in der Mitte stark aufgebogenen Acetabula, den längeren Bohrer und die an Basis und Spitze dunkel gezeichneten Hinterschienen.

L. 4 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

8. **S. cognata** Tschek. 1871 *S. cognata* Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI p. 46 ♀♂ | 1880 *S. cognata* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 147 ♀.

Kopf hinter den Augen stark verschmälert; Gesicht quadratisch; Fühler von halber Körperlänge, gegen die Spitze verdünnt. Area superomedia breiter als lang, durch eine feine Querleiste hinten geschlossen. Der rücklaufende Nerv vor der Mitte der Areola mündend; Nervellus unter der Mitte gebrochen. Segment 2 und 3 an Länge unter einander fast gleich; Bohrer kürzer als das 1. Segment. — Schwarz; Palpen rötlichgelb. Tegulä blassgelb. Flügel etwas getrübt, Stigma bräunlich. Beine mit Ausnahme der Hüften und Trochanteren rot, Vorderhüften an der Spitze rötlich; Hinterschienen an Basis und Spitze gebräunt; Hintertarsen rot, an der Spitze der Glieder gebräunt. Segment 2—5 rot, das 2. Segment oft nur am Ende.

Sehr ähnlich der *S. raptor*, hauptsächlich verschieden durch den kurzen Bohrer.

L. 6,5 mm.

Mitteleuropa; selten.

9. **S. zonata** (Grav.) Tschek. 1829 *Campoplex zonatus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 584 ♀♂ | 1858 *Sagaritis zonata* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 45 var. 2 ♀♂ | 1871 *S. zonata* Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI p. 47 ♀♂.

Anmerk. *S. zonata* Holmgren gehört nur zum kleinsten Teil hier, *S. zonata* Thomson ist identisch mit *S. maculipes* Tschek.

Kopf hinter den Augen nur wenig verengt, beim ♀ etwas mehr als beim ♂; der Metathorax hat 5 vollständig geschlossene obere Felder; die Area superomedia ist sechseckig, kaum länger als breit. Rücklaufender Nerv deutlich vor der Mitte der Areola mündend; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitz; Nervellus unter der Mitte gebrochen. Das 2. Hinterleibssegment unbedeutend länger als an der Spitze breit, an der Basis dicht und fein lederartig; das 3. Segment fast quadratisch, glatter und glänzender als das zweite; Bohrer so lang wie der Hinterleibsstiel. —

Schwarz; Palpen, Mitte der Mandibeln, Tegulä und Bauchfalte gelblich. Beine rot, Hüften und Basis der Trochanteren schwarz, letztere am Ende gelblich, die hintersten Schienen rötlich, an Basis und Ende schwärzlich. Segment 2—4 am Endrand, 3—7 auch an den Seiten braunrot. Beim ♂ sind die hinteren Segmente an den Seiten kaum rot.

Tschek führt eine Varietät an, wo der Hinterleib ganz schwarz ist, ebenso erwähnt er ♂, bei denen die hintersten Schienen aussen in der Mitte gelblichweiss sind. Es ist sehr fraglich, ob diese Tiere hierher gehören.

L. 6—7 mm.

Nord- und Mitteleuropa.

10. **S. maculipes** Tschek. 1871 *S. maculipes* Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI p. 49 ♀ ♂ | 1829 *Campoplex zonatus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 584 Var. 2 ♀ | 1887 *S. zonata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1094 ♀ ♂ [non Gravenhorst].

Abgesehen von der Färbung durch zartere Fühler und Beine, den schlankeren, reichlicher behaarten Hinterleib, namentlich auch durch die Gestalt und Skulptur des 2. Segmentes von *S. zonata*, der sie sonst durch die Felderung des Metathorax und die Insertion des rücklaufenden Nerves verwandt ist, verschieden.

Kopf hinter den Augen wenig verschmälert. Seiten des Thorax und Spitze des Hinterleibs reichlich mit weisslichen Härchen bekleidet. Area superomedia vollständig, etwas länger als breit. Rücklaufender Nerv vor der Mitte der Areola mündend; Nervellus unter der Mitte ganz schwach gebrochen. Das 2. Hinterleibssegment ziemlich schmal, fast um die Hälfte länger als breit, durchaus gleichmässig und sehr dicht lederartig, glanzlos. Das 3. Segment weniger glatt als bei *zonata*; Bohrer etwas kürzer als das 1. Segment. — Schwarz; Mitte der Mandibeln und Palpen rötlichgelb. Tegulä und Bauchfalte blassgelb; Stigma rötlichgelb. Beine rötlich, Hüften und Basis der Trochanteren schwarz; Mittelschenkel an der äussersten Basis zuweilen schwarz, Mittelschienen an Basis und Spitze meist etwas verdunkelt; die hintersten Schenkel an der äussersten Basis und Spitze meist schwarz, die hintersten Schiene weisslich, kurz hinter der Basis und am Ende, wie die Tarsen schwärzlich. Beim ♂ Vorderhüften ganz oder am Ende gelblich. Segment 3—7 an den Seiten mehr oder weniger ausgedehnt rot.

L. 6—7 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

11. **S. latrator** Grav. ? 1802 *Ichneumon latrator* Schrank, Fauna Boica II p. 306 ♂ | 1829 *Campoplex latrator* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 586 ♀♂ | 1858 *Sagaritis mitis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 46 ♀♂ | 1871 *S. latrator* Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI p. 48 ♀♂ | 1887 *S. latrator* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1094 ♀♂.

Kopf nach hinten verschmälert. Area superomedia kurz, hinten in der Regel offen, selten durch schwache Leiste geschlossen; beiderseits davon zwei geschlossene Felder. Areola im Vorderflügel mit dem rücklaufenden Nerv in der Mitte; Nervellus unter der Mitte gebrochen; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitz; Endabschnitt des Radius fast doppelt so lang als der gekrümmte Basalabschnitt. Das 2. Hinterleibssegment etwas länger als breit, das 3. annähernd quadratisch; Bohrer etwas kürzer als das 1. Segment. — Schwarz; Mandibeln, Palpen, Tegulä und Bauchfalte gelb. Stigma bräunlichgelb. Vorderhüften gelb, bei den ♂ vielfach auch zum Teil schwarz; Trochanteren gelb, die hintersten zum Teil schwarz; Schenkel rötlich; Vorderschienen rötlichgelb; die hintersten schwärzlich, in der Mitte breit weisslich; Hintertarsen dunkel. Segment 2 und 3 mit braunrotem Endrand, die folgenden Segmente an den Seiten rot.

L. 6--7 mm.

Nord- und Mitteleuropa; nicht häufig.

12. **S. Holmgreni** Tschek. 1871 *S. Holmgreni* Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI p. 50 ♀♂ | 1887 *S. fasciata* Bridgman, Trans. Entom. Soc. London p. 366 ♀♂ | 1887 *S. macroura* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1093 ♀♂.

Kopf nach hinten kaum verschmälert; Gesicht weisslich behaart; Fühler etwas länger als der halbe Körper. Mesonotum dicht lederig-punktiert, matt. Felderung des Metathorax bei den meisten Exemplaren undeutlich. Area superomedia ungefähr so lang als breit. Der Radius entspringt hinter der Mitte des Stigma; der rücklaufende Nerv mündet in oder kurz vor der Mitte der Areola; Nervellus undeutlich gebrochen. Das 2. Segment länger als breit; das 3. ungefähr so lang als breit; Bohrer nur wenig kürzer als der halbe Hinterleib. — Schwarz, Mandibeln grösstenteils, Palpen, Tegulä, vordere Trochantern und Bauchfalte gelb. Stigma bräunlichgelb. Beine mit Ausnahme der Hüften rotgelb; die hintersten Schienen innen rötlich, aussen in der Mitte beim ♀ weisslich, beim ♂ rötlichweiss, in beiden Geschlechtern unterhalb der weisslichen Basis mit dunklem Ring und am Ende breit schwarzbraun. Segment 2 am Endrand, 3 und 4 fast ganz rot, an



der Basis oben mit schwärzlicher Makel, die folgenden Segmente beim ♀ an den Seiten rot.

Tschek führt noch die folgende Varietät des ♀ an: Vorderhüften an der Spitze rötlich, die vorderen Trochanteren blassgelb; das 1. Segment am Ende sehr schmal rötlich, das 2. ganz schwarz, das 3. und 4. seitlich mit einem rötlichen Fleck. Der Metathorax ist gefeldert, die Area superomedia fast sechseckig, breiter als lang, am Ende mit einer feinen Leiste geschlossen. — Er schlägt für diese Färbung, wenn man sie als eigene Art betrachten will, den Namen *S. extricata* vor.

L. 6 mm.

Nord- und Mitteleuropa. Hier in Thüringen die häufigste von den Arten dieser Gruppe.

13. ***S. declinator*** Grav. 1829 *Campoplex declinator* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 589 ♀ ♂ | 1858 *Sagaritis declinator* Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV p. 358 ♀ ♂ | 1887 *S. declinator* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1092 ♀ ♂.

Scheitel breit, nach hinten nicht verschmälert; Fühler ziemlich dick, wenig länger als Kopf und Thorax zusammen. Thorax wie der Kopf ziemlich dicht weisslich pubescent; Metathorax in der Regel ohne Costula; es sind also je die beiden Seitenfelder durch eine Querleiste nicht geschieden. Radius aus der Mitte des Stigma entspringend; rücklaufender Nerv in der Mitte der Areola; Nervellus unterhalb der Mitte schwach gebrochen; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle sehr spitz. Hinterleib wenig zusammengedrückt; Postpetiolus fast quadratisch, 2. Segment kaum länger als breit; Bohrer lang und kräftig, etwas länger als der halbe Hinterleib. — Schwarz; Mandibeln des ♀ und Palpen gelb. Tegulä gelb, beim ♀ jedoch auch zuweilen braun bis schwärzlich; Stigma bräunlichgelb. Beine rötlich, Hüften, Basis der Trochanteren, Mittelschenkel an der Basis, Hinterschenkel ganz schwarz; die hintersten Schienen an Basis und Spitze schwärzlich. Segment 2 mit schmalem, 3 und 4 mit breitem roten Endrand und roten Seiten, beim ♀ auch 5 und 6 an den Seiten rot.

Var. ♀. Die hintersten Schenkel am Ende rot. Segment 2 mit rotem Endrand, 3 und 4 rot, oben mit schwarzer Basis, 5 und 6 am Endrand und den Seiten rot.

Die Art gehört mit zu den grössten, da sie eine Länge von 6–7 mm hat.

Nord- und Mitteleuropa.

14. **S. ebenina** (Grav.) Tschek. ? *Campoplex ebeninus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 480 ♀♂ | ? 1844 *Campoplex ebeninus* Ratzeburg, Ichneum. d. Forstins. I p. 93 | 1854 *C. ebeninus* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. p. 12 ♀♂ | 1871 *Sagaritis ebenina* Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI p. 52 ♀♂.

*S. ebenina* ist die grösste aller *Sagaritis*-Arten. Ob sie der *Campoplex ebeninus* Grav. und Ratzeb. ist, lässt sich aus den Beschreibungen nicht mit Sicherheit entscheiden. Sie stimmt am meisten mit *S. agilis* überein, unterscheidet sich aber schon durch die Grösse.

Kopf nach hinten schräg verschmälert; Stirn mit einer feinen, erhabenen Längslinie. Mesonotum dicht punktiert, lederartig, matt; Area superomedia hinten offen, die Seitenfelder durch Querleiste von einander geschieden. Rücklaufender Nerv in der Mitte der Areola. Bohrer sehr kurz, nach Gravenhorst von  $\frac{1}{2}$  Hinterleibslänge. — Schwarz; Mandibeln und Palpen braunrot bis schwärzlich. Tegulä gelblich, Stigma braun. Beine rot, Hüften, die hintersten Trochanteren, die mittleren an der Basis, die hintersten Kniee und die Spitzen der hintersten Schienen und Tarsenglieder braun. Bauchfalte gelb und braun gefleckt.

9 mm.

Mittleres Europa.

15. **S. crassicornis** Tschek. 1871 *S. crassicornis* Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI p. 51 ♀♂ | 1880 *S. crassicornis* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 147 ♀♂.

Kopf nach hinten kaum merklich verschmälert; Gesicht quer, mit kleiner Beule; die ziemlich flache Stirn fein lederig punktiert; Fühler ziemlich dick, beim ♀ so lang wie der halbe Körper, beim ♂ etwas länger. Mesonotum vorn schwach dreilappig, fein und nicht dicht punktiert, ziemlich glänzend; Metathorax lederig, seitlich graulich behaart; die Luftlöcher ziemlich gross, rundlich, Area superomedia hinten breit offen, die beiden Seitenfelder nicht scharf von einander getrennt. Der rücklaufende Nerv mündet ungefähr in der Mitte der Areola; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitz; Nervellus unter der Mitte gebrochen. Beine kurz und kräftig, Schenkel, besonders die hinteren, beim ♀ merklich verdickt. Das 1. Segment kaum so lang wie die Hinterhüften mit den Trochanteren, Postpetiolus nicht besonders convex, wenig kürzer als der Petiolus, etwas länger als breit; das 2. Segment gegen das Ende unbedeutend breiter, wenig länger als breit, das 3. Segment beim ♀ etwas breiter als lang, beim ♂ fast quadratisch; Bohrer etwas kürzer als das 1.

Segment. — Schwarz; Mandibeln an der Spitze und Palpen rötlichgelb. Tegulä blassgelb; Stigma bräunlich. Schenkel und Schienen rot, die hintersten Schienen an Basis und Spitze gebräunt. Bauchfalte gelb.

L. 6–7 mm.

Mittleres Europa; hier in Thüringen eine der häufigsten Arten, die man im Frühjahr, von Ende April an, auf Grasplätzen findet.

Die Arten *S. crassicornis*, *postica* und *varians* sind schwer auseinander zu halten. Man kann sie wohl auch unter einer Art vereinigen, der dann der Name *S. crassicornis* zukommen würde.

16. **S. varians** Thoms. 1887 *S. varians* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1095 ♀♂.

Kopf nach hinten nicht oder kaum verschmälert. Area superomedia kurz, zuweilen fast quadratisch. Rücklaufender Nerv bei den zahlreichen Exemplaren, die ich in Thüringen gefangen habe und die ich auf *S. varians* beziehe, etwas vor der Mitte der Areola mündend. Der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitz. Beine kräftig. Hinterleib wie bei *S. crassicornis*; Bohrer etwas länger als der Postpetiolus. — Schwarz. Schenkel und Schienen rötlich, die hintersten Schienen ins Gelbliche, an der Basis undeutlich, am Ende kaum dunkler gefärbt. Vorderhüften beim ♂ unten gelblich. Hinterleib schwarz, nach Thomson die mittleren Segmente zuweilen rötlich gerandet.

L. 6 mm.

Nord- und Mitteleuropa. Mit der vorigen Art zusammen und von dieser kaum zu trennen.

17. **S. postica** Bridgm. 1886 *S. postica* Bridgman, Trans. Entom. Soc. London p. 350 ♀.

Kopf nach hinten kaum verschmälert. Mesonotum vorn schwach dreiteilig; Area superomedia sechseitig, etwas länger als breit, hinten undeutlich geschlossen; Seitenfelder von einander getrennt. Areola mit dem rücklaufenden Nerv vor der Mitte; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitz; Nervellus unter der Mitte gebrochen. Postpetiolus 3 mal so breit wie der Petiolus, länger als breit; das 2. Segment ein Drittel länger als breit; das 3. wenig länger als breit; Bohrer so lang wie das 1. Segment. — Schwarz; Mandibeln und Palpen gelb, Tegulä weisslich, Stigma braungelb. Beine rot, Hüften schwarz, Trochanteren gelb, an der Basis schwärzlich; die äusserste Basis der

hintersten Schenkel braun; die hintersten Schienen in der Mitte gelblich, in der Nähe der Basis mit dunklem Halbring; Endglied aller Tarsen verdunkelt. Bauchfalte gelb, hinten an den Seiten dunkel gefleckt.

L. 7 mm.

England.

18. **S. femoralis** Grav. 1829 *Campoplex femoralis* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 592 ♀ | 1858 *Sagaritis laticollis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 46 ♀♂ | 1871 *S. laticollis* Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI p. 51 ♀♂ | 1877 *S. femoralis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1092 ♀♂.

Körper ziemlich schlank. Kopf nach hinten etwas verbreitert; Fühler des ♂ wenig länger als der halbe Körper. Thorax matt, etwas schmaler als der Kopf. Area superomedia hinten oft offen, die Seitenfelder nicht verschmolzen, indem die Costula gewöhnlich nur schwach angedeutet ist oder fehlt. Rücklaufender Nerv in der Mitte der Areola mündend; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitz; Nervellus unter der Mitte gebrochen. Beine schlank, Hinterleib etwas länger als Kopf und Thorax zusammen. Postpetiolus wenig convex, nicht viel länger als breit, doppelt so breit als der Petiolus; das 2. Segment länger als breit, das 3. beim ♀ quer, beim ♂ etwa so lang als breit; Bohrer länger als das 1. Segment, fast so lang wie der halbe Hinterleib. — Schwarz; Mandibeln und Palpen gelb, seltener dunkel. Tegulä blassgelb, Stigma braungelb. Beine rötlich, Hüften und Trochanteren schwarz, letztere am Ende gelb; Vorder- und Mittelschenkel an der Basis, die hintersten ganz schwarz; Mittelschienen an Basis und Spitze verdunkelt; die hintersten Schienen schwärzlich, an der Basis schmal, in der Mitte breit weisslich; Hintertarsen schwärzlich, an der Basis heller. Die vorderen Einschnitte des Hinterleibs oft rötlich, Bauchfalte gelb.

Var. Die hintersten Schenkel ganz oder in der Mitte rot.

L. 5 mm.

Verbreitet in Nord- und Mitteleuropa. — Als Wirte werden *Depressaria nervosa* und *Plusia gamma* angeführt.

19. **S. annulata** Grav. 1829 *Campoplex annulatus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 493 ♀ | 1887 *S. annulata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1094 ♀♂.

Kopf nach hinten verschmälert. Area superomedia deutlich länger als breit, hinten geschlossen. Radius hinter der Mitte des Stigma entspringend; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitz. Hinterleib kaum länger

als Kopf und Thorax zusammen; Bohrer kürzer als das 1. Segment. — Schwarz; Mandibeln in der Mitte und Palpen gelb. Tegulä weisslich. Stigma dunkelgelb. Beine rötlich, Hüften und Trochanteren schwarz, letztere an der Spitze rot oder gelblich; Vorderschenkel an der Basis, die hintersten ganz oder zum grössten Teil schwarz; Hinterschienen innen schwärzlich, aussen weisslich, nahe der Basis und am Ende breit schwärzlich; Hintertarsen schwarzbraun, der Metatarsus mit weisslicher Basis. Bauchfalte gelb.

L. 4—5 mm.

Nord- und Mitteleuropa.

20. **S. punctata** Bridgm. 1886 *S. punctata* Bridgman, Trans. Entom. Soc. London p. 349 ♀♂.

Kopf quer, nach hinten verschmälert; Fühler länger als Kopf und Thorax. Metathorax ziemlich kurz mit mehr oder weniger deutlicher Felderung; Area superomedia breiter als lang, mit Spuren von Querrunzelung. Rücklaufender Nerv in oder kurz vor der Mitte der Areola, letztere regelmässig, so breit als lang, gestielt; Nervellus unter der Mitte gebrochen. Beine schlank. Hinterleib länglich oval, beim ♂ fast cylindrisch, Petiolus und Postpetiolus fast von gleicher Länge, letzterer fast 4 mal so breit als der erstere, etwas länger als breit; das 2. Segment beim ♀ etwa  $\frac{1}{3}$  länger als breit, beim ♂ fast doppelt so lang als breit; das 3. Segment beim ♀ quadratisch, beim ♂ länger als breit; Bohrer etwas länger als das 1. Segment. — Schwarz; Mandibeln in der Mitte gelblich; Palpen rot. Tegulä blassgelb, Stigma bräunlich. Beine rot, Hüften und Basis der Trochanteren schwarz, Spitze der Vorderhüften zuweilen rot; Hinterschienen weisslich, an Basis und Spitze schwarz; Hintertarsen schwarz, Basis der Glieder hell.

L. 6 mm.

England. — Aus *Plusia orichalcea*.

## 6. Gen. *Cymodusa* Holmgr.

1858 *Cymodusa* Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV p. 325.

Kopf meist nach hinten etwas verschmälert; Augen vorstehend, dünn behaart, innen neben der Fühlerbasis leicht ausgerandet; Gesicht des ♀ nach unten deutlich verschmälert, beim ♂ weniger deutlich. Thorax länger als hoch; Metathorax gefeldert aber mit schwachen Leisten; die Luftlöcher rund.

Radialzelle gestreckt, Endhälfte des Radius nur schwach gekrümmt; Areola regelmässig, gestielt, der rücklaufende Nerv ungefähr in der Mitte mündend; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle ein rechter; Nervellus gebrochen. Hinterleib gegen das Ende beim ♀ von der Seite zusammengedrückt, Petiolus ohne Seitengrübchen, Postpetiolus flach; Bohrer vorstehend aber kaum länger als der Petiolus.

Die Gattung ist an den behaarten Augen und an dem namentlich beim ♀ gegen den Mund zu stark verschmälerten Gesicht nicht schwer zu erkennen. Der Hinterleib hat bei den meisten und häufigsten Arten 2 oder 3 rote Gürtel.

#### Uebersicht der paläarktischen Arten.

1. Tegulä schwarz. Hinterleib mit roten Gürteln. Schenkel und Schienen rot. 2.

Tegulä weiss. Hinterleib selten mit roten Gürteln; meist schwarz oder die mittleren Segmente an den Seiten rot. 4.

2. Hinterleib mit 2 roten Gürteln. Schiensporen lang. Mesopleuren fein und sparsam punktiert. 5 mm.

#### 3. **longicalcar** Thoms.

Hinterleib mit 3 roten Gürteln. Schiensporen nicht auffallend lang. 3.

3. Fühlerbasis beim ♀ weiss gezeichnet. Beim ♂ Metathorax mit undeutlicher Costula und die hintersten Schienen an Basis und Spitze schwarz. 5—7 mm.

#### 1. **leucocera** Holmgr.

Fühlerbasis beim ♀ nicht weiss gezeichnet. Metathorax mit deutlicher Area superomedia und Costula. Schenkel und Schienen rot, die hintersten Schienen nicht dunkel gezeichnet. 5—6 mm.

#### 2. **cruentata** Grav.

4. Hinterleib ganz schwarz, bei *C. petulans* ♀ zuweilen die Segmentränder schwach rot. 5.

Einige Segmente am Endrand oder an den Seiten deutlich rot. 6.

5. Beine rötlich, Hüften, zuweilen auch Hinterschenkel schwärzlich. Beim ♀ Endrand der Segmente zuweilen schwach rötlich.

#### 6. **petulans** Holmgr.

Vorderbeine hellgelb, nur die Schenkel rötlich. Die hintersten Beine schwärzlich. Mitte der Schienen rotgelb. 6 mm.

#### 7. **flavipes** Brischke.

6. Segment 2 und 3 am Endrand rötlich. Vorderbeine rötlich, Hüften zum Teil schwarz; Hinterbeine trüb rot, Hintersehenkel zum Teil und Schienen an Basis und Spitze bräunlich. 4 mm.

4. **exilis** Holmgr.

Die mittleren Segmente auch an den Seiten rötlich. Vorderhüften gelb. 7.

7. Segment 3—7 beim ♀ am Ende und den Seiten rot, beim ♂ Segment 3—5 an den Seiten verloschen rot. 5—7 mm.

5. **antennator** Holmgr.

Segment 2 mit rotem Hinterrand, 3 rot mit schwarzer Basis, 4 rot, 5 rot mit schwarzem Querfleck, 6 und 7 schwarz mit roten Seiten und Hinterrändern. Behaarung der Augen ziemlich undeutlich. 4 mm.

8. **elachistae** Brischke.

1. **C. leucocera** Holmgr. 1858 *C. leucocera* Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet. - Akad. Förh. XV p. 325 ♀ ♂ | 1887 *C. leucocera* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1096 ♀ ♂.

Kopf nach hinten namentlich beim ♂ kaum verschmälert; Gesicht weisslich pubescent, beim ♀ nach unten stark verschmälert; Behaarung der Augen deutlich; Fühler etwas länger als der halbe Körper. Thorax schmaler als der Kopf, fast doppelt so lang als hoch, matt, Brustseiten mit poliertem Speculum; Metathorax fein runzlig mit ziemlich deutlicher Felderung; beim ♂ die Costula undeutlich; Area superomedia kaum so lang als breit, selten hinten offen. Areola im Vorderflügel gestielt; Radius am Ende schwach gekrümmt; Nervellus unterhalb der Mitte schwach gebrochen. Beine schlank. Hinterleib gestreckt, länger als Kopf und Thorax zusammen, schwach glänzend, beim ♀ gegen das Ende seitlich zusammengedrückt, das 1. Segment schwach gebogen, etwas länger als die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus ziemlich convex, etwas länger als breit, doppelt so breit als der Postpetiolus; das 2. Segment länger als breit, das 3. so lang als breit; Bohrer so lang oder wenig kürzer als das 1. Segment. — Schwarz; weisslich pubescent; Mandibeln in der Mitte gelblich. Fühler des ♀ an der Basis auf der einen Seite weiss, beim ♂ ganz schwarz. Tegulä schwärzlich, Stigma bräunlich. Beine trüb rot, Hüften und Basis der Trochantern schwarz; die hintersten Schenkel zuweilen mehr oder weniger braun bis schwärzlich; die hintersten Schienen am Ende, beim ♂ auch in der Regel an der Basis schwarz;

Hintertarsen braun, an der Basis heller. Das 2. Segment mit breitem roten Endrand, das 3. rot mit schwarzer Basis oder nur hinten rot, das 4. ebenso, zuweilen ganz rot; auch die hinteren Segmente zuweilen mit schmalem roten Endrand; Bauchfalte gelb.

L. 5—7 mm.

Verbreitet in Nord- und Mitteleuropa und meist nicht selten. Hier in Thüringen zuweilen sehr häufig und dann wieder fehlend. Mit Vorliebe auf kurzgrasigen Wiesen.

2. **C. cruentata** Grav. 1829 *Campoplex cruentatus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 575 ♀ | 1858 *Cymodusa cruentata* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 40 ♀♂ | 1887 *C. cruentata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1096 ♀♂.

Von der vorigen Art hauptsächlich verschieden durch die fehlende weisse Zeichnung der Fühlerbasis beim ♀ und durch die gestrecktere Area superomedia; auch ist die dunklere Zeichnung der Hinterschienen höchstens angedeutet; auf das Vorhandensein oder Fehlen möchte ich, wie es Thomson tut, kein Gewicht legen.

Scheitel etwas länger als bei *C. leucocera*. Area superomedia mindestens so lang als breit. Bohrer etwas länger als das 1. Segment. — Schwarz, Mitte der Mandibeln und Palpen gelblich. Tegulä schwarz, Stigma bräunlich. Beine rot, Hüften und Basis der Trochanteren schwarz, die hintersten Tarsen braun, der Metatarsus an der Basis rötlich. Nach Holmgren sollen die hintersten Schenkel zuweilen mehr oder weniger ausgedehnt schwärzlich, ebenso die Basis und Spitze der hintersten Schienen verdunkelt sein. Segment 2—4 mit rotem Hinterrand, zuweilen auch an den Seiten zum Teil rötlich.

L. 5—6 mm.

Nord- und Mitteleuropa; seltener als *C. leucocera*. — Aus *Anisopteryx aescularia*.

3. **C. longicalcar** Thoms. 1887 *C. longicalcar* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1096.

Wie von so vielen anderen Arten gibt Thomson auch von dieser nur die folgende kurze Beschreibung: Sporen lang, Mesopleuren fein und zerstreut punktiert. Schwarz; Tegulä schwarz; Schenkel und Schienen rot; Hinterleib mit 2 roten Gürteln.

L. 5 mm.

Schweden.



4. **C. exilis** Holmgr. 1858 *C. exilis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 41 ♀♂ | 1880 *C. exilis* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 144 ♀ | 1887 *C. exilis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1097 ♀♂.

Von schlanker Gestalt. Kopf nach hinten etwas verschmälert; Stirn mit einer schwachen erhabenen Linie. Thorax schmaler als der Kopf, sehr dicht und fein punktiert und pubescent, wenig glänzend; Area superomedia breit, sechsseitig, hinten offen, beiderseits je 2 Seitenfelder. Areola im Vorderflügel kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv in der Mitte aufnehmend; Nervellus unter der Mitte ganz schwach gebrochen. Hinterleib schmal, im Durchschnitt fast rundlich; Postpetiolus convex, mit gerundeten Seiten; Bohrer gerade, so lang oder etwas kürzer als das 1. Segment. — Schwarz, weisslich pubescent; Mandibeln in der Mitte und Palpen gelblich. Tegulä gelblich, Stigma bräunlich. Die vordersten Beine rötlich, Hüften zum Teil und Basis der Trochanteren schwarz; Hinterbeine trüb rot, Hüften schwarz, Trochanteren gelb, an der Basis schwarz; Hintersehenkel zum Teil braun; die hintersten Schienen an Basis und Spitze verdunkelt. Segment 2 und 3 mit braunrotem Endrand. Bauchfalte gelblich.

Eine der kleinsten Cymodusa-Arten, nur 4 mm lang.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

5. **C. antennator** Holmgr. 1858 *C. antennator* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 41 ♀♂ | 1880 *C. antennator* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 144 ♀ | 1887 *C. antennator* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1097 ♀♂.

Schlanker als *C. leucocera* und *cruentata*. Kopf nach hinten wenig verschmälert; Stirn schwach eingedrückt, sehr dicht und fein punktiert; Gesicht beim ♀ nach unten stark verengt, fein weisslich behaart; Fühler dünn, gegen das Ende kaum verdünnt. Thorax schmaler als der Kopf, sehr dicht runzlig-punktiert, matt; Brustseiten mit poliertem Speculum; Area superomedia hinten in der Regel offen, beiderseits je zwei Felder. Areola im Vorderflügel sehr kurz gestielt oder fast sitzend; der rücklaufende Nerv fast vor der Mitte mündend; Nervellus unter der Mitte sehr undeutlich gebrochen. Hinterleib länger als Kopf und Thorax zusammen; Postpetiolus doppelt so breit als der Petiolus, wenig convex und dicht punktiert; das 2. Segment fast doppelt so lang als breit, fein lederig-punktiert, gegen das Ende glatter; das 3. so lang als breit; Bohrer so lang wie das 1. Segment. — Schwarz, weisslich pubescent; Mitte der Mandibeln und Palpen gelb. Tegulä blassgelb, Stigma hellbraun. Vorderbeine rot, Hüften und Trochanteren

gelblich; die hintersten Beine rot, Hüften und Trochanteren schwarz, letztere am Ende gelb; Spitze der Schienen und die Tarsen grösstenteils schwarzbraun. Segment 2 mit rotem Endrand, 3—5 am Endrand und den Seiten rot, 6 und 7 fast ganz rot. Beim ♂ ist der Hinterleib schwarz, Segment 3—5 an den Seiten verloschen rot gezeichnet.

Var. 1 ♂. Die hintersten Kniee und Basis und Spitze der hintersten Schienen schwarzbraun.

Var. 2 ♂. Die hintersten Schenkel und der Hinterleib fast ganz schwarz.

L. 5—7 mm.

Nord- und Mitteleuropa; nicht häufig.

6. **C. petulans** Holmgr. 1858 *C. petulans* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.-Handl. II p. 42 ♀♂ | 1880 *C. petulans* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 144 ♀ | 1887 *C. petulans* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1097 ♀♂.

Kopf nach hinten etwas verschmälert; Stirn ziemlich flach; Gesicht weisslich behaart; Augen dünn behaart. Thorax schmaler als der Kopf, lederartig-punktiert, matt; Mesopleuren mit poliertem Speculum; Area superomedia am Ende offen, die beiden Seitenfelder von einander getrennt. Areola im Vorderflügel gestielt, den rücklaufenden Nerv etwas hinter der Mitte aufnehmend; Nervellus kaum gebrochen. Hinterleib fein pubescent; Postpetiolus doppelt so breit als der Petiolus; das 2. Segment länger als breit; das 3. quadratisch; Bohrer so lang wie das 1. Segment. — Schwarz; Mandibeln grösstenteils und Palpen rötlichgelb. Tegulä blassgelb, Stigma bräunlichgelb. Beine rot, alle Hüften und Basis der hinteren Trochanteren schwärzlich; die hintersten Schienen an der Spitze, die Basis der hintersten Schenkel und die Tarsen grösstenteils dunkelbraun; seltener die hintersten Schenkel grösstenteils dunkel. Der Hinterleib ist nach Holmgren schwarz, nach Thomson soll er zum Teil rot sein.

L. 5 mm.

Nord- und Mitteleuropa.

7. **C. flavipes** Brischke. 1880 *C. flavipes* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 144 ♂.

„Seidenhaarig. Kopf hinter den Augen nicht verschmälert, mit ziemlich breiten Wangen; Gesicht nach unten etwas verschmälert; Fühler fast körperlang; Metathorax allmählich abschüssig, Area superomedia schmal, hinten offen; beiderseits davon je 2 Felder. Areola im Vorderflügel sitzend, den rücklaufenden Nerv kurz vor der Mitte aufnehmend; Radius am Ende fast gerade; Nervellus nicht

gebrochen. Hinterleib schmal, wenig zusammengedrückt, Segment 1 etwas länger als Hüften und Trochanteren; dünn, gerade; Postpetiolus wenig breiter als der Petiolus, mit parallelen Seiten; Segment 2 über doppelt so lang als breit, Segment 3 etwas länger als breit. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Flügelwurzel und Tegulä hellgelb. Stigma braun. Vorderbeine hellgelb, nur die Schenkel rötlich, Spitze der hinteren Trochanteren hellgelb, Mitte der Hinterschienen rotgelb, Schiensporen weisslich. Bauchfalte gelb.“

L. 6 mm. — Nur das ♂ bekannt.

Deutschland, England.

Anmerk. Man vergleiche die Bemerkung bei der nächsten Art.

8. **C. elachistae** Brischke. 1880 *C. elachistae* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 145 ♀♂.

„Stimmt fast ganz mit *Campoplex alternans* Grav. Matt, kurz seidenhaarig; Kopf breiter als der Thorax, nach hinten verschmälert; Augen unbehaart; Fühler fast körperlang, Thorax cylindrisch; Metathorax mit 5 Feldern, Area superomedia lang und schmal, hinten offen. Areola unregelmässig fünfeckig, sitzend, den rücklaufenden Nerv etwas hinter der Mitte aufnehmend; Radialnerv am Ende gerade; Nervellus nicht gebrochen. Segment 1 gekrümmt, nicht so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren, die Luftlöcher vortretend; Postpetiolus etwas länger als breit, mit geraden parallelen Seiten; Segment 2 länger als breit; Bohrer kurz, gekrümmt. — Schwarz; Palpen und Mandibeln gelb, Schaft unten rötlichgelb, Geissel unten braunrot. Tegulä blassgelb, Stigma hell bräunlich. Beine gelblichrot, vordere Hüften gelb, Hinterhüften schwarz mit gelber Spitze, Trochanteren gelb. Segment 2 mit rotem Hinterrand und roten Thyridien, Segment 3 rot mit schwarzem Basis, 4 rot, 5 rot mit schwarzem Quersack, 6 und 7 schwarz mit roten Seiten und Hinterrändern.“

L. 4 mm.

Deutschland. — Aus Blättern von *Phleum pratense* gezogen, in welchen Raupen einer *Elachista* minierten.

Anmerk. Vorliegende Art ist wegen der unbehaarten Augen keine *Cymodusa*; sicherlich gehört auch die vorhergehende Art nicht zu dieser Gattung. Die zahlreichen, namentlich unter der alten Gattung *Limneria* von Brischke neubeschriebenen Arten lassen recht sehr eine kritische Behandlung vermissen, wie sie bei dieser schwierigen Gruppe durchaus notwendig ist. Immerhin habe ich versucht, die Arten bei den einzelnen Gattungen einzureihen.

7. Gen. **Thersitia** Schmiedekn.

1907 Thersitia Schmiedeknecht, Die Hymenopt. Mitteleur. p. 598.

Kopf und Thorax matt. Kopf nach hinten geradlinig verschmälert, von Thoraxbreite; Augen nach unten stark convergierend, innen deutlich ausgerandet, schwach behaart. Parapsidenfurchen fehlend; Thoraxseiten fein und dicht gerunzelt, matt; Speculum poliert; Metathorax vollständig gefeldert, mit starken Leisten, Area superomedia etwas länger als breit, der Länge nach vertieft. Radialzelle kurz. Radiusende stark gekrümmt; Nervulus kurz hinter der Gabel, schräg nach aussen gestellt; Areola ziemlich gross, fast rhombisch, kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv wenig hinter der Mitte aufnehmend; Nervellus antefurcal, tief unten schwach gebrochen und einen feinen Längsnerv aussendend. Das 1. Segment stark gekniet, der Postpetiolus quadratisch, an der Beugungsstelle auffallend bucklig aufgetrieben; das 2. Segment so lang als hinten breit, an der Basis mit Quereindruck. Der ganze Hinterleib mit sehr feiner Skulptur, schwach glänzend; Bohrer etwas kürzer als der halbe Hinterleib.

**Th. egregia** Schmiedekn. 1907 Thersitia egregia Schmiedeknecht, l. c. p. 598 ♀.

Kopf und Thorax schwarz, Basalhälfte der Fühler unten weiss. Palpen und Mandibeln weiss, letztere mit dunklen Spitzen. Tegulä schwarzbraun, Flügelbasis weisslich, Stigma hellbraun. Beine rot, Hüften schwarz, Trochanteren grösstenteils gelblichweiss, Tarsen und die Endhälfte der hintersten Schenkel braunschwarz. Endrand des Postpetiolus, fast die Endhälfte von Segment 2 und Segment 3 und 4 rot, Basis von 3 schwarz.

L. 6 mm.

Diese auffallende Gattung, welche im Habitus an Omorgus, durch die Fühlerfärbung sofort an Cymodusa leucocera erinnert, wurde von Herrn R. Jussel in einem ♀ bei Schliers in Vorarlberg entdeckt.

8. Gen. **Rhytmonotus** Först.

1868 Rhytmonotus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 151.

Aus der Förster'schen Gattungstabelle ergeben sich für diese Gattung nur die folgenden kurzen Notizen: Augen nackt, innen deutlich ausgerandet. Metathorax gefeldert, Area superomedia durch Leisten vollständig geschlossen; Luftlöcher rund. Hinterleib mehr oder weniger keulenförmig. — Nach

der hier beschriebenen Art, welche ich zu Rhytmonotus ziehe, kann ich die Diagnose vervollständigen. Kopf und Thorax, weniger der Hinterleib sind dicht weisslich pubescent. Kopf kurz, nach hinten stark verengt; Gesicht mit parallelen Seiten; Fühler kräftig, gegen das Ende stark verdünnt; Clypeus mit starken Seitengruben, am Ende abgerundet; Mandibeln mit 2 gleichen Endzähnen. Thorax matt, auch das Speculum fehlend; Brustseiten fein runzlig-punktiert, Metathorax kurz, hinten ziemlich steil abfallend, Felderung fast vollständig, Area superomedia pentagonal, so lang als breit; der ganze Metathorax runzlig-punktiert, der abschüssige Teil etwas gröber als der obere. Radialzelle gestreckt, der Endabschnitt des Radius doppelt so lang als der Basalabschnitt, nur leicht gebogen; Areola unregelmässig, schief, lang gestielt, der rücklaufende Nerv kurz vor dem Ende mündend; Basalnerv ziemlich steil, Discocubitalnerv mit kurzem und dickem Ramellus: der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle sehr spitz; Nervulus interstitial, Nervellus nicht gebrochen. Beine ziemlich kräftig; die hintersten Schiensporen fast etwas länger als der halbe Metatarsus; Klauen lang gekämmt. Hinterleib von der Seite gesehen annähernd keulenförmig, die vorderen Segmente mehr flach, die hinteren etwas von der Seite zusammengedrückt; Hinterleibsstiel beiderseits mit Längsfurche; Postpetiolus deutlich abgesetzt, so lang als breit, ziemlich gewölbt; das 2. Segment deutlich länger als breit, beim ♂ um die Hälfte länger, hinten in der Mitte mit einem punktförmigen Eindruck, der bei anderen Exemplaren möglicherweise fehlen dürfte; das 3. Segment so lang als breit. Die ganze Hinterleib fein lederartig, die vorderen Segmente schwach, die hinteren etwas stärker glänzend.

**Rh. singularis** n. sp. Schwarz; Fühlergruben unterhalb der Fühler mit gelbem Rand; auch der Schaft und die beiden folgenden Glieder am Ende unten gelb. Tegulä weisslich; Flügel leicht getrübt, Stigma bräunlichgelb. Vorder- und Mittelbeine gelb, Hüften und Schenkel schwach rostgelb; Mittelhüften an der Basis schwarz gefleckt. An den hintersten Beinen sind Hüften und Trochanteren fast ganz schwarz; Schenkel bräunlich rot, an der Basalhälfte verschwommen schwärzlich; Schienen weisslichgelb, an der Basis schmal, am Ende breit schwärzlich; Schiensporen weisslich; Tarsen schmutziggelb, am Ende der Glieder schwach verdunkelt. Bauchfalte bräunlichgelb.

L. 7 mm. — Nur das ♂ bekannt.

Das betreffende Tier steckt seit fast 20 Jahren mit Fragezeichen in meiner Sammlung. Ich fing es am Fenster meiner Wohnstube in Blankenburg in Thüringen.

9. Gen. **Casinaria** Holmgr.1858 *Casinaria* Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV p. 325.

Kopf kurz, quer, nach hinten verschmälert, von vorn gesehen mehr oder weniger dreieckig; Augen innen neben der Fühlerbasis ausgerandet; Fühler kurz und meist kräftig; Wangen kurz; Clypeus nicht vom Gesicht getrennt, am Ende breit abgerundet; Mandibeln klein, mit gleichen Endzähnen. Thorax bucklig, Metathorax nach hinten allmählich abfallend, oft mit seichtem Längseindruck, ohne alle Felderung, höchstens mit Spuren davon. Stigma im Vorderflügel schmal, Radius meist vor der Mitte desselben entspringend; Areola klein und gestielt, meist von regelmässiger Gestalt, der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle mehr oder weniger spitz. Beine schlank, Klauenglied und Klauen klein. Hinterleib im Durchschnitt rundlich, mehr oder weniger keulenförmig, nur am Ende schwach zusammengedrückt; Spirakeln des 1. Segmentes im Enddrittel liegend; Seitengrübchen fehlend; das 2. Segment mit grossen, von der Basis entfernten Thyridien; Bohrer kurz und versteckt.

## Uebersicht der paläarktischen Arten.

1. Augenränder grösstenteils und Unterseite des Schaftes weisslich. Schenkel rot; Tarsenglieder weiss geringelt. Hinterleib schwarz. 2.  
 Augenränder schwarz. Tarsenglieder nicht weiss geringelt. Hinterleibsmittle oft rot. 3.
2. Schildchen schwarz. Mandibeln des ♂ gelb. 5—6 mm.  
 1. **orbitalis** Grav.  
 Schildchen mit weisser Makel. Mandibeln des ♂ schwarz. 8 mm.  
 2. **alboscutellaris** Thoms.
3. Hinterleibsmittle rot oder die mittleren Hinterleibssegmente an den Hinterrändern mehr oder weniger breit rot. Das 3. Segment quer. 4.  
 Hinterleib schwarz. Das 3. Segment bei einer Reihe von Arten länger als breit. 11.
4. Die hintersten Schienen an der Basis weiss. 5.  
 Die hintersten Schienen an der Basis nicht weiss. 7.
5. Schenkel und Schienen rot; die hintersten Schienen an Basis und Spitze schwarz. Tegulä weiss. 5 mm.  
 3. **scabra** Thoms.  
 Beine, namentlich die Hinterschenkel grösstenteils schwarz. Tegulä schwarz oder schwarzbraun. 6.

6. Beine schwarz, nur die vordersten Schienen und Kniee hell. 5 mm.

4. **moesta** Grav.

Vorderschienen und Schenkel ausgedehnt hell gefärbt. 7 mm.

5. **rufimana** (Grav.) Thoms.

7. Schenkel und Schienen rot, die hintersten Schienen an der Spitze meist etwas verdunkelt. Mandibeln und Tegulä schwarz. 5 mm.

6. **claviventris** Holmgr.

Die hintersten Schenkel an der Spitze oder ganz schwarz. 8.

8. Mittel- und Hinterschenkel fast ganz schwarz. Rücklaufender Nerv hinter der Mitte der Areola. Mund und Tegulä schwarz. 6—8 mm.

7. **punctiventris** Woldst.  
(subglabra Thoms.)

Schenkel grösstenteils hell. Die hintersten Schienen an Basis und Spitze schwarz. 9.

9. Tegulä schwarz. Hinterleibsmittle rot, selten die mittleren Segmente nur breit rot gerandet. Die hintersten Schenkel an Basis und Spitze schwarz. Rücklaufender Nerv etwas hinter der Mitte der Areola. 5—6 mm.

8. **varians** Tschek.  
(alpina Thoms.)

Tegulä weiss. Hinterleibsmittle nur mit roten Gürteln. Rücklaufender Nerv vor der Mitte der Areola. 10.

10. Die vorderen Hüften und Trochanteren, sowie der Fühlerschaft hell. Die hintersten Schenkel ziemlich dick, an der Spitze schwarz. 5 mm.

9. **monticola** Thoms.

Hüften und Trochanteren schwarz. Areola im Vorderflügel sitzend. 6 mm.

10. **affinis** Tschek.

11. Das 3. Segment quer, selten nur wenig breiter als lang. Postpetiolus an den Seiten gerundet. 12.

Das 3. Segment mehr oder weniger (beim ♀ weniger deutlich) länger als breit, ebenso der Postpetiolus. Der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle sehr spitz. 15.

12. Schenkel rot. 13.

Die hintersten Schenkel schwarz. 14.

13. Schenkel und Schienen rot, die hintersten Schienen an der Spitze und nahe der Basis schwärzlich. Das 2. Segment quadratisch oder fast etwas länger als breit. Fühler kurz, Schaft unten meist hell. 5 mm.

11. **morionella** Holmgr.

Schienen blassgelb, die hintersten an Basis und Spitze schwarz. Areola im Vorderflügel undeutlich.

12. **senicula** Grav.

14. Die hintersten Schienen schwarz, an der Basis und in der Mitte rötlich. Areola kurz gestielt. Das letzte Tarsenglied der Hinterbeine etwas länger als das vorletzte. 5 mm.

13. **stygia** Tschek.

Schienen und Tarsen gelblichweiss, Hinterschienen an der Spitze und hinter der Basis hell braunrot; Hintertarsen mit rötlichen Spitzen der Glieder. Fühlerschaft unten weissgelb. 5 mm.

14. **pallipes** Brischke.

15. Die hintersten Schenkel fast ganz schwarz. Palpen weiss. Schienen gelblich, die hintersten schwarz, an der Basis und in der Mitte weisslich. 5—7 mm.

15. **albipalpis** Grav.

Die hintersten Schenkel ganz oder grösstenteils rot. 16.

16. Nervellus schief postfurcal. Radius gleichmässig gekrümmt, Endhälfte kaum länger als die Basalhälfte. Tegulä, zumal des ♀, zuweilen schwarz. Hinterleib hinten kaum erweitert. Trochanteren schwarz. 5—7 mm.

16. **tenuiventris** (Grav.) Thoms.

Nervellus vertical. Endhälfte des Radius deutlich länger als die Basalhälfte. Tegulä weisslich. 17.

17. Hinterleib hinten kaum erweitert. Brustseiten fein lederartig. 5—6 mm.

17. **ischnogaster** Thoms.

Hinterleib hinten erweitert, sehr schlank. Brustseiten dicht punktiert. 5 mm.

18. **protensa** Thoms.

1. **C. orbitalis** Grav. 1829 *Campoplex orbitalis* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 510 ♀ | 1858 *Casinarina orbitalis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 48 ♀♂ | 1871 *Casinarina orbitalis* Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI p. 54 | 1887 *Casinarina orbitalis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1098 ♀♂.

Kopf kurz, quer, hinten kaum ausgerandet; Stirn leicht eingedrückt; Gesicht kaum vorstehend; Clypeus nicht



vom Gesicht getrennt, am Ende abgerundet; Augen innen nur wenig ausgerandet; Fühler kaum länger als der halbe Körper. Thorax bucklig, wenig länger als hoch; Mesonotum ohne Parapsidenfurchen; Metathorax fein gerunzelt, ohne Felderung, mit flachem Längseindruck. Basalnerv schräg, Endabschnitt des Radius wenig länger als der Basalabschnitt, an der Spitze leicht eingebogen; Areola kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv fast in der Mitte aufnehmend; Nervellus nicht gebrochen. Schiensporen sehr lang. Hinterleib schwach glänzend, fein weisslich behaart, das 1. Segment kaum länger als die hintersten Hüften und Trochanteren, Postpetiolus convex, mit gerundeten Seiten; das 2. Segment wenig länger als breit; das 3. Segment quer. — Schwarz. Mandibeln beim ♀ zuweilen in der Mitte rötlich, beim ♂ gelblich. Augenränder grösstenteils, namentlich an Stirn und Wangen weisslich; auch die Unterseite des Schaftes weisslich. Tegulä gelblichweiss, Stigma schwärzlich. Beine rötlich, Hüften und Trochanteren schwarz; Mittelschienen gelblich, am Ende braun, innen rötlich; die hintersten Schienen weiss, an Basis und Spitze schwarz; Vordertarsen gelblichweiss, die Spitze der Glieder rötlich; Hintertarsen schwarz, die Basis der Glieder weiss.

L. 5—7 mm.

Verbreitet in Nord- und Mitteleuropa. Die Art findet sich mit Vorliebe an trockenen und grasigen Orten; sie wurde aus *Deilephila galii* und *Larentia*-Arten gezogen.

2. **C. alboscutellaris** Thoms. 1887 *C. alboscutellaris* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1098 ♀♂.

Die Art stimmt nach Thomson ganz mit der vorhergehenden überein, ist aber grösser und robuster und das Schildchen hat hinten einen weissen Fleck; die weisse Zeichnung der Schienen und Tarsen soll ausgedehnter und beim ♂ sollen die Mandibeln schwarz sein. Als Länge wird 8 mm, als Vaterland Norddeutschland angegeben.

Ich habe zusammen mit *C. orbitalis* hier in Thüringen verschiedene Exemplare gefangen, deren Schildchen weiss gefleckt war, die sich sonst aber nicht von der Stammart, auch nicht durch Grösse unterscheiden. Auf die Färbung des Schildchens hin möchte ich also nicht 2 Arten unterscheiden.

3. **C. scabra** Thoms. 1887 *C. scabra* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1099 ♀♂.

Metathorax runzlig-punktiert, an der Basis mit Spuren von Felderung, weniger dicht behaart als bei der ver-

wandten *C. claviventris*. Radius am Ende deutlich gekrümmt; Nervellus unterhalb der Mitte gebrochen. Das 3. Segment etwas breiter als lang. — Schwarz. Tegulä weisslich. Schenkel und Schienen rot; die hintersten Schienen an der Basis weiss, unterhalb davon und am Ende schwärzlich. Hinterleibsmittle rot.

L. 5 mm.

Die Art wurde in Frankreich entdeckt; ich habe sie auch einzeln hier in Thüringen gefunden.

4. **C. moesta** Grav. 1829 *Campoplex moestus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 599 ♂ | 1876 *Casinaria moesta* Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Petersburg XXII p. 391 ♂ | 1887 *C. moesta* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1100 ♀♂.

Der *C. scabra* sehr verwandt, aber Metathorax mit tieferem Längseindruck, Endabschnitt des Radius länger, Stigma breiter und die Beine anders gezeichnet. Die Areola im Vorderflügel ist nach Gravenhorst sitzend. Das 3. Segment ist beim ♀ breiter als lang, beim ♂ quadratisch. — Schwarz. Tegulä schwarzbraun, Stigma braun. Beine schwarz, die Spitzen der vordersten Schenkel und die vordersten Schienen rötlich; Hinterschienen mit weisslicher Basis. Endrand des 2. Segmentes und Segment 3–5 rot, meist die Basis des 3. und der Endrand des 5. schwarz.

L. 5 mm.

Mittel- und Südeuropa; selten.

5. **C. rufimana** Grav. 1829 *Campoplex rufimanus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 597 ♀♂ | 1872 *Limneria rufimana* Marshall, Catal. Brit. Hymen. p. 58 ♀♂ | 1887 *Casinaria rufimanus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1101 ♀♂.

Die Art schliesst sich eng an die vorhergehende an, ist aber grösser und besonders durch die Färbung der Vorderbeine verschieden. — Schwarz; Kopf und Thorax fein weisslich behaart. Tegulä schwarz; Stigma braun; Areola kurz gestielt. Beine schwarz, die vorderen Schenkel am Ende und auf der Oberseite und die vorderen Schienen grösstenteils rot; die hintersten Schienen in der Mitte braunrot. Nach Thomson soll die Basis der Hinterschienen weisslich sein; Gravenhorst erwähnt davon nichts, während er es bei den verwandten Arten tut. Es ist deshalb nicht sicher, ob die von den erwähnten Autoren beschriebenen Arten identisch sind. Hinterleib schwach seitlich zusammengedrückt; Segment 2 am Ende und 3–5 braunrot.

L. 7 mm.

Südeuropa bis Tirol.

6. **C. claviventris** Holmgr. 1858 *C. claviventris* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 49 ♀♂ | 1887 *C. claviventris* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1099 ♀♂.

Stimmt im Habitus mit *C. orbitalis*, der Metathorax zeigt jedoch an der Basis Spuren von Felderung, der Endabschnitt des Radius ist wenig länger als der Basalabschnitt und am Ende ziemlich gerade, die Areola ist unregelmässig und nimmt den rücklaufenden Nerv etwas hinter der Mitte auf, der Nervulus ist interstitial und der Nervellus in der Mitte schwach gebrochen. — Schwarz, bräunlichgrau pubescent. Mandibeln in der Mitte rötlich. Tegulä braun bis schwärzlich; Stigma braun. Beine rot, Hüften und Trochanteren schwarz, Tarsen gegen das Ende verdunkelt; auch die Spitze der hintersten Schienen meist etwas gebräunt. Segment 1 und 2 am Ende, 3 und 4 ganz, 5 an der Basis rot, 2 zuweilen fast ganz rot.

L. 5 mm.

Nord- und Mitteleuropa; ziemlich häufig.

7. **C. punctiventris** Woldst. 1876 *C. punctiventris* Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Petersburg XXII p. 392 ♀ | 1887 *C. subglabra* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1101 ♀.

Kopf nach hinten stark verschmälert; Stirn mit feinem Längskiel; Fühler etwas kürzer als der Körper. Thorax dicht punktiert; Metathorax mit Längseindruck. Areola im Vorderflügel gestielt, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend; Nervellus weit unterhalb der Mitte schwach gebrochen. Hinterleib am Ende etwas seitlich zusammengedrückt, auf der Oberseite mit einzelnen grösseren Punkten; das 1. Segment länger als die hintersten Hüften und Trochanteren, glänzend; das 2. etwas länger als breit; das 3. und 4. quer. — Schwarz. Tegulä dunkelbraun; Stigma hell. Beine schwarz, die vordersten Schenkel, Schienen und Tarsen rot, Mittelschenkel nur an der Spitze rot; Mitte der hintersten Schienen rötlich. Segment 2 am Ende, 3 und 4 ganz rot.

L. 6—8 mm.

Mittel- und Südeuropa.

Ich habe *C. subglabra* Thoms. mit dieser Art zusammengezogen, da ich nur in den Angaben über die Beinfärbung einen Unterschied finde. Bei *C. subglabra* sind die vordersten Schenkel nur an der Spitze hell gefärbt und zwar wird die Färbung als rötlichgelb bezeichnet. Nach Thomson soll der Endabschnitt des Radius nicht länger als der Basalabschnitt und am Ende gerade sein. Woldstedt macht darüber keine Angabe.

8. **C. varians** Tschek. 1871 *C. varians* Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI p. 55 ♀♂ | 1887 *C. alpina* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1100 ♀♂.

Aehnlich der *C. claviventris* Holmgr., aber leicht durch die Färbung der Beine zu unterscheiden. In der Flügel-nervatur stimmt sie mit derselben überein. Von gestreckter Gestalt. Fühler länger als der halbe Körper, das 1. Geissel-glied länger als das zweite. Thorax nicht länger als hoch; Mesonotum ziemlich grob und dicht runzlig; Schildchen grob punktiert; Metathorax nach hinten sanft abschüssig, grob punktiert, an der Basis mit den Anfängen von zwei mittleren Längsleisten. Areola gestielt, den rücklaufenden Nerv etwas hinter der Mitte annehmend; Nervellus undeutlich gebrochen. An den Hinterbeinen sind die letzten Tarsenglieder gleich lang. Hinterleib sparsam behaart, das 1. Segment bedeutend länger als die hintersten Hüften mit den Trochanteren, das 2. entschieden länger als breit, das 3. und 4. etwas breiter als lang. — Schwarz. Tegulä schwärzlich, Stigma dunkelbraun. Schenkel und Schienen rot, Vorderschenkel zuweilen an der Basis oben, die hintersten am Ende und meist auch an der Basis, die hintersten Schienen an Basis und Spitze schwarz. Segment 2—4, zuweilen auch Segment 1 am Ende rot, 2 und 3 an der Basis, 4 am Endrande rot.

Thomson nennt die Hinterleibsmittle einfach rot, die Acetabula gibt er als zweilappig an. Ich glaube nicht, dass seine *C. alpina* von der vorliegenden Art verschieden ist.

L. 5—6 mm.

Mittleres Europa; auch hier in Thüringen von mir gefunden.

9. **C. monticola** Thoms. 1887 *C. monticola* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1100 ♀.

Verwandt mit *C. claviventris* Holmgr., aber kleiner und schlanker. Metathorax an der Basis mit feinen Leisten. Areola im Vorderflügel unregelmässig, den rücklaufenden Nerv deutlich vor der Mitte aufnehmend; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle ziemlich spitz; Nervellus gebrochen. — Schwarz. Tegulä weisslich. Die vorderen Hüften und Trochanteren ganz, die hintersten am Ende, ebenso der Fühlerschaft hell; Schenkel rötlich, die hintersten dick, am Ende schwarz; Schienen gelblich, die hintersten an Basis und Spitze breit schwärzlich. Hinterleibsmittle mit roten Gürteln.

Länge kaum 5 mm.

Die Art wurde in den Pyrenäen gefunden.

10. **C. affinis** Tschek. 1871 *C. affinis* Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI p. 56 ♀♂.

Kopf hinter den Augen wenig verschmälert; Fühler beim ♀ kaum länger, beim ♂ wenig länger als der halbe Körper, die beiden ersten Geisselglieder von gleicher Länge. Thorax länger als hoch, Mesonotum und Schildchen dicht lederig-punktiert; Metathorax dicht runzlig-punktiert, der Längseindruck sehr seicht. Radius am Ende kaum gebogen, Areola sitzend, den rücklaufenden Nerv vor der Mitte aufnehmend; Nervellus unter der Mitte schwach gebrochen. Das 1. Hinterleibssegment länger als die hintersten Hüften mit den Trochanteren; Postpetiolus beim ♀ so lang als breit, beim ♂ etwas länger, seine Seiten gerundet; das 2. Segment länger als breit, gegen das Ende ziemlich stark erweitert, fein lederig; das 3. Segment fast quadratisch. — Schwarz. Tegulä gelblichweiss; Stigma braun. Hüften und Trochanteren schwarz; die vorderen Schenkel und Schienen rot, Mittelschenkel an der Basis meist schwarz; die hintersten Schenkel rot, schwarz gefleckt, die Schienen rötlichgelb, an Basis und Spitze schwarz. Hinterleibsmittle, zuweilen vom Endrand des 1. Segmentes an mit roten Gürteln.

L. 6 mm.

Nieder-Oesterreich.

11. **C. morionella** Holmgr. 1858 *C. morionella* Holmgren. Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 48 ♀♂ | 1880 *C. morionella* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 147 ♀♂ | 1887 *C. morionella* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1099 ♀♂.

In der Statur eng mit *C. orbitalis* Grav. verwandt; ausser der anderen Zeichnung verschieden durch das längere 1. Hinterleibssegment und durch das Vorhandensein einer Felderung an der Basis des Metathorax; auch ist der Nervellus mehr oder weniger deutlich gebrochen und fast antefurcal. Fühler kurz und dick, die vorletzten Glieder quer. Postpetiolus an den Seiten gerundet. Das 2. Hinterleibssegment wenig länger als breit, das 3. quer. — Schwarz. Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich. Unterseite des Schaftes meist hell. Tegulä gelblichweiss; Flügel deutlich rauchig getrübt, Stigma bräunlich. Vorderbeine rot, Hüften schwarz, Tarsen gegen das Ende gebräunt; die hintersten Beine rot, Hüften und Trochanteren schwarz, Kniee zuweilen verdunkelt; die hintersten Schienen unterhalb der Basis und am Ende, sowie die Tarsen dunkelbraun.

Var. ♀. Die hintersten Schenkel braun, in der Mitte rötlich.

L. 5 mm.

Zerstreut in Nord- und Mitteleuropa. -- Als Wirte werden angegeben *Eupithecia absynthiaria*, *Acidalia trilineata*, *Cidaria sinuaria* (Brischke) und *Eupithecia expallidata* (Bridgman).

12. **C. senicula** Grav. 1829 *Campoplex seniculus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 473 ♂ | 1872 *Limneria seniculus* Marshall, Catal. Brit. Hymen. p. 58 ♀ | 1880 *Casinarina senicula* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 147 ♀.

Eine sehr zweifelhafte Art. Brischke gibt die folgende Beschreibung: Kopf kurz, hinter den Augen verengt. Thorax kaum länger als hoch; Metathorax kurz, mit einer Querleiste, die zweite umgrenzt die breite, flache, gerunzelte Area posteromedia. Radialnerv am Ende gerade, Nervellus nicht gebrochen. Segment 2 länger als breit, 3 quadratisch, Bohrer kaum vorragend.

Gravenhorst hat nur das ♂ gekannt. Ich trage grosse Bedenken, dem Beispiele Brischkes zu folgen und das Tier für eine *Casinarina* zu halten. Einesteils fehlt die Areola im Vorderflügel fast ganz (areola subnulla), andernteils ist der Postpetiolus quadratisch und 3 mal so breit als der Petiolus, mit 3 Grübchen versehen. Das lässt kaum auf eine *Casinarina* schliessen, viel eher auf eine *Angitia*. Sonst gibt Gravenhorst die folgende Beschreibung: Gesicht weisslichgrau behaart, Palpen und Mitte der Mandibeln gelb; Fühler länger als der halbe Körper. Thorax bucklig, graulich behaart. Flügel schwach getrübt; Tegulä weisslich, Stigma braun. Hüften schwarz, die vordersten unten gelb; Trochanteren gelb, die hintersten schwarz; Schenkel rot, die vorderen unten gelblich; Vorderschienen gelb, am Ende rötlich; die hintersten Schienen weisslichgelb, an der Basis und am Ende schwärzlich, Sporen weisslich; Vordertarsen gelblich, die hintersten schwärzlich. Hinterleib fein behaart, länger als der Kopf mit dem Thorax, etwas schmaler als der letztere.

Die Grösse wird von Gravenhorst auf ungefähr 10 mm angegeben; auch dies spricht gegen *Casinarina*.

Mitteleuropa. — Brischke zog sein Exemplar aus *Orygia gonostigma*.

13. **C. stygia** Tschek. 1871 *C. stygia* Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI p. 54 ♀.

In Gestalt der *C. orbitalis* Grav. ähnlich. Kopf hinter den Augen nur wenig verschmälert; Stirn dicht lederig-punktiert, wie das *Mesonotum* glanzlos; Fühler etwas länger als der halbe Körper. Metathorax mit Längseindruck, an der

Basis mit Spuren von Seitenfeldern, die Area posteromedia seitlich gerandet. Endabschnitt des Radius leicht eingebogen; Areola kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv etwas hinter der Mitte aufnehmend; Nervellus nicht oder unter der Mitte undeutlich gebrochen. Das letzte Tarsenglied der Hinterbeine wenig länger als das vorletzte. Hinterleib mit kurzen weisslichen Haaren bekleidet; das 1. Segment länger als die hintersten Hüften mit den Trochanteren; Postpetiolus so lang als breit, stark convex, die Seiten gerundet; das 2. Segment deutlich länger als breit; das 3. ziemlich quadratisch. — Schwarz, weisslich pubescent. Tegulä gelblichweiss; Stigma braun. Die vordersten Schenkel rötlich, an der Basis schwarz; Mittelschenkel nur am Ende rötlich; die vorderen Schienen rötlichgelb, die mittleren zum Teil verdunkelt; die hintersten Schienen schwarz, an der Basis und in der Mitte rötlich.

L. 5 mm.

Oesterreich; sehr selten.

14. **C. pallipes** Brischke. 1880 *C. pallipes* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 148 ♀♂.

Der *C. morionella* Holmg. sehr ähnlich. Kurz silberhaarig, auch die Beine. Metathorax in der Mitte etwas vertieft, querrunzlig, seitlich mit Leisten. Areola in der Regel ziemlich klein und langgestielt, selten grösser und kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv in der Mitte aufnehmend; Nervellus nicht gebrochen. — Schwarz, Palpen, Mandibeln, Unterseite des Schaftes, Flügelwurzel und Tegulä weissgelb. Flügel getrübt, Stigma schwarz. Hüften schwarz, Vorderhüften unten rotgelb, vordere Trochanteren weissgelb, die hinteren schwarzbraun; Vorderschenkel rotgelb, Hinterschenkel schwarzbraun, nur die Basis zuweilen hell; Schienen und Tarsen gelblichweiss, die Hinterschienen an der Spitze und unterhalb der Basis hell braunrot; Hintertarsen mit rötlichen Spitzen der Glieder.

L. 5 mm.

Deutschland. — Wurde aus einer *Nemoria*-Raupe gezogen. Cocon elliptisch, runzlig, weiss, mit breitem, unregelmässigem, schwarzem Gürtel vor den Enden.

15. **C. albipalpis** Grav. 1839 *Campoplex albipalpis* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 495 ♀♂ | 1871 *Casinaria albipalpis* Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI p. 55 ♀♂ | 1872 *Limneria albipalpis* Marshall, Catal. Brit. Hymen. p. 55 ♀ | 1887 *Casinaria albipalpis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1102 ♀.

Kopf nach hinten deutlich verschmälert, beim ♂ klein und schmaler als der Thorax; letzterer länger als hoch,

der Metathorax mit deutlichem Längseindruck. Endabschnitt des Radius gerade, kaum länger als der Basalabschnitt; Areola ziemlich gross, kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv in der Mitte aufnehmend; Nervellus nicht gebrochen. Das 2. Hinterleibssegment fast doppelt so lang als breit, das 3. beim ♀ wenig, beim ♂ deutlich länger als breit. Bohrer kurz vorstehend. — Schwarz, Palpen und Tegulä gelblichweiss; Stigma bräunlich. Vorder- und Mittelschenkel rötlich, die mittleren meist an der Basis schwarz, namentlich beim ♂; Vorderschienen rötlichgelb, an der Basis und Spitze meist verdunkelt; die hintersten Schenkel dick, ausgedehnt schwarz gezeichnet, beim ♂ meist ganz schwarz; die hintersten Schienen schwarzbraun, an der Basis und in der Mitte weisslich; die hintersten Tarsen braun, der Metatarsus an der Basis weisslich.

L. 5—7 mm.

Mittleres Europa; selten. Von mir hier bei Blankenburg an trockenen Bergabhängen gefangen.

16. **C. tenuiventris** Grav. 1829 *Campoplex tenuiventris* Gravenhorst, *Ichneum. Eur.* III p. 482 ♀♂ | 1844 *Campoplex canonicus* Ratzeburg, *Ichneum. d. Forstins.* I p. 95 ♂ | 1858 *Casinaria latifrons* Holmgren, *Svensk. Vet.-Akad. Handl.* II p. 50 ♀♂ | 1871 *Casinaria tenuiventris* Tschek, *Verh. zool. bot. Ges. Wien* XXI p. 55 | 1887 *Casinaria tenuiventris* Thomson, *Opusc. Entom.* XI p. 1101 ♀♂.

Körper schlank, namentlich der Hinterleib sehr gestreckt. Fühler wenig länger als der halbe Körper. Radius gleichmässig gekrümmt, der Endabschnitt wenig länger als der Basalabschnitt; Areola mehr oder weniger regelmässig, gestielt; Nervellus schräg postfurcal. Beine schlank. Hinterleib fein behaart, länger und schmaler als Kopf und Thorax, beim ♂ fast um die Hälfte schmaler, gegen das Ende beim ♀ kaum etwas zusammengedrückt; das 1. Segment lang und dünn, das 2. Segment fast doppelt, das 3. nur wenig länger als breit. Bohrer kurz vorstehend und etwas nach oben gekrümmt. — Schwarz. Mandibeln kaum hell gezeichnet. Tegulä gelblich bis schwarz variierend; Stigma bräunlich. Beine rot, Hüften und Trochanteren schwarz, höchstens die vordersten Trochanteren an der Spitze rötlich. Die hintersten Schenkel am Ende meist verdunkelt; Schienen an der Aussenseite oft gelblich oder gelblichweiss; die hintersten Schienen an der Basis weisslich, dahinter und an der Spitze gewöhnlich verdunkelt, selten grösstenteils dunkel.

L. 5—7 mm.

Nord- und Mitteleuropa.



17. **C. ischnogaster** Thoms. 1887 *C. ischnogaster* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1101 ♀♂ ! 1829 *Campoplex tenuiventris* var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 484 | 1854 *Campoplex tenuiventris* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. p. 10 ♀ [non Gravenhorst] | 1858 *Casinaria tenuiventris* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. p. 49 ♂.

Der vorhergehenden Art ausserordentlich ähnlich, namentlich durch die Färbung der Beine und den am Ende kaum erweiterten Hinterleib, hauptsächlich verschieden durch folgende Merkmale: Brustseiten fein lederartig; Endabschnitt des Radius deutlich länger als der Basalabschnitt; Nervellus vertikal, nicht gebrochen; Trochanteren und der hinterste Trochantellus rötlichgelb. — Schwarz. Palpen und Mandibeln in der Mitte gelblich. Tegulä gelblichweiss; Stigma braun. Areola ziemlich regelmässig, gestielt. Vorderbeine rötlich, Trochanteren heller, Hüften schwarz; an den hintersten Beinen Hüften und Trochanteren schwarz, Schenkel rot, Schienen schwärzlich, in der Mitte gelblichweiss, an der äussersten Basis rötlich; Sporen weiss; Tarsen schwärzlich, Basis des Metatarsus weisslich.

L. 5—6 mm.

Verbreitet in Nord- und Mitteleuropa und eine der häufigeren Arten.

18. **C. protensa** Grav. 1887 *C. protensa* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1102 ♀♂.

Der vorigen Art eng verwandt, aber Hinterleib länger und hinten etwas verbreitert, Mesopleuren dicht punktiert. Areola regelmässig, Nervulus interstitial, Nervellus vertikal. — Schwarz; Tegulä weisslich, Schenkel und Schienen rot, die hintersten Schienen gelblich, an Basis und Spitze dunkel gezeichnet.

L. 5 mm.

Norddeutschland; selten.

## 10. Gen. **Trophocampa** Schmiedekn.

1907 *Trophocampa* Schmiedeknecht, Die Hymenopt. Mitteleur. p. 598.

Kopf quer, nach hinten verschmälert; Fühler im Durchschnitt länger und schlanker als bei *Casinaria*; Augen innen deutlich ausgerandet; Gesicht nach unten kaum verschmälert. Metathorax der Länge nach mehr oder weniger eingedrückt, an der Basis mit Spuren von Felderung, Area superomedia fehlend oder nur ganz schwach angedeutet; Luftlöcher des Metathorax rund oder kurz oval. Areola im Vorderflügel vorhanden, ziemlich regelmässig. Hinterleib wenigstens gegen das Ende deutlich von der Seite zusammengedrückt; Bohrer

kurz vorstehend. — Diese Gattung schliesst sich an *Casinaria* an, im Habitus sind die Tiere jedoch ganz verschieden und ähneln weit mehr der Gattung *Campoplex*; von dieser sind sie verschieden durch die rundlichen Luftlöcher und die bis zur Spitze des 3. Segmentes reichenden Epipleuren.

#### Uebersicht der Arten.

1. Mund, Clypeus, Spitze der Wangen und Stirnseiten gelblich. Der längere Sporn der hintersten Schienen beinahe so lang wie der Metatarsus.

##### cf. *Echthronomas ochrostoma* Holmgr.

Stirnseiten nicht gelblich gezeichnet. Der längere Sporn der hintersten Schienen nicht von solcher Länge. 2.

2. Schenkel und Schienen rot, die hintersten Schenkel an der Spitze, die hintersten Schienen an Basis und Spitze verdunkelt. Hinterleibsmittle mehr oder weniger ausgedehnt rot. 6—8 mm.

##### 1. *mesozosta* Grav.

Hinterschenkel schwarz. 3.

3. Luftlöcher des Metathorax rund. Endsegmente an den Seiten meist braunrot. Die vordersten Schenkel fast ganz, Mittelschenkel an der Spitze rötlichgelb; Vorderschienen gelblich, Mittelschienen an Basis und Spitze gebräunt, Hinterschienen schwarz, in der Mitte rötlich. 6—7 mm.

##### 2. *dubia* Tschek.

Luftlöcher des Metathorax deutlich, wenn auch kurz, oval. Hinterleib mit anderer Zeichnung. 4.

4. Hinterleib ganz schwarz, Vorderbeine rötlichgelb, an der Basis schwarz. Hinterbeine schwarz, Schienen in der Mitte breit weisslich. 6—7 mm.

##### 3. *vidua* Grav.

Hinterleibsmittle rot. Mitte der Schienen nicht breit weisslich. 5.

5. Segment 1 und 2 an der Spitze, 3 und 4 rot, 3 an der Basis mit schwarzem Fleck. Tegulä weissgelb. Die vordersten Schenkel rotgelb, Mittelschenkel nur an der Spitze; die hintersten Schienen rötlichgelb, an der Spitze breit und ein Ring nahe der Basis braun. Schildchen flach. 11 mm.

##### 4. *scutellaris* Tschek.

Segment 3 und 4 grösstenteils rot. Tegulä schwarzbraun. Hinterbeine schwarz, Schienen verschwommen rötlich, an der Basis weiss. 9—11 mm.

##### 5. *nigripes* Grav.

1. **T. mesozosta** Grav. 1829 *Campoplex mesozostus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 532 ♂ | 1854 *Campoplex fallax* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. p. 10 ♂ | 1858 *Casinaria mesozosta* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. p. 50 ♂ | 1887 *Casinaria ischnogaster* var. *mesozosta* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1102.

Kopf nach hinten stark verschmälert; Gesicht breit; Fühler etwas länger als der halbe Körper. Thorax runzlig-punktiert, matt; Brustseiten ohne Speculum; Metathorax deutlich der Länge nach eingedrückt, an der Basis beiderseits mit Spuren einer Querleiste. Endabschnitt des Radius deutlich länger als der Basalabschnitt; Areola ziemlich gross, kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv etwas hinter der Mitte aufnehmend; Nervulus etwas hinter der Gabel; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle sehr spitz; Nervellus schräg, gekrümmt, nicht oder undeutlich gebrochen. Hinterleib gegen das Ende deutlich von der Seite zusammengedrückt, auch beim ♂; das 1. Segment schlank, deutlich länger als die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus doppelt so breit als der Petiolus; das 2. Segment doppelt so lang, das 3. beim ♀ wenig, beim ♂ deutlich länger als breit. — Schwarz, weisslich pubescent. Unterseite des Schaftes rötlichgelb. Palpen und Mandibeln gelblich. Tegulä gelblichweiss. Flügel hyalin, Stigma rostrot. Beine rötlich, Hüften schwarz, die vorderen Trochanteren und Basis der Vorderschienen gelblich; Spitze der hintersten Schenkel, ein Ring unterhalb der Basis der Hinterschienen und Spitze derselben schwärzlich, die Basis der Schienen weisslich. Segment 1—3 am Endrande, 4 fast ganz rot.

Var. ♀. Schaft auf der Unterseite schwarz.

L. 6—8 mm.

Wie es scheint, über den grössten Teil von Europa verbreitet, aber überall selten.

2. **T. dubia** Tschek. 1871 *Casinaria dubia* Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI p. 57 ♀♂.

Kopf nach hinten stark verschmälert; Fühler länger als der halbe Körper, gegen die Spitze dünner, die beiden ersten Geisselglieder beinahe gleich lang. Thorax länger als hoch, glanzlos, lederig-punktiert; Schildchen ziemlich convex; Metathorax schräg abfallend, der Länge nach vertieft, ungefeldert, besonders an den Seiten mit anliegenden, weisslichen Haaren bekleidet, dicht und ziemlich grob runzlig-punktiert; Luftlöcher rundlich. Radialzelle beinahe noch einmal so lang als breit; Radius am Ende nur wenig eingebogen; Areola gestielt, den rücklaufenden Nerv

zwischen Mitte und Ende aufnehmend; Nervellus unterhalb der Mitte undeutlich gebrochen. Hinterleib vom Rücken gesehen linear, die Segmente vom 3. angefangen seitlich ziemlich stark zusammengedrückt; das 1. viel länger als die hintersten Hüften und Trochanteren, Postpetiolus stark convex, länger als breit, mit gerundeten Seiten; das 2. Segment über doppelt so lang als breit, fein lederig, mit rötlich durchschimmernden Thyridien, gegen die Spitze allmählich erweitert; das 3. etwas länger als breit; Bohrer kaum vorstehend. — Schwarz, weisslich behaart. Palpen und Mitte der Mandibeln rötlichgelb. Tegulä mit hellem Rande oder ganz gelblichweiss; Stigma braun. Beine schwarz, die vordersten Schenkel rötlich, mit schwarzer Makel an der Basis; Mittelschenkel am Ende rötlichgelb; Vorderschienen rötlichgelb, die Mittelschienen hinter der Basis und am Ende verdunkelt; die hintersten Schienen schwärzlich, in der Mitte rötlich, nahe der Basis aussen weisslich gefleckt. Endsegmente an den Seiten braunrot, bei einem Exemplar der Hinterleib ganz schwarz.

Tschek ist nicht ganz sicher, ob das ♂ zu dem beschriebenen ♀ gehört. Die Radialzelle ist im Verhältnis zur Länge viel breiter, die Areola ist kleiner und nimmt den rücklaufenden Nerv dicht hinter der Mitte auf. Die rote Färbung des Hinterleibs ist ausgedehnter, indem Segment 2 und 3 am Ende, 3—5 an den Seiten rot sind; die hintersten Schienen sind ganz schwarz, nur nahe der Basis weiss gefleckt.

L. 7—9 mm.

Niederösterreich.

3. **T. vidua** Grav. 1829 *Campoplex viduus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 497 ♂ | 1858 *Casinaria vidua* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 51 ♀ | 1872 *Campoplex viduus* Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I p. 84 ♀ | 1887 *Campoplex viduus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 66 ♂.

Kopf quer und kurz, nach hinten deutlich verschmälert, weisslichgrau behaart; Augen innen deutlich ausgerandet; Fühler fadenförmig, gegen das Ende wenig verdünnt, länger als der halbe Körper. Thorax länger als hoch, weisslichgrau pubescent; Metathorax fein gerunzelt, der Länge nach deutlich eingedrückt, an der Basis mit Spuren von Felderung. Areola gestielt, den rücklaufenden Nerv etwas hinter der Mitte aufnehmend; Nervellus unterhalb der Mitte schwach gebrochen. Hinterleib stark von der Seite zusammengedrückt, das 1. Segment schmal, ziemlich gerade, etwas länger als die hintersten Hüften und Tro-

chanteren, Postpetiolus lang und schmal, leicht convex; das 2. Segment länger als breit; Segment 3 und 4 an Länge fast gleich; Bohrer gerade, etwas vorstehend. — Schwarz. Mandibeln und Palpen gelblich. Flügel leicht getrübt; Tegulä weisslichgelb, Stigma braun. Vorderbeine rötlichgelb, Hüften und Basis der hinteren Trochanteren schwarz; die hintersten Beine schwarz, die Schienen in der Mitte breit und die Sporen weisslich.

L. 7—8 mm.

Nord- und Mitteleuropa, ziemlich häufig. Man findet die Art an schattigen Stellen im Walde. — Als Wirt wird von Bignell *Abraxas grossulariata* angegeben.

4. **T. scutellaris** Tschek. 1871 *Casinaria scutellaris* Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI p. 58 ♀.

Die Art gleicht durch die Färbung des Hinterleibes sehr der *T. mesozosta* Grav., weicht aber sogleich durch die schwarzen Hinterschenkel davon ab. — Schildchen flach; Hinterschildchen grösser als gewöhnlich; fast viereckig, ebenfalls ganz flach, nur mit etwas erhöhtem, schmalem Rande und mit zwei ziemlich grossen Gruben in den Basalecken. Metathorax der Länge nach eingedrückt, seine Luftlöcher ziemlich gross, oval. Radialzelle gestreckt, Basal- und Endabschnitt des Radius leicht gekrümmt; Areola ziemlich gross, kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv in der Mitte aufnehmend; Nervellus nicht gebrochen. Hinterleib seitlich nicht stark zusammengedrückt; das 1. Segment viel länger als die hintersten Hüften mit den Trochanteren; der lange Petiolus bis zu den Luftlöchern allmählich erweitert; Postpetiolus bis zur Spitze wieder verschmälert, nicht länger als breit. Das 2. Segment knapp um die Hälfte länger als hinten breit, am Grunde sehr schmal, am Ende fast 3 mal so breit als an der Basis. Bohrer kaum vorstehend. — Schwarz, weisslich behaart. Palpen und Tegulä gelblich; Stigma braun. Beine schwarz, die vordersten Schenkel, Mittelschenkel an der Spitze und die vorderen Schienen und Tarsen rötlich; die hintersten Schienen gelblich, ein Ring nahe der Basis und die Spitze breit schwärzlich. Segment 1 und 2 am Ende, 3 und 4 und Basis von 5 rot, 3 an der Basis mit schwarzem Fleck.

L. 10—11 mm. — ♂ unbekannt.

Niederösterreich.

5. **T. nigripes** Grav. 1829 *Campoplex nigripes* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 598 ♂ | 1880 *Campoplex nigripes* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig, N. F. IV p. 140 ♀♂ | 1887 *Casinaria nigripes* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1102 ♀♂.

Kopf und Thorax fein lederig-punktiert, matt, graulich-weiss pubescent; Kopf kurz, etwas schmaler als der Thorax, nach hinten stark verengt; Stirn flach; Augen innen deutlich ausgerandet; Fühler etwas länger als der halbe Körper. Thorax etwas länger als hoch; Schildchen ziemlich flach, an den Seiten bis nahe an das Ende gerandet; Speculum nur schwach glänzend; Metathorax fein runzlig, der Länge nach deutlich eingedrückt, die Luftlöcher ziemlich gross, oval. Radialzelle etwas über doppelt so lang als hoch, die beiden Abschnitte des Radius keinen scharfen Winkel bildend, der Endabschnitt gerade; Areola ziemlich gross, regelmässig, gestielt, den rücklaufenden Nerv in der Mitte aufnehmend; Nervulus deutlich hinter der Gabel; Nervellus schräg, kaum gebrochen. Hinterleib weit länger als Kopf und Thorax zusammen, gegen das Ende seitlich zusammengedrückt; das 1. Segment länger als die hintersten Hüften und Trochanteren, Postpetiolus gestreckt, mit gerundeten Seiten; das 2. Segment über doppelt so lang als breit, hinten doppelt so breit als an der Basis; das 3. Segment wenig länger als breit; das 4. quadratisch; Bohrer kurz vorstehend. — Schwarz. Palpen am Ende rötlich. Tegulä schwärzlich, Stigma dunkelbraun. Die vordersten Schenkel und Schienen, an den Mittelbeinen die Schenkelspitzen, Schienen und Tarsen rötlich, die Schienen am Ende gebräunt; die hintersten Beine schwarz, Schienen verschwommen rötlich, Basis dieser und der Metatarsen weisslich; Schiensporen braun. Segment 3 und 4 ganz oder grösstenteils braunrot.

L. 9—11 mm.

Mitteleuropa; selten. Mehrfach von mir hier bei Blankenburg im Spätsommer gefangen.

## 11. Gen. **Eripternus** Först.

1868 *Eripternus* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 152.

Ich habe diese Gattung mit aufgenommen, da ich in Förster's nachgelassenen Schriften die folgende ausführliche Diagnose derselben fand:

Clypeus vom Gesicht getrennt, mit tiefen Seitengrübchen; das 1. und 2. Geisselglied von gleicher Länge; Mittelbrustseiten mit glänzendem Speculum; Metanotum ohne geschlossene

Area superomedia, die beiden Seitenfelder nicht scharf von einander getrennt (Costula also nicht deutlich). Vorderflügel ohne Areola, Radius scharf, fast rechtwinklig gebrochen; Nervus parallelus aus der Mitte der Brachialzelle entspringend; Nervulus interstitial; Nervellus tief unter der Mitte gebrochen. Der hinterste Metatarsus merklich verkürzt, nicht mehr als ein Drittel der Länge der Hinterschienen betragend und deutlich dicker als die folgenden Glieder. Postpetiolus ziemlich flach, so lang wie an der Spitze breit, fast genau quadratisch, die Seitenleisten desselben schwach und nur an der Spitze ziemlich deutlich; Thyridien sehr klein, kaum bemerkbar. Bohrer nicht über die Spitze des Hinterleibs hervorragend.

## 12. Gen. **Nepiesta** Först.

1868 Nepiesta Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 152.

Kopf und Thorax fein lederig-punktiert, fast glanzlos; Scheitel ziemlich breit, nach hinten kaum verschmälert; Fühler etwas länger als der halbe Körper; Augen innen kaum ausgerandet; Gesicht deutlich breiter als hoch; Wangen lang; Clypeus mit tiefen Seitengruben, nicht vom Gesichte getrennt; Mandibeln kräftig. Thorax länger als hoch; Schildchen convex; Metathorax runzlig-punktiert, mit undeutlicher Felderung, Area superomedia gestreckt, nicht vollständig geschlossen; Costula fehlend; Brustseiten mit glänzendem Speculum. Radialzelle ziemlich kurz, die beiden Abschnitte des Radius keinen scharfen Winkel bildend; Areola nicht vorhanden; der Cubitalquernerv deutlich länger als der Abstand zwischen ihm und dem hinteren rücklaufenden Nerv; Nervulus interstitial; Nervellus schräg nach innen gestellt, tief unter der Mitte gebrochen. Beine ziemlich schlank, die hintersten Schenkel etwas verdickt; Sporen der Hinterschienen etwa so lang wie der halbe Metatarsus. Hinterleib gestreckt, nach hinten leicht zusammengedrückt und keulenförmig, wie bei Casinaria; das 1. Segment gebogen, so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus etwas länger als breit; das 2. Segment fein lederig-punktiert, etwas länger als breit, das 3. quadratisch. Bohrer kaum vorstehend.

### Uebersicht der Arten.

1. Segment 2 und 3, zuweilen auch 4 mit breitem dunkelroten Endrand. Kopf und Mesonotum fein und dicht lederig-punktiert, ohne allen Glanz. Stigma dunkel, an Basis und Spitze heller. 5 mm.

### 3. **subclavata** Thoms.

Hinterleib schwarz, höchstens die mittleren Segmente mit hellen Einschnitten. Kopf und Thorax zerstreuter punktiert und deshalb nicht vollständig matt. 2.

2. Stigma gelb. Tegulä meist weisslichgelb. Kopf und Thorax nur mit schwachem Glanz. Kleinere Art von 5—6 mm.

1. **aberrans** Grav.

Stigma und Tegulä schwärzlich. Kopf und Mesonotum, namentlich letzteres, ziemlich glänzend. Grössere Art von 8—9 mm.

2. **robusta** n. sp.

1. **N. aberrans** Grav. 1829 *Campoplex aberrans* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 496 ♂ | 1858 *Limneria mandibularis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 97 ♀ ♂ | 1887 *Nepiesta aberrans* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1116 ♀ ♂ | 1880 *Canidia umbrata* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 176 ♂.

Diese Art ist die häufigste und lässt sich sogleich durch das hellgelbe Stigma, den schwarzen Hinterleib und den schwachen Glanz von Kopf und Thorax erkennen. — Schwarz. Mandibeln und Palpen zum Teil rötlich. Tegulä gelblichweiss, zuweilen braun. Die vordersten Schenkel und Schienen, die Spitzen der Mittelschenkel und die Mittelschienen rötlichgelb; die hintersten Beine schwarz, Spitze der Trochanteren und der Schenkel, die Schienen und Basis der Metatarsen rötlich; Basis der Hinterschienen, ein breiter Ring dahinter und die Spitzen verschwommen bräunlich. Die Einschnitte von Segment 2 und 3 zuweilen schmal rötlich.

L. 5—6 mm.

Nord- und Mitteleuropa. Hier in Thüringen durchaus nicht selten, namentlich im Frühjahr auf trockenen Grasplätzen.

2. **N. robusta** n. sp.

Kopf und Thorax ziemlich grob punktiert und ziemlich stark glänzend, namentlich das Mesonotum; auch die Brustseiten glänzend, mit grossem, poliertem Speculum; Metathorax ziemlich grob runzlig - punktiert, vorn mit Spuren von Felderung, Area superomedia nur vorn deutlich. Stigma im Vorderflügel breit; Radius am Ende kaum gekrümmt, Endabschnitt um die Hälfte länger als der Basalabschnitt. Beine kräftig, Schenkel ziemlich verdickt. Hinterleib fein lederartig punktiert, matt, gegen das Ende glatter und glänzender; Postpetiolus doppelt so breit als Petiolus, so lang als breit; 2. Segment fast doppelt so lang als hinten breit, gegen die Basis wenig verschmälert; 3. Segment wenig länger als breit; 4. quadratisch. — Schwarz, dünn graulich pubescent. Mandibeln in der Mitte rötlich. Tegulä schwärzlich, Flügelwurzel weisslich; Stigma und



Flügel nervatur schwärzlich. Beine wie bei der vorigen Art gefärbt, doch sind auch die vordersten Schenkel an der Basalhälfte schwarz. Hinterleib durchaus schwarz.

L. 8—9 mm.

Ich fand diese Art in mehreren Exemplaren hier bei Blankenburg in Thüringen.

3. **N. subclavata** Thoms. 1887 *N. subclavata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1116.

Thomson gibt die folgende kurze Beschreibung: Schwarz, Hinterleib ziemlich keulenförmig, mit 2 roten Gürteln; die vordersten Schenkel und die Schienen rötlich, die Schienen an der Spitze schwarz. Etwas kleiner als *N. aberrans*, die Skulptur feiner, das Gesicht kürzer, das Stigma breiter, der Endabschnitt des Radius gerade und kaum länger als der Basalabschnitt, die Area petiolaris angedeutet.

Ich habe in Thüringen ein Exemplar gefangen, welches ich wegen der Hinterleibsfärbung zu dieser Art ziehe und welches einige bessere Unterschiede von *N. aberrans* bietet, als die von Thomson angegeben. Das Stigma ist dunkelbraun, an Basis und Spitze weisslich, während es bei *N. aberrans* einfarbig gelblich ist, Kopf und Thorax sind feiner und dichter punktiert und zeigen fast gar keinen Glanz. Segment 2—4 haben breite rote Endbinden, die Binde auf dem 4. Segment ist weniger deutlich. Abweichend von Thomsons Angabe, ist der Endabschnitt des Radius um die Hälfte länger als der Basalabschnitt.

L. 5 mm.

Nord- und Mitteleuropa; sehr selten.

### 13. Gen. **Zaporus** Först.

1868 *Zaporus* Förster. Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 152.

Kopf mit breitem Scheitel, nach hinten nicht verengt, fast kubisch, ziemlich lang behaart; Gesicht quer; Wangen aufgetrieben; Fühler etwas länger als der halbe Körper, gegen die Spitze wenig verdünnt. Thorax robust, ziemlich dicht und anliegend behaart, namentlich an den Seiten; Metathorax deutlich gefeldert. Area posteromedia bis zur Mitte hinaufreichend. Radius wie bei der Gattung *Meloboris* ziemlich gleichmässig gekrümmt; Areola im Vorderflügel fehlend. Nervulus schräg, hinter der Gabel; Nervellus nicht gebrochen. Beine ziemlich lang; Klauen lang und gekrümmt, ohne Kammzähne. Hinterleib gegen das Ende wenig zusammengedrückt; Postpetiolus convex, nicht länger als breit; das 2. Segment kaum so lang

als breit; Bohrer etwas länger als das 1. Segment, leicht nach oben gekrümmt.

**Z. dorsalis** Grav. 1829 *Campoplex dorsalis* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 528 ♂ | 1858 *Limneria dorsalis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. p. 96 ♀ ♂ | 1887 *Meloboris dorsalis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1149 ♀ ♂ | 1907 *Zaporus dorsalis* Schmiedeknecht, Hymen. Mitteleurop. p. 599.

Schwarz; Mandibeln und Palpen rötlich; Unterseite des Schaftes rötlichgelb. Stigma braun, Tegulä gelblich. Beine rot, nur die Tarsen gegen das Ende verdunkelt. Ende von Segment 1, sowie der grösste Teil von Segment 2 und 3, zuweilen auch die Basis von 4 braunrot.

L. 7—8 mm.

Nord- und Mitteleuropa.

#### 14. Gen. **Gonotypus** Först.

1868 *Gonotypus*, Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 153.  
1887 *Gonotypa*, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1136.

Scheitel breit, nach hinten kaum verschmälert; Wangen ziemlich aufgetrieben; Clypeus mit kleinen Seitengrübchen; Mandibeln klein; das 3. Glied der Maxillarpalpen nicht länger als das vierte; Fühler lang und dünn, fadenförmig. Thorax gestreckt; Metathorax mit kurzer dreieckiger *Area superomedia*; *Costula* fehlend. Flügel ohne *Areola*; der untere Aussenwinkel der Discoidal- und Brachialzelle fast ein rechter; Discocubitalnerv ohne Nervenast. Nervellus schräg, unter der Mitte schwach gebrochen. Beine mit ziemlich kurzen Schiensporen. Hinterleib schlank; das 1. Segment kurz, Petiolus mit deutlichen Seitengrübchen, Postpetiolus quadratisch, wenig breiter als der Petiolus, Segment 2—7 von ziemlich gleicher Breite, gegen das Hinterleibsende an Glanz zunehmend; das 7. Segment eingeschnitten; Bohrer kurz, ziemlich dick und gekrümmt.

Die Gattung ähnelt im Habitus *Angitia* und unterscheidet sich hauptsächlich durch den gebrochenen Nervellus und den fast rechten unteren Aussenwinkel der Discoidal- und Brachialzelle.

**G. melanostoma** Thoms. 1887 *Gonotypa melanostoma* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1137.

Schwarz. Flügel mit breitem, bräunlichem Stigma; Tegulä weisslich, beim ♂ in der Regel verdunkelt. Beine trüb rot, Hüften, Trochanteren und Oberseite der Hinterschenkel schwarz; beim ♂ die Hinterschenkel gewöhnlich ganz schwarz.

L. 5—6 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten. — Ich habe die Art in mehreren Exemplaren hier bei Blankenburg ausschliesslich auf trockenen Holzschlägen und Waldblößen gefangen.

### 15. Gen. **Dioratica** Först.

1868 *Dioratica*, Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 153.

Diese Gattung schliesst sich eng an die vorhergehende an. Wie bei dieser fehlt im Vorderflügel die Areola und im Hinterflügel ist der Nervellus gebrochen. Während aber letzterer bei *Gonotypus* unterhalb der Mitte gebrochen ist, ist er bei vorliegender Gattung in der Mitte gebrochen. Als weitere Unterschiede führt Förster an, dass der Discocubitalnerv mit einem kurzen Nervenast versehen und dass das 3. Glied der Maxillarpalpen länger als das 4. ist. Eine Art ist bis jetzt nicht beschrieben.

### 16. Gen. **Phaedroctonus** Först.

1868 *Phaedroctonus* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 153.

Körper von schlanker Gestalt. Kopf quer, von vorn gesehen rundlich, deutlich breiter als der Thorax; Augen innen nicht ausgerandet; Fühler lang und dünn; Clypeus am Ende leicht abgerundet, mit kleinen Seitengrübchen. Thorax cylindrisch; Metathorax allmählich abfallend, hinten über die Basis der Hüften hinausverlängert; Area superomedia gestielt, pentagonal; Costula mehr oder wenig deutlich. Vorderflügel ohne Areola; Radialzelle sehr breit; der Winkel, welchen die beiden Abschnitte des Radius bilden, fast ein rechter; der untere Aussenkinkel der Discoidalzelle ein spitzer; Nervellus nicht oder ganz undeutlich gebrochen. Vorderbeine schlank; die hintersten Beine weit länger und kräftiger; Schiensporen ziemlich kurz, von ungleicher Länge; Klauenglied und Klauen klein. Hinterleib schmal, nach hinten deutlich zusammengedrückt; das 2. Segment langgestreckt, weit länger als das folgende; Bohrer mindestens so lang wie der halbe Hinterleib.

#### Uebersicht der Arten.

1. Segment 3—7 mit roten Seiten und schmalen roten Hinterändern. Bohrer von halber Hinterleibslänge. 5 mm.
3. **ensifer** Brischke.

Hinterleib schwarz, höchstens die hintersten Einschnitte schmal rötlich. 2.

2. Postpetiolus glatt und glänzend, weit kürzer als der Petiolus. Die hintersten Beine schwarzbraun. Bohrer von halber Hinterleibslänge.

#### 1. *transfugus* Grav.

Postpetiolus fein runzlig, matt, wenig kürzer als der Petiolus. Die hintersten Beine rötlich und schwarz. Bohrer fast von Hinterleibslänge.

#### 2. *cremastoides* Holmgr.

1. **Ph. *transfugus*** Grav. 1829 *Campoplex transfuga* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 521 ♀♂ | 1858 *Limneria transfuga* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 97 ♀♂ | 1887 *Nemeritis transfuga*, Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1118 ♀♂.

Das 1. Segment deutlich länger als die hintersten Hüften und Trochanteren, Petiolus lang und dünn, fast doppelt so lang als der Postpetiolus, letzterer convex und glatt. Bohrer von halber Hinterleibslänge. — Schwarz, schwach glänzend, fein weisslich pubescent. Fühlerschaft unten, Tegulä und Bauchfalte gelblich. Stigma im Vorderflügel bräunlich, Vorderbeine rötlich, Trochanteren gelblich; die hintersten Hüften und Trochanteren schwarz, letztere am Ende gelblich; die hintersten Schenkel ganz oder grösstenteils braun, die Schienen rötlichgelb, an Basis und Spitze, wie die Tarsen braun.

L. 4—5 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten. — Als Wirt wird *Dioryctria abietella* von Brischke angegeben.

2. **Ph. *cremastoides*** Holmgr. 1858 *Nemeritis cremastoides* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 105 ♀ | 1887 *Nemeritis cremastoides* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1118 ♀♂.

Erinnert im Habitus an manche *Cremastus*-Arten. — Hinterleib gegen das Ende deutlich zusammengedrückt. Postpetiolus fein runzlig, matt, wenig kürzer als der Petiolus. Bohrer fast von Hinterleibslänge. — Schwarz, fast matt. Palpen, Mandibeln, Tegulä und Bauchfalte blassgelb; Fühler schwärzlich, unten heller, die beiden Basalglieder auf der Unterseite meist gelblich gefleckt. Flügel leicht getrübt. Stigma bräunlichgelb. Vorderbeine rötlich, Hüften und Trochanteren gelb; die hintersten Hüften und Basis der Trochanteren schwärzlich, die Schenkel rot, die Schienen rötlichgelb, an Basis und Spitze sowie die Tarsen bräunlich. Hinterleibseinschnitte 5—7 schmal rötlichgelb; Bauchfalte gelb.

L. 5—7 mm.

Nord- und Mitteleuropa; häufiger als die vorhergehende Art. Von mir öfters aus Tannenzapfen gezogen.

3. **Ph. ensifer** Brischke. 1880 Limneria (Phaedroctonus?) ensifera Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. p. 172 ♀.

Matt, kurz seidenhaarig. Kopf hinter den Augen etwas verschmälert; Fühler länger als der halbe Körper. Thorax länger als hoch; Metathorax mit 5 Feldern, Area supero-media hinten offen, Area posteromedia etwas vertieft. Areola fehlt, Nervellus nicht gebrochen. Das 1. Segment etwas länger als die hintersten Hüften und Trochanteren, gerade, ziemlich dünn; Postpetiolus gewölbt, mit gerundeten Seiten; das 2. Segment fast doppelt so lang wie breit, das 3. quadratisch, die folgenden Segmente seitlich zusammengedrückt. Bohrer gekrümmt, breit, so lang wie der halbe Hinterleib. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Flügelwurzel und Tegulä gelb. Fühlerglieder 1 und 2 unten rot. Stigma braun. Beine rot, Vorderhüften gelb mit schwarzer Basis, Hinterhüften schwarz, Trochanteren gelb, die hintersten mit schwarzer Basis; Schienen aussen gelb, die hintersten an der Spitze und vor der Basis schwarzbraun; Vordertarsen gelblich mit dunklen Spitzen, Hintertarsen schwarzbraun mit heller Basis. Segment 3–7 mit roten Seiten und schmalen roten Hinterrändern; Bauchfalte gelb.

L. 5 mm.

Deutschland.

## 17. Gen. **Diocetes** Först.

1868 Diocetes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 153.

Diese Gattung stimmt mit der Gattung Angitia im Sinne Thomson's überein und unterscheidet sich von derselben durch die fehlende Areola. Wenn also dieses Merkmal zur Abtrennung einer Gattung nicht genügt, mag die hier beschriebenen Arten bei Angitia belassen. — Kopf nach hinten meist deutlich verschmälert; Clypeus mit kleinen Seitengruben. Flügel ohne Areola; Radialzelle nicht auffallend breit; der Winkel, den die beiden Abschnitte des Radius bilden, ziemlich stumpf; Nervellus nicht gebrochen. Hinterleib weniger gestreckt als bei der Gattung Phaedroctonus, nach hinten nur schwach seitlich zusammengedrückt. Bohrer mehr oder weniger über die Hinterleibsspitze hervorragend. — Die Arten sind klein oder mittelgross, von schwarzer Färbung.

### Uebersicht der Arten.

1. Alle Schenkel rot. 2.

Die hintersten Schenkel und Schienen schwarz, letztere in der Mitte weiss. Petiolus kurz. Nur 3–4 mm lang. 8.

2. Die hintersten Schienen an der Spitze schwarz. Bohrer meist von halber Hinterleibslänge. 3.

Die hintersten Schienen rötlichgelb, nicht schwarz gezeichnet. Bohrer meist kürzer als der halbe Hinterleib. Scheitel deutlich verschmälert. 5.

3. Segment 3—7 mit roten Seiten und schmalen roten Hinterrändern. Fühlerglieder 1 und 2 unten rot. Bohrer von halber Hinterleibslänge. 5 mm.

cf. **Phaedroctonus ensifer** Brischke.

Hinterleib ganz schwarz. 4.

4. Bohrer kaum kürzer als der halbe Hinterleib. Beine rötlichgelb, die hintersten Hüften und Trochanteren und die Spitze der hintersten Schienen schwärzlich. Kopf nach hinten wenig verschmälert, Gesicht nicht verengt. Speculum matt. Bauchfalte dunkel. Schaft unten gelb. 5—6 mm.

1. **apostata** Grav.

Bohrer fast kürzer als der Postpetiolus. Die hintersten Schienen weisslich, nahe der Basis und an der Spitze schwärzlich. Auch die vordersten Hüften fast ganz schwarz. Gesicht verengt. 4 mm.

2. **melanius** Thoms.

5. Beine rot, Hüften und die hintersten Trochanteren schwarz, die vorderen Trochanteren rötlichgelb. Schaft beim ♀ schwarz oder nur verloschen gelblich. Das 2. Segment kurz. Beim ♂ Fühlerbasis und Vorderhüften blassgelb. Bohrer etwas länger als das 1. Segment. 5—7 mm.

3. **exareolatus** Ratzeb.

Beine gelb oder rötlichgelb. Schaft unten hell. 6.

6. Bohrer kaum vorragend. Vorderbeine blassgelb, die hintersten rötlichgelb mit schwarzen Hüften. Kopf nach hinten deutlich verschmälert. Costula deutlich. 5—6 mm.

cf. **Eriborus Fitchi** Bridgm.

Bohrer deutlich vorragend, mindestens doppelt so lang als der Postpetiolus. Vorderbeine rötlichgelb. 7.

7. Bohrer doppelt so lang als der quadratische Postpetiolus. Vorderhüften ganz oder grösstenteils gelb. 5 mm.

4. **parvicauda** Thoms.

Bohrer fast halb so lang wie der Hinterleib. Vorderhüften gelblich, die Trochanteren weisslich; die hintersten Hüften schwarz. 5—7 mm.

5. **crataegellae** Thoms.

8. Bohrer etwas länger als der Postpetiolus. Stigma braun. Hinterleib schwarz. Schiensporen kurz.

6. **Elishai** Bridgm.

Bohrer kaum vorragend. Stigma hell. Das 3. Hinterleibssegment an den Seiten in der Regel gelb gefleckt.

cf. **Nythobia pusio** Holmgr.

1. **D. apostata** Grav. 1829 Campoplex apostata Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 510 ♀ | 1872 Limneria apostata Marshall, Catal. Brit. Hymen. p. 55 ♀ | 1887 Angitia apostata Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1161 ♀♂.

Kopf nach hinten nur schwach verschmälert. Mesopleuren deutlich punktiert, mit lederartigen Zwischenräumen; Speculum matt; Metathorax fein gerunzelt, Costula schwach. Bohrer fast so lang wie der halbe Hinterleib. — Schwarz; Palpen und Unterseite des Schaftes gelblich. Flügel hyalin; das schmale Stigma gelblich. Tegulä gelblichweiss. Beine rötlichgelb, die Trochanteren blassgelb; die hintersten Hüften und Trochanteren schwarz; die Spitze der hintersten Schienen und die hintersten Tarsen zum grössten Teil schwarzbraun. Bauchfalte dunkel.

L. 5—6 mm.

Nord- und Mitteleuropa; hier in Thüringen selten.

2. **D. melanius** Thoms. 1887 Angitia melania Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1160 ♀.

Kopf nach hinten deutlich verschmälert; Fühlergeissel ziemlich dünn; Gesicht stark verschmälert. Bohrer fast kürzer als der quadratische Postpetiolus. — Schwarz. Palpen und Mandibeln gelblich. Stigma hell; Tegulä weisslichgelb. Beine rötlich, Hüften schwarz, die vordersten nur an der Spitze hell; die hintersten Schienen weisslich, am Ende und nahe der Basis schwärzlich.

L. 4 mm.

Schweden.

3. **D. exareolatus** Ratzeb. 1852 Campoplex exareolatus Ratzeburg, Ichneum d. Forstins. III p. 89 ♀ | 1858 Limneria exareolata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. p. 96 ♀♂ | 1887 Angitia exareolata Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1163 ♀♂.

Kopf nach hinten wenig verschmälert, Fühler halb so lang als der Körper, beim ♂ etwas länger. Thorax etwas bucklig, wenig schmaler als der Kopf; Mesopleuren mit fast mattem Speculum; Felderung des Metathorax nicht scharf, Area superomedia fast quer; Costula undeutlich oder fehlend, sodass die beiden Seitenfelder verschmelzen.

Schiensporen lang, Klauen ziemlich deutlich bis ungefähr zur Mitte gekämmt. Hinterleib gegen das Ende leicht zusammengedrückt, Postpetiolus quadratisch oder etwas länger als breit, etwas kürzer aber doppelt so breit als der Petiolus; das 2. Segment beim ♀ fast breiter als lang, beim ♂ etwas länger als breit; Bohrer etwas länger als das 1. Segment. — Schwarz; weisslich pubescent; Palpen und Mandibeln gelblich. Fühlerschaft schwarz, zuweilen auf der Unterseite verloschen gelblich. Stigma bräunlich gelb; Tegulä weisslich. Beine rötlich, Hüften schwarz, Vorderhüften ausgedehnt rötlichgelb; Trochanteren gelblich, die hintersten an der Basis schwarz; die hintersten Tarsen gebräunt, die hintersten Schienen ohne dunkle Zeichnung. Bauchfalte gelb. — Beim ♂ der Schaft ausgedehnt gelb, meist nur mit schwarzer Seitenlinie; Fühlergeissel unten rötlich. Das 2. Segment hinten oft verschwommen rötlich. Die hintersten Schienen zuweilen am Ende und nahe der Basis schwach gebräunt.

L. 5—7 mm.

Nord- und Mitteleuropa; zuweilen in Anzahl.

4. **D. parvicauda** Thoms. 1887 *Angitia parvicauda* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1163 ♂.

Stimmt mit der vorhergehenden Art ziemlich überein und unterscheidet sich hauptsächlich durch die Farbe des Fühlerschaftes und der Beine, sowie durch den kürzeren Bohrer. — Schwarz. Schaft grösstenteils und Bauchfalte gelblich. Beine rötlich gelb; Vorderhüften hellgelb, die mittelsten an der Basis, die hintersten ganz schwarz. Trochanteren gelb. Bohrer doppelt so lang als der quadratische Postpetiolus.

L. 5 mm.

Schweden.

5. **D. crataegellae** Thoms. 1887 *Angitia crataegellae* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1164 ♀♂.

Schwarz. Fühlerschaft des ♀ unten weisslich. Beine rötlichgelb, Hüften und Trochanteren weisslichgelb, die hintersten Trochanteren an der Basis und die hintersten Hüften schwarz. Bohrer beinahe so lang wie der halbe Hinterleib. — Aehnelt sehr *D. exareolatus* und unterscheidet sich durch das schmalere Stigma im Vorderflügel, die weisslichen Trochanteren und die weissliche Unterseite des Fühlerschaftes. Von *D. parvicauda* verschieden durch Färbung der Beine und des Schaftes, sowie durch den etwas längeren Bohrer.



L. 5—7 mm.

Von Kriechbaumer in Bayern aus *Scythrobia crataegella* gezogen.

6. **D. Elishai** Bridgm. 1884 *Limneria Elishae* Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, p. 426 ♀♂ | 1887 *Angitia Elishae* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1165 ♀♂.

Kopf quer, nach hinten kaum verschmälert; Gesicht mit parallelen Seiten, weisslich behaart; Fühler fast von Körperlänge. Thorax um ein Drittel länger als hoch; Metathorax gestreckt, Area superomedia pentagonal, länger als breit; Costula schwach oder fehlend, die Seitenfelder deshalb nur unvollständig von einander getrennt. Schiensporen kurz. Postpetiolus länger als breit, mit gerundeten Seiten; das 2. Segment um ein Drittel länger als breit, das 3. fast quadratisch. Hinterleib fein weisslich pubescent; Bohrer sehr kurz, wenig länger als der Postpetiolus. — Schwarz, Mandibeln gelblich. Stigma im Vorderflügel braun. Hüften schwarz; Trochanteren gelblich, die hinteren an der Basis schwarz; Vorderschenkel rötlich, die mittleren an der Basis braun, die hintersten Schenkel schwarz; Schienen und Tarsen blass rötlich, die hintersten Schienen an der Spitze und nahe der Basis schwärzlich; Tarsenglieder am Ende gebräunt.

L. 3—4 mm.

Von Elisha in England entweder aus *Ornix scoticella* oder aus *Nepticula aucupariae* gezogen.

## 18. Gen. **Eriborus** Först.

1868 *Eriborus* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 153.

Kopf nach hinten schwach verengt; Clypeus mit kleinen Seitengruben. Vorderflügel ohne Areola; Nervellus nicht gebrochen. Area superomedia meist pentagonal; die beiden Seitenfelder des Metathorax von einander getrennt, indem die Costula deutlich vorhanden ist. Bohrer nicht über die Hinterleibsspitze hinausragend. — Die Gattung schliesst sich eng an *Anilastus* und *Angitia* an, von denen sie sich durch die fehlende Areola unterscheidet. *Nythobia* unterscheidet sich durch die fehlende Costula und den nach hinten nicht verschmälerten Kopf.

### Uebersicht der Arten.

1. Hinterleib schwarz. Die hintersten Schenkel rötlich. Schaft unten und die Vorderbeine gelb. 6 mm.

#### 3. **Fitchi** Bridgm.

Hinterleib hinten wenigstens an den Seiten rot oder braunrot. Die hintersten Schenkel schwarz oder schwarzbraun. 2.

2. Hinterleib hinten kastanienbraun. Schaft unten nicht hell.  
7—8 mm.

1. **perfidus** Grav.

Hinterleib hinten an den Seiten rot. Schaft unten gelblich-weiss. 7 mm.

2. **braccatus** Gmel.

1. **E. perfidus** Grav. 1829 *Campoplex perfidus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 595 ♀ | 1887 *Anilasta perfida* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1175 ♀.

Schwarz; Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich; Gesicht graulich behaart. Stigma bräunlich; Tegulä weisslichgelb. Die vordersten Beine rötlich, Hüften schwarz, Trochanteren gelb; an den Mittelbeinen Hüften und Trochanteren schwarz, letztere am Ende gelb; Schenkel braunrot, an der Basis und auf der Aussenseite schwarz; Schienen und Tarsen gelblich; die hintersten Beine schwarz, Schienen in der Mitte rostrot. Segment 3—7 bräunlichrot, auf dem Rücken verdunkelt.

L. 7—8 mm.

Mitteleuropa; zerstreut.

2. **E. braccatus** Gmel. 1790 *Ichneumon braccatus* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. XIII p. 2705 | 1829 *Campoplex braccatus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 549 | 1872 *Limneria braccata* Marshall, Catal. Brit. Hymen. p. 55 | 1880 *Limneria* (*Eriborus*?) *braccata* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig, N. F. p. 172 ♀♂ | 1887 *Anilasta braccata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1175 ♀♂.

Gesicht und Metathorax ziemlich dicht weisslich behaart. — Schwarz; Palpen und Mandibeln gelblich; Schaft unten weisslich, Stigma bräunlich; Tegulä weisslichgelb. Vorderbeine rötlichgelb, Hüften schwarz, die vordersten an der Spitze gelblich, Trochanteren gelb; an den hintersten Beinen die Hüften schwarz, die Trochanteren gelb, an der Basis oben rötlich, die Schenkel schwarzbraun, an den Enden meist rötlich, die Schienen und Tarsen schwärzlich, die Schienen aussen in der Mitte rötlich. Hinterleib trüb rot, Segment 1 und 2, sowie 3 an der Basis oben schwärzlich.

L. 7 mm.

Zerstreut in Mittel- und Südeuropa; hier in Thüringen nur wenige Exemplare.

3. **E. Fitchi** Bridgm. 1881 *Limneria Fitchi* Bridgman, Trans. Entom. Soc. London p. 157 ♀ | 1887 *Angitia Fitchi* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1163 ♀.

Da bei dieser Art der Bohrer kaum vorsteht, habe ich kein Bedenken getragen, sie bei der Gattung *Eriborus* mit

einzureihen. Von den beiden vorhergehenden Arten unterscheidet sie sich leicht durch den nicht rot gezeichneten Hinterleib. Thorax buckelig, Speculum fast matt, Costula deutlich. Die hintersten Schienen mit langen Sporen. — Schwarz, Unterseite des Schaftes und Beine gelblich, die hintersten Beine rötlich, mit schwarzen Hüften.

L. 6 mm.

England. — Nach Bridgman aus *Nola albula* gezogen.

### 19. Gen. *Nythobia* Först.

1868 *Nythobia* Förster. Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 153.

Kopf ziemlich aufgetrieben, hinter den Augen nicht ver schmälert; Gesicht quer; Clypeus am Ende abgerundet; Mandibeln schmal, mit gleichen Zähnen; Augen innen nicht ausgerandet; Fühler fadenförmig, nach dem Ende hin nicht verdünnt, länger als Kopf und Thorax. Thorax etwas länger als hoch; Metathorax runzlig, mit nicht scharf begrenzten Feldern; Area superomedia am Ende offen; Area supero-externa und dentipara nicht von einander getrennt. Flügel ohne Areola; Nervellus nicht gebrochen. Hinterleib gegen das Ende von der Seite zusammengedrückt; das 1. Segment ziemlich kurz und dick; Postpetiolus convex, fast quadratisch, fast doppelt so breit als der Petiolus; das 2. Segment länger als breit; das 3. etwa so lang als breit; Bohrer kaum vorragend. Hierher nur eine einzige, sehr kleine Art.

**N. pusio** Holmgr. 1858 *Meloboris pusio* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 100 ♀ | 1887 *Angitia pusio* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1165 ♀.

Schwarz, weisslich pubescent. Palpen und Mandibeln gelblich. Stigma bräunlichgelb, Tegulä weisslich. Vorderbeine rötlichgelb, Hüften schwarz, an der Spitze meist gelblich, Trochanteren weisslichgelb; Mittelschenkel an der Basis zuweilen gebräunt; die hintersten Hüften und Trochanteren schwärzlich, letztere an der Spitze gelblich; Schenkel dunkelbraun oder schwärzlich, an Basis und Spitze meist hell; Schienen gelblich oder weisslich, an der Spitze und nahe der Basis verdunkelt, Tarsen braun, mit heller Basis. Das 2. Hinterleibssegment mit rötlichem Endrand, das 3. meist an den Seiten rötlich gefleckt.

L. 3—4 mm.

Nord- und Mitteleuropa; in Thüringen von mir in einigen Exemplaren gefunden.

20. Gen. **Diadegma** Först.1868 *Diadegma* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 153.

Kopf ziemlich aufgetrieben, hinter den Augen nicht verengt, von vorn gesehen rundlich; Gesicht quer, nach unten etwas verbreitert; Wangen aufgetrieben, ziemlich kurz; Clypeus am Ende breit abgerundet, mit kleinen Seitengruben; Augen innen kaum etwas ausgerandet; Fühler schlank, gegen das Ende etwas verdünnt, wenig länger als der halbe Körper; Mandibeln ziemlich breit, gegen das Ende kaum verschmälert. Thorax cylindrisch; Metathorax mit 5 deutlichen Feldern, Area supromedia hinten meist unvollständig geschlossen; Mesopleuren ziemlich dicht punktiert. Radius gebogen, kaum winklig gebrochen, am Ende ziemlich gerade, Areola gestielt, den rücklaufenden Nerv etwas hinter der Mitte aufnehmend; der untere Aussenerv der Discoidalzelle ein spitzer; Nervellus nicht gebrochen, wenig schräg. Beine ziemlich kräftig, Schienen aussen nicht gedörnelt; Klauenglied und Klauen gross, letztere höchstens an der Basis mit Spur von Zähnelung. Hinterleib annähernd spindelförmig, nach hinten seitlich zusammengedrückt; das 1. Segment kräftig, Petiolus mit Seitengrübchen, Postpetiolus convex, deutlich breiter als der Petiolus, quadratisch oder etwas länger als breit; das 2. Segment wenig länger als breit, das 3. quadratisch; Bohrer etwas länger als das 1. Segment.

Diese Gattung steht in nächster Nähe von *Meloboris* und kann bei einer weiteren Auffassung des Gattungsbegriffes mit dieser vereinigt werden.

**D. crassicornis** Grav. 1829 *Campoplex crassicornis* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 565 ♀ (partim) | 1858 *Limneria crassicornis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 67 ♀ | *Meloboris crassicornis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1151 ♀♂ | *Diadegma crassicornis* Schmiedeknecht, Hymen. Mitteleurop. p. 599.

Schwarz, Palpen rötlich; Mandibeln zum Teil braunrot. Stigma bräunlichgelb, Tegulä weisslichgelb. Beine rot, Hüften schwarz, die vorderen am Ende rötlich; Trochanteren an der Basis schwarz; Vorderschienen an der Basis hell, die hintersten zuweilen an der Spitze etwas verdunkelt. Hinterleibsmittle rot oder bräunlichrot und zwar in der Regel das 2. Segment am Endrande, das 3. und 4. ganz, letzteres zuweilen am Ende verdunkelt.

L. 7—10 mm.

Verbreitet in Nord- und Mitteleuropa. — Von Brischke aus *Nematus Vallisnieri* erhalten.

## 21. Gen. **Sinophorus** Först.

1868 Sinophorus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 153.

Kopf quer, hinter den Augen stark verschmälert; Augen innen ganz schwach ausgerandet; Clypeus mit kleinen Seiten gruben; Fühler schlank, etwas länger als der halbe Körper, gegen das Ende verdünnt. Thorax stark bucklig, kaum länger als hoch; Metathorax hinten schwach eingedrückt, fast ungefeldert, nur die vordere Querleiste angedeutet, Luftlöcher klein und rund, Brustseiten fein und dicht runzlig punktiert. Radius gebogen, kaum winklig gebrochen, der Endabschnitt doppelt so lang als der Basalabschnitt, am Ende gerade; Areola gestielt, ziemlich gross, rücklaufender Nerv hinter der Mitte; Nervulus interstitial, ziemlich schräg; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle ein spitzer; Nervus parallelus wenig unter der Mitte der Brachialzelle entspringend; Nervellus unterhalb der Mitte ganz schwach gebrochen, ohne ausgehenden Nerv. Beine, namentlich die Hinterbeine kräftig; Schienen aussen gedörnelt; Schiensporen lang, die Hälfte des Metatarsus erreichend; Fussklauen mit einzelnen Kammzähnen. Hinterleib hinten schwach zusammengedrückt; Postpetiolus mehr oder weniger deutlich abgesetzt, mit fast parallelen Seiten, quadratisch oder wenig länger als breit, doppelt so breit als der Petiolus; das 2. Segment so lang oder etwas länger als breit; das 3. kürzer als breit, bei *S. egregius* so lang wie breit. Bohrer etwa so lang oder etwas kürzer als der halbe Hinterleib.

**S. thuringiacus** Schmiedeknecht. 1907 *S. thuringiacus* Schmiedeknecht, Hymen. Mitteleurop. p. 600 ♀.

Mattschwarz, weisslich pubescent; Schaft und das folgende Glied unten braunrötlich, mit helleren Einschnitten; Mandibeln und Palpen rötlichgelb. Tegulä und Flügelwurzel weisslich, Stigma bräunlichgelb. Beine einfarbig rötlichgelb, die hintersten Hüften und die Basis der mittleren schwärzlich. Endrand der hinteren Hinterleibssegmente schmal rötlich; Bauchmembran schwärzlich mit gelben Einschnitten.

L. 7 mm.

Ein ♀ von Blankenburg in Thüringen.

Zu *Sinophorus* gehört ein auffallendes Tier, welches ich je in einem Exemplar in Griechenland und Aegypten gefangen habe. Namentlich das letztere Exemplar ist durch lebhaftere Färbung ausgezeichnet, wie man sie bei den düster gefärbten Limnerien gar nicht gewohnt ist. Ich nenne die Art:

**S. egregius** n. sp.

Metathorax ausser der vorderen Querleiste auch noch mit 2 Längsleisten als Seitenbegrenzung der Area supero-media und posteromedia; der dadurch eingeschlossene Raum ziemlich glänzend. Areola im Vorderflügel gross, schräg, gestielt, den rücklaufenden Nerv weit hinter der Mitte aufnehmend; Nervellus schräg nach aussen gestellt, kaum mit Spur von Brechung. Bohrer so lang wie der halbe Hinterleib, stark gekrümmt. — Kopf und Thorax lederartig, mattschwarz, schwach graulich pubescent. Palpen, Mandibeln, die inneren und zum Teil die äusseren Augenränder und ein Fleck der Wangen gelb. Die gelbe Zeichnung der inneren Augenränder verbreitert sich oben auf dem Scheitel nach innen. Seitenflecken vorn auf dem Mesonotum, ein grosser quadratförmiger Fleck auf dem Schildchen und das Hinterschildchen gelblich. Mesopleuren mit verschwommenen rötlichen Flecken, auch der Schildchenfleck rötlich umsäumt. Stigma im Vorderflügel schmal, gelblich; Tegulä und Schulterbeulen weisslich. Alle Hüften schwarz; Trochanteren weisslich, die hintersten an der Basis schwarz. Schenkel und Vorderschienen rötlich, die Schienen zum Teil und die Tarsen weisslich, letztere dunkel geringelt. Die hintersten Schienen weiss, die schmale Basis und fast das Enddrittel schwarz; die Sporen weiss mit schwarzen Spitzen. Die hintersten Tarsenglieder schwarz, mit weisser Basis. Hinterleib ziemlich glänzend; Endhälfte des Postpetiolus und Segment 2 und 3 verschwommen rötlich.

L. 7 mm.

Von mir bei Athen gefangen.

**Var. aegyptiacus** ♀.

Thorax blutrot, nur die Seitenränder und ein breiter Mittelstreif des Mesonotums, sowie die Basis des Metathorax und die Nähte davor schwarz. Vorn neben dem schwarzen Streif des Mesonotums je ein gelber Seitenfleck, ebenso gelbe Flecke auf Schildchen und Hinterschildchen wie bei der Stammform. Endrand des Postpetiolus und Segment 2 und 3 rot, das 2. Segment an der Basis mit schwarzem Fleck, das 3. mit schwarzem Endrand.

Von mir bei Helouan in Aegypten gefangen.

22. Gen. **Eulimneria** Schmiedekn.

1907 Eulimneria Schmiedeknecht, Hymen. Mitteleurop. p. 600.

1887 Limneria Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1103 [non Holmgren].

Vorliegende Gattung umfasst nur eine kleine Anzahl leicht erkennbarer Arten der von Holmgren aufgestellten Gattung Limneria. Letztere enthält den grössten Teil der von Förster abgetrennten Gattungen. Da der Name Limneria bereits von Adams vergeben war, ist er neuerdings von Ashmead in Limnerium umgewandelt worden. Da nun unter Limnerium wieder mehrfach, so z. B. auch im Dalla-Torre'schen Kataloge die alte Gattung Limneria im Holmgren'schen Sinne verstanden wird, so habe ich für die hier zu behandelnden Arten einen neuen Gattungsnamen geschaffen.

Die für diese Gattung charakteristischen Merkmale sind die folgenden: Kopf nach hinten nicht oder kaum verschmälert; Metathorax der Länge nach deutlich ausgehöhlt; Vorderflügel mit ziemlich grosser Areola; Nervellus nicht schief und nicht gebrochen; Hinterleib ohne helle Zeichnung; Bohrer vorstehend, gekrümmt, meist etwas kürzer als der halbe Hinterleib. Mit wenigen Ausnahmen robuste Tiere. — Clypeus mit kleinen Seiten gruben; Mandibeln kurz und kräftig, gegen das Ende wenig verschmälert; Fühler kräftig, gegen die Spitze verdünnt, Schaft unten nicht hell gezeichnet. Metathorax undeutlich gefeldert, nur die vordere Querleiste scharf; Area basalis kurz, meist quer, Area superomedia nur angedeutet, quer. Areola im Vorderflügel gross und ziemlich regelmässig, in der Regel deutlich gestielt, den rücklaufenden Nerv in oder nahe der Mitte aufnehmend; Nervulus wenig schräg, der untere Aussenkinkel der Discoidalzelle nicht oder kaum spitz. Beine kräftig, Klauen wenigstens an der Basis mit deutlichen Kammzähnen, die hintersten Schienen und Tarsen meist mit scharf abgegrenzter heller und dunkler Zeichnung. Hinterleib ziemlich breit, hinten wenig zusammengedrückt, Petiolus breit, mit flachen oder fehlenden Seitengrübchen, dagegen die von diesen ausgehende Furche (sulcus glymmialis) zuweilen ziemlich tief; Postpetiolus deutlich abgesetzt, an den Seiten wenig gerundet; Bohrer kräftig, bis von halber Hinterleibslänge.

Von den verwandten Gattungen kommt nur Omorgus ziemlich nahe, da ein der Länge nach ausgehöhlter Metathorax sich nur noch bei einer Anzahl Arten dieser Gattung findet. Omorgus unterscheidet sich leicht durch den gebrochenen, schräg nach innen gestellten Nervellus, ebenso durch den convexen, an den Seiten stark gerundeten Postpetiolus.

## Uebersicht der Arten.

1. Mittel- und Hinterschenkel schwarz, erstere an der Spitze hell. Die hintersten Schienen schwarz, ein schmaler Ring an der Basis und die Mitte breit weisslich. Sehr kleine Art von nur 4 mm.

11. **nigritella** Thoms.

Schenkel rot, selten die hintersten Schenkel ausgedehnt dunkel. Grössere Arten. 2.

2. Tegulä schwarz. Die hintersten Schienen einfärbig rot, höchstens an der Basis weisslich. 3.

Tegulä weiss. Die hintersten Schienen meist mit dunkler Zeichnung. 4.

3. Schenkel, Schienen und Tarsen einfärbig rot; die hintersten Schienen an der Basis nicht weisslich. Aushöhlung des Metathorax nicht tief, punktiert. Kleine Art von 5 mm.

12. **hyperborea** Thoms.

Hinterschienen mit weisslicher Basis. Aushöhlung des Metathorax ziemlich glänzend, mit Spuren von feiner Querrunzelung. Stigma braun. Rücklaufender Nerv vor der Mitte der Areola. 8—9 mm.

13. **nitida** Brischke.

4. Die hintersten Schienen nahe der Basis und fast stets auch am Ende dunkel gezeichnet. Area basalis sehr kurz. Mandibeln nicht lang, gegen das Ende etwas verschmälert. 5.

Die hintersten Schienen rötlich, nicht dunkel gezeichnet, an der Basis weiss; die Tarsen hell geringelt. Area basalis quadratisch. Mandibeln kräftig, lang, wenig verschmälert. 14.

5. Die hintersten Schienen in der Mitte weisslich. Sulcus glymmalis schwach. 6.

Die hintersten Schienen in der Mitte rot oder gelblich. Sulcus glymmalis tief. Die hintersten Schenkel an der Spitze meist schwarz. 10.

6. Die hintersten Schenkel an der Spitze schwarz. Die hintersten Schienen nahe der Basis und an der Spitze schwarz gezeichnet. Die hintersten Tarsenglieder dunkel, mit weisslicher Basis. 5—6 mm.

5. **geniculata** Grav.

Die hintersten Schenkel einfärbig rot. 7.



7. Die grösste Art, 9—10 mm lang. Die hintersten Schienen weisslich, ein Ring unterhalb der Basis rostrot, Spitze breit schwarz. Metathorax dicht punktiert, mit deutlicher Costula. Bohrer ungefähr von halber Hinterleibslänge.

1. **albida** (Gmel.) Thoms.

Kleinere Arten. Die hintersten Schienen auch an der Basis schwärzlich. 8.

8. Stigma braun. Aushöhlung des Metathorax oben dicht punktiert. Die hintersten Schienen an der Spitze breit schwarz; Trochanteren ziemlich dunkel. Bohrer deutlich kürzer als der halbe Hinterleib. 6—7 mm.

2. **fuscicarpus** Thoms.

Stigma bräunlichgelb. Aushöhlung des Metathorax oben ziemlich glatt und glänzend. 9.

9. Schenkel und Schienen rot. Kopf hinter den Augen kaum verengt. Das 2. Segment fast quer; auch der Postpetiolus ziemlich breit. Beim ♂ das 3. und 4. Segment mit weisslicher Endbinde. 6—7 mm.

3. **juniperina** Holmgr.

Schenkel und Schienen mehr rotgelb. Kopf hinter den Augen deutlich verengt. Das 2. Segment nicht quer. Postpetiolus ziemlich gestreckt. Beim ♂ das 3. und 4. Segment ohne weissliche Endbinden. Kleiner als *E. juniperina*. 5—6 mm.

4. **pleuralis** Thoms.

10. Die hintersten Schenkel wenigstens an der Spitze schwarz. Die hintersten Schienen nahe der Basis und am Ende schwarz. 11.

Die hintersten Schenkel ganz rot. 13.

11. Die hintersten Schenkel an Basis und Spitze, zuweilen fast ganz schwarz. Postpetiolus an den Seiten gerundet. Das 2. Segment länger als breit. 5—6 mm.

7. **turionum** (Hart.) Ratzeb.

Die hintersten Schenkel nur an der Spitze schwarz. 12.

12. Färbung der Beine gelbrot, Schenkel nicht verdickt. Scheitel winklig ausgeschnitten. Das 2. Segment beim ♀ fast quer. Kleine Art von nur 5 mm Länge.

6. **planiscapus** Thoms.

Färbung der Beine dunkler rot als bei der vorigen Art; Schenkel verdickt. Beim ♂ der Kopf hinten erweitert. Grössere Art von 6—9 mm.

8. **crassifemur** Thoms.

13. Die hintersten Schienen an Basis und Spitze schwarz gezeichnet. Die Aushöhlung des Metathorax am oberen Ende ziemlich glatt und glänzend. 6—7 mm.

9. **rufifemur** Thoms.

Die hintersten Schienen am Ende kaum dunkler. Die Aushöhlung des Metathorax am oberen Ende nicht glatt, sondern dicht punktiert. 7 mm.

10. **costalis** Thoms.

14. Metathorax mit starken Leisten und deutlich ausgehöhlt. Beim ♂ die Vorderhüften unten gelb. 8—9 mm.

14. **xanthostoma** Grav.

Metathorax undeutlich gefeldert und wenig ausgehöhlt; Costula fast fehlend. 6 mm.

15. **pineticola** Thoms.

1. **E. albida** (Gmel.) Thoms. 1790 *Ichneumon albidus* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13. p. 2705 | 1829 *Campoplex albidus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 474 ♀♂ (partim) | 1858 *Limneria albida* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 53 ♀♂ (partim) | 1887 *Limneria albida* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1104 ♀♂.

Die älteren Autoren unterschieden nur 2 *Eulimneria*-Arten, bei denen die hintersten Schienen weisslich mit dunkler Zeichnung sind, nämlich *E. albida* und *geniculata*; Thomson hat davon drei weitere Arten abgetrennt, deren Unterschiede jedoch durchaus nicht sichere sind. *E. albida* ist also hier im engeren d. h. im Sinne Thomson's aufgefasst. Die grösste Art. Postpetiolus und das 2. Segment nicht quer. Sulcus glymmalis schwach. Mesopleuren ziemlich dicht punktiert. Metathorax nicht querrunzig sondern dicht punktiert, mit sehr kurzer Area basalis und kräftiger Costula. Bohrer ungefähr von halber Hinterleibslänge. — Schwarz; Schenkel und Schienen rot, die hintersten Schienen weisslich, ein Ring nahe der Basis rostrot, Spitze breit schwarz; die vorderen Trochanteren rot, beim ♂ gelblich.

L. 9—10 mm.

Die Art ist selten; Thomson gibt sie für Norddeutschland an; ich habe mehrere Exemplare hier in Thüringen gefunden.

2. **E. fuscicarpus** Thoms. 1887 *Limneria fuscicarpus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1104 ♀♂.

Der vorhergehenden Art ähnlich, namentlich auch durch den oben deutlich punktierten ausgehöhlten Raum des Metathorax; verschieden durch geringere Grösse, die auch an der Basis schwärzlich gezeichneten Hinterschienen, das

dunkle Stigma im Vorderflügel, die dunkleren Trochanteren und den kürzeren Bohrer.

L. 6—7 mm.

Die Art wurde von Thomson nach schwedischen Exemplaren aufgestellt; in Thüringen habe ich verschiedene Stücke gefangen, die ich hierherziehe, aber, wie ich bereits erwähnt habe, sind die Unterschiede dieser und der verwandten Arten nicht scharf.

3. **E. juniperina** Holmgr. 1854 *Campoplex juniperinus* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. p. 15 ♂ | 1858 *Limneria juniperina* Holmgren, ibidem p. 53 ♂ (partim) | 1887 *Limneria juniperina* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1104 ♀♂.

Schwarz; Schenkel und Schienen rot, die hintersten Schienen weisslich, nahe der Basis und am Ende schwärzlich gezeichnet. Beim ♂ das 3. und 4. Segment mit weisslicher Endbinde. — Auch diese Art ähnelt der *E. albida*, ist aber kleiner, der Postpetiolus ist im Verhältnis breiter, auch das 2. Segment fast quer, der ausgehöhlte Raum des Metathorax ist oben ziemlich glatt und glänzend. Die ♂ sind an den hellen Binden, wie sie keine zweite *Eulimneria*-Art hat, leicht zu erkennen.

L. 6—7 mm.

Die Art scheint über ganz Nord- und Mitteleuropa verbreitet und die häufigste dieser Gruppe zu sein.

4. **E. pleuralis** Thoms. 1887 *Limneria pleuralis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1105 ♀♂.

„Schwarz, Schenkel und Schienen rotgelb, die hintersten Schienen in der Mitte weisslich, nahe der Basis und am Ende schwärzlich gezeichnet; Mesopleuren dicht punktiert, Klauen den Pulvillus kaum überragend. — Aehnlich der *E. juniperina*, aber kleiner. Scheitel schmaler, das 2. Segment nicht quer, Postpetiolus schmaler, Segment 3 und 4 beim ♂ nicht mit hellem Endrand, Mesopleuren vor dem Spiegel stärker gestreift, Kopf hinter den Augen verschmälert, Clypeus am Ende stärker abgerundet.

L. 5—6 mm.

Schweden.“ (Thomson.)

Mir ist die Art nie vorgekommen.

5. **E. geniculata** Grav. 1829 *Campoplex geniculatus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 486 ♀♂ | 1858 *Limneria geniculata* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. p. 54 ♀♂ var. 1 und 2 | 1880 *Limneria geniculata* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 148 ♀♂ | 1887 *Limneria geniculata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1105 ♀♂.

Bei den früheren Autoren ist auch diese Art nicht scharf geschieden, sondern mit den verwandten Arten der folgenden

Gruppe vermengt, Von allen Eulimneria-Arten mit weisslicher Mitte der hintersten Schienen ist sie ausgezeichnet durch die schwärzliche Spitze der hintersten Schenkel, auch durch die weissliche Basis der hintersten Tarsenglieder. Die Mesopleuren sind wie bei *E. pleuralis* dicht aber weniger stark punktiert. Postpetiolus mit mehr parallelen Seiten. — Schwarz, Palpen und Mitte der Mandibeln rötlichgelb. Stigma im Vorderflügel bräunlich; Tegulä weisslichgelb. Schenkel und Schienen rötlich, die vordersten Schienen mehr gelblich, die hintersten Schenkel an der Spitze, zuweilen auch an der Basis schwärzlich; die hintersten Schienen weisslich, nahe der Basis und an der Spitze schwärzlich; Hintertarsen braun, mit weisslicher Basis der vorderen Glieder. Bohrer so lang wie der halbe Hinterleib.

L. 5—6 mm.

Mitteuropa; selten. Mir ist die Art nur in einem einzigen Stück vorgekommen.

6. ***E. planiscapus*** Thoms. 1887 *Limneria planiscapus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1105 ♀ | 1858 *Limneria geniculata* Holmgren, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. p. 54 ♀♂ (excl. varietatibus).

Schwarz, Schenkel und Schienen gelbrot, die hintersten Schenkel am Ende, die hintersten Schienen nahe der Basis und am Ende schwärzlich. — Der *E. geniculata* in Bezug auf Grösse, Habitus und Färbung ähnlich, aber die hintersten Schienen in der Mitte nicht weisslich sondern rötlich, der Petiolus breiter und kürzer, mit tiefen Seitengrübchen von der Basis bis fast zu den Luftlöchern, Postpetiolus ziemlich flach; Scheitel winklig ausgerandet, das 2. Segment beim ♀ fast quer.

L. 5—6 mm.

Nord- und Mitteleuropa; eine der häufigeren Arten.

7. ***E. turionum*** (Hartig) Ratzeb. 1844 *Campoplex turionum* (Hartig) Ratzeburg, Ichneum. d. Forstins. I p. 93 | 1887 *Limneria turionum* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1105 ♀♂.

Schwarz; Schenkel und Schienen rot, die hintersten Schenkel ganz oder an Basis und Spitze schwarz, die hintersten Schienen nahe der Basis und an der Spitze dunkel gezeichnet. — Der *E. planiscapus* sehr ähnlich, aber der Scheitel nicht winklig ausgeschnitten, Postpetiolus mit stärker gerundeten Seiten, das 2. Segment länger und die schwarze Zeichnung der hintersten Schenkel ausgedehnter.

L. 5—6 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten. Mir ist die Art unbekannt.

8. **E. crassifemur** Thoms. 1887 *Limneria crassifemur* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1106 ♀♂.

Schwarz; die dicken Schenkel und die Schienen rot, die hintersten Schenkel an der Spitze, die hintersten Schienen nahe der Basis und an der Spitze breit schwarz. — Der ausgehöhlte Raum des Metathorax oben glänzend. Seitenrübchen des Petiolus tief. — Mit *E. planiscapus* und *rufifemur* verwandt, verschieden durch ansehnlichere Grösse, das kräftige Rot der Beine, die ziemlich dicht punktierten Mesopleuren, die aufgetriebenen Wangen, durch die längeren und kräftigeren Mandibeln und den nur schwach zugrundeliegenden Clypeus. Beim ♂ ist der Scheitel nach hinten verbreitert.

L. 6—9 mm.

Von Thomson nach schwedischen Exemplaren aufgestellt; eine Anzahl Stücke, die ich zu dieser Art ziehe, besitze ich aus Thüringen.

9. **E. rufifemur** Thoms. 1887 *Limneria rufifemur* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1106 ♀♂.

Schwarz; Schenkel und Schienen gelbrot, die hintersten Schienen nahe der Basis und am Ende schwärzlich gezeichnet. Der ausgehöhlte Raum des Metathorax oben ziemlich glatt und glänzend. Von den verwandten Arten durch die ganz roten Hinterschenkel verschieden; darin stimmt sie mit *E. costalis* überein, bei welcher jedoch der ausgehöhlte Raum des Metathorax oben dicht punktiert ist. Nun finden sich freilich Exemplare, bei welchen die Spitze der hintersten Schenkel nur einen Schein von Verdunklung zeigt, sodass man in Zweifel ist, ob man eine Art mit einfarbigen oder mit dunkel gezeichneten Hinterschenkeln vor sich hat.

L. 6—7 mm.

Nord- und Mitteleuropa. Von Kriechbaumer aus *Botys sericealis* gezogen.

10. **E. costalis** Thoms. *Limneria costalis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1106 ♀.

Die Art ist von Thomson ausserordentlich kurz beschrieben. Sie gleicht am meisten der *E. rufifemur*, indem die hintersten Schenkel am Ende nicht dunkel gezeichnet sind. Als Unterschiede von *E. rufifemur* werden angeführt, dass der ausgehöhlte Raum des Metathorax oben nicht glatt sondern dicht punktiert ist und dass die hintersten Schienen am Ende kaum dunkel gezeichnet sind.

L. 7 mm.

Schweden.

11. **E. nigritella** Thoms. 1887 *Limneria nigritella* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1107 ♀.

Durch ihre Kleinheit, durch die dunkle Beinfärbung und durch die fadenförmigen Fühler ist diese Art vor allen anderen ausgezeichnet. Wie bei allen vorhergehenden Arten ist die Basalzelle sehr kurz. Die Mandibeln sind schwach. Scheitel nach hinten nicht verschmälert. Der ausgehöhlte Raum des Metathorax fast ganz glatt und glänzend. — Schwarz; Tegulä weisslich. Vorderschenkel ganz, Mittelschenkel an der Spitze breit und die Schienen rötlich; die hintersten Schienen schwarz, ein schmaler Ring an der Basis und die Mitte breit weisslich.

Nur 4 mm. lang.

Schweden.

12. **E. hyperborea** Thoms. 1887 *Limneria hyperborea* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1106.

Die Beschreibung, welche Thomson von dieser Art gibt, ist ausserordentlich kurz. Immerhin ist die Art gekennzeichnet durch die schwarzen Tegulä und die einfarbig roten Schenkel und Schienen. Durch den fehlenden weissen Basalring der hintersten Schienen unterscheidet sie sich von der *E. nitida*, welche ebenfalls schwarze Tegulä besitzt. Die Area basalis ist sehr kurz. Thomson's Beschreibung lautet: „Schwarz, Schenkel, Schienen und Tarsen rot, die hintersten Schienen ohne weissen Basalring. Tegulä schwarz. Der ausgehöhlte Raum des Metathorax nicht sehr tief, oben punktiert.“

L. 5 mm.

Lapland.

13. **E. nitida** Brischke. 1880 *Limneria nitida* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 150 ♀♂ | 1887 *Limneria tegularis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1107 ♀.

„Glänzend. Kopf und Thorax fein und dicht punktiert. Kopf nach hinten kaum verschmälert, Gesicht weisshaarig. Mesonotum, Schildchen und Brustseiten ziemlich grob punktiert, Seiten des Prothorax und der Mittelbrust unter den Flügeln gestreift; Metathorax glänzend, runzlig, nur das Basalfeld beiderseits mit Leisten; der ausgehöhlte Raum ziemlich tief, nach Thomson glänzend, nach Brischke mit Querrunzeln. Areola länger oder kürzer gestielt, den rücklaufenden Nerv vor der Mitte aufnehmend. Das 1. Segment länger als die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus etwas länger als breit, mit fast parallelen Seiten, das 2. Segment etwas länger als breit, Bohrer halb so lang

wie der Hinterleib. — Schwarz, Palpen und Mandibeln rötlichgelb. Tegulä schwarz, beim ♂ rötlich gerandet; Stigma braun. Beine rötlich, Hüften und Trochanteren schwarz. Die hintersten Schienen an der Basis weisslich, selten an der äussersten Spitze gebräunt, Hintertarsen gewöhnlich mit braunroten Gliederspitzen.“

L. 8—9 mm.

Nord- und Mitteleuropa; mir noch nicht vorgekommen.

14. **E. xanthostoma** Grav. 1829 *Campoplex xanthostomus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 460 ♂ | 1887 *Limneria xanthostoma* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1107 ♀♂.

Die vorhergehende, diese und die folgende Art bilden die 2. Gruppe der Eulimneria-Arten, ausgezeichnet durch folgende Merkmale: Mandibeln lang und kräftig, gegen das Ende wenig verschmälert. Area basalis quadratisch. Die hintersten Schienen rot, an der Basis weisslich, ohne dunkle Zeichnung, Tarsen hellgeringelt. Klauen lang, fast unbewehrt.

Kopf und Thorax schwach glänzend, Hinterleib mit stärkerem Glanz. Kopf kurz, nach hinten etwas verschmälert; Fühler ziemlich kurz, gegen das Ende verdünnt. Metathorax mit starken Leisten, Costula deutlich, der ausgehöhlte Raum ziemlich flach, fein quergerunzelt, mit der Area superomedia verschmolzen, an den Seiten mit scharfer Randleiste. Areola gestielt, der rücklaufende Nerv bei meinen Exemplaren ziemlich weit hinter der Mitte. Postpetiolus ziemlich stark gewölbt, an den Seiten gerundet; das 2. Segment fast um die Hälfte länger als breit, das 3. fast quadratisch; Bohrer so lang wie der halbe Hinterleib. — Schwarz; Mandibeln und Palpen rötlichgelb. Tegulä weisslich. Stigma bräunlichgelb. Schenkel und Schienen gelbrot, die Mittel- und Hinterschienen an der Basis weisslich, am Ende mit einer Spur von Bräunung; die Tarsen gegen das Ende verdunkelt. Beim ♂ die Vorderhüften am Ende gelblich.

L. 7—8 mm.

Einzeln durch fast ganz Europa.

15. **E. pineticola** Thoms. 1887 *Limneria pineticola* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1108 ♀.

Zu dieser Art vergleiche man die Beschreibung der vorhergehenden; sie ist von derselben hauptsächlich durch die Struktur des Metathorax verschieden. — Kopf nach hinten etwas verschmälert; Fühlergeissel fadenförmig. Felderung des Metathorax undeutlich, Costula fast fehlend, der ausgehöhlte Raum schmal, ziemlich seicht, schwach

gerunzelt, an den Seiten kaum gerandet. — Schwarz, Mandibeln und Tegulä gelblich; Schenkel und Schienen rot, die hintersten Schienen an der Basis weisslich, Hintertarsenglieder mit heller Basis.

L. 6 mm.

Scheint weit verbreitet zu sein. Thomson führt sie von Lund in Schweden an und ich selbst fand sie auf Corfu; das Exemplar von daher hat Thomson vorgelegen.

### 23. Gen. **Pyracmon** Holmgr.

1858 Pyracmon Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV p. 326 (partim).

Kopf kubisch, hinter den Augen nicht verschmälert, zuweilen fast verbreitert; Wangen lang und aufgetrieben; Augen klein, Gesicht nach unten oft verbreitert; Clypeus vorn gewöhnlich winkelig zugespitzt; Mandibeln kurz und kräftig; Fühler kurz und im Verhältnis dünn, faden- oder fast borstenförmig. Thorax cylindrisch; Metathorax mit starken Leisten, Area superomedia lang, mit der Costula vor der Mitte; Luftlöcher rund. Vorderflügel mit grosser, meist sitzender und pentagonaler Areola; Nervellus stark antefurcal und deutlich gebrochen und einen deutlichen Nerv aussendend. Beine kräftig, Schenkel verdickt, Schienen mit kurzen Sporen, Klauen und Klauenglied kräftig. Hinterleib gestreckt, das 1. Segment wenig gebogen, die Spirakeln kurz hinter der Mitte, Petiolus in der Regel allmählich in den Postpetiolus übergehend, das 2. Segment deutlich länger als breit; Bohrer dünn.

Die Gattung Pyracmon nimmt sich fremd zwischen den neben ihr stehenden Gattungen aus. Sie bildet ein Zwischenglied zwischen den Ophioninen und den Xoridinen; meiner Meinung nach würden die meisten Arten überhaupt besser bei den letzteren einzureihen sein, dafür spricht nicht allein die ganze Struktur und der Habitus, besonders der aufgetriebene Kopf und die Beschaffenheit des 1. Segmentes, auch die helle Kopfzeichnung einzelner Männchen, sondern auch die Lebensweise; man trifft nämlich fast alle Arten, vielleicht mit Ausnahme von *P. fumipennis*, an totem Holz, wo sie bei Käfern, speziell Cerambyciden und Buprestiden leben.

#### Uebersicht der Arten.

1. Beine schlank, schwarz, nur die Schienen in der Mitte rötlich. Körper matt, Kopf und Thorax bräunlich behaart. Flügel getrübt. Bohrer von  $\frac{2}{3}$  Hinterleibslänge. 6—7 mm.

##### 1. **bucculentus** Holmgr.

Schenkel und Schienen kräftig, grösstenteils rötlich gefärbt. 2.



2. Tegulä schwarz. Clypeus am Ende abgerundet. 3.  
Tegulä rötlich oder weisslich. Clypeus am Ende in der Mitte winklig vortretend. 5.

3. Schenkel und Schienen rot, ohne dunkle Zeichnung. Beim ♀ das Hinterleibsende gelbrot. 6—9 mm.

2. **fumipennis** Zett.

Schenkel mehr oder weniger dunkel gezeichnet. Segment 3—7 an den Seiten rotbraun. 4.

4. Die vorderen Schenkel unten, die hintersten auch oben an Basis und Spitze schwarz. Kopf hinter den Augen erweitert. Areola breit sitzend, pentagonal. 8 mm.

3. **truncicola** Thoms.

Schenkel nur unten in der Mitte schwarz gefleckt. Scheitel weniger breit. Areola unregelmässig. 7 mm.

4. **lateralis** Thoms.

5. Die hintersten Schenkel und Schienen schwarz. Scheitel stark verbreitert. 8—9 mm.

5. **obscuripes** Holmgr.

Die hintersten Schenkel ganz oder grösstenteils rot. 6.

6. Schenkel und Schienen rot, nur zuweilen die Spitze der hintersten Schienen etwas gebräunt. Areola gestielt. Bohrer länger als der halbe Hinterleib. Gesicht des ♂ nicht weiss. 6—7 mm.

6. **melanurus** Holmgr.

Die hintersten Schienen und Tarsen ausgedehnt braun oder schwärzlich gezeichnet, zuweilen auch die hintersten Kniee verdunkelt. 7.

7. Beim ♀ Hinterrand von Segment 3—6 in der Mitte gelblich-weiss. Beim ♂ Gesicht, Orbiten zum Teil, die vorderen Hüften, Trochanteren und Tarsen, sowie eine grosse Brustmakel weiss. 9—10 mm.

7. **pectoralis** Kriechb.

Hinterleibssegmente des ♀ nicht mit weisslichem Hinterrand. ♂ ohne grosse weisse Brustmakel. 8.

8. Die hintersten Schienen ganz braun. Bohrer etwas länger als der halbe Hinterleib. Beim ♂ das Gesicht weiss. 8—9 mm.

8. **xoridiformis** Holmgr.

Die hintersten Schienen an Basis und Spitze, seltener an der ganzen Aussenseite braun. Bohrer von  $\frac{3}{4}$  Hinterleibslänge. Beim ♂ das Gesicht schwarz, selten mit 2 gelblichen Längsstreifen. 9—10 mm.

9. **austriacus** Tschek.

1. **P. bucculentus** Holmgr. 1858 *Limneria bucculenta* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. p. 63 ♀ | 1887 *Pyracmon bucculentus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1110 ♀♂.

Fein runzlig-punktiert, wenig glänzend, Kopf und Thorax bräunlich-pubescent. Kopf nach hinten nicht verschmälert; Gesicht nach unten breiter werdend; Wangen aufgetrieben, weit unter die Augen herabreichend; Clypeus am Ende breit abgerundet, fast abgestutzt; Fühler ziemlich kräftig; fadenförmig, etwas länger als der halbe Körper. Thorax schmaler als der Kopf, Metathorax beiderseits mit je 2 mehr oder weniger deutlich getrennten Feldern. Areola im Vorderflügel kurz gestielt oder fast sitzend, der rücklaufende Nerv fast in der Mitte mündend. Beine schlanker als bei den übrigen Arten. Das 1. Segment länger als die hintersten Hüften und Trochanteren. Postpetiolus etwas länger als breit; das 2. Segment etwas länger als breit; das 3. quadratisch; Bohrer ziemlich gerade, etwas länger als der halbe Hinterleib. — Schwarz. Flügel deutlich getrübt, mit braunem Stigma. Beine schwarz, nur die Schienen in der Mitte rötlich.

L. 6–7 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten. Mir noch nicht vorgekommen.

2. **P. fumipennis** Zett. 1838 *Porizon fumipennis* Zetterstedt, Insect. Lappon. I p. 395 ♀ | 1858 *Pyracmon fumipennis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. p. 101 ♀ | 1858 *Pyracmon melanurus* Holmgren, l. c. p. 102 ♂ (excl. ♀) | 1887 *Pyracmon fumipennis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1109 ♀♂.

Kopf nach hinten nicht erweitert; Clypeus undeutlich vom Gesicht getrennt, flach, am Ende breit abgerundet, mit deutlichen Basalgruben; Fühler fadenförmig, länger als der halbe Körper. Brustseiten mit deutlichem Speculum; Metathorax fast vollständig gefeldert, die Leisten ziemlich schwach, Area superomedia gestreckt, annähernd sechseitig, Area posteromedia leicht eingedrückt. Areola sitzend oder ganz kurz gestielt, fast regelmässig. Nervellus stark gebrochen und einen deutlichen Nerv aussendend. Hinterleib so lang wie Kopf und Thorax, gegen das Ende schwach seitlich zusammengedrückt; das 1. Segment schwach gebogen, Petiolus breit, Postpetiolus etwas länger als breit, leicht convex; das 2. Segment etwas länger als breit, an der Basis mit deutlichen Gastrocölen; das 3. Segment quadratisch; Bohrer etwas länger als das 1. Segment. — Schwarz, graulich pubescent; Palpen und Mitte der Mandibeln rötlichgelb. Flügel etwas getrübt, Stigma braun; Tegulä schwärzlich. Beine rot, Hüften und Basis der Trochanteren schwarz. Beim ♀ Endrand des 2. Segmentes

rötlich, das 3. Segment mit rötlichem Endrand und meist auch mit rötlichen Seiten, die folgenden Segmente rötlich, auf dem Rücken meist verdunkelt. Beim ♂ ist der Hinterleib ganz schwarz, höchstens die Einschnitte etwas heller.

L. 6—9 mm.

Die häufigste von allen Arten und weit verbreitet; man findet sie mit Vorliebe auf Grasplätzen u. s. w.

3. **P. truncicola** Thoms. 1887 *Pyracmon truncicola* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1109 ♀.

„Schwarz, Schenkel zum Teil und Schienen braunrot, Segment 3—7 mit schmalem rötlichem Endrand und rotbraunen Seiten. Brustseiten lederartig matt. — Dem *Pyracmon fumipennis* ähnlich, aber der Kopf nach hinten verbreitert, Areola im Vorderflügel ziemlich breit sitzend, pentagonal; Vorderschenkel unten, die hintersten auch oben an der Basis und Spitze schwarz gezeichnet.

L. 8 mm.

Bisher nur in Schweden gefunden.“ (Thomson.)

4. **P. lateralis** Thoms. 1887 *P. lateralis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1109 ♀.

„Schwarz, Segment 3—7 an den Seiten, Schenkel und Schienen braunrot, Schenkel an der Unterseite in der Mitte schwarz gefleckt. — Dem *P. truncicola* sehr ähnlich, aber Scheitel weniger breit, nach hinten nicht erweitert, Bohrer etwas länger, Brustseiten fein gerunzelt, Flügel mit unregelmässiger Areola.

L. 7 mm.

Schweden.“ (Thomson.)

5. **P. obscuripes** Holmgr. 1858 *Pyracmon obscuripes* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. p. 102 ♀ | 1887 *Pyracmon obscuripes* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 110 ♀.

Im Habitus an *P. fumipennis* erinnernd, aber der Kopf nach hinten mehr aufgetrieben. Clypeus vorn beiderseits leicht gebuchtet und dadurch winklig vortretend.

Körper fast matt, mit graulicher Behaarung. Schwarz; Palpen und Mandibeln rötlichgelb. Flügel schwach getrübt, mit braunem Stigma; Tegulä rötlich bis bräunlich. Die vorderen Schenkel und Schienen rötlich, die mittleren zuweilen mehr bräunlich; die hintersten Beine schwärzlich, die Spitze der Trochanteren und die äusserste Basis der Schenkel gewöhnlich rötlich.

L. 8—9 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten. Ich fand diese Art voriges Jahr an Holzstämmen bei Seis in Südtirol.

6. **P. melanurus** Holmgr. 1858 *Pyracmon melanurus* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. p. 102 ♀ (excl. ♂) | 1887 *Pyracmon melanurus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1110 ♀ | ? 1829 *Campoplex megacephalus* Gravenhorst, Ichneum. Europ. III p. 502 ♀♂.

Diese Art, welche mir nur der Beschreibung nach bekannt ist, bildet nach Thomson einen Uebergang zu *Nemeritis macrocentrus*. Der Kopf ist stark aufgetrieben, der rücklaufende Nerv mündet fast am Ende der nicht sitzenden Areola; das 2. Hinterleibssegment erweitert sich deutlich nach hinten, Segment 3—7 mehr und mehr seitlich zusammengedrückt; Bohrer länger als der halbe Hinterleib. Wenig glänzend, fein graulich pubescent. Schwarz, Palpen und Mandibeln gelblichweiss. Flügel etwas getrübt, mit braunem Stigma; Tegulä weisslich. Schenkel und Schienen rot, auch die Trochanteren am Ende hell.

L. 6—7 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

7. **P. pectoralis** Kriechb. 1890 *Pyracmon pectoralis* Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V p. 484 ♂ | 1904 *Pyracmon pectoralis* Habermehl, Jahresber. Gymn. u. Oberrealsch. Worms p. 32 ♀♂.

Kopf fast kubisch, Clypeus in der Mitte etwas vorstehend, von dem schwach gewölbten Gesichte nicht getrennt, wie dieses dicht punktiert. Scheitel, Schläfen und Wangen breit und sehr fein punktiert. Area superomedia klein, annähernd sechseitig. Areola pentagonal, der rücklaufende Nerv weit hinter der Mitte mündend. Hinterleib glänzend, von der Mitte an seitlich zusammengedrückt; Bohrer kurz.

♀ Schwarz; Mandibeln mit Ausnahme der Spitze, Palpen, die äusserste Basis der Fühler, Tegulä und die Mitte des Hinterrandes der Segmente 3—6 weisslichgelb. Endrand des Clypeus und des 2. Segmentes und die Beine rot; die Spitzen der Mittelschienen und die Mitteltarsen bräunlich; die hintersten Beine braunrot, die äusserste Spitze der Schenkel und Schienen, die Hinterseite der Schienen und die Tarsen braun. Unterseite des Vorderbrust unmittelbar über den Vorderhüften schmal gelbrot.

♂ Schwarz, Mandibeln, Gesicht, Orbiten fast ganz, Wangen und Schläfen, ein Teil des Scheitels, die beiden Basalglieder der Fühler, eine grosse Brustmakel, die vorderen Hüften, Trochanteren und Tarsen und die Tegulä weisslich. Beine sonst rot, die vorderen mehr gelblich, die hintersten Schienen aussen und die Tarsen braun. Stigma gelblich.

L. 9—10 mm, Bohrer 3 mm.

Mitteleuropa, besonders Alpengebiet. Lebt nach Kriechbaumer in *Anthaxia quadripunctata*.

8. **P. xoridiformis** Holmgr. 1858 *Pyracmon xoridiformis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. p. 103 ♀♂ | 1887 *Pyracmon xoridiformis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1119 ♀♂.

Kopf stark aufgetrieben, nach hinten verbreitert; Clypeus vorn in der Mitte fast zahnartig vorspringend. Felderung des Metathorax wenig deutlich, beim ♂ nach Brischke's Angabe deutlich. Hinterleib gegen das Ende zusammengedrückt; Bohrer dünn, länger als der halbe Hinterleib. — Schwarz; Palpen und Mandibeln gelblich. Flügel leicht getrübt, Stigma rötlichgelb, Tegulä gelblich. Beine rot, Basis der Vorderhüften schwärzlich; die hintersten Hüften fast ganz, Schienen und Tarsen schwärzlich. — Beim ♂ Mund, Gesicht, Wangen, Schaft unten und Tegulä gelblich-weiss. Vorderbeine rötlichgelb, die hintersten rötlich, Hüften grösstenteils schwarz, Schienen und Tarsen mehr oder weniger braun.

L. 8—9 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten. Ich besitze die Art aus dem Alpengebiete.

9. **P. austriacus** Tschek. 1871 *Pyracmon austriacus* Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI p. 62 ♀.

Ich habe diese Art in einer Anzahl von Exemplaren Anfang Juli 1908 an Holzstämmen einer Schneidemühle bei Seis in Südtirol gefangen und kann deshalb die Beschreibung vervollständigen und namentlich auch die des bisher noch unbekannten ♂ geben.

Kopf und Thorax sehr fein runzlig-punktiert, ziemlich glänzend, wenig behaart. Kopf kubisch, hinter den Augen erweitert; Fühler fast von Körperlänge, dünn borstenförmig, die Basalglieder der Geissel sehr gestreckt, die Endglieder nicht länger als breit, das letzte Glied rundlich; Clypeus nicht vom Gesicht getrennt, ziemlich glänzend und mit wenigen Punkten, in der Mitte des Endrandes winklig vorgezogen. Brustseiten lederartig, mit feiner Punktierung; Speculum deutlich. Metathorax fein gerunzelt, mit 5 deutlichen Feldern, Area superomedia dreiseitig, hinten offen. Radialzelle gestreckt, Radius an der Basis und am Ende leicht geschwungen. Areola unregelmässig, sitzend, der rücklaufende Nerv kurz vor dem Ende mündend. Nervellus bei allen meinen Exemplaren deutlich unter der Mitte, nach Tschek dagegen fast in der Mitte gebrochen. Hinterleib von der Mitte an deutlich von der Seite zusammengedrückt, an der Basis durch feine Runzelung fast matt, gegen das Ende glänzend; das 2. Segment um die Hälfte, das 3. wenig länger als breit; Bohrer etwa von

$\frac{3}{4}$  Hinterleibslänge. — Schwarz; Mundteile rötlich. Flügel schwach getrübt, Stigma schwarzbraun, Tegulä rostrot. Beine rötlich, Hüften schwärzlich; bei meinen ♀ die Schenkel an der Basis oben gelblich; an den hintersten Beinen die Spitze der Schenkel, die Basis und Spitze der Schienen und die Tarsen verdunkelt. Bei den ♀ ist diese Verdunkelung sehr schwach und eine scharfe Trennung von *P. melanurus* ist, wie mir scheint, nicht gut möglich. — Bei dem ♂ ist das Gesicht schwarz, meist mit Spuren von zwei gelben Längsstreifen unter der Fühlerbasis; bei einem Exemplar sind diese Streifen ganz deutlich. Die dunkle Zeichnung der hintersten Beine ist deutlicher als beim ♀, variiert aber ebenfalls sehr. Bei einzelnen Exemplaren ist nur die Basis und Spitze der Schienen, bei anderen die ganze Aussenseite braun.

L. 10—11 mm.

Mittleres Europa; selten.

## 24. Gen. *Rhimphoctona* Först.

1868 *Rhimphoctona* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 153.

Noch fremdartiger als *Pyracmon* nimmt sich die vorliegende Gattung unter den Ophioniden, speziell unter den Campopleginen aus. Der Anfänger wird eher eine grössere Tryphonide darin erblicken. Die einzige hierher gehörende Art fällt schon durch die abnorme Grösse von den übrigen Gattungen auf. Im Habitus schliesst sich die Gattung an *Pyracmon* an und unterscheidet sich hauptsächlich durch die länglichovalen Luftlöcher des Metathorax.

Kopf nicht kubisch, sondern quer, hinter den Augen deutlich verbreitert. Fühler dick borstenförmig, von  $\frac{3}{4}$  Körperlänge; Clypeus kurz, nicht vom Gesicht getrennt, in der Mitte des Endrandes stumpf zahnartig vorspringend. Brustseiten mit ziemlich mattem Speculum. Metathorax deutlich gefeldert; Area superomedia und posteromedia mit einander verschmolzen und von sehr starken Leisten umgeben; Costula wenigstens beim ♂, das ich allein vergleichen kann, deutlich. Radialzelle sehr gestreckt, fast 3 mal so lang als breit; Areola breit sitzend, den rücklaufenden Nerv fast im äussersten Winkel aufnehmend; Nervellus unter der Mitte stark gebrochen und einen kräftigen Nerv aussendend. Fussklauen an der Basis mit deutlichen Kammzähnen. Bohrer weit vorstehend.

***R. fulvipes*** Holmgr. 1858 *Pyracmon fulvipes* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. p. 102 ♂ | 1887 *Pyracmon fulvipes* Thomson, Opusc.

Entom. XI p. 1109 ♀♂ | 1871 Pyracmon (Rhimphoctona?) rufipes  
Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI p. 63 ♀.

Kopf und Thorax dicht runzlig-punktiert, matt, bräunlich-grau pubescent. Hinterleib an der Basis dicht und fein gerunzelt, matt, gegen das Ende glatter und glänzender. Bohrer von  $\frac{3}{4}$  Hinterleibslänge. — Schwarz; Fühlergeißel, namentlich an der Unterseite, bräunlich. Mandibeln und Palpen rötlich. Flügel schwach getrübt, das lange, schmale Stigma braun; Tegulä rostrot. Die ganzen Beine rötlich, die hintersten Schienen und Tarsen zuweilen schwach verdunkelt.

L. 12—15 mm.

Nord- und Mitteleuropa; sehr selten. Ich habe vor vielen Jahren ein einziges ♂ hier in Thüringen gefangen; seit dieser Zeit ist mir das Tier nicht wieder vorgekommen.

## 25. Gen. **Anempheres** Först.

1868 Anempheres Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 154.

Diese und die beiden folgenden Gattungen sind dadurch ausgezeichnet, dass die Luftlöcher des 2. Segmentes hinter der Mitte liegen. Von Idechthis und Lathrosticus ist die vorliegende Gattung durch das grob runzlige, nicht gefelderte Metanotum unterschieden. In seinen hinterlassenen Schriften giebt Förster die folgende Diagnose der Gattung: „Thyridien des 2. Segmentes gross, weit von der Basis abliegend. Luftlöcher des 2. und 3. Segmentes nahe am Seitenrande; auf dem 2. Segmente liegen dieselben weit hinter der Mitte; das 2. Segment 2 mal so lang wie am Ende breit. Metathorax nicht gefeldert, verlängert, konisch. Der längere Sporn der Hinterschienen  $\frac{2}{3}$  der Länge des Metatarsus betragend. Areola im Vorderflügel kurz gestielt; die beiden Abschnitte des Radius einen sehr stumpfen Winkel bildend; Stigma sehr schmal. Das 5. Tarsenglied der Hintertarsen kaum länger als das 4. und um  $\frac{1}{3}$  kürzer als das 3. Glied. Fussklauen gekämmt. Bohrer kaum über die Hinterleibsspitze hervorragend. Augen innen neben der Fühlerbasis ziemlich ausgerandet.“

Eine Art ist nicht beschrieben.

## 26. Gen. **Idechthis** Först.

1868 Idechthis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 154.

Diese Gattung ist wie Anempheres und Lathrosticus dadurch ausgezeichnet, dass die Luftlöcher des 2. Segmentes hinter der

**Mitte liegen.** Von der vorhergehenden Gattung unterscheidet sie sich durch das nicht grob gerunzelte und deutlich gefelderte Metanotum, sowie durch den weit vorragenden Bohrer. Von *Lathrostizus* ist sie verschieden durch die Lage des Nervus parallelus, welcher aus oder etwas unter der Mitte der Brachialzelle entspringt und durch den langen Sporn der Hinterschienen, welcher das 2. Tarsenglied an Länge übertrifft.

Eine weitere Notiz über diese Gattung findet sich nicht, ebensowenig die Beschreibung einer Art.

## 27. Gen. **Lathrostizus** (Först.) Thoms.

1868 *Lathrostizus* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 154.

1887 *Lathrostiza* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1152.

Kopf nach hinten verschmälert; Clypeus mit kleinen Seitenrinnen; Fühlergeissel dünn, fadenförmig. Thorax gestreckt, Metathorax deutlich gefeldert. Mittelbrust hinten mit einem gegabelten Fortsatze. Areola im Vorderflügel klein, gestielt, unregelmässig; Basalnerv fast vertikal, Nervus parallelus oberhalb der Mitte der Brachialzelle entspringend; Nervellus vertikal, nicht gebrochen. Beine ziemlich kräftig, Schienen mit ungleichen Endsporen, der lange Sporn der Hinterschienen nicht länger als das 2. Tarsenglied. Hinterleib spindelförmig, Petiolus mit deutlichen Seitengrübchen, Postpetiolus fast doppelt so breit aber wenig länger als der Petiolus; das 2. Segment nicht länger als am Ende breit; Bohrer vorstehend, dick und gekrümmt.

Die Gattung ähnelt im Habitus der Gattung *Angitia*. Durch den zweitheiligen Fortsatz am Ende der Mittelbrust ist sie leicht zu erkennen; auch die Stellung des Nervus parallelus ist charakteristisch.

### Uebersicht der beiden Arten.

Die mittleren Hinterleibssegmente rot gerandet. Bohrer deutlich länger als der Petiolus. Die hintersten Schenkel unten ohne grosse schwarze Makel.

#### 1. **sternocerus** Thoms.

Hinterleib ganz schwarz. Bohrer kaum länger als der Petiolus, dick und stark gebogen. Die hintersten Schenkel unten mit grosser schwarzer Makel.

#### 2. **forticauda** Thoms.

1. **L. sternocerus** Thoms. 1887 *Lathrostiza sternocera* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1152 ♀♂.

Schwarz. Endrand des Clypeus, Unterseite des Schaftes, der Pedicellus und Schulterbeulen gelblich. Beine rotgelb,



Hüften schwarz; Vorderhüften an der Spitze, die vorderen Trochanteren, die Basis der hintersten Schienen und Metatarsen gelblichweiss: bei meinen Exemplaren die äussersten Spitzen der Hinterschienen und eine Makel unterhalb der weisslichen Schienebasis gebräunt. Die mittleren Hinterleibssegmente meist rötlich gerandet.

L. 5—6 mm.

Schweden; nördliches Deutschland bis Thüringen. Ich habe die Art in 2 Exemplaren hier bei Blankenburg gefangen. Wurde nach Thomson aus Gallen von *Salix caprea* und *alba* gezogen.

2. **L. forticauda** Thoms. 1887 *Lathrostiza forticauda* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1153 ♀.

„Schwarz, Beine rot und gelblich gezeichnet. Bohrer dick, stark gebogen, kaum länger als der Petiolus. — Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, aber Bohrer kürzer, die hintersten Schenkel unten mit grösserer schwarzer Makel, der Hinterleib breiter und ganz schwarz.

L. 6 mm.“

Die Art ist bis jetzt nur in Lappland gefunden worden.

## 28. Gen. *Synetaeris* Först.

1868 *Synetaeris* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 155.

1887 *Synetaeris* Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1114.

Kopf mit etwas aufgetriebenen, ziemlich langen Wangen; Mandibeln kräftig; Clypeus mit tiefen Seitengruben; Fühler schlank, bei den bekannten Arten mit ganz schwarzem Schaft. Thorax gestreckt, Metathorax gefeldert, mit deutlicher Costula. Stigma im Vorderflügel breit, Radius fast vor der Mitte entspringend, der Endabschnitt desselben lang, mit dem Basalabschnitt fast einen rechten Winkel bildend; Nervulus und Nervellus sehr schief stehend; Nervus parallelus unterhalb der Mitte der Brachialzelle entspringend. Beine schlank, Schiensporen an Länge gleich. Hinterleib länglich spindelförmig, Petiolus fast ohne Seitengrübchen, Postpetiolus wenig breiter und deutlich kürzer als der Petiolus; das 2. Segment länger als breit, nur bei einer Art breiter als lang; Bohrer gekrümmt.

### Uebersicht der Arten.

1. Tegulä weiss. Die hintersten Schenkel rot oder schwärzlich. 2.
- Tegulä schwarz. Alle Schenkel rot. 3.

2. Die hintersten Schenkel schwarz. Vorderhüften schwärzlich. Das 2. Segment um  $\frac{1}{3}$  länger als breit.

1. **sepiella** Holmgr.

Alle Schenkel rot. Die vorderen Hüften und Trochanteren weisslich. Das 2. Segment kürzer als breit.

2. **albicoxis** n. sp.

3. Areola ziemlich breit, fast sitzend. Der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle fast ein rechter. Bohrer länger als der halbe Hinterleib.

3. **carbonella** Thoms.

Areola gestielt. Der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle fast spitz. Bohrer so lang wie der halbe Hinterleib.

4. **heteropus** Thoms.

1. **S. sepiella** Holmgr. 1858 *Limneria sepiella* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. p. 63 ♀♂ | 1887 *Synetaeris sepiella* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1115 ♀♂.

Von allen Arten ausgezeichnet durch die schwärzlichen Hinterschenkel. Kopf nach hinten kaum verschmälert; Gesicht quer, nach unten etwas verbreitert; Fühler etwas länger als der halbe Körper, gegen die Spitze wenig verdünnt. Thorax gedrungen; Metathorax kurz, mit starken Leisten; Area superomedia fünfseitig, hinten offen. Areola im Vorderflügel sitzend, beim ♂ weniger deutlich; Nervellus gebrochen. Das 1. Hinterleibssegment kräftig, wenig gebogen, fein gerunzelt, matt; das 2. Segment um  $\frac{1}{3}$  länger als breit, das 3. quer; die folgenden Segmente glänzender; Bohrer etwas länger als der halbe Hinterleib, leicht gekrümmt. — Wenig glänzend, fein graulich pubescent, schwarz; Mund, Tegulä und Bauchfalte gelblich. Flügel leicht getrübt, Stigma dunkel. Vorderbeine rötlichgelb, Hüften schwärzlich, auch die Schenkel an der Basis unten meist gebräunt; die hintersten Beine schwärzlich, die Spitze der Trochanteren und die Mitte der Schienen breit rötlich, auch die Basis der Tarsenglieder heller.

L. 5 mm.

Scheint nur aus Schweden bekannt zu sein; es ist die einzige Art, die mir nicht vorgekommen ist.

2. **S. albicoxis** n. sp.

Kopf und Thorax fast matt, fein und dünn weisslich pubescent. Kopf nach hinten schwach verschmälert; Fühler fadenförmig, gegen das Ende verdünnt, fast so lang wie der Körper. Brustseiten fein runzlig-punktiert, mit deutlichem Speculum; Metathorax kurz, hinten ziemlich steil

abfallend; vollständig gefeldert, die Leisten sehr kräftig; Area superomedia pentagonal, kaum länger als breit, hinten geschlossen. Endabschnitt des Radius doppelt so lang als der Basalabschnitt, letzterer stark gebogen; Areola dreieckig, ziemlich lang gestielt, der Stiel dick, rücklaufender Nerv kurz vor dem Ende mündend; Nervulus weit hinter der Gabel, wie der Nervellus sehr schräg, letzterer tief unten gebrochen, der ausgehende Nerv sehr undeutlich. Hinterleib an der Basis sehr schwach, gegen das Ende stärker glänzend; das 1. Segment mit Längsfurche; Petiolus kräftig, Postpetiolus so lang wie breit, mit fast geraden Seiten; das 2. Segment etwas kürzer als breit, die folgenden stark quer, mehr und mehr von der Seite zusammengedrückt; Bohrer dick, so lang wie das 1. Segment. — Schwarz; Palpen, Mandibeln und Tegulä gelblichweiss. Stigma braun. Beine rötlich, die vorderen Hüften und alle Trochanteren gelblichweiss, Mittelhüften an der Basis schwärzlich; die hintersten Schienen an der äussersten Basis blass, am Ende schwach gebräunt, auch die hintersten Tarsen verdunkelt. Hinterleib mit blassen Einschnitten, das 3. Segment beiderseits an der Basis bräunlich durchschimmernd.

L. 5 mm.

Ich fand ein ♀ in den an seltenen Schlupfwespen reichen Badeanlagen von Blankenburg Anfang September zwischen Erlengebüsch.

3. **S. carbonella** Thoms. 1887 *Synetaeris carbonella* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1115 ♀♂.

Ausgezeichnet durch die schwarzen Tegulä und die sitzende Areola.

Kopf und Thorax fein runzlig-punktiert, matt, nur ganz schwach pubescent. Kopf nach hinten nicht verschmälert; Fühler von  $\frac{3}{4}$  Körperlänge, kräftig, gegen das Ende kaum verdünnt. Brustseiten matt, runzlig-punktiert, auch das Speculum runzlig und nur schwach glänzend; Metathorax kurz, die Leisten nicht so kräftig wie bei *S. albicoxis*, Area superomedia hinten offen. Radius an der Basis stark, am Ende schwach gebogen; Areola unregelmässig, sitzend, der rücklaufende Nerv deutlich hinter der Mitte mündend; Nervulus interstitial, Nervellus tief unten gebrochen, der ausgehende Nerv undeutlich. Der ganze Hinterleib fein runzlig-punktiert, nur die Endsegmente schwach glänzend. Petiolus schlanker als bei den übrigen Arten, Postpetiolus länger als breit, mit ziemlich geraden Seiten; das 2. Segment länger als breit, die folgenden quer; Bohrer etwas länger als der halbe Hinterleib, — Schwarz. Palpen und

Mandibeln rötlichgelb. Tegulä schwärzlich, Stigma braun. Hüften und Basis der Trochanteren schwarz, die übrigen Beine, auch die hintersten Tarsen rötlich.

L. 5—6 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten. — Ich besitze ein Exemplar von Blankenburg.

4. **S. heteropus** Thoms. 1887 Synetaeris heteropus Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1115 ♀♂.

Nach Thomson von *S. carbonella* verschieden durch das bräunlichgelbe Stigma, die gestielte Areola, den fast spitzen unteren Aussenwinkel der Discoidalzelle und den etwas kürzeren Bohrer. Ich habe in Thüringen ein ♀ gefangen, das eine langgestielte Areola besitzt, nach Thomson's Diagnose also zu *S. heteropus* gehört. Ich kann nun in der Farbe des Stigmas keinen Unterschied von *S. carbonella* finden, ebensowenig finde ich den Aussenwinkel der Discoidalzelle und die Bohrerlänge verschieden. Ich glaube also nicht, dass wir es mit zwei verschiedenen Arten zu tun haben. Leider besitze ich nur je ein ♀. Die hintersten Tarsen sind bei beiden rötlich.

L. 5 mm.

Nord- und Mitteleuropa.

## 29. Gen. **Biolysia** Schmiedekn.

1907 Biolysia Schmiedeknecht, Hymen. Mitteleurop. p. 601.

Kopf nach hinten wenig verschmälert; Wangen ziemlich lang; Mandibeln kräftig, mit spitzen Zähnen; Clypeus mit grossen und tiefen Seitengruben. Thorax gedrungen; Mesonotum stark bucklig. Metathorax schwach gefeldert, mit undeutlicher Costula. Endabschnitt des Radius wenig länger als der Basalabschnitt; Basalnerv fast vertikal; Areola rhombisch, gestielt. Der rücklaufende Nerv vor der Mitte mündend; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle fast ein rechter. Nervulus und Nervellus ziemlich schräg, letzterer deutlich gebrochen und einen Nerv aussendend. Beine schlank. Hinterleibsstiel lang und dünn, ohne Seitengrübchen. Postpetiolus wenig länger als breit; Bohrer kaum vorstehend.

Im Habitus eng mit *Canidia* verwandt, mit dieser Gattung auch übereinstimmend durch die grossen Seitengruben des Clypeus; verschieden durch den kaum vorstehenden Bohrer und die kleine gestielte Areola. Die einzige Art ist überdies leicht kenntlich durch die hellen Segmentränder.

**B. marginella** Thoms. 1887 *Nepiesta marginella* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1117 ♀.

Schwarz, auch die Mandibeln, nur die Palpen etwas bräunlich. Stigma im Vorderflügel gelblich. Beine rötlich, Hüften, Trochanteren, die vorderen Schenkel an der Basis, die hintersten mit Ausnahme der Spitze schwarz; Spitzen der Hinterschienen und Hintertarsen gebräunt. Die vorderen Segmente mit schmalem rötlichen, die hinteren mit weisslichem Endrande; Bauchfalte gelblich.

L. 5—6 mm.

Verbreitet. Nach Thomson im Norden selten; hier bei Blankenburg ziemlich häufig aber nur kurze Zeit anzutreffen und zwar Ende April und Anfang Mai auf Wiesen, grasigen Plätzen u. s. w.

### 30. Gen. **Canidia** (Holmgr.) Thoms.

1858 *Canidia* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. p. 103.

1887 *Canidia* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1111.

1900 *Canidiella* Ashmead, Canad. Entomol. XXXII p. 368.

Anmerk. Es liegt kein Grund vor, statt *Canidia* einen neuen Namen einzuführen. Thomson's Auffassung der Gattung weicht in der Hauptsache nicht von der Holmgren'schen ab.

Körper klein und gedrungen. Kopf nach hinten wenig verschmälert, mit in der Regel etwas aufgetriebenen Wangen; Mandibeln kräftig; Clypeus am Ende abgerundet, mit grossen und tiefen Seitengrübchen; Gesicht mit parallelen Seiten; Fühler kurz und kräftig, Schaft bei den bekannten Arten schwarz. Thorax kurz und bucklig; Metathorax schwach gefeldert; Costula undeutlich oder fehlend; Area posteromedia weit hinaufreichend. Tegulä meist schwarz. Basalnerv ziemlich senkrecht; Areola bei den meisten Arten sitzend, pentagonal; Stigma ziemlich breit, meist gelblich; Nervellus schräg, schwach gebrochen. Beine ausgedehnt schwarz gefärbt; Schiensporen kurz. Hinterleib schräg, nur bei einer Art mit roter Mitte. Hinterleibsstiel flach, ohne Seitengrübchen, Postpetiolus deutlich abgesetzt; das 2. Segment kurz, gewöhnlich mit rötlichem Endrand; Bohrer kurz, nur bei einer Art Hinterleibslänge erreichend.

#### Uebersicht der Arten.

1. Areola sitzend. Meist nur das 2. Segment mit rötlichem Endrand. Tegulä meist schwärzlich. 2.

Areola gestielt. Hinterleibssegmente fein hell gerandet. Tegulä gelblich. 12.

2. Segment 2—4 fast ganz, Schenkel und Schienen rot. 4 mm.  
1. **balteata** Thoms.

Nur das 2. Segment, selten auch das 3. und 4. mit rötlichem Endrand. Die hintersten Schenkel schwarz. 3.

3. Segment 2 und 3 oder 2—4 mit rotem Endrand. Vorderbeine mit Ausnahme der Hüften rot, Mittelschenkel mit schwarzer Basis. Die hintersten Schenkel schwarz, die hintersten Schienen rot, nahe der Basis und an der Spitze schwarzbraun. Bohrer kürzer als das 1. Segment. 5 mm.

2. **cingulata** Brischke.

Nur das 2. Segment mit rötlichem Endrand. 4.

4. Bohrer kaum vorragend. 5.  
Bohrer mindestens so lang wie  $\frac{1}{3}$  Hinterleib. 6.

5. Hinterleib ganz schwarz. Beine grösstenteils schwarz, Vorderschenkel nur am Ende hell, die hintersten Schienen nur in der Mitte aussen weisslich. Eine der grössten Arten; 5 mm.

3. **corvina** Thoms.

Segment 2 am Ende, 3 an der Basis rot. Vorderschenkel fast ganz hell; Schienen hell, die hintersten wenig dunkel gezeichnet. Kaum 4 mm.

4. **anura** Thoms.

6. Bohrer so lang wie der Hinterleib, dieser glänzend. Das 2. Segment länger als breit. Beine wenig hell gezeichnet. 4 mm.

5. **quinqueangularis** Ratzeb.

Bohrer höchstens von halber Hinterleibslänge. 7.

7. Schienen rötlich. Vorderschenkel zum grössten Teil hell. 8. Die hintersten Schienen in der Mitte weisslich, an Basis und Spitze schwärzlich. 9.

8. Stigma im Vorderflügel breit. Bohrer nur von  $\frac{1}{3}$  Hinterleibslänge. 4 mm.

6. **contracta** Thoms.

Stigma schmal. Bohrer von halber Hinterleibslänge. 4 mm.

7. **stenostigma** Thoms.

9. Kopf von vorn gesehen dreiseitig, nach unten verlängert. Bohrer von  $\frac{1}{3}$  Hinterleibslänge, stark gekrümmt.

8. **rostrata** Thoms.

Kopf nach unten nicht auffallend verlängert. 10.

10. Das 2. Segment quer, kürzer als breit; Bohrer von  $\frac{1}{3}$  Hinterleibslänge.

9. **curculionis** Thoms.

Das 2. Segment quadratisch oder länger als breit; Bohrer von halber Hinterleibslänge oder nur sehr wenig kürzer. 11.

11. Postpetiolus an den Seiten abgerundet, convex. Das 2. Segment länger als breit. Tegulä gelblichweiss. 4 mm.

10. **subcincta** Grav.

Postpetiolus mit ziemlich geraden Seiten. Das 2. Segment quadratisch. Tegulä schwärzlich, nur beim ♂ zuweilen weisslich. 4 mm.

11. **exigua** Grav.

12. Vorderschenkel und Schienen rot, erstere an der Basis schwarz. Bohrer nur wenig vorragend. 5 mm.

12. **immolator** Grav.

Hinterschienen in der Mitte weisslich, an Basis und Spitze dunkel gezeichnet. 13.

13. Hinterleib kaum hell gezeichnet. Die hintersten Schienen weisslich, an der Basis und am Ende sowie auf der Innenseite schwärzlich. Vorderschenkel fast ganz, Mittelschenkel am Ende rötlich. 5—6 mm.

13. **tristis** Grav.

Segment 2—7 mit weisslichem Endsaum. Die hintersten Schienen nur aussen in der Mitte und der Trochantellus weisslich. Vorderschenkel und Spitze der Mittelschenkel rot. 5 mm.

14. **trochantella** Thoms.

1. **C. balteata** Thoms. 1887 Canidia balteata Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1113 ♀♂.

Anmerk. Thomson führt bei Beschreibung dieser Art als Autor Bridgman in Klammern an. Nun finde ich nirgends eine von Bridgman gegebene Beschreibung, auch Dalla-Torre ist eine solche unbekannt. Ich nehme deshalb Thomson als Autor an.

Diese Art ist von allen ausgezeichnet durch die rote Hinterleibsmitte. Dies genügt, um die Art trotz der sehr kurzen Beschreibung leicht erkennen zu lassen. Die Areola im Vorderflügel ist sitzend. Segment 2—4 fast ganz, sowie Schenkel und Schienen rot.

L. 4 mm.

Die Art ist bis jetzt nur aus Mitteleuropa bekannt; Thomson gibt sie für Frankreich an, ich habe sie auch hier in Thüringen in einigen Exemplaren gefunden.

2. **C. cingulata** Brischke. 1880 *Canidia cingulata* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 176 ♀.

„Matt, Hinterleib glänzender. Kopf kurz, hinter den Augen nicht schmaler. Areola sitzend, fünfseitig, den rücklaufenden Nerv in der Mitte aufnehmend, Radius fast gerade, Nervellus unter der Mitte gebrochen, der ausgehende Nerv sehr undeutlich. Das 1. Segment so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren, Postpetiolus mit parallelen Seiten, Segment 2—4 gleich breit, die folgenden seitlich zusammengedrückt, Segment 2 nur wenig länger als breit; Bohrer kürzer als das 1. Segment, gekrümmt. — Schwarz; Stigma gelblich. Schenkel, Schienen und Tarsen der vorderen Beine rot, Mittelschenkel mit schwarzer Basis, Mittelschienen mit bräunlicher Spitze, auch die Mitteltarsen bräunlich; Hinterschienen nahe der Basis und an der Spitze, ebenso die Hintertarsen schwarzbraun, diese mit roter Basis. Segment 2 und 3 oder 2—4 mit schmalem roten Hinterrande.

L. 5 mm.

Deutschland.“

3. **C. corvina** Thoms. 1887 *Canidia corvina* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1111 ♀♂.

Eine der grössten Arten der Gattung. Scheitel nach hinten nicht verschmälert, Wangen ziemlich aufgetrieben. Stigma im Vorderflügel breit, Areola sitzend. Thyridien des 2. Segmentes undeutlich. — Schwarz, an den Vorderbeinen die Schenkel an der Spitze, die vordersten auch auf der Oberseite und die Schienen gelblich; Mittel- und Hinterschienen aussen in der Mitte, Mittelschienen auch an der Basis weisslich. Das 2. Segment mit rötlichem Endrand. Bohrer kaum vorstehend.

L. 5 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

4. **C. anura** Thoms. 1887 *Canidia anura* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1113 ♀♂.

Kopf nach hinten nicht verschmälert; Fühlergeissel ungefähr 24 gliedrig. Stigma im Vorderflügel schmal. Schiensporen fast die Mitte des Metatarsus erreichend. Hinterleib pubescent, das 2. Segment mit grossen, hell durchschimmernden Thyridien; Bohrer kaum vorstehend. — Schwarz, Vorderschenkel fast ganz, sowie Schienen und Tarsen hell gefärbt, die hintersten Schienen kaum dunkel gezeichnet, Segment 2 am Ende, 3 an der Basis rot.



In dem kurzen Bohrer stimmt diese Art mit *C. corvina* überein, unterscheidet sich aber durch geringere Grösse, rot gezeichneten Hinterleib, kaum dunkel gefärbte Hinterschienen, durch das schmale Stigma und die grossen Thyridien. Die beiden letzten Merkmale hat sie mit *C. stenostigma* gemeinsam, welche Art sich leicht durch den längeren Bohrer unterscheidet.

L. kaum 4 mm.

Deutschland.

5. ***C. quinqueangularis*** (Ratzeb.) Brischke. 1852 *Campoplex quinqueangularis* Ratzeburg, *Ichneum. d. Forstins.* III p. 82 ♀ | 1880 *Canidia quinqueangularis* Brischke, *Schrift. d. naturf. Ges. Danzig N. F.* IV p. 175 ♀♂ | 1887 *Canidia quinqueangularis* Thomson, *Opusc. Entom.* XI p. 1112 ♀.

Diese Art ist ausgezeichnet durch den glatten und glänzenden, ziemlich stark seitlich zusammengedrückten Hinterleib, wodurch die Art an die Gattung *Thersilochus* erinnert. Das 2. Segment ist etwas länger als breit. Hinterschenkel ziemlich stark verdickt. Ueber die Länge des Bohrers sind die Angaben verschieden. Ratzeburg sagt: „Bohrer von mehr als halber Hinterleibslänge,“ dagegen sagt Brischke „Bohrer kürzer als das 1. Segment“ und schliesslich Thomson „Bohrer nicht kürzer als der Hinterleib.“ Bei meinen Exemplaren aus Thüringen finde ich ihn wenig kürzer als den Hinterleib. Areola sitzend, ziemlich regelmässig pentagonal; Stigma breit. — Schwarz. Vorderchenkel am Ende und die Vorderschienen rötlich, Hinterschienen nur in der Mitte hell. Viel heller gibt Brischke die Farbe der Beine an; nach ihm sind dieselben rot, Hüften, Trochanteren und Basis der Hinterschenkel schwarz; Spitze der Hinterschienen und die Hintertarsen schwarzbraun. Bei einer Varietät sollen auch die Hinterschenkel ganz rot sein. Segment 2, zuweilen auch 3, gewöhnlich hinten fein rot gerandet.

L. 4—5 mm.

Nord- und Mitteleuropa. — Die Exemplare, welche Ratzeburg beschrieben hat, stammten von Brischke; dieser hatte sie aus den Larven von *Phytonomus arundinis* gezogen.

6. ***C. contracta*** Thoms. 1887 *Canidia contracta* Thomson, *Opusc. Ent.* XI p. 1113 ♀.

Diese Art ist ausgezeichnet durch die rötliche Färbung der Hinterschienen; darin stimmt sie mit *C. stenostigma* überein, die sich durch das schmale Stigma und den etwas längeren Bohrer unterscheidet. Areola sitzend; Stigma

breit. Das 2. Segment fein runzlig, matt. Bohrer von  $\frac{1}{3}$  Hinterleibslänge. — Schwarz; Vorderschenkel zum grössten Teil und die Schienen rötlich; die hintersten Schienen am Ende verdunkelt.

L. kaum 4 mm.

Wurde bei Lille in Frankreich gefunden.

7. **C. stenostigma** Thoms. 1887 *Canidia stenostigma* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1114 ♀♂.

Diese Art ist wie *C. anura* durch folgende Merkmale ausgezeichnet: Geissel ungefähr 24gliedrig. Stigma schmal. Schiensporen fast die Mitte des Metatarsus erreichend. Hinterleib pubescent, das 2. Segment mit grossen, durchscheinenden Thyridien. Das 6. und 7. Segment schwach ausgerandet. Bohrer von halber Hinterleibslänge. — Schwarz. Vorderschenkel grösstenteils, Trochanteren am Ende und die Schienen blass rötlich, die hintersten Schienen nur wenig dunkel gezeichnet.

L. kaum 4 mm.

Bei Aachen von Förster gefunden.

8. **C. rostrata** Thoms. 1887 *Canidia rostrata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 112 ♀♂.

Kopf von vorn gesehen dreieckig, nach unten etwas verlängert; Wangen nicht aufgetrieben. Stigma im Vorderflügel breit, Areola sitzend. Thyridien des 2. Segmentes kaum sichtbar. Bohrer von  $\frac{1}{3}$  Hinterleibslänge, ziemlich stark gekrümmt. — Schwarz. Vorderschenkel mit Ausnahme einer Makel an der Basis, Mittelschenkel an der Spitze und die Schienen rötlichgelb, Schienen am Ende breit verdunkelt, die hintersten auch nahe an der Basis mit dunklem Ring.

L. 4—5 mm.

Schweden; ich habe auch in Thüringen Exemplare gefangen, die ich auf diese Art beziehe.

9. **C. curculionis** Thoms. 1887 *Canidia curculionis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1113 ♀ | 1858 *Canidia subcincta* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 103 ♀♂ (non Gravenhorst).

Kopf quer, nach hinten kaum verschmälert. Stigma im Vorderflügel breit, Areola sitzend. Hinterleib wenig zusammengedrückt, mit feiner und ziemlich dichter Behaarung. Postpetiolus quer, doppelt so breit als der Petiolus; auch das 2. Segment quer. — Schwarz; das 2. Segment hinten mit rötlichem Einschnitt. Stigma im Vorderflügel bräun-

lichgelb, Tegulä braun. Vorderschenkel rötlichgelb, Mittelschenkel nur am Ende; Schienen gelblichweiss, am Ende, die hintersten auch nahe der Basis verdunkelt.

L. 4 mm.

Die Art ist weit verbreitet und eine der häufigsten der Gattung.

10. **C. subcincta** Grav. 1829 *Campoplex subcinctus* Gravenhorst, Ichneum. Europ. III p. 494 ♀ | 1880 *Canidia subcincta* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 175 ♀.

Holmgren verwechselt diese Art mit der vorigen; sie unterscheidet sich von dieser hauptsächlich durch das längere 2. Segment. Der Postpetiolus ist convex und an den Seiten abgerundet. Der Bohrer ist etwas kürzer als der halbe Hinterleib. Areola im Vorderflügel schmal sitzend. — Schwarz; Hinterrand des 2. Segmentes schmal rötlich. Tegulä gelblichweiss. Die vorderen Schenkel und Schienen rötlich gelb, die Mittelschenkel nur am Ende, Schienen am Ende verdunkelt; die hintersten Beine schwarz, die Schienen in der Mitte und an der äussersten Basis weisslich.

L. 4 mm.

Deutschland.

Gravenhorst scheint übrigens zwei verschiedene Arten vor sich gehabt zu haben. Bei dem einen ♀ gibt er das 2. Segment als fast doppelt so lang als breit, bei dem anderen als nur wenig länger als breit an.

11. **C. exigua** Grav. 1829 *Campoplex exiguus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 499 ♀ | 1858 *Canidia pusilla* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. p. 104 ♀♂ | 1880 *Limneria exigua* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 159 ♀♂ | 1887 *Canidia exigua* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1112 ♀♂.

Körper sehr wenig behaart und deshalb glänzender erscheinend. Kopf nach hinten fast verschmälert; Fühlergeissel ziemlich dünn, etwa 18gliedrig, die Glieder verschieden. Areola im Flügel sitzend. Hinterleib ziemlich zusammengedrückt, Postpetiolus mit beinahe geraden Seiten, das 2. Segment etwa so lang als breit; Bohrer von halber Hinterleibslänge. — Schwarz, das 2. Segment hinten fein rötlich gerandet. Tegulä braun, nach Thomson beim ♂ auch weisslich. Die vorderen Schenkel und Schienen gelblich, die Schienen fast weisslich, Mittelschenkel nur am Ende; Hinterschienen schwärzlich, in der Mitte aussen breit weisslich.

L. 4 mm.

Nord- und Mitteleuropa; eine der häufigeren Arten.

12. **C. immolator** Grav. 1829 *Campoplex immolator* Gravenhorst, *Ichneum. Eur.* III p. 491 ♀♂ | 1872 *Limneria immolator* Marshall, *Catal. Brit. Hymen.* p. 56 | 1880 *Canidia immolator* Brischke, *Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F.* p. 179 ♀.

Diese und die beiden folgenden Arten unterscheiden sich von der vorhergehenden durch die gestielte Areola. *C. immolator* selbst ist von *tristis* und *trochantella* leicht durch die Färbung der Beine zu unterscheiden. — Fühler etwas länger als der halbe Körper. Areola klein, regelmässig, gestielt. Hinterleib etwas länger und schmaler als der Thorax; Petiolus ziemlich dick, Postpetiolus deutlich breiter und nur wenig kürzer als der Petiolus. Bohrer sehr kurz, nur wenig über die Hinterleibsspitze vorragend. — Schwarz; Stigma im Vorderflügel und Tegulä gelblich. Beine schwarz, Vorder- und Mittelschenkel, alle Schienen und Vordertarsen rötlich, Vorderschenkel an der Basis schwarz, Hinterschenkel mit rötlicher Spitze. Das 2. Hinterleibssegment mit rötlichem Endrande.

L. 5 mm.

Die Art ist aus Mitteleuropa nachgewiesen; mir ist sie nie vorgekommen.

13. **C. tristis** Grav. 1829 *Campoplex tristis* Gravenhorst, *Ichneum. Eur.* III p. 492 ♀♂ | 1872 *Limneria tristis* Marshall, *Catal. Brit. Hymen.* p. 58 | ? 1880 *Canidia tristis* Brischke, *Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F.* p. 175 ♀.

Der Unterschied dieser Art von *C. trochantella* Thoms. ist in der Bestimmungstabelle angegeben; ob sich freilich dieser Unterschied durchführen lässt, ist noch sehr die Frage, ich wenigstens besitze Exemplare, wo man nicht weiss, zu welcher Art man sie stellen soll. Ob Gravenhorst's Exemplare alle zu derselben Art gehören, ist auch noch fraglich, da er auch Exemplare mit sitzender Areola anführt. Die von Brischke als *L. tristis* beschriebene Art stelle ich mit Fragezeichen hierher, da er die Tegulä als schwarz und die Areola als 5seitig angibt. — In der Körpergestalt und dem kurzen Bohrer stimmt die Art mit der vorhergehenden überein, übertrifft sie aber etwas an Grösse. Stigma im Vorderflügel braun, also dunkler als bei *C. immolator*. Hüften, Trochanteren, Mittel- und Hinterschenkel und Basis der vordersten schwarz; die vordersten Schienen rötlichgelb, Mittel- und Hinterschienen gelblichweiss, an der Basis und Spitze, sowie auf der Innenseite schwarz. Beim ♂ sind Mittel- und Hinterschenkel auf der Unterseite zum Teil braunrot; die hintersten Schienen sind schwarz, auf der Mitte der Aussenseite und an der äussersten Basis weisslich. Von einer hellen Hinterleibsfärbung, wie sie Thomson bei *C. trochantella* anführt, gibt Gravenhorst nichts an.

L. 5–6 mm.

Gravenhorst's Exemplare stammten von Turin und Genua.

14. **C. trochantella** Thoms. 1887 *Canidia trochantella* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1114 ♀.

„Areola im Vorderflügel regelmässig, gestielt. Area superomedia kurz, fünfseitig. — Schwarz, die vordersten Schenkel mit Ausnahme der Basis und die mittleren Schenkel an der Spitze rot; Hinterschienen aussen in der Mitte und der Trochantellus gelblichweiss. Tegulä weiss. Segment 2—7 mit weisslichem Endsaum. — Nur das ♀ bekannt.

L. 5 mm.

Nicht selten im mittleren und südlichen Europa bis zu den Pyrenäen.“

Schon Thomson spricht die Vermutung aus, dass diese Art möglicherweise identisch mit *C. tristis* Grav. ist.

Die von Brischke (Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. (1880) p. 176) nach einem ♂ aufgestellte *Canidia umbrata* gehört gar nicht hierher, da die Areola im Vorderflügel fehlt. Es ist das wieder ein Fall von den vielen recht unnötigen Beschreibungen.

### 31. Gen. **Nemeritis** Holmgr.

1858 *Nemeritis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. P. 8, p. 104.

Kopf von vorn gesehen rundlich; Wangen ziemlich aufgetrieben; Clypeus mit kleinen Seitengruben; Scheitel ziemlich breit; Mandibeln klein, gelblich; Fühler lang und dünn, Schaft unten gewöhnlich gelblich. Thorax langgestreckt, mehr oder weniger cylindrisch; Metathorax über die Basis der Hinterhüften hinaus verlängert, gefeldert, die Leisten schwach, Area superomedia lang, pentagonal, die Costula vor der Mitte aufnehmend. Tegulä immer weiss. Basal- und Cubitalnerv divergierend, der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle ziemlich spitz, Areola klein. Nervellus schwach gebrochen. Beine schlank, die hintersten dicker und weit länger als die vorderen, Schienen mit kurzen und ungleichen Sporen, nur bei *N. lissonotoides* die Sporen ziemlich lang; Klauenglied und Klauen klein. Hinterleib lang und schmal, das 1. Segment wenig gekrümmt, ohne Seitengrübchen, Postpetiolus wenig breiter als der Petiolus; das 2. Segment lang, weit länger als das 3., gegen das Ende deutlich verbreitert und meist rötlich gerandet. Bohrer dünn, meist von Hinterleibslänge.

#### Uebersicht der Arten.

1. Die hintersten Schenkel rot. Bohrer meist von Hinterleibslänge. 2.

Die hintersten Schenkel schwarz oder braun. 7.

2. Beine mit Einschluss der Hüften ganz rot. Hinterleib sehr gestreckt, das 2. Segment fast 3 mal, das 3. Segment nicht ganz 2 mal so lang als breit. Bohrer von  $\frac{2}{3}$  Hinterleibslänge. 7 mm.

1. **rufipes** Bridgm.

Hüften schwarz, nur die Vorderhüften zuweilen am Ende gelb; die hintersten Schienen mehr oder weniger ausgedehnt braun. 3.

3. Bohrer länger als der Körper. Basalhälfte von Segment 2 und 3 verschwommen rot. Kleine Art von 4 mm Länge.

cf. 6. **lissonotoides** n. sp.

Bohrer höchstens von Hinterleibslänge. Hinterleibsmitte nicht ausgedehnt rot. 4.

4. Scheitel breit, nach hinten kaum verschmälert. Die vorderen Trochanteren und Hüften an der Spitze gelb; die hintersten Schienen rötlich, an der Basis gelblich, dahinter und an der Spitze schwärzlich. Bohrer fast von Hinterleibslänge. 6 mm.

2. **sordida** Grav.

Scheitel nach hinten deutlich verschmälert und zugerundet. Hinterschienen mit anderer Zeichnung. 5.

5. Vorderhüften schwarz, an der Spitze nicht gelb; nur der Trochantellus rot. Die hintersten Schienen schwarzbraun, ohne Spur einer helleren Zeichnung. Bohrer etwas länger als der halbe Hinterleib. 9 mm.

3. **raphidia** Kriechb.

Die vordersten Hüften an der Spitze und die Trochanteren gelb. Mittel- und Hinterschienen braun, an der Basis weisslich, selten in der Mitte schwach rötlich. 6.

6. Bohrer wenig kürzer als der Hinterleib. Das 2. Segment hinten fein rötlich gerandet. Beim ♂ die Vorderbeine an der Basis und die hintersten Schienen in der Mitte gelblich.

4. **macrocentra** Grav.

Bohrer kaum länger als der halbe Hinterleib. Das 2. Segment ohne rötlichen Endsaum. Beim ♂ die Vorderhüften an der Basis schwarz. 6—8 mm.

5. **caudatula** Thoms.

7. Bohrer länger als der Körper. Basalhälfte von Segment 2 und 3 verschwommen rot. Hinterschenkel rotbraun. Kleine Art von 4 mm Länge.

6. **lissonotoides** n. sp.

Bohrer höchstens von Hinterleibslänge. 8.

8. Das 2. Segment nicht länger als hinten breit, mit breitem roten Endsaum. Bohrer fast so lang wie der Hinterleib. Sehr kleine Art von nur 3 mm Länge.

7. **lativentris** Thoms.

Das 2. Segment deutlich länger als breit. Grössere Arten. 9.

9. Bohrer fast so lang wie der Hinterleib. Die hintersten Beine schwarz, die Trochanteren gelb, die Schienen in der Mitte trüb rot. 5 mm.

8. **stenura** Thoms.

Bohrer so lang wie der halbe Hinterleib. 10.

10. Hinterleib schwarz. Beine wenig hell gezeichnet. Gesicht nach unten verschmälert. 4 mm.

9. **convergens** Thoms.

Hinterleib am Ende, sowie die Vorderbeine rötlich. Alle Trochanteren und die Vorderhüften gelb. 6—7 mm.

10. **canescens** Grav.

1. **N. rufipes** Bridgm. 1883 *Nemeritis rufipes* Bridgman, Trans. Ent. Soc. London p. 166 ♀.

Diese Art kommt am nächsten der *N. macrocentra* und unterscheidet sich besonders durch die ganz roten Beine und die längeren Hinterleibssegmente.

Kopf quer, hinter den Augen verschmälert; Fühler von etwa  $\frac{3}{4}$  Körperlänge. Metathorax mit 5 Feldern; Area superomedia länger als breit; abschüssiger Raum etwas ausgehöhlt. Area im Vorderflügel gestielt, rücklaufender Nerv hinter der Mitte mündend; Nervellus kaum gebrochen. Hinterleib lang und schlank, fast 2 mal so lang als Kopf und Thorax zusammen; das 1. Segment länger als die hintersten Hüften und Trochanteren, das 2. Segment fast 3 mal so lang als breit, das 3. nicht ganz 2 mal so lang als breit, das 4. und 5. quadratisch. Bohrer ungefähr  $\frac{2}{3}$  der Hinterleibslänge. — Schwarz; Beine rot, die äusserste Spitze der Tarsen braun. Stigma im Vorderflügel hellbraun.

L. 7 mm.

England.

2. **N. sordida** Grav. 1829 *Campoplex sordidus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 466 ♀ | 1872 *Limneria sordida* Marshall, Catal. Brit. Hymen. p. 58 ♀ | 1887 *Nemeritis sordida* Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1118 ♀♂.

Diese Art ist besonders durch den breiten, nach hinten kaum verschmälerten Scheitel und die Zeichnung der hintersten Schienen ausgezeichnet. — Fühler etwa von  $\frac{3}{4}$  Körperlänge. Areola im Vorderflügel ziemlich unregelmässig, fast sitzend oder kurz gestielt. Hinterleib schmaler

als der Thorax, so lang als Kopf und Thorax zusammen; Postpetiolus doppelt so lang als breit; Bohrer von Hinterleibslänge oder nur wenig kürzer. — Schwarz; Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich; Fühlerschaft unten rötlich. Tegulä blassgelb, Stigma im Vorderflügel bräunlichgelb. Beine rötlich; Hüften schwarz, die vordersten am Ende rötlichgelb; Trochanteren gelb, die hintersten an der Basis schwarz; die hintersten Schenkel zuweilen mit schwärzlicher Endmakel; die hintersten Schienen an der Basis gelblich, dahinter und an der Spitze breit schwärzlich, in der Mitte trüb rostrot; die hintersten Tarsen braun.

L. 6 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

3. **N. raphidiae** Kriechb. 1892 Nemeritis raphidiae Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII p. 234 ♀.

Körper mit äusserst feiner lederartiger Skulptur, mit mattem Seitenschimmer, welcher durch die feine weissliche Behaarung hervorgerufen wird, die besonders auf dem Metathorax ziemlich dicht ist. Hinterleibsende mehr und mehr glänzend. Kopf nach hinten verschmälert, breiter als der Thorax. Dieser fast  $2\frac{1}{2}$  mal so lang wie breit. Area basalis schmal, länglich viereckig, Area superomedia etwas breiter, einer kleinen Flasche ähnlich, als deren Hals die Area basalis betrachtet werden kann, an die Area superomedia schliesst sich, etwa die hintere Hälfte einnehmend, die bedeutend grössere, fast ovale Area posteromedia an. Alle diese 3 Felder sind mehr oder weniger mit einander verschmolzen. Die oberen Seitenfelder sind durch feine Leisten von einander geschieden. Flügel stark irisierend; Areola fast dreieckig, schief, den rücklaufenden Nerv fast am Ende aufnehmend; Nervellus ziemlich weit unter der Mitte gebrochen. Hinterleib von der Mitte des 3. Segmentes an stark zusammengedrückt, das 1. Segment länger als Hüften und Trochanteren, Petiolus und Postpetiolus fast von gleicher Länge, letzterer mit einer seichten Mittelfurche; das 2. Segment wenigstens doppelt so lang als breit, nach hinten kaum erweitert. Bohrer etwas länger als der halbe Hinterleib. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Schenkel und die vordersten Schienen rötlich; die hinteren Schienen und Tarsen schwarzbraun, die Schienen ohne Spur eines helleren Ringes. Tegulä weisslich. Stigma im Vorderflügel braun.

L. 9 mm.

Die Art wurde bei München aufgefunden; sie schmarotzt bei Larven von *Raphidia*.



4. **N. macrocenta** Grav. 1829 *Campoplex macrocentrus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 519 ♀ | 1858 *Nemeritis macrocentra* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 105 ♀ | 1880 *Nemeritis macrocentra* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 177 ♀ ♂ | 1887 *Nemeritis macrocentra* Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1118 ♀ ♂ | 1829 *Campoplex gracilis* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 511 ♂.

Körper fein lederartig punktiert, wenig glänzend. Kopf weniger stark aufgetrieben als bei *N. sordida*, nach hinten verengt; Fühler etwas länger als der halbe Körper, gegen das Ende kaum verdünnt. Thorax langgestreckt, Metathorax deutlich gefeldert, Area superomedia länger als breit, hinten zuweilen offen. Nervellus schwach gebrochen. Hinterleib gegen das Ende nur wenig zusammengedrückt, das 1. Segment etwa so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren, leicht gebogen; Postpetiolus fast doppelt so breit wie der Petiolus, länger als breit; das 2. Segment weit länger als breit, fein gerunzelt und wenig glänzend; das 3. Segment ungefähr so lang als breit, die folgenden quer; Bohrer so lang als der Hinterleib oder wenig kürzer. — Schwarz; Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich. Fühlerschaft unten rötlichgelb. Stigma im Vorderflügel bräunlich. Tegulä gelblichweiss. Vorderbeine rötlich, Hüften schwarz, am Ende gelblich, Trochanteren gelb; Mittelschienen an der Basis weisslich, dahinter und am Ende verschwommen braun. Hinterbeine rötlich, Hüften schwarz, Trochanteren gelblich; die hintersten Schienen rostrot bis braunrot, an der Basis weisslich, dahinter und an der Spitze verdunkelt; die hintersten Schenkel zuweilen an der Spitze schwärzlich, zuweilen auch aussen dunkel gestreift, nach Holmgren zuweilen grösstenteils oder ganz schwarz. Der Einschnitt zwischen dem 2. und 3. Segmente rötlich.

Beim ♂ sind die vorderen Hüften und Trochanteren blassgelb, Mittelhüften an der Basis schwarz; die hintersten Schienen an der Basis schmal, in der Mitte breit gelblich.

L. 5–7 mm.

Nord- und Mitteleuropa; die Art gehört zu den häufigeren.

5. **N. caudatula** Thoms. 1887 *Nemeritis caudatula* Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1119 ♀ ♂.

Von dieser Art gibt Thomson die folgende kurze Beschreibung: „Der *N. macrocentra* Grav. in Gestalt und Färbung sehr ähnlich, aber Bohrer kaum länger als der halbe Hinterleib, das 2. Segment ohne rötlichen Endrand, Area superomedia länger und die hintersten Schenkel ohne dunkle Zeichnung. Beim ♂ sind die vorderen Hüften an der Basis schwarz.

L. 6–8 mm.

Seltener als *N. macrocentra*.“ Mir ist die Art noch nicht vorgekommen.

6. ***N. lissonotoides* n. sp.**

Ein merkwürdiges Tierchen, das sich durch seinen langen Bohrer unter den Limnerien ganz fremdartig ausnimmt; beim ersten Anblick glaubt man ein zu den Pimplinen gehöriges Tier vor sich zu haben. Am besten passt es noch zu *Nemeritis*, wenn es auch hier einen etwas fremden Eindruck macht. Auf jeden Fall widerstrebt es mir, eine neue Gattung daraus zu machen, da wir deren schon genug in dieser schwierigen Gruppe haben.

Kopf im Verhältnis zum übrigen Körper auffallend gross, breiter als der Thorax und viel breiter als der Hinterleib. Scheitel breit, nach hinten nur schwach verschmälert, hinten breit ausgerandet; Fühler sehr dünn, etwas länger als der halbe Körper, gegen das Ende nicht verdünnt, die Basalglieder der Geissel etwa 4 mal so lang als breit, die folgenden nach und nach kürzer werdend, die vorletzten Glieder so lang als breit, das Endglied etwas länger. Augen gross, oval, ihre Innenränder parallel. Wangen so lang wie die Breite der Mandibelbasis. Clypeus mit kleinen Seitengruben; Clypeusrand glatt und glänzend, in der Mitte etwas vorgezogen. Kopf und Thorax mit sehr feiner lederartiger Skulptur, matt, nur das Schildchen und zum Teil der Metathorax schwach glänzend; Speculum mit etwas stärkerem Glanz aber nicht poliert. Metathorax von der Basis der Area superomedia nach hinten abfallend, der abschüssige Teil in der Mitte mit Längsvertiefung; Area superomedia hinten nicht geschlossen. Die Seitenfelder des Metathorax durch eine deutliche Costula getrennt. Metathorax wenig über die Basis der Hinterhüften hinausreichend. Areola im Vorderflügel ziemlich gross, fast regelmässig pentagonal, Nervulus etwas hinter der Gabel und ziemlich schräg; Nervellus bei manchen Exemplaren sehr deutlich, bei anderen nur schwach gebrochen. Der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle fast ein rechter. Vorderbeine schlank, die hintersten weit länger und kräftiger. Dadurch gehört die Art am besten zur Gattung *Nemeritis*. Der innere Sporn der hintersten Schienen fast die Mitte des Metatarsus erreichend. Hinterleib sehr lang und schmal, spindelförmig, nach hinten zugespitzt, die Endsegmente seitlich zusammengedrückt; das 1. Segment fast  $\frac{1}{3}$  der Hinterleibslänge ausmachend, leicht gebogen, Postpetiolus  $1\frac{1}{2}$  mal so lang als breit, schwach glänzend, doppelt so breit als der Petiolus; das 2. Segment doppelt so lang als hinten

breit, fein runzlig, nach hinten ziemlich stark verbreitert; das 3. nach hinten verschmälert,  $1\frac{1}{2}$  mal so lang als vorn breit; die folgenden Segmente nach hinten verschmälert, das 4. etwas länger, das 5. ebenso lang als vorn breit, glatter und glänzender als das 2. und 3. Segment. Bohrer etwa von  $1\frac{1}{4}$  Körperlänge. — Schwarz; Mandibeln zum grössten Teil, Palpen, Flügelwurzel und Tegulä gelblich-weiss. Stigma im Vorderflügel bräunlichgelb. Beine mit Ausschluss der Hüften rötlich, die vorderen Hüften am Ende gelblich; die hintersten Trochanteren an der Basis schwarz; die hintersten Schenkel verschwommen schwarzbraun, bei einigen Exemplaren nur die Ober- und Unterseite mit schwarzem Längsstreif; die hintersten Schienen unterhalb der Basis und am Ende, ebenso das Ende der hinteren Tarsenglieder dunkelbraun. Das 2. und 3. Segment mehr oder weniger ausgedehnt verschwommen rötlich und zwar meist die Basishälfte dieser beiden Segmente.

Var. ♀. Der Aussenerv der Areola rudimentär.

L. 4 mm. — ♂ bis jetzt unbekannt.

Von dieser merkwürdigen Art habe ich verschiedene Exemplare in Thüringen gefangen, namentlich an den trockenen Abhängen des Greifensteins bei Blankenburg.

7. **N. lativentris** Thoms. 1887 *Nemeritis lativentris* Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1119 ♀♂.

Diese Art ist ausgezeichnet durch ihre Kleinheit und durch das kurze 2. Segment. Thomson's Beschreibung lautet: „Körper klein, Postpetiolus kaum länger als breit, auch das 2. Segment nicht länger als hinten breit, Bohrer fast von Hinterleibslänge. — Schwarz; Vorderbeine grösstenteils hell, die hintersten Schenkel schwärzlich, das 2. Segment mit ziemlich breitem rotem Endrand.

L. 3 mm.

Schweden.“

8. **N. stenura** Thoms. 1887 *Nemeritis stenura* Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1119 ♀.

Scheitel nach hinten verschmälert. Im Vorderflügel Stigma und Radialzelle ziemlich schmal. Postpetiolus ziemlich flachgedrückt, das 2. Segment länger als breit, mit abstehenden Härchen besetzt. Bohrer fast von Hinterleibslänge. — Schwarz; Fühlerschaft unten kaum hell gezeichnet. Vorderbeine grösstenteils hell, die hintersten Beine schwarz, die Trochanteren gelb, die Schienen in der Mitte trüb rot.

L. 5 mm.

Schweden.

9. **N. convergens** Thoms. 1887 Nemeritis convergens Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1120 ♀.

Die Beschreibung, welche Thomson von dieser Art gibt, besteht nur aus wenigen Zeilen, immerhin sind darin einige charakteristische Merkmale angegeben, die die Art erkennen lassen: „Schwarz; Vorderbeine mit geringer heller Zeichnung, Gesicht verschmälert, Areola im Vorderflügel sitzend, Bohrer nur halb so lang als der Hinterleib.

L. 4 mm.

Ungarn.“

10. **N. canescens** Grav. 1829 Campoplex canescens Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 555 ♀ | 1887 Nemeritis canescens Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1120 ♀♂.

Von schlanker Gestalt und namentlich durch den langen und dünnen Hinterleibsstiel, wodurch die Art an Phaedroctonus transfugus erinnert, ausgezeichnet. — Kopf gräulich pubescent; Fühler etwas länger als der halbe Körper. Flügel kurz, Areola gestielt, dreieckig. Hinterleib doppelt so lang als der Thorax und nur halb so breit wie dieser, stark von der Seite zusammengedrückt; Petiolus sehr lang, Postpetiolus breiter und fast um die Hälfte kürzer als der Petiolus. Bohrer etwas länger als der halbe Hinterleib. — Schwarz; Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich. Fühlerschaft unten rötlichgelb gefleckt. Stigma im Vorderflügel braun; Tegulä blassgelb. Die vordersten Beine rötlich, Hüften und Trochanteren gelb; die mittleren Beine bräunlichrot, Hüften, Trochanteren und Basis der Schienen gelb; die hintersten Beine schwärzlich oder dunkelbraun, die äusserste Spitze der Hüften und Trochanteren heller. Segment 4—7 an den Seiten und unten rötlich oder gelblich.

L. 6—7 mm.

Südeuropa; Kleinasien.

### 32. Gen. **Phobocampe** Först.

1868 Phobocampe Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 156.  
1887 Phobocampa Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1120.

Kopf kurz, nach hinten deutlich verschmälert; Mandibeln schwärzlich; Clypeus mit kleinen Seitengruben; Wangen kurz; Fühler lang, Schaft unten mehr oder weniger ausgedehnt hell, oft die ganze Unterseite gelb; Geissel fein behaart, gegen das Ende verdünnt. Thorax bucklig, Brust quer, Schulterbeulen hell, Mesopleuren fein gerunzelt, Metathorax kurz, mit feinen Leisten, Area superomedia quer, hinten meist offen, Area petio-

laris bis über die Mitte hinaufreichend. Tegulä weisslich. Stigma im Vorderflügel gross; Endabschnitt des Radius lang, mit dem Basalabschnitt fast einen rechten Winkel bildend; Areola klein und schräg, mit kurzem und dickem Stiel; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitz; Nervulus und Nervellus sehr schräg nach innen gestellt, der erstere hinter der Gabel, der letztere tief unten gebrochen. Beine ziemlich kräftig; die hintersten Schienen meist weisslich, mit langen Endsporen; Klauenglied und Klauen klein. Das 1. Hinterleibssegment kräftig, ziemlich flach; Postpetiolus fast um die Hälfte kürzer als der Petiolus, quadratisch oder quer; das 2. Segment kurz, höchst selten etwas länger als breit, fast stets mit rötlichem oder gelblichem Endrand; auch das 3. Segment hinten oft hell gerandet; Bauchfalte gelb. Bohrer die Hinterleibsspitze nicht überragend.

Die Gattung Phobocampe ist an der schrägen Stellung des Nervulus und Nervellus, den meist grösstenteils weisslich gefärbten Hinterschienen und den in der Regel rot oder gelb gerandeten mittleren Hinterleibssegmenten leicht zu erkennen. In der Stellung des Nervulus und Nervellus stimmt Phobocampe mit Synetaeris und Spudastica überein; bei Synetaeris sind die Seitengruben des Clypeus gross; Spudastica ist ausgezeichnet durch den ungefelderten Metathorax und den langen, dünnen Hinterleibsstiel.

#### Uebersicht der Arten.

1. Die ganze Unterseite des Schaftes, sowie Vorderhüften blassgelb. Vorderbeine rötlichgelb oder gelb. Das 2. Segment meist deutlich rot gerandet. 2.

Schaft unten höchstens mit hellem Punkt. Der Endrand des 2. Segmentes selten hell gefärbt. Vorderhüften an der Basis schwarz. Die hintersten Schenkel meist schwärzlich. 9.

2. Die hintersten Schenkel schwarzbraun, oben zuweilen braunrot. Die hintersten Hüften schwarz. Die mittleren Segmente ohne deutliche rote Endbinden. 3.

Die hintersten Schenkel rot, höchstens am Ende schwarz. Hinterleib meist mit roten Endbinden. 4.

3. Das 2. Segment mit schmalem rötlichen Endsaum, bei den folgenden Segmenten nur eine schwache Spur davon. Die hintersten Schenkel schwarzbraun, oben zuweilen braunrot. 7 mm.

#### 1. **luctuosa** n. sp.

Zwei Binden des Hinterleibs und die Beine gelb. Die hintersten Schenkel schwarzbraun. 5 mm.

#### 2. **flavicincta** Thoms.

4. Die hintersten Hüften schwarz. 5.

Die hintersten Hüften rot. Das 2. Segment mit rotem Endrand. 8.

5. Die hintersten Schienen rötlich, in der Mitte blassgelb. Das 2. Segment kaum rot gerandet. 5 mm.

3. **alticollis** Thoms.

Die hintersten Schienen weisslich, am Ende breit schwarz, meist auch an der Basis verdunkelt. Das 2. oder auch das 2. und 3. Segment rot gerandet. 6.

6. Das 2. Segment hinten nur ganz schmal rot gerandet. Die hintersten Schienen an der Basis und am Ende breit schwarz. 7 mm.

cf. 1. **luctuosa** n. sp.

Das 2. oder das 2. und 3. Segment deutlich rot gerandet. 7.

7. Nur das 2. Segment mit rotem Endrand. Die hintersten Schenkel rot, am Ende schwarz; die hintersten Schienen an der Basis selten deutlich dunkel gezeichnet. 5 mm.

4. **crassiuscula** Grav.

Das 2. und 3. Segment mit rotem Endrand. Beine mehr rötlichgelb; die hintersten Schenkel selten an der äussersten Spitze schwärzlich; die hintersten Schienen auch an der Basis dunkel gezeichnet. 5 mm.

5. **bicingulata** Grav.

8. Beine rötlichgelb, die hintersten Schenkel rot, die Schienen weiss, an Basis und Spitze dunkel. Postpetiolus am Ende schmal, das 2. Segment am Ende breit rot. 4 mm.

6. **pulchella** Thoms.

Beine rot, die hintersten Schienen aussen gelblich, an Basis und Spitze schwärzlich. Tarsen braun. Postpetiolus grösstenteils und das 2. Segment rot, letzteres an der Basis schwarz. 6 mm.

7. **confusa** Thoms.

9. Alle Schenkel rot; Hüften und die Spitzen der hintersten Schienen schwarz. Das 2. Segment mit ziemlich breitem roten Endrand. Metathorax mit starken Leisten. 8 mm.

8. **Püngeleri** n. sp.

Die hintersten Schenkel schwarz. Endrand des 2. Segmentes kaum hell gezeichnet. 10.

10. Das 2. Segment deutlich länger als breit. Postpetiolus quadratisch. Die hintersten Schienen gelblich, an Basis und Spitze dunkel. 5—6 mm.

9. **obscura** Holmgr.

Das 2. Segment kaum länger als breit. Postpetiolus fast breiter als lang. Die hintersten Schienen beim ♀ schwärzlich, in der Mitte breit gelblich. 4—5 mm.

10. **neglecta** Holmgr.

1. **Ph. luctuosa** n. sp.

Der ganze Körper mit fein lederartiger Skulptur, matt und mit feiner weisslicher Pubescenz, die namentlich im Gesicht, auf dem Metathorax und dem Hinterleibsende stärker hervortritt. Das Speculum an den Brustseiten hat etwas stärkeren Glanz, ist aber nicht poliert. Kopf kurz und quer, nach hinten deutlich verschmälert; Augen gross, die Innenränder parallel, leicht ausgerandet; Fühler länger als der halbe Körper, gegen das Ende deutlich verdünnt; Wangen kürzer als die Breite der Mandibelbasis. Thorax gedrungen und ziemlich bucklig, nicht viel länger als hoch; Metathorax fein lederartig gerunzelt, mit schwachen Leisten; Area superomedia quer, nur durch die beiden vorderen, einen Winkel bildenden Leisten angedeutet, hinten vollständig mit der Area superomedia verschmolzen, letztere flach vertieft. Endabschnitt des Radius doppelt so lang als der Basalabschnitt; Areola ziemlich lang gestielt, klein und schräg, rücklaufender Nerv weit hinter der Mitte mündend; Nervus parallelus aus der Mitte der Brachialzelle; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle sehr spitz. Nervulus weit hinter der Gabel und sehr schräg; Nervellus unter der Mitte schwach gebrochen. Schiensporen sehr lang, der innere über die Mitte des Metatarsus reichend. Postpetiolus so lang als hinten breit, nach hinten verbreitert, die Seiten geradlinig, Oberseite leicht convex, ohne Spur von Eindrücken; das 2. Segment etwas länger als hinten breit, das 3. und 4. quadratisch. Bohrer die Hinterleibsspitze nicht überragend. — Schwarz; Unterseite des Schaftes, der grösste Teil des Pedicellus und die Mandibeln mit Ausnahme der Endzähne blassgelb. Tegulä und Brustbeulen weisslich. Stigma im Vorderflügel braun. Vorderhüften rötlichgelb, die mittleren an der Basis schwärzlich, die hintersten ganz schwarz; Trochanteren gelblichweiss, die hintersten an der Basis schwarz. Die vorderen Schenkel, Schienen und Tarsen rötlichgelb, Mittelschienen am Ende gebräunt. Die hintersten Schenkel schwärzlich, bei dem

einen Exemplar oben verschwommen braunrot. Möglicherweise können auch Exemplare vorkommen mit ganz braunroten Hinterschenkeln. Die hintersten Schienen weisslich, fast die Endhälfte und die Basis breit schwärzlich. Sporen weisslich. Hintertarsen braun, Basis der Glieder gelblichweiss. Hinterleibssegmente vom 2. an mit ganz schmalem rötlichen Endsaum; auf dem 2. Segmente ist derselbe am deutlichsten.

7 mm.

Ich fing zwei Weibchen von dieser Art bei Blankenburg in Thüringen.

2. **Ph. flavicincta** Thoms. 1887 *Phobocampa flavicincta* Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1122 ♀♂.

„Schwarz; Unterseite des Schaftes blassgelb, 2 Binden des Hinterleibs und die Beine rötlichgelb, die hintersten Hüften schwarz, die hintersten Schenkel schwarzbraun, die Schienen und Tarsen gelblichweiss, die Schienen an Basis und Spitze schwärzlich. Postpetiolus quadratisch.— Der *Ph. bicingulata* ähnlich, aber das Gesicht etwas breiter und die hintersten Schenkel schwärzlich.

L. kaum 5 mm.

Schweden.“

3. **Ph. alticollis** Thoms. 1887 *Phobocampa alticollis* Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1121. ♀ | ? 1858 *Limneria tempestiva* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 94 ♀♂.

„Schwarz; Unterseite des Schaftes blassgelb; Beine rötlich, die hintersten Hüften und die Spitze der hintersten Schenkel schwärzlich; die hintersten Schienen in der Mitte breit gelblich. Stigma im Vorderflügel breit. Das 2. Segment hinten nur schwach rot gerandet.

L. 5 mm.

Norddeutschland. — Wurde aus *Hypsipetes elutaria* gezogen.“

*Limneria tempestiva* Holmgren stimmt mit dieser Art so ziemlich überein, doch sind bei der ersteren die hintersten Schienen an Basis und Spitze dunkel gezeichnet, was bei der Thomson'schen Art nicht der Fall ist, wenigstens geht dies aus der kurzen Beschreibung nicht hervor.

4. **Ph. crassiuscula** Grav. 1829 *Campoplex crassiusculus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 531 ♀♂ | 1872 *Limneria crassiuscula*, Marshall, Catal. Brit. Hymen. p. 56 | 1887 *Phobocampa crassiuscula* Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1121 ♀♂.

Von ziemlich gedrungener Gestalt. Der ganze Körper fein weisslich pubescent. Fühler etwas länger als der halbe



Körper; Gesicht breit. Thorax bucklig; Metathorax mit ziemlich undeutlicher Felderung; Area superomedia breit; Brustseiten mit ziemlich mattem Speculum. Areola im Vorderflügel klein, unregelmässig, kurz gestielt. Hinterleib so lang als Kopf und Thorax zusammen; Postpetiolus über doppelt so breit als der Petiolus, rundlich convex. — Schwarz; Palpen, Mandibeln mit Ausnahme der Zähne, Unterseite des Schaftes und des Pedicellus hellgelb. Stigma im Vorderflügel bräunlich; Tegulä weisslich. Vorderbeine rötlichgelb, Trochanteren weisslich; an den hintersten Beinen die Hüften schwärzlich, die Trochantern gelblich-weiss, an der Basis schwarz; Schenkel rot mit schwarzer Spitze, oft auch die Oberseite etwas gebräunt; Schienen weisslich, an der Basis kaum, am Ende breit schwärzlich; Tarsenglieder braun mit weisslicher Basis. Beim ♂ die hintersten Tarsen an der Basis nur wenig hell gezeichnet. Das 2. Segment mit rötlichem Endrand.

L. 5 mm.

Nord- und Mitteleuropa; ziemlich selten. Als Wirte sind zu nennen: *Eupithecia exiguaria*, *satyrata* und *actaeata*, ferner *Dicranura vinula*.

5. **Ph. bicingulata** Grav. 1829 *Campoplex bicingulatus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 527 ♀♂ | 1858 *Limneria bicingulata* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 80 ♀♂ | 1887 *Phobocampa bicingulata* Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1122 ♀♂.

Körper fein lederartig, matt und fein weisslich pubescent. Kopf kurz, quer, nach hinten rundlich verschmälert; Wangen und Schläfen kaum aufgetrieben; Gesicht beim ♀ etwas länger als breit, beim ♂ quadratisch; Fühler fadenförmig, etwas länger als der halbe Körper. Thorax bucklig; Brust quer; Metathorax kurz. Area superomedia schmal, hinten offen; Seitenfelder nicht scharf von einander getrennt; Brustseiten mit ziemlich glänzendem Speculum. Areola im Vorderflügel klein und schief, kurz gestielt oder fast sitzend. Postpetiolus etwa so lang als breit, doppelt so breit als der Petiolus; das 2. Segment kaum länger als breit; das 3. Segment quer, die folgenden Segmente von der Seite zusammengedrückt. — Schwarz; Palpen und Mandibeln mit Ausnahme der Zähne gelblich. Unterseite des Schaftes und des Pedicellus, ebenso die Tegulä gelblichweiss. Stigma im Vorderflügel bräunlichgelb. Vorderbeine rötlichgelb, die Trochanteren mehr gelb; die hintersten Hüften schwärzlich, Schenkel rötlich, an der Spitze kaum dunkel, die Schienen weisslich, hinter der

Basis und an der Spitze breit schwärzlich; Tarsen braun, Basis der Glieder weisslich. Das 2. und das 3. Hinterleibssegment hinten deutlich rot gerandet.

L. 5 mm.

Die häufigste der *Phobocampe*-Arten und über Nord- und Mitteleuropa verbreitet. — Bignell zog sie aus *Hibernia progemmaria*.

6. **Ph. pulchella** Thoms. 1887 *Phobocampa pulchella* Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1121 ♀ ♂ | 1858 *Limneria uncinata* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 81 ♂.

Anmerk. *Campoplex uncinatus* Grav. ♀ gehört nicht zur Gattung *Phobocampe*, da der Bohrer von  $\frac{1}{3}$  Hinterleibslänge ist. Das ♂ gehört zu der folgenden Art.

Nach Thomson unterscheidet sich diese Art von *Ph. crassiuscula* nur durch den roten Hinterrand des Postpetiolus und die roten Hinterhüften. — Schwarz; Palpen, Mandibeln grösstenteils, Unterseite von Schaft und Pedicellus und Tegulä gelblichweiss. Stigma im Vorderflügel bräunlichgelb. Vorderbeine rötlichgelb, Hüften und Trochanteren blassgelb; die hintersten Hüften und Schenkel rötlich, letztere am Ende schwärzlich; Trochanteren gelblich; Schienen weisslich, an der Basis und am Ende braun; Tarsen hell, gegen das Ende verdunkelt. Das 1. Hinterleibssegment mit schmalem, das 2. mit breitem roten Hinterrande.

L. 4 mm.

Nord- und Mitteleuropa; sehr selten. Mir ist die Art noch nicht vorgekommen.

7. **Ph. confusa** Thoms. 1887 *Phobocampa confusa* Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1122 ♀ | 1829 *Campoplex uncinatus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 529 ♂ (excl. ♀).

In der Gestalt mit *Ph. crassiuscula* eng verwandt, aber grösser und der Hinterleib spärlicher behaart und dadurch glänzender. In der roten Färbung der hintersten Hüften stimmt die Art mit der vorhergehenden überein und unterscheidet sich von dieser besonders durch die ausgedehnte rote Färbung der Hinterleibsbasis, indem der ganze Postpetiolus und das 2. Segment mit Ausnahme der Basis rot gefärbt sind. Nach Gravenhorst ist beim ♂ das 3. Segment schwarz mit roter Seitenmakel. Die Beine sind rötlich, die hintersten Schienen sind gelblichweiss, an der Basis in geringer Ausdehnung, am Ende breit schwarz, die hintersten Tarsen dunkel.

L. 6 mm.

Die Art ist bis jetzt nur aus Deutschland bekannt.

8. **Ph. Püngeleri** n. sp.

Diese und die beiden folgenden Arten sind dadurch ausgezeichnet, dass nicht die ganze Unterseite des Schaftes, sondern nur ein kleiner Fleck hell gezeichnet ist. Von den beiden folgenden Arten unterscheidet sich diese neue Art durch die hellen Hinterschenkel und den breiten roten Endrand des 2. Segmentes. — Kopf und Thorax fein lederartig, fast ohne Glanz, dünn weisslich pubescent, namentlich im Gesicht, auf den Brustseiten und dem Metathorax. Kopf quer, nach hinten nur wenig verschmälert; Augen gross, innen seicht ausgerandet, mit parallelen Seiten; Fühler kräftig, etwas länger als der halbe Körper, gegen die Basis und das Ende verdünnt; Clypeus in der Mitte des Endrandes winklig vorspringend. Thorax bucklig; Brustseiten fein und dicht punktiert, mit glänzendem Speculum; Seiten des Prothorax mit Spuren von Längsrunzeln; Metathorax runzlig-punktiert, schwach glänzend, mit sehr starken Leisten, Area superomedia quer, mit der Area posteromedia vollständig verschmolzen, beide ziemlich ausgehöhlt. Endabschnitt des Radius über  $1\frac{1}{2}$  mal so lang als der Basalabschnitt; Areola ziemlich gross, unregelmässig, kurz und dick gestielt, den rücklaufenden Nerv etwas hinter der Mitte aufnehmend; Nervulus schräg, etwas hinter der Gabel; Nervellus oben sehr schräg nach innen gestellt, tief unter der Mitte gebrochen und einen deutlichen Nerv aussendend. Petiolus schlank, Postpetiolus fast 3 mal so breit als dieser, stark convex, an den Seiten ziemlich gerundet, etwas länger als breit; das 2. Segment um die Hälfte länger als hinten breit, auch das 3. Segment noch etwas länger als breit, die folgenden quer. Hinterleib mit sehr fein lederartiger Skulptur, schwach glänzend. Bohrer kurz vorstehend. — Schwarz; Mandibeln mit Ausnahme der Zähne und Palpen rötlichgelb; Unterseite des Schaftes gegen das Ende verloschen gelblich. Schulterbeulen und Tegulä blassgelb. Flügel ziemlich stark getrübt; Stigma gelblich. Alle Hüften schwarz, die vorderen am Ende verschwommen gelblich. Vorderbeine sonst rötlichgelb, Trochanteren und Schienen zum Teil gelb. Hinterschenkel rötlich, an der Basis unten schwärzlich; die hintersten Schienen gelblichweiss, hinter der Basis unten und am Ende ziemlich breit schwärzlich; die hintersten Schienen braun, an der Basis gelblichweiss. Das 2. Segment mit ziemlich breitem rötlichen, die folgenden Segmente mit schmäleren gelblichen Endrändern.

L. 8 mm.

Ich nenne die Art zu Ehren des bekannten Lepidopterologen Amtsgerichtsrat R. Püngeler in Aachen, der dieselbe aus einer bei Digne in Frankreich gefundenen Raupe von *Eupithecia guereata* Mill. zog und mir übersandte.

9. **Ph. obscurella** Holmgr. 1858 *Limneria obscurella* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. P. 8, p. 75 ♀♂ | 1887 *Phobocampa obscurella* Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1123 ♀.

Körper fein lederartig, fast matt, dünn weisslich pubescent. Kopf nach hinten schwach verschmälert, beim ♀ deutlicher als beim ♂; Gesicht quer, so breit wie die Stirn; Fühler kräftig, gegen das Ende verdünnt, etwas länger als der halbe Körper. Thorax bucklig, Metathorax deutlich gefeldert, Area superomedia quer, hinten undeutlich geschlossen. Areola im Vorderflügel gestielt, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend; Nervellus undeutlich gebrochen. Postpetiolus so lang als breit, das 2. Segment länger als breit, das 3. quadratisch. Bohrer nicht vorstehend. — Schwarz; Palpen und Mandibeln mit Ausnahme der Spitze gelblich. Stigma im Vorderflügel bräunlichgelb, Tegulä weisslich. Die vorderen Schenkel, Schienen und Tarsen rötlich, Spitze der Hüften und die Trochanteren gelblich; die hintersten Schenkel braunschwarz, die Schienen gelblich, an Basis und Spitze braun; Tarsen dunkel, gegen die Basis heller. Das 2. Segment hinten kaum hell gerandet.

L. 5–6 mm.

Nord- und Mitteleuropa; sehr selten. Ich kenne die Art nicht.

10. **Ph. neglecta** Holmgr. 1858 *Limneria neglecta* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II P. 8 p. 77 ♀♂ | 1877 *Phobocampa neglecta* Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1122 ♀♂.

Kopf schwach glänzend, fein lederartig, weisslich pubescent, nach hinten rundlich-verschmälert, von vorn gesehen annähernd dreieckig; Gesicht quer; Augen innen seicht ausgerandet; Fühler fadenförmig, etwas länger als der halbe Körper, gegen das Ende wenig verdünnt. Mesonotum ziemlich matt, Brustseiten und Metathorax schwach glänzend. Area superomedia kürzer als breit, Area postero-media breit, leicht vertieft; Seitenfelder nicht scharf von einander getrennt. Areola im Vorderflügel unregelmässig gestielt, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend; Nervellus undeutlich gebrochen. Beine schlank, Schiensporen sehr ungleich, der innere fast doppelt so lang als der äussere. Hinterleib ziemlich glänzend; Postpetiolus

leicht convex, fast etwas kürzer als breit, über doppelt so breit als der Petiolus; das 2. Segment kaum länger als breit, das 3. wenig kürzer als das 2., quer. Bohrer nicht vorstehend. — Schwarz; Palpen und Mandibeln grösstenteils gelblich. Stigma im Vorderflügel bräunlichgelb, Tegulä weisslich. Vorderbeine rötlich, Trochanteren gelblich, Hüften schwärzlich, Schenkel an der Basis meist gebräunt; die hintersten Beine schwärzlich, Schienen in der Mitte breit gelblichweiss. — Beim ♂ ist der Fühlerschaft unten hell, Vorderschienen zum Teil gelblich, das 2. Segment hinten rötlich; die hintersten Schenkel sind braun.

L. 4—5 mm.

Die Art ist bis jetzt nur in Schweden gefunden worden.

### 33. Gen. **Spudastica** Först.

1868 *Spudastica* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 155.

Kopf nach hinten kaum verschmälert; Fühler kurz und dick, fast gerade, nur an der Spitze kurz gekrümmt; Augen gross, innen seicht ausgerandet; Wangen kurz; Mandibeln gross. Thorax gedrunken, bucklig; Metathorax kurz und steil abfallend, kaum mit Spur einer Leiste. Stigma im Vorderflügel gross, Areola breit, fast sitzend, den rücklaufenden Nerv weit hinter der Mitte aufnehmend; Nervulus und Nervellus sehr schräg gestellt, letzterer gebrochen. Hinterleibsstiel lang und dünn, fast gerade, mit kleinen Seitengrübchen; Postpetiolus allmählich in den Petiolus übergehend, länger als breit. Bohrer vorstehend.

Die Gattung *Spudastica* ist leicht kenntlich an dem kurzen ungefelderten Metathorax und dem langen und dünnen Hinterleibsstiel; dazu kommt als 3. Merkmal die schräge Stellung von Nervulus und Nervellus.

**S. Kriechbaumeri** Bridgm. 1882 *Limneria Kriechbaumeri* Bridgman, Trans. Ent. Soc. London p. 151 ♀♂ | 1887 *Spudastica petiolaris* Thomson, Opusc. Ent. XI p. 112 ♀♂ | 1898 *Spudastica Kriechbaumeri* Dalla Torre, Catalog. Hymen. V. p. 112.

Kopf und Thorax mit graulicher, abstehender, kurzer Behaarung, namentlich das Gesicht dicht behaart. Thorax höher als breit; Metathorax ohne horizontale Fläche, sondern gleichmässig nach hinten abfallend, mit glänzenden weissen Haaren. Das 2. Hinterleibssegment länger als breit; Hinterleibsspitze leicht comprimiert; Bohrer von  $\frac{1}{3}$  Hinterleibslänge. — Schwarz; Palpen und Mandibeln gelb. Stigma im Vorderflügel braun; Tegulä und Flügelbasis

gelblichweiss. Beine rot, Hüften und Trochanteren schwarz, die äusserste Basis der Schienen gelblich, Spitze der Hintertarsen gebräunt.

L. 5—7 mm.

Nord- und Mitteleuropa. Hier in Thüringen selten. — Die Art wurde gezogen aus *Taeniocampa instabilis* und *gracilis*. Die Puppe ist schwarzbraun mit hellem Gürtel.

### 34. Gen. **Ecphoropsis** Ashm.

1868 *Ecphora* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 154 (non Conrad 1843).

1900 *Ecphoropsis* Ashmead, Canad. Entomol. XXXII p. 368.

Im Habitus sehr an *Sagaritis* erinnernd, Endrand des Clypeus jedoch ohne Zahn, sondern nur leicht vorgezogen, glatt und glänzend. Fühlerschaft unten nicht hell gezeichnet; Basalglieder der Geissel deutlich von einander abgesetzt; Mandibeln ziemlich gross, mit spitzen Zähnen; Wangen kaum aufgetrieben. Thorax nicht bucklig; Metathorax mit vollständiger und meist deutlicher Felderung. Tegulä weisslich. Areola im Vorderflügel klein und gestielt, den rücklaufenden Nerv vor der Mitte aufnehmend, wie das auch bei verschiedenen *Sagaritis*-Arten der Fall ist. Radialzelle kurz und breit, der Endabschnitt gerade und kaum länger als der Basalabschnitt; Nervellus schwach gebrochen und etwas schräg. Beine schlank, Schiensporen nicht sehr lang, Fussklauen lang und fast ohne Zähne. Hinterleib etwas spindelförmig, Petiolus niedergedrückt, mit kleinen Seitengruben, fast doppelt so lang als der Postpetiolus; dieser deutlich abgegrenzt, indem die Luftlöcher vorspringen. Hinterleibssegmente rot gerandet oder die Hinterleibsmittle zum Teil braunrot. Bohrer von  $\frac{1}{3}$  Hinterleibslänge.

#### Uebersicht der Arten.

1. Schiensporen von ungleicher Länge. Segment 2—5—6 hinten und an den Seiten rot. Hinterschenkel selten an der Basis schwärzlich gezeichnet. Der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle ein spitzer. 5—6 mm.

##### 1. **vexans** Holmgr.

Schiensporen von ziemlich gleicher Länge. Segment 2—5—6 nur mit roten Hinterrändern oder Segment 2—4 sind fast ganz rot (*fuscipes* ♀). Hinterschenkel an der Basis ausgedehnt schwarz. 2.

2. Beim ♀ die Hinterleibssegmente hinten schmal rot gerandet, das 2. deutlich länger als breit. Die hintersten Schienen blassgelb, selten rötlich, nahe der Basis und am Ende gebräunt. 6 mm.

2. **viennensis** Grav.

Beim ♀ Segment 2—4 braunrot; das 2. nicht oder kaum länger als breit. Beine trüb rötlich, Hüften und Basis der Trochanteren schwärzlich, Hinterschenkel an der Basis schwärzlich, die hintersten zuweilen fast ganz; Hinterschienen an Basis und Spitze verdunkelt. Beim ♀ alle Hinterleibssegmente hinten rötlich gerandet. 5—6 mm.

3. **fuscipes** Holmgr.

1. **E. vexans** Holmgr. 1858 *Limneria vexans* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II P. 8 p. 72 ♀ | 1887 *Ecphora vexans* Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1125 ♀♂.

Körper mit fein lederartiger Skulptur, weisslich pubescent, fast ohne allen Glanz. Kopf nach hinten kaum verschmälert; Scheitel breit ausgerandet; Fühler fadenförmig, etwas länger als Kopf und Thorax zusammen, gegen das Ende verdünnt; Gesicht quer, von Stirnbreite, dicht behaart; Wangen so lang wie die Breite der Mandibelbasis. Thorax etwas länger als breit, wenig schmaler als der Kopf; Brustseiten schwach glänzend, unter der Flügelbasis querrissig; Speculum glänzend; Metathorax runzlig, matt, fein aber deutlich gefeldert; Area superomedia fünfseitig, hinten nicht vollständig geschlossen. Areola im Vorderflügel regelmässig, klein und gestielt, den rücklaufenden Nerv vor der Mitte aufnehmend; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle ein spitzer. Endsporen der Hinterschienen von ungleicher Länge. Hinterleib schmal, von der Seite gesehen etwas keulenförmig; das 1. Segment etwas länger als die hintersten Hüften und Trochanteren, leicht gekrümmt, Postpetiolus über doppelt so breit als der Petiolus; das 2. und 3. Segment fein gerunzelt; das 2. länger als breit, das 3. quadratisch. Bohrer so lang wie das 1. Segment. — Schwarz; Palpen und Mandibeln mit Ausnahme der Zähne gelblich. Flügel leicht getrübt, Stigma gelblich, Tegulä gelblichweiss. Vorderbeine rötlichgelb, Hüften und Trochanteren schwarz, letztere am Ende gelb. Mittelschienen in der Mitte aussen weisslich, an Basis und Spitze verdunkelt. An den hintersten Beinen sind Hüften und Trochanteren schwarz, Schenkel rot, zuweilen an der Spitze, selten auch an der Basis etwas verdunkelt, die Schienen sind gelblichweiss, nahe der Basis und am Ende braun oder schwärzlich; Tarsen braun. Segment 2—5—6 mit rötlichem

Endrande, die Segmente vom 3. an auch mit rötlichen Seiten. Bauchfalte blassgelb.

L. 5—6 mm.

Die Art findet sich im nördlichen und mittleren Europa, gehört aber überall zu den Seltenheiten.

2. **E. viennensis** Grav. 1829 *Campoplex viennensis* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 478 ♀♂ | 1838 *Porizon annulator* Zetterstedt, Insect. Lappon. I p. 394 ♀ (excl. ♂) | 1858 *Limneria viennensis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II P. 8 p. 57 ♀ | 1887 *Ecphora viennensis* Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1124 ♀♂.

Im Habitus, Skulptur und Behaarung mit der vorigen Art übereinstimmend aber etwas kräftiger. Kopf nach hinten nicht verschmälert; Stirn flach, dicht runzlig-punktiert; Fühler ziemlich dick. Thorax wenig länger als hoch, Mesonotum dicht runzlig-punktiert, matt; Mesopleuren mit glänzendem Speculum; Metathorax gerunzelt, der mittlere Längsraum flach, Seitenfelder von einander getrennt. Areola im Vorderflügel klein und gestielt, Endsporen der Hinterschienen fast von gleicher Länge. Postpetiolus mit ziemlich geraden Seiten; das 2. Segment länger als breit, nach der Basis zu wenig verschmälert. Bohrer so lang wie das 1. Segment. — Schwarz; Palpen und Mandibeln mit Ausnahme der Zähne gelblich. Flügel hyalin, Stigma gelblich, Tegulä weisslich. Beine rötlich, Hüften, Basis der Trochanteren und Basis der Hinterschenkel schwarz; die vorderen Trochanteren am Ende gelblich; Hinterschienen gelblichweiss, nahe der Basis und am Ende braun bis schwärzlich; Hintertarsen dunkelbraun. Endränder der Segmente braunrot.

L. 6 mm.

Verbreitung und Vorkommen wie bei der vorigen Art.

3. **E. fuscipes** Holmgr. 1854 *fuscipes* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV p. 16 ♂ | 1858 *Limneria fuscipes* Holmgren, l. c. II. P. 8 p. 66 ♀♂ | 1887 *Ecphora fuscipes* Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1124 ♀♂.

Die Art stimmt im Grossen und Ganzen mit der vorhergehenden überein und unterscheidet sich hauptsächlich durch die Bildung und Färbung des Hinterleibs. Der Postpetiolus ist quer; das 2. Segment ist kaum länger als hinten breit, nach vorn nur sehr wenig verschmälert; das 3. ist quadratisch. Der Bohrer ist wie bei den anderen Arten dieser Gattung so lang wie das 1. Segment. Endsporen der Hinterschienen an Länge unter sich ziemlich gleich. — Schwarz; Palpen und Mandibeln gelblich, letztere mit schwärzlichen Zähnen. Flügel schwach getrübt, Stigma



bräunlichgelb; Tegulä gelblichweiss. Beine trüb rötlich, Hüften und Basis der Trochanteren schwärzlich, die letzteren am Ende gelblich. Hinterschenkel an der Basis schwärzlich, die hintersten zuweilen ganz verdunkelt; die hintersten Schienen an Basis und Spitze und die hintersten Tarsen gebräunt, die Schienen in der Mitte gelblich. Segment 2—4 ganz oder zum grössten Teil verschwommen rötlich. Bauchfalte hellgelb. Beim ♂ sind die Segmente 1—7 am Endrande mehr oder weniger breit rötlich gefärbt.

L. 5—6 mm.

Zerstreut in Nord- und Mitteleuropa.

### 35. Gen. **Omorgus** Först.

1868 Omorgus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 154.

1887 Omorga Thomson, Opusc. Ent. XI p. 1125.

Kopf nach hinten mehr oder weniger verschmälert; Fühler dünn, meist etwas länger als der halbe Körper; Schaft in der Regel unten schwarz, selten hell gefleckt; Clypeus mit kleinen Seitengruben. Thorax gestreckt, Seiten des Pronotums meist gestreift; Metathorax in der Regel mit scharfer Felderung, bei einer Reihe von Arten wie bei Eulimneria hinten der Länge nach breit ausgehöhlt. Endabschnitt des Radius deutlich länger als der Basalabschnitt, Areola durchschnittlich klein und gestielt, etwas unregelmässig, den rücklaufenden Nerv gewöhnlich hinter der Mitte aufnehmend; Basalnerv weniger steil als bei Angitia, mit dem Cubitalnerv divergierend; Nervellus meist schräg oben nach innen gestellt, bei den meisten Arten ziemlich deutlich, bei manchen aber auch fast gar nicht gebrochen. Beine schlank, die hintersten Schenkel häufig ganz oder zum Teil dunkel, Schiensporen nicht sehr lang, meist von ungleicher Länge; Klauenglied und Klauen klein. Das 1. Segment ohne Seitenrübchen, Postpetiolus convex und fast bei allen Arten mit gerundeten Seiten, deutlich kürzer und breiter als der Petiolus, die Luftlöcher nicht oder wenig vorspringend. Das 7. Rücken-segment ist, mit Ausnahme von *O. difformis*, beim ♀ nicht ausgeschnitten. Bauchfalte oft dunkel. Bohrer weit vorragend, meist von halber Hinterleibslänge.

Die Gattung *Omorgus* hat im Habitus, namentlich auch durch den langen Bohrer, die grösste Ähnlichkeit mit *Angitia*. Ein geübtes Auge erkennt sie ohne Schwierigkeit, nur bei den Männchen ist die Schwierigkeit grösser. Ein Hauptkennungs-zeichen ist der an den Seiten gerundete, oben convexe Postpetiolus; dazu kommen der in den meisten Fällen gebrochene Nervellus, der nicht selten deutlich der Länge nach ausgehöhlte

abschüssige Raum des Metathorax und die fehlenden Seitengrübchen des 1. Segmentes. Eine Anzahl grösserer, schwarzgefärbter *Omorgus*-Arten erinnern durch den hinten der Länge nach ausgehöhlten Metathorax sehr an die Gattung *Eulimneria*; bei ihnen ist jedoch der Kopf nach hinten stark verengt, der Nervellus deutlich gebrochen und der Postpetiolus ganz anders geformt.

Uebersicht der paläarktischen Arten.

1. Hinterleib des ♀ ganz schwarz. 2.  
Hinterleib des ♀ in der Mitte oder hinten an den Seiten rot oder mit roten Gürteln. 30.
2. Bauchfalte dunkel oder der Metathorax hinten ausgehöhlt. Trochanteren nicht hellgelb. Schenkel rot. 3.  
Bauchfalte gelb. Metathorax nicht ausgehöhlt. 13.
3. Bauchfalte hellgelb. Metathorax hinten ausgehöhlt mit starken Leisten. Bohrer fast länger als der halbe Hinterleib. Mesopleuren deutlich punktiert. Nervellus meist deutlich gebrochen. 4.  
Bauchfalte schwarzbraun. 7.
4. Schaft unten nicht hell gezeichnet. Scheitel nach hinten kaum verengt. Schenkel und Schienen rot. 5.  
Schaft unten hell gezeichnet. 6.
5. Die hintersten Schenkel und Schienen nicht dunkel gezeichnet. Beim ♀ das 6. und 7. Segment am Ende ausgeschnitten. 6—9 mm.  
1. **difformis** Gmel.  
Basis der Hinterschenkel und Spitze der Hinterschienen schwärzlich. Discokubitalnerv mit kurzem Ast. 5—7 mm.  
2. **ramidulus** Brischke.
6. Schenkel und Schienen, sowie die vorderen Trochanteren rot, letztere beim ♂ gelblich. Flügel etwas getrübt. 5—7 mm.  
3. **faunus** Grav.  
Hinterschenkel an der Basis schwarz. Die vorderen Trochanteren bei ♀ und ♂ schwarz. 6 mm.  
4. **molestus** Grav.
7. Beine mit Einschluss der Hüften rötlich. Das 2. Segment doppelt so lang als hinten breit. Bohrer länger als der halbe Hinterleib. 7 mm.  
5. **ruficoxa** Thoms.  
Hüften schwarz. 8.

8. Metathorax hinten deutlich ausgehöhlt mit groben Runzeln oder Streifen. Acetabula (der leistenartige Vorderrand der Mittelbrust) zurückgebogen. Scheitel nach hinten deutlich verschmälert. Grössere Arten. 9.

Metathorax nur schwach ausgehöhlt, mit feiner Skulptur. Mesopleuren fein runzlig - punktiert. Scheitel kaum verschmälert. Kleinere Arten. 12.

9. Schenkel und Schienen trüb rot, die hintersten Schienen zuweilen am Ende, seltener auch an der Basis verdunkelt. 10. Schenkel rot; die hintersten Schienen gelblich oder weisslich, an Basis und Spitze braun oder schwärzlich. 11.

10. Acetabula nicht zweilappig. Die hintersten Schienen am Ende, zuweilen auch an der Basis schwärzlich. Bohrer etwa so lang wie der halbe Hinterleib. 5—7 mm.

6. **mutabilis** Holmgr.

Acetabula zweilappig. Mandibeln und die hintersten Tarsen schwarz. Schenkel und Schienen rot. Skulptur von Metathorax und Brustseiten noch gröber als bei *O. mutabilis*.

7. **bilobus** Thoms.

11. Alle Schienen gelb, die hintersten an Basis und Spitze verdunkelt. Das 2. Segment weit länger als breit, auch das 3. länger als breit. Nur das ♂ bekannt. 8 mm.

5. **excavatus** Brischke.

Vorderschienen rötlich, die hintersten Schienen aussen weiss, innen rötlich, unterhalb der Basis und am Ende breit schwarzbraun. Das 2. Segment wenig länger als breit, das 3. kaum so lang als breit. Nur das ♀ bekannt. 8 mm.

9. **tricoloripes** n. sp.

12. Schenkel und Schienen rot, die hintersten Schienen am Ende schwärzlich. Felderung des Metathorax ziemlich deutlich. 5 mm.

10. **fusciplia** Thoms.

Die hintersten Schienen schwarz, in der Mitte breit weisslich; auch Basis des Metatarsus breit weiss. Metathorax fast ohne Leisten. 5 mm.

11. **exoletus** Thoms.

13. Vorderhüften und Trochanteren, sowie Unterseite des Schaftes gelb. Hinterschenkel grösstenteils schwarz; Hinterschienen hell, an Basis und Spitze dunkel. Metathorax glänzend. 5 mm.

12. **scaposus** Thoms.

Vorderhüften schwarz; auch die Unterseite des Schaftes selten hell gezeichnet. 14.

## 14. Mandibeln gelb. 15.

Mandibeln schwarz. Hinterschenkel selten dunkel gezeichnet. 24.

15. Schenkel rot, die mittleren unten schwarz gestreift, die hintersten unten und auch am Ende schwarz; die hintersten Schienen schwarz, in der Mitte breit gelblich. Area supero-media kurz und glänzend. Kleine Art von nur 4 mm.

13. **melampus** Thoms.

Die hintersten Schenkel am Ende nicht schwarz, oder sie sind ganz schwarz. 16.

16. Die hintersten Schenkel rot oder an der Basis schwarz. Trochanteren meist gelb. 17.

Die hintersten Schenkel schwarz. Trochantellus nicht gelblich, sondern schwarz, rot oder weisslich. 21.

17. Beine rot, Hüften schwarz, die hintersten Schienen höchstens am Ende dunkel; Hintertarsen grösstenteils schwarz-braun. 18.

Die hintersten Schienen hell, an Basis und Spitze dunkel gezeichnet. 19.

18. Bohrer länger als der halbe Hinterleib. Segment 2 wenig länger als breit, 3 quer. Spitze der Hinterschienen schwärzlich. 7 mm.

14. **ovatus** Brischke.

Bohrer kaum so lang als das 1. Segment. Segment 2 und 3 länger als breit. Spitze der Hinterschienen nicht dunkel. 8 mm.

15. **procerus** Brischke.

19. Schenkel und Schienen rot, Hinterschenkel an der Basis, Hinterschienen an Basis und Spitze schwarz. 6 mm.

16. **abbreviatus** Brischke.

Die hintersten Schienen in der Mitte weisslich oder blassgelb. 20.

20. Die hintersten Schienen innen rot, aussen weisslich, nahe der Basis und am Ende schwarz gezeichnet. Metathorax rauh punktiert. 5 mm.

17. **picticus** Thoms.

Die hintersten Schienen blassgelb, nahe der Basis und am Ende braun gezeichnet. Metathorax glatt und glänzend.

18. **lyratus** Thoms.

21. Die vorderen Trochanteren, der hinterste Trochantellus, ein Ring an der Basis der hintersten Schienen und deren Mitte breit weisslich. Die vorderen Schenkel und Schienen rötlich; Mittelschenkel an der Basis schwarz. Kopf nach hinten nicht verengt. 4—5 mm.

19. **borealis** Zett.

Die vorderen Trochanteren nicht weisslich; die hintersten Schienen gelblich oder rötlich, am Ende und meist auch an der Basis dunkel. 22.

22. Tegulä schwarz. Areola den rücklaufenden Nerv meist etwas vor der Mitte aufnehmend. Die hintersten Schienen trüb rot, nur am Ende undeutlich verdunkelt. 4 mm.

20. **atramentarius** n. sp.

Tegulä gelblichweiss. Areola den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend. Die hintersten Schienen gelblich, nahe der Basis und an der Spitze dunkelbraun. 23.

23. Das 2. Hinterleibssegment kaum länger als hinten breit. Kopf nach hinten verschmälert. Bohrer wenig länger als das 1. Segment. 5—6 mm.

21. **lugubrinus** Holmgr.

Das 2. Hinterleibssegment reichlich um ein Drittel länger als hinten breit. Kopf nach hinten nicht verschmälert. Bohrer etwas länger als der halbe Hinterleib. 5 mm.

22. **cursitans** Holmgr.

24. Schenkel und Schienen rot, die ersteren an der Basis zuweilen schwarz. 25.

Schenkel und Schienen rotgelb oder gelblich. 28.

25. Hinterschenkel an der Basis schwarz. Die hintersten Schienen an Basis und Spitze verdunkelt. Das 2. Segment nicht oder kaum länger als breit. 26.

Hinterschenkel an der Basis nicht schwarz. 27.

26. Postpetiolus an den Seiten schwach gerundet. Mesopleuren dicht punktiert. Area superomedia fast quer. 5 mm.

23. **angulatus** Thoms.

Postpetiolus an den Seiten deutlich gerundet. Mesopleuren fein gerunzelt, schwach glänzend. 5 mm.

24. **coracinus** Thoms.

27. Das 2. Segment fast quer. Postpetiolus an den Seiten wenig gerundet, fast quadratisch. Die hintersten Schienen an Basis und Spitze dunkel gezeichnet. Mesopleuren fein gerunzelt, ziemlich glänzend. 5 mm.

25. **liogaster** Thoms.

Das 2. Segment deutlich länger als breit. Postpetiolus an den Seiten gerundet. Die Spitze der Hinterschienen und die Hintertarsen braun. 8 mm.

26. **solitarius** Brischke.

28. Metathorax mit starken Leisten. Scheitel nach hinten etwas verschmälert. 5 mm.

27. **forticosta** Thoms.

Metathorax mit schwachen Leisten. 29.

29. Beine rötlichgelb, Hüften und die hintersten Trochanteren schwarz. Beim ♂ auch die hintersten Kniee und die hintersten Schienen und Tarsen gegen das Ende gebräunt. 5 mm.

28. **nigridens** Thoms.

Beine rötlichgelb, Hüften und die hintersten Trochanteren schwarz; die hintersten Kniee, Basis und Spitze der hintersten Schienen und ihre Tarsen dunkelbraun. Area superomedia quer. Das 2. Segment kaum länger als breit. Beim ♂ Tegulä braun. 5 mm.

29. **striolatus** Thoms.

30. Wenigstens das 3. Segment ganz rot oder gelblich. 31.

Hinterleib nur an den Seiten rot, selten der Hinterrand von einem oder mehreren Segmenten rot. 34.

31. Hinterleib ganz rot, nur die Basis des 1. Segmentes schwarz. 4—5 mm.

37. **melanostictus** Grav. var.

Hinterleib nur in der Mitte rot. 32.

32. Segment 2 und 3 und Beine mit Ausnahme der Basis gelblich. Fühler kurz und dick, die vorletzten Glieder quer. Das 2. Segment fast quer. Bohrer kaum länger als das 1. Segment. 5 mm.

30. **hadrocerus** Thoms.

Hinterleibsmitte rot. Fühler länger. 33.

33. Beine mit Einschluss der Hüften ganz rot, Vorderhüften am Ende gelblich. Segment 1 am Ende, 2 und 3 ganz und 4 an der Basis rot. Klauenglied und Klauen gross. 7 mm.

31. **ferinus** Holmgr.

Die vorderen Hüften und Trochanteren gelb, die hintersten Hüften schwarz; Schenkel und Schienen rot, Hinterschienen an Basis und Spitze verdunkelt. Segment 3 ganz, 4—7 unten rot. Beim ♂ die rote Hinterleibszeichnung weniger deutlich, die hintersten Schenkel zuweilen schwärzlich. 4—5 mm.

32. **litoreus** Thoms.

34. Segment 3 oder 2 und 3 mit deutlichem roten Hinterrand. 35. Die mittleren Segmente an den Seiten, zuweilen auch am Hinterrande rot. 36.

35. Nur das 3. Segment mit breitem roten Hinterrand. Beine mit Ausnahme der Hüften und hinteren Trochanteren trüb rot, die hintersten Schienen an Basis und Spitze nur schwach gebräunt. 5 mm.

33. **unicingulatus** n. sp.

Segment 2 und 3 mit breitem roten Hinterrand. Vordere Beine gelbrot, Basis der Hüften schwarz; Hinterbeine rot, Hüften und Basis der Trochanteren schwarz; Schienen gelbrot, vor der Basis und an der Spitze braun. 7 mm.

34. **cingulatus** Brischke.

36. Segment 2—7 am Endrande, an den Seiten breiter rot, Schaft unten gelb. Bohrer länger als der halbe Hinterleib. Beim ♂ die rote Hinterleibszeichnung undeutlich. 37. Segment 2—7 oder 3—7 nur an den Seiten rot. 38.

37. Die hintersten Schienen weisslich oder gelblich, an Basis und Spitze braun gefleckt. Vorderhüften nur an der Spitze gelblich. 5—6 mm.

35. **multicinctus** Grav.

Die hintersten Schienen braunrot, an Basis und Spitze dunkler. Vorder- und Mittelhüften und alle Trochanteren weisslichgelb. 6—8 mm.

36. **orientalis** n. sp.

38. Postpetiolus und Segment 2—7 rot, mit schwarzer Rückenbinde. Schaft unten meist hell. Stigma schwärzlich. Hinterbeine fast ganz schwarz, nur die Schienen an der Basis schmal, in der Mitte breit gelblich. Bohrer so lang wie das 1. Segment. 4—5 mm.

37. **melanostictus** Grav.

Segment 3—7 nur an den Seiten rot. 39.

39. Die hintersten Schenkel ganz oder grösstenteils rot. 40. Die hintersten Schenkel ganz oder grösstenteils schwarz. 42.

40. Tegulä dunkelbraun. Fühler lang, vor dem Ende verdickt. Schenkel und Schienen rot, die hintersten Schienen an Basis und Spitze dunkel gezeichnet. Bohrer kurz und dick. 5 mm.

38. **fusicornis** Thoms.

Tegulä blassgelb oder weisslich. Die hintersten Kniee dunkel. Bohrer etwas länger als das 1. Segment. 41.

41. Kopf nicht aufgetrieben, nach hinten verschmälert. Beine rötlichgelb, die hintersten Hüften, seltener auch die vorderen schwarz; die hintersten Schenkel am Ende, die hintersten Schienen an der Basis und am Ende schwärzlich gezeichnet. Metathorax deutlich ausgehöhlt. 5 mm.

39. **Rothi** Holmgr.

Kopf etwas aufgetrieben, nach hinten nicht verschmälert. Beine rot, die Hüften und die hintersten Schenkel an Basis und Spitze schwarz; die vorderen Trochanteren und die hintersten Schienen weisslich, letztere an Basis und Spitze dunkel gezeichnet. Schaft unten schwarz. Metathorax weniger deutlich ausgehöhlt. 4–5 mm.

40. **ensator** Grav.

42. Vorderschenkel und die Schienen rot, die hintersten Schienen an Basis und Spitze dunkel gezeichnet. Endabschnitt des Radius wenig länger als der Basalabschnitt. Der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle fast ein rechter. 5 mm.

41. **continuus** Thoms.

Die hintersten Schienen in der Mitte weisslich oder gelblich. Der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitzer. 43.

43. Vorderbeine gelb mit schwarzen Hüften; die hintersten Beine schwarz, Schienen weisslichgelb, Spitze und ein Ring hinter der Basis schwärzlich. Kleine Art von 4 mm.

42. **gastroides** Grav.

Vorderbeine rot. Grössere Arten. 44.

44. Postpetiolus an den Seiten stark rundlich aufgetrieben, oben stark convex. Die hintersten Schenkel ganz schwarz. 6 mm.

43. **tumidulus** Grav.

Postpetiolus weniger rundlich erweitert. Die hintersten Schenkel meist nur an Basis und Spitze schwarz, selten auch in der Mitte verdunkelt.

cf. 40. **ensator** Grav.



**I. Section.** Hinterleib des ♀ schwarz. Bauchfalte dunkel oder der Metathorax hinten der Länge nach ausgehöhlt.

- I. O. difformis** Gmel. 1790 *Ichneumon difformis* Gmelin, Linné: System. nat. Ed. 13. p. 2720 | 1829 *Campoplex difformis* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 458 ♀♂ (partim) | 1858 *Limneria difformis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 58 ♀ | 1887 *Omorga difformis* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1127 ♀♂.

Körper ziemlich glänzend, fein graulich pubescent, Kopf nach hinten kaum verengt; Wangen ziemlich aufgetrieben. Thorax dicht runzlig-punktiert; Metathorax hinten der Länge nach vertieft, mit starken Leisten; Area superomedia hinten offen; Mesopleuren dicht punktiert. Areola im Vorderflügel kurz gestielt, unregelmässig, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend; Nervellus deutlich gebrochen. Postpetiolus mit gerundeten Seiten; das 2. Segment um  $\frac{1}{3}$  länger als hinten breit; das 3. quadratisch; das 6 und 7. Segment beim ♀ am Ende ausgeschnitten; Bohrer länger als der halbe Hinterleib. — Schwarz; Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich. Schaft auf der Unterseite nicht hell gezeichnet. Flügel ziemlich getrübt; Stigma braun; Tegulä weisslichgelb. Beine rot, Hüften und Trochanteren schwarz, die vorderen Trochanteren zum Teil hell. Tarsen am Ende gebräunt. Bauchfalte hellgelb. Beim ♂ sind die Afterklappen am Ende zugespitzt.

L. 5—9 mm.

Ueber ganz Europa verbreitet und eine der häufigsten Arten dieser Gattung.

- 2. O. ramidulus** Brischke. 1880 *Limneria ramidula* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 155 ♀♂.

Matt; Kopf nach hinten nicht verschmälert; Fühler von halber Körperlänge. Thorax länger als hoch; Metathorax mit 5 Feldern, Area superomedia breit, dreieckig, hinten offen; Area posteromedia breit, der Länge nach vertieft, querrunzlig. Radius am Ende fast gerade; Areola gestielt, schräg, den rücklaufenden Nerv vor der Spitze aufnehmend; Discocubitalnerv mit einem kurzen Aste; Basalnerv fast interstitial; Nervellus unter der Mitte deutlich gebrochen. Das 1. Segment so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus convex mit gerundeten Seiten; das 2. Segment länger als breit, das 3. beim ♀ quer. Bohrer gekrümmt, von halber Hinterleibslänge. — Schwarz; Palpen gelb. Stigma dunkelbraun. Ueber die Färbung der Tegulä macht Brischke keine Angabe, der Diagnose nach müssten sie also schwarz sein. Beine rot, Hüften

und Trochanteren schwarz; beim ♀ die Trochanteren mit roten Spitzen und die Hinterschenkel mit schwarzer Basis, Spitze der Hinterschienen und die Hintertarsen braun.

L. ♀ 7, ♂ 5 mm.

Deutschland. — Aus Raupen von *Ratinia resinana* und aus Larven von *Nematus Valisnieri* gezogen.

3. **O. faunus** Grav. 1829 *Campoplex faunus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 517 ♀ | 1858 *Limneria faunus* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 55. ♀ | 1887 *Omorga faunus* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1126 ♀♂ | ? 1829 *Campoplex maurus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 516 ♂.

Kopf quer, nach hinten etwas verengt. Metathorax noch etwas stärker ausgehöhlt als bei *O. difformis*, mit starken Leisten. Postpetiolus mit gerundeten Seiten, doppelt breiter als der Petiolus; das 2. Segment etwas länger als breit, das 3. quer. Bohrer etwas länger als der halbe Hinterleib. — Schwarz; Palpen und Mandibeln mit Ausnahme der Zähne gelblich. Fühlerschaft unten mit gelblicher Makel. Flügel ziemlich getrübt, Stigma bräunlichgelb, Tegulä weisslichgelb. Beine rot, Hüften und die hintersten Trochanteren schwarz, Hintertarsen braun. Beim ♂ die vorderen Trochanteren gelblich. Bauchfalte gelblich.

Von den *Omorgus*-Arten mit ausgehöhlttem Metathorax und gelblicher Bauchfalte ist die vorliegende ausgezeichnet durch die hell gezeichnete Unterseite des Fühlerschaftes und die durchweg rote Färbung der Schenkel und vorderen Trochanteren.

L. 5—7 mm.

Verbreitet über einen grossen Teil von Europa und eine der häufigeren Arten.

4. **O. molestus** Grav. 1829 *Campoplex molestus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 518 ♀ | 1887 *Omorga molesta* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1126 ♀♂.

Metathorax ausgehöhlt, mit starken Leisten. Areola im Vorderflügel gestielt, unregelmässig, Postpetiolus convex, an den Seiten gerundet; das 2. Segment kaum länger als breit; Bohrer etwas länger als der halbe Hinterleib. — Schwarz; Palpen und Mitte der Mandibeln rötlichgelb. Schaft unten weisslich gefleckt. Flügel schwach getrübt, Stigma bräunlichgelb, Tegulä weisslich. Beine rot, Hüften, Trochanteren und Basis der Mittel- und Hinterschenkel schwarz; die Spitze der hintersten Schienen und die Hintertarsen braun. Bauchfalte gelblich.

L. 6 mm.

Scheint weit verbreitet, aber sehr selten zu sein; ich kenne die Art nicht.

Von dem sehr ähnlichen *O. faunus* verschieden durch die dunklen vorderen Trochanteren und die schwarze Basis der Hinterschienen.

5. **O. ruficoxa** Thoms. 1887 *Omorga ruficoxa* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1127 ♀.

Diese Art lässt sich von allen *Omorgus*-Arten mit hinten ausgehöhltem Metathorax leicht durch die helle Färbung der Hüften unterscheiden. — Kopf nach hinten verschmälert. Metathorax ohne Area superomedia und posteromedia, aber mit kräftiger Costula, hinten der Länge nach vertieft. Brustseiten fein runzlig-punktiert. Das 2. Hinterleibssegment doppelt so lang als hinten breit. Bohrer etwas länger als der halbe Hinterleib. — Schwarz; Mund und Tegulä weisslich. Beine rot, die hintersten Trochanteren an der Basis und die hintersten Tarsen braun. Bauchfalte dunkelbraun. — Ich besitze ein ♂ aus Thüringen. Bei diesem ist die Unterseite des Schaftes und des Pedicellus rötlichgelb und die hintersten Hüften sind auf der Oberseite schwarz. Als eine neue Art möchte ich dieses Exemplar einstweilen nicht betrachten.

L. 7 mm.

Als Vaterland gibt Thomson Ungarn an; das von mir beschriebene ♂ stammt, wie bereits erwähnt, aus Thüringen.

6. **O. mutabilis** Holmgr. 1858 *Limneria mutabilis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 55 ♀♂ | 1887 *Omorga mutabilis* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1125 ♀♂ | ? 1844 *Campoplex lineolatus* Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I p. 93 ♀.

Kopf quer, nach hinten schwach verschmälert; Stirn ziemlich flach, dicht runzlig-punktiert. Vorderrand der Mittelbrust (Acetabula) kielförmig erhaben und zurückgebogen, aber nicht zweilappig; Metathorax ziemlich grob gerunzelt, hinten deutlich der Länge nach ausgehöhlt; Seitenfelder geteilt. Areola im Vorderflügel gestielt; Nervellus schwach gebrochen. Postpetiolus stark convex, an den Seiten gerundet; das 2. Segment länger als breit, das 3. quadratisch; Bohrer etwas länger als der halbe Hinterleib. — Schwarz; Palpen und Mitte der Mandibeln rötlichgelb. Stigma bräunlichgelb, Tegulä weisslich. Beine rot, Hüften und die hinteren Trochanteren schwarz, die Spitze und zuweilen die Basis der hintersten Schienen etwas verdunkelt; Hintertarsen braun. Bauchfalte braun.

L. 5–7 mm.

Weit verbreitet und eine der häufigeren Arten. — Wurde gezogen aus *Eupithecia pimpinellaria* (Brischke), *Ephippiphora nigricostana* und aus *Tortrix*-Arten (Bignell).

7. **O. bilobus** Thoms. 1887 *Omorga biloba* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1126 ♀♂.

Diese Art stimmt durch den hinten ausgehöhlten Metathorax, die zurückgebogenen Acetabula und die dunkle Bauchfalte mit der vorhergehenden überein und unterscheidet sich nur durch die folgenden Merkmale: Acetabula zweilappig, Mandibeln und die hintersten Tarsen schwarz und die Skulptur der Brustseiten und des Metathorax noch gröber.

L. 6—7 mm.

Von Thomson in Schweden gefunden; ich fand die Art auch hier in Thüringen.

8. **O. excavatus** Brischke. 1880 *Limneria excavata* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 149 ♂.

Körper fein lederartig, kurzhaarig. Kopf nach hinten verschmälert, Gesicht ziemlich lang behaart, Fühler fast von Körperlänge, Metathorax allmählich abschüssig, mit breiter, vertiefter Mittelfurche und je 2 Seitenfeldern. Areola kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv in der Mitte aufnehmend; Basalnerv interstitial; Radialnerv am Ende gerade; Nervellus kaum gebrochen. Das 1. Segment etwas länger als die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus gewölbt, etwas länger als breit, das 2. Segment viel länger als breit, auch das 3. noch länger als breit. — Schwarz, Palpen, Mandibeln und Tegulä gelb. Stigma schwarzbraun. Beine rot, Hüften schwarz, an den Vorderbeinen die Spitze der Hüften, die Trochanteren, Schienen und Tarsen gelb, an den Hinterbeinen die Basis der Trochanteren schwarz, Basis und Spitze der Schienen und Tarsen braun; Schiensporen weiss.

L. 8 mm. — Bis jetzt nur das ♂ bekannt.

Deutschland. — Aus einer *Tortrix*-Art gezogen.

9. **O. tricoloripes** n. sp.

Körper fein lederartig, schwach glänzend, dünn weisslich pubescent. Kopf quer, nach hinten stark verengt; Fühler kräftig, weit länger als der halbe Körper. Acetabula leistenförmig erhaben, zweilappig. Brustseiten dicht und ziemlich grob punktiert, schwach glänzend, Speculum poliert; Metathorax fein gerunzelt, matt, in der Mitte von der Basis an der Länge nach breit und ziemlich tief ausgehöhlt,

Area basalis kurz, Area superomedia nur durch die beiden vorderen in einen flachen Winkel gestellten Leisten begrenzt, hinten vollständig offen, die beiden Seitenfelder undeutlich abgegrenzt. Areola im Vorderflügel ziemlich gross, regelmässig, kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv in der Mitte aufnehmend; Nervulus interstitial, Nervellus oben etwas nach innen geneigt, tief unter der Mitte deutlich gebrochen und einen schwachen Nerv aussendend. Hinterleib schwach glänzend, wie mit feinem Duft bedeckt; Postpetiolus stark convex, mit gerundeten Seiten. Das 2. Segment etwa  $\frac{1}{4}$  länger als hinten breit, das 3. und 4. kaum so lang als breit. Bohrer von halber Hinterleibslänge. — Schwarz; Palpen gelblich, Mandibeln rötlich gefleckt. Stigma braun, Tegulä weisslich. Trochanteren am Ende, Schenkel und Schienen rötlich; Vorderschienen an der Basis und die hintersten Schienen aussen weiss, letztere innen rötlich, unterhalb der Basis und am Ende breit schwarzbraun. Die hintersten Tarsen schwarz, der Metatarsus an der Basis breit, die beiden folgenden Glieder nur schmal weiss.

L. 8 mm.

Ein ♀ von Blankenburg in Thüringen.

10. **O. fusciplica** Thoms. 1887 *Omorga fusciplica* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1127 ♀♂.

Diese Art ist ausgezeichnet durch die dunkle Bauchfalte und nicht oder kaum ausgehöhlten Metathorax. Darin stimmt sie mit *O. exoletus* und *ruficoxa* überein, die sich beide durch andere Färbung der Beine unterscheiden.

Kopf nach hinten kaum verschmälert. Metathorax nicht oder kaum ausgehöhlt, mit feiner Skulptur; Mesopleuren fein runzlig-punktiert. — Schwarz, Schenkel und Schienen rot, die hintersten Schienen am Ende verdunkelt. Palpen und Mandibeln, ebenso Stigma im Vorderflügel bräunlich. Bauchfalte schwärzlich.

L. 5 mm.

Südliches Schweden.

11. **O. exoletus** Thoms. 1887 *Omorga exoleta* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1127 ♀♂.

Diese Art schliesst sich eng an die vorhergehende an; durch die helle Schienenzeichnung erinnert sie sehr an Arten der Gattung *Eulimneria*. — Metathorax fast ohne Leisten. Brustseiten wie bei *O. fusciplica* fein runzlig-punktiert. Schwarz; alle Schenkel und die Vorderschienen und Tarsen rot, die hintersten Schienen weisslich, an Basis

und Spitze breit schwärzlich; die hintersten Tarsen schwarz, der Metatarsus an der Basis breit, die nächsten Glieder schmal weisslich.

L. 5 mm.

Schweden.

11. **Section.** Hinterleib des ♀ schwarz. Bauchfalte gelb. Metathorax nicht ausgehöhlt.

12. **O. scaposus** Thoms. 1887 *Omorga scaposa* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1128 ♀♂.

Von den Arten mit schwarzem Hinterleibe, heller Bauchfalte und nicht ausgehöhltem Metathorax ist *O. scaposus* durch die helle Färbung der Vorderhüften und der Unterseite des Schaftes leicht zu erkennen. —

Metathorax nicht ausgehöhlt, glänzend; Area superomedia nicht breiter als lang. — Schwarz; Palpen, Mandibeln mit Ausnahme der Zähne, Unterseite des Schaftes, Tegulä und die Trochantellen weisslich. Die vorderen Schenkel und Schienen rötlich; die hintersten Schenkel schwarz, an der Basis hell, die hintersten Schienen gelblich, nahe der Basis und am Ende dunkelbraun.

L. 5 mm.

Schweden.

13. **O. melampus** Thoms. 1887 *Omorga melampus* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1131 ♀.

Diese Art ist besonders durch die Färbung der Hinterbeine und die Form der Area superomedia ausgezeichnet.

Scheitel nach hinten verschmälert. Area superomedia kurz, glänzend. Metathorax nicht ausgehöhlt. Stigma im Vorderflügel schmal; Endabschnitt des Radius ziemlich kurz; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle fast ein rechter. — Schwarz; Palpen und Mandibeln mit Ausnahme der Zähne gelblich. Schenkel und Schienen trüb rot; Mittel- und Hinterschenkel unten mit schwarzem Streif, Hinterschenkel auch am Ende schwarz; die hintersten Schienen schwarz, in der Mitte breit schmutzig blassgelb. Bauchfalte gelb.

Kleine Art von nur 4 mm Länge.

Schweden.

14. **O. ovatus** Brischke. 1880 *Limneria ovata* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 151 ♀.

Körper matt, dicht und fein punktiert. Kopf hinter den Augen verschmälert. Metathorax gerunzelt, mit zwei Seiten-

feldern, der abschüssige Raum kaum eingedrückt. Areola im Vorderflügel gestielt, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend; Radialnerv am Ende gerade; Nervellus unter der Mitte gebrochen. Postpetiolus schwach gewölbt, mit gerundeten Seiten und seichter Längsfurche zwischen den Stigmen, das 2. Segment wenig länger als breit, nach der Spitze hin allmählich verbreitert, das 3. Segment quer, die folgenden von der Seite zusammengedrückt. Bohrer länger als der halbe Hinterleib, aufwärts gebogen. — Schwarz, Palpen und Mandibeln, Flügelwurzel und Tegulä gelb. Stigma scherbengelb. Beine rot, Hüften und Basis der hintersten Trochanteren schwarz; die äusserste Spitze der Hinterschienen und die Hintertarsen schwarzbraun, der Metatarsus fast ganz rot.

L. 7 mm.

Deutschland, England.

15. **O. procerus** Brischke. 1880 *Limneria procera* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 154 ♀♂.

Körper etwas glänzend; Kopf und Thorax weisshaarig. Kopf hinter den Augen wenig verschmälert; Gesicht etwas länger als breit; der innere Augenrand schwach ausgebuchtet; Fühler etwa so lang wie Kopf und Thorax; letzterer kurz. Prothorax kurz und breit; Metathorax gerundet, Seitenfelder undeutlich geschieden; Area supero-media fünfseitig, hinten offen und wie die Area postero-media querrunzig. Areola im Vorderflügel gestielt, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend; Basalnerv interstitial; Nervellus kaum gebrochen. Das 1. Segment etwas länger als die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus gewölbt, mit gerundeten Seiten, Segment 2 und 3 länger als breit; Bohrer kaum so lang wie das 1. Segment; beim ♂ die Genitalklappen lang, mit abgerundeter Spitze. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Flügelwurzel und Tegulä gelb. Stigma braun. Beine rot, Hüften und Basis der Trochanteren schwarz; Hintertarsen braun mit roter Basis.

L. 8 mm.

Deutschland.

Die Art gehört durch die Bildung des Postpetiolus zu *Omorgus*.

16. **O. abbreviatus** Brischke. 1880 *Limneria abbreviata* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. p. 157 ♀.

Körper durch feine Skulptur matt. Kopf nach hinten wenig verschmälert; Fühler länger als Kopf und Thorax; dieser

etwas länger als hoch; Metathorax kurz, der abschüssige Raum flach; Area supero- und posteromedia mit einander verschmolzen, fein gerunzelt; Seitenfelder von einander getrennt. Areola im Vorderflügel klein, gestielt, den rücklaufenden Nerv fast am Ende aufnehmend; Nervulus interstitial, Nervellus tief unter der Mitte gebrochen. Das 1. Segment so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren; Petiolus in der Mitte verengt und dann allmählich bis zum Postpetiolus breiter werdend; letzterer gewölbt, etwa so lang als breit; das 2. Segment länger als breit, an der Spitze über noch einmal so breit als an der Basis; das 3. Segment quer. Bohrer gekrümmt, länger als der halbe Hinterleib. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Flügelwurzel und Tegulä gelb. Stigma braun. Beine rot, Hüften und die hintersten Trochanteren fast ganz schwarz; vordere Trochanteren gelb; Hinterschenkel an der Basis, Hinterschienen an der Basis und Spitze schwarz; Hintertarsen braunschwarz. Bauchfalte gelb.

L. 6 mm.

Deutschland.

17. **O. picticus** Thoms. 1887 *Omorga picticus* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1128 ♀.

Metathorax runzlig-punktiert, nicht ausgehöhlt. Das 2. Hinterleibssegment kaum länger als breit. Bohrer von  $\frac{1}{3}$  Hinterleibslänge. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Tegulä und die vorderen Trochanteren blassgelb. Stigma bräunlich-gelb. Schenkel und Schienen rot; die hintersten Schienen dreifarbig, innen rot, aussen weisslich, nahe der Basis und am Ende schwarz gezeichnet. Bauchfalte gelb.

L. 5 mm.

Bei Lund im südlichen Schweden gefunden.

18. **C. lyratus** Thoms. 1887 *Omorga lyrata* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1128 ♀.

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Tegulä, die vorderen Trochanteren und auch der Trochantellus der Hinterbeine blassgelb; Schenkel und Schienen rot; die hintersten Schienen blass gelblich, nahe der Basis und am Ende braun gezeichnet. — Ausser der Färbung der Beine von der vorhergehenden Art noch verschieden durch den nicht rauh punktierten, sondern fast glatten und glänzenden Metathorax und die längere, hinten etwas verschmälerte Area superomedia.

L. 5 mm.

Schweden.



19. **O. borealis** Zett. 1838 Porizon borealis Zetterstedt, Insect. Lappon. I p. 395 | 1848 Campoplex subcinctus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II p. 82 ♂ | 1858 Limneria borealis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 98 ♀♂ | 1887 Omorga borealis Thomson, Opusc. ent. XI p. 1129 ♀♂.

Kopf gross, aufgetrieben, nach hinten nicht verschmälert. Metathorax deutlich gefeldert, Area superomedia nicht quer, die beiden Seitenfelder geteilt. Das 1. Hinterleibssegment etwas kürzer als die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus convex, an den Seiten gerundet; das 2. Segment um  $\frac{1}{3}$  länger als hinten breit; Bohrer so lang wie der halbe Hinterleib. — Schwarz; Palpen, Mandibeln mit Ausnahme der Endzähne und Tegulä gelblichweiss. Stigma bräunlich. Die vorderen Schenkel und Schienen rötlich; Basis der Mittelschenkel und die Hinterbeine schwarz; die vorderen Trochanteren, der hinterste Trochantellus, ein Ring an der Basis der hintersten Schienen und deren Mitte breit weisslich; auch der Metatarsus mit heller Basis. Bauchfalte hellgelb.

Var. ♀. Schaft auf der Unterseite weisslich.

L. 4—5 mm.

Nord- und Mitteleuropa. Wurde aus Apterona helix Sieb. gezogen.

20. **O. atramentarius** n. sp.

Körper schlank und zart, ziemlich glänzend, namentlich auf dem Mesonotum und Hinterleibe. Kopf nach hinten kaum verschmälert; Fühler etwas länger als Kopf und Thorax zusammen, die Glieder deutlich abgesetzt, bis zur Mitte etwa so lang als breit, die folgenden breiter als lang; Clypeus convex, mit wenigen Punkten, glänzend. Mesonotum fein runzlig-punktiert; Metathorax mit deutlichen Leisten, Area superomedia mit der Area posteromedia verschmolzen, dieser Raum ganz schwach vertieft und fein querrunzlig; Seitenfelder von einander getrennt; Brustseiten matt, sehr fein runzlig-punktiert; Speculum poliert. Endabschnitt des Radius  $1\frac{1}{2}$  mal so lang als der Basalabschnitt, sehr leicht gebogen; Areola gestielt, den rücklaufenden Nerv meist vor der Mitte aufnehmend, bei einigen Exemplaren aber auch etwas hinter der Mitte; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitz; Nervulus ziemlich schräg gestellt, etwas hinter dem Basalnerv; Nervellus kaum gebrochen, oben etwas nach innen gestellt. Beine schlank. Das 1. Hinterleibssegment ziemlich glatt und glänzend; Petiolus dünn; Postpetiolus convex, an den Seiten gerundet, Luftlöcher ziemlich vortretend; das 2. Segment um die Hälfte länger als hinten breit, nach vorn ziemlich stark

verschmälert; das 3. Segment so lang als breit, das 4. nur wenig kürzer. Bohrer von halber Hinterleibslänge. — Schwarz; Palpen weisslich; Mandibeln in der Mitte rötlich. Stigma im Vorderflügel bräunlichgelb. Tegulä braun oder schwärzlich. Vorderschenkel, Mittelschenkel im letzten Drittel, alle Schienen und die Vordertarsen rötlich; Trochantellus an allen Beinen weisslich, seltener etwas rötlich; die hintersten Schienen nur am äussersten Ende und die hintersten Tarsen schwach gebräunt. Bauchfalte gelblich, mit dunklen Einschnitten.

L. 4 mm.

Ich traf diese Art einmal in ziemlicher Menge bei Blankenburg in Thüringen und zwar Ende September um Wachholder schwärmend, einzelne wahrscheinlich überwinterte Exemplare erschienen Anfang April im darauffolgenden Jahre.

21. **O. lugubrinus** Holmgr. 1858 *Limneria lugubrina* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 64 ♀ | 1887 *Omorga lugubrina* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1129 ♀♂.

Kopf nach hinten etwas verschmälert; Wangen nicht aufgetrieben; Fühler etwas länger als Kopf und Thorax. Seiten des Thorax schwach glänzend, Speculum poliert; Metathorax kaum eingedrückt, mit schwachen Leisten; Area superomedia hinten offen, Seitenfelder geteilt. Areola im Vorderflügel kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend. Das 1. Hinterleibssegment so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus convex, an den Seiten leicht gerundet; das 2. Segment kaum länger als breit; die folgenden quer; Bohrer wenig länger als das 1. Segment. — Schwarz, fein graulich pubescent. Palpen und Mandibeln mit Ausnahme der Zähne gelblich. Stigma bräunlich, Tegulä weisslich. Die vorderen Schenkel und Schienen trüb rötlichgelb, die Trochanteren gelb; die Basis der Mittelschenkel und die hintersten Schenkel schwärzlich; die hintersten Schienen blass gelblich, nahe der Basis und an der Spitze dunkelbraun; die hintersten Tarsen schwärzlich, an der Basis hell. Bauchfalte hellgelb.

L. 5—6 mm.

Nord- und Mitteleuropa; zerstreut.

22. **O. cursitans** Holmgr. 1858 *Limneria cursitans* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 64 ♀ | 1887 *Omorga cursitans* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1129 ♀.

Der vorigen Art ähnlich aber schlanker, Kopf nach hinten nicht verschmälert, das 2. Segment und der Bohrer länger, ausserdem die Beine anders gefärbt.

Kopf etwas aufgetrieben, nach hinten nicht verschmälert; Wangen aufgetrieben; Fühler etwas länger als der halbe Körper. Thorax etwas schmaler als der Kopf, länger als hoch; Brustseiten fein lederartig, Speculum glänzend; Metathorax allmählich abfallend, der Länge nach nicht eingedrückt; Area superomedia länger als breit, am Ende offen; Seitenfelder geteilt. Areola im Vorderflügel gestielt, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend; Nervellus unter der Mitte schwach gebrochen. Hinterleib schmal; Postpetiolus convex, mit gerundeten Seiten, fast doppelt so breit als der dünne Petiolus; das 2. Segment fast um die Hälfte länger als breit, fein gerunzelt. Bohrer etwas länger als der halbe Hinterleib. — Schwarz, fein graulich pubescent. Palpen und Mandibeln blassgelb. Fühlerschaft unten meist rötlich gefleckt. Stigma bräunlich, Tegulä weisslich. Die vorderen Schenkel und Schienen rötlich, die Trochanteren gelblich, die mittelsten nur an der Spitze; Mittelschenkel zum Teil braun; die hintersten Schenkel schwärzlich, die Schienen blass gelblich, an der Basis und am Ende dunkelbraun; Schiensporen weisslich; die Tarsen verdunkelt, an der Basis heller. Bauchfalte blassgelb.

L. 5 mm.

Nord- und Mitteleuropa; zerstreut.

23. **O. angulatus** Thoms. 1887 *Omorga angulata* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1129 ♀♂.

Mit *O. angulatus* beginnt eine Reihe von Thomson beschriebener Arten, welche einen nicht vertieften Metathorax und gelbe Bauchfalte besitzen und welche sich von den anderen Arten durch die schwärzlichen Mandibeln unterscheiden.

Mesopleuren dicht punktiert; Metathorax mit kräftigen Leisten; Area superomedia fast quer, Area petiolaris runzlig, oben mehr glatt und glänzend, die Seitenleiste des Thorax winklig gebrochen. Thomson sagt: „costa laterali thoracis angulata“; was er unter costa lateralis versteht, ist mir nicht klar, da er die beiden Seitenfelder des Metathorax trennende Querleiste immer als Costula bezeichnet. Postpetiolus an den Seiten schwach gerundet. Das 2. Segment kaum länger als breit. Bohrer von halber Hinterleibslänge. — Schwarz; Schenkel und Schienen rot, Mittel- und Hinterschenkel an der Basis schwarz, die hintersten Schienen an Basis und Spitze verdunkelt. Beim ♂ Schenkel und Schienen schwärzlich, Schenkel in der Mitte braunrot,

Schienen an der Basis mit einem schmalen, in der Mitte mit einem breiten hellen Ringe.

5 mm.

Schweden.

24. **O. coracinus** Thoms. 1887 *Omorga coracina* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1130 ♀.

Brustseiten fein gerunzelt, schwach glänzend. Postpetiolus an den Seiten stark gerundet, von ovaler Gestalt; das 2. Segment nicht länger als breit, nach der Basis ziemlich stark verschmälert; Bohrer von halber Hinterleibslänge. — Schwarz; Schenkel und Schienen gesättigt rot; Mittel- und Hinterschenkel an der Basis, die hintersten Schienen an Basis und Spitze schwärzlich.

In der Färbung fast ganz mit *O. angulatus* übereinstimmend, aber Mesopleuren fein gerunzelt und ziemlich glänzend, Postpetiolus an den Seiten stärker gerundet und das 2. Segment nach der Basis hin stärker verschmälert. In der Thoraxbildung steht die Art dem *O. striolatus* am nächsten.

L. 5 mm.

Südliches Schweden.

25. **O. liogaster** Thoms. 1887 *Omorga liogaster* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1130 ♀.

Metathorax mit starken Leisten, Area superomedia fast quer, Area petiolaris runzlig, oben mehr glatt und glänzend; Mesopleuren fein gerunzelt und ziemlich glänzend. Hinterleib sehr sparsam pubescent und deshalb glänzender; Postpetiolus niedergedrückt und fast quadratisch; das 2. Segment kaum so lang als breit; Bohrer von halber Hinterleibslänge. — Schwarz; Schenkel und Schienen rot, die hintersten Schienen dunkel gezeichnet. Von den beiden vorhergehenden Arten, was die Färbung anbetrifft, durch die an der Basis nicht schwarz gezeichneten Hinterschenkel verschieden.

L. 5 mm.

Schweden.

26. **C. solitarius** Brischke. 1880 *Limneria solitaria* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig, N. F. IV p. 157 ♀.

Matt, kurz seidenhaarig. Kopf hinter den Augen verschmälert; Fühler so lang wie der halbe Körper. Thorax bucklig; Mittelbrustseiten gestreift; Metathorax kurz, steil abfallend, mit je 2 fein umleisteten Seitenfeldern; Area posteromedia breit, schwach vertieft. Areola im Vorder-

flügel gestielt, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend; Nervellus unter der Mitte gebrochen. Das 1. Hinterleibssegment so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus convex, mit gerundeten Seiten; das 2. Segment länger als breit, das 3. quadratisch; Bohrer kürzer als der halbe Hinterleib. — Schwarz; Palpen gelb. Tegulä gelb; Flügel schwach getrübt, Stigma hellbraun. Beine rot, Hüften und Trochanteren schwarz, Spitze der hintersten Schienen und die Hintertarsen braun, letztere an der Basis rötlich; Schiensporen gelblichweiss.

L. 8 mm.

Deutschland. — Aus der Raupe von *Eupithecia pimplinellaria*.

27. **O. forticosta** Thoms. 1887 *Omorga forticosta* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1131 ♀♂.

Scheitel nach hinten etwas verschmälert. Metathorax mit starken Leisten. Das 2. Hinterleibssegment kaum länger als breit; Bohrer von halber Hinterleibslänge. — Schwarz; Schenkel, Schienen und die vorderen Trochanteren rötlichgelb.

Die von Thomson gegebene Beschreibung ist sehr kurz. In der hellen, mehr gelblichen Färbung der Beine stimmt die Art mit *O. nigridens* und *striolatus* überein; von der ersteren unterscheidet sie sich durch die starken Leisten des Metathorax, von der zweiten ausserdem noch durch die nicht dunkel gezeichneten Hinterschienen.

L. 5 mm.

Schweden.

28. **O. nigridens** Thoms. 1887 *Omorga nigridens* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1130 ♀♂.

Aehnlich dem *O. angulatus*, aber schlanker, die Brustseiten fein gerunzelt; Metathorax mit feinerer Skulptur und mit schwachen Leisten; Hinterleib stärker zusammengedrückt. — Schwarz; Beine rötlichgelb, Hüften und die hintersten Trochanteren schwarz. Beim ♂ die hintersten Kniee und die Spitzen der hintersten Schienen und Tarsen gebräunt.

L. 5 mm.

Im südlichen Schweden bei Lund gefunden.

29. **O. striolatus** Thoms. 1887 *Omorga striolata* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1131 ♀♂.

Metathorax fein punktiert, ohne Glanz; Area superomedia quer; Brustseiten vor dem glänzenden Speculum mit

Querstreifen. Das 2. Hinterleibssegment fast etwas breiter als lang. — Schwarz; Mandibeln in der Mitte braun. Beine rötlichgelb; Hüften und die hintersten Trochanteren schwarz; an den hintersten Beinen die Kniee, Basis und Spitze der blassgelben Schienen und die Tarsen gebräunt. Beim ♂ die Tegulä braun.

L. 5 mm.

Schweden.

### III. Section. Hinterleib des ♀ zum Teil rot gezeichnet.

30. **O. hadrocercus** Thoms. 1887 *Omorga hadrocera* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1134 ♀.

Ausgezeichnet durch die Fühlerbildung, den flachen Postpetiolus, den kurzen Bohrer und die charakteristische Färbung des Hinterleibs. Fühler kurz und dick, die vorletzten Glieder quer mit absteher Behaarung. Postpetiolus ziemlich flach; das 2. Segment fast breiter als lang; Bohrer kaum länger als das 1. Segment. — Schwarz; Schaft unten hell gezeichnet. Schenkel und Schienen gelblich, die hintersten Schienen mit dunkler Zeichnung. Segment 2 und 3 schmutzig gelblich gefärbt.

L. 5 mm.

Von Förster bei Aachen gefunden.

31. **O. ferinus** Holmgr. 1858 *Limneria ferina* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. Vol. 2, p. 68 ♀♂ | 1887 *Omorga ferina* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1133 ♀♂.

Die Art erinnert sehr an die Gattungen *Meloboris* und *Diadegma*, aber der Kopf ist nicht kubisch und der Nervellus gebrochen.

Kopf nach hinten verschmälert. Metathorax gerunzelt; Area superomedia hinten offen, Seitenfelder geteilt. Klauenglied und Klauen gross. Das 1. Segment so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren, Postpetiolus convex, mit gerundeten Seiten, doppelt so breit als der Petiolus; das 2. Segment etwas länger als breit; Bohrer etwa so lang wie der halbe Hinterleib. — Schwarz, weisslich pubescent. Palpen und Mandibeln mit Ausnahme der Spitze gelblich. Schaft selten auf der Unterseite heller gefärbt. Stigma im Vorderflügel bräunlichgelb, Tegulä gelblichweiss. Beine mit Einschluss der Hüften rötlich, die vorderen Hüften und Trochanteren zum Teil gelblich; Tarsen an der Spitze gebräunt. Das 1. Segment am Ende, das 2. und 3. ganz, das 4. an der Basis rot.

L. 7 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

32. **O. litoreus** Thoms. 1887 *Omorga litorea* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1134 ♀♂.

Metathorax hinten runzlig-punktiert; Area superomedia kurz. Das 2. Segment fast etwas breiter als lang. — Schwarz; die vorderen Hüften und Trochanteren gelb, die hintersten Hüften schwarz; Schenkel und Schienen rot, Hinterschienen an Basis und Spitze schwärzlich. Endrand von Segment 2, 3 ganz, 4—7 unten rot. Fühlerschaft beim ♂ zuweilen unten gelblich, die rote Hinterleibszeichnung verschwommen; die hintersten Schenkel schwärzlich.

L. 4—5 mm.

Schweden.

33. **O. unicingulatus** n. sp.

♂ Körper fein lederartig, matt, nur der Hinterleib nach hinten schwach glänzend. Kopf kurz und quer, nach hinten rundlich verschmälert; Fühler von  $\frac{3}{4}$  Körperlänge; Gesicht ziemlich dicht weisslich behaart; Schildchen stark convex, ohne Glanz; Metathorax mit starken Leisten, ziemlich grob gerunzelt, Area superomedia kurz, mit der Area petiolaris vollständig verschmolzen; dieser Raum flach, mit Spuren von Querrunzeln; Seitenfelder geteilt. Brustseiten matt; Speculum poliert, der Raum davor mit deutlichen Längsstreifen. Radius am Ende gerade; Areola ziemlich klein, gestielt, den rücklaufenden Nerv weit hinter der Mitte aufnehmend; Nervellus tief unter der Mitte schwach gebrochen. Das 1. Hinterleibssegment etwas länger als die hintersten Hüften und Trochanteren; seine Luftlöcher stark vorspringend; Postpetiolus nach hinten verengt, mit schwach gerundeten Seiten, doppelt so breit als der Petiolus; das 2. Segment doppelt so lang als hinten breit, das 3. quadratisch, das 4. etwas breiter als lang. — Schwarz; Palpen, Mandibeln und Tegulä weisslichgelb; Stigma bräunlichgelb. Beine mit Ausnahme der Hüften und hinteren Trochanteren trüb rot; die hintersten Schienen an Basis und Spitze nur schwach gebräunt. Das 3. Segment mit breitem roten Hinterrand. Bauchfalte bräunlichgelb.

L. 5 mm.

Ich fand einige ♂♂ bei Blankenburg in Thüringen.

34. **O. cingulatus** Brischke. 1880 *Limneria cingulata* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 170 ♂.

Matt, mit kurzer weisser Behaarung. Kopf nach hinten nicht verschmälert; Fühler von etwa halber Körperlänge. Thorax etwas länger als hoch; Metathorax mit 5 Feldern, Area superomedia sechseckig, geschlossen. Areola gestielt,

den rücklaufenden Nerv etwas vor der Mitte aufnehmend; Radius am Ende gebogen; Nervellus fast in der Mitte gebrochen. Das 1. Hinterleibssegment so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus allmählich nach hinten verbreitert, mit sanft gerundeten Seiten; das 2. Segment länger als breit, das 3. quadratisch. — Schwarz; Palpen, Mandibeln und Tegulä weisslichgelb. Stigma braun. Vorderbeine gelbrot, Basis der Hüften schwarz; Hinterbeine rot, Hüften und Basis der Trochanteren schwarz, Schienen gelbrot, vor der Basis und an der Spitze, sowie die Tarsen braun. Das 2. und 3. Segment mit breitem roten Hinterrand.

L. 7 mm. — Nur das ♂ bekannt.

Deutschland.

35. **O. multicinctus** Grav. 1829 *Campoplex multicinctus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 534 ♀ ♂ | 1858 *Limneria multicincta* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 71 ♀ | 1887 *Omorga multicincta* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1134 ♀ ♂.

Fein lederartig, matt, mit weisslicher Behaarung. Kopf nach hinten verschmälert; Gesicht stark behaart; Fühler schlank, etwas länger als Kopf und Thorax. Metathorax fein gerunzelt; Area superomedia hinten vollständig offen; Seitenfelder geteilt. Radius am Ende gerade; Areola gestielt, klein, den rücklaufenden Nerv etwas hinter der Mitte aufnehmend; Nervellus unter der Mitte schwach gebrochen. Hinterleib gegen das Ende deutlich zusammengedrückt; das 1. Segment so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus convex; an den Seiten gerundet, doppelt so breit als der Petiolus; das 2. Segment um  $\frac{1}{3}$  länger als hinten breit; das 3. etwa so lang als breit; Bohrer etwas länger als der halbe Körper. — Schwarz; Schaft unten rötlichgelb; Palpen und Mandibeln mit Ausnahme der Spitze gelblich. Stigma bräunlichgelb, Tegulä gelblich weiss. Vorderbeine rötlich gelb, die Hüften an der Basis schwarz, Trochanteren und Aussenseite der Schienen blassgelb; an den hintersten Beinen die Hüften und Trochanteren schwarz, Schenkel rot, gewöhnlich zum Teil braun oder schwärzlich, Schienen weisslich, nahe der Basis und an der Spitze mit den Tarsen schwärzlich, letztere mit weisslicher Basis. Segment 2—7, zuweilen auch der Postpetiolus, mit rotem Hinterrande, 3—7 auch an den Seiten rot. Bauchfalte gelblich. Beim ♂ ist die rote Hinterleibsfärbung meist verschwommen.

L. 5—7 mm.

Nord- und Mitteleuropa; nicht häufig.



36. **O. orientalis** n. sp.

Kopf und Thorax matt, fein weisslich pubescent, am dichtesten im Gesicht und auf dem Metathorax. Kopf nach hinten rundlich verschmälert, etwas breiter als der Thorax; Fühler länger als Kopf und Thorax, gegen das Ende verdünnt, die letzten Glieder perlschnurförmig. Metathorax fein gerunzelt, hinten nicht vertieft, mit feinen Leisten; Area superomedia länger als breit, pentagonal, hinten offen. Brustseiten matt, Speculum poliert, der Raum davor mit deutlichen Schrägleisten. Endabschnitt des Radius gerade; Areola unregelmässig, kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv ziemlich weit hinter der Mitte aufnehmend; Nervulus interstitial; Nervellus tief unter der Mitte sehr schwach gebrochen. Das 1. Hinterleibssegment lang und schlank, glänzend; der übrige Hinterleib matt, gegen das Ende etwas glänzender. Postpetiolus länger als breit, convex, an den Seiten schwach gerundet; das 2. Segment  $2\frac{1}{2}$  mal so lang als hinten breit, das 3. Segment etwas länger als breit, das 4. und 5. so lang wie breit. Bohrer etwas länger als der halbe Hinterleib. — Schwarz; Schaft und Pedicellus rötlichweiss, Schaft auf der Oberseite zum Teil gebräunt. Palpen und Mandibeln weisslich gelb. Tegulä weisslich; Stigma braun. Hüften und Trochanteren gelblich weiss. Die hintersten Hüften mit Ausnahme der Spitze schwarz. Schenkel und Schienen rötlich, die Vorderschienen zum Teil gelblich; die hintersten Schenkel an der Basis, zum Teil auch auf der Oberseite gebräunt; die hintersten Schienen bräunlichrot, hinter der weisslichen Basis und an der Spitze dunkler; die hintersten Tarsen braun. Segment 3—7 an den Seiten rot, die rote Färbung nach hinten breiter werdend, sodass die hintersten Segmente fast ganz rot sind, nur mit einer dunklen Längsmakel oben an der Basis. Das 1. und 2. Segment sind zuweilen am Endrande schmal rot. Bauchfalte blassgelb.

L. 6—8 mm.

Ich erhielt diese Art in einer Reihe von Exemplaren von Jerusalem durch Herrn J. Aharony, Lehrer an der Kunstgewerbeschule Bezalel in Jerusalem.

37. **O. melanostictus** Grav. 1829 *Campoplex melanostictus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 539 ♀ | 1858 *Limneria melanosticta* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 70 ♀ | 1887 *Omorga melanosticta* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1132 ♀♂.

Kopf nach hinten kaum verschmälert; Fühler länger als der halbe Körper; Wangen aufgetrieben. Metathorax fein gerunzelt; Area superomedia pentagonal, hinten offen;

Seitenfelder geteilt; Brustseiten mit poliertem Speculum, der Raum davor mit Schrägstreifen. Stigma im Vorderflügel gross, dreieckig; Areola kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend; Nervellus unterhalb der Mitte sehr schwach gebrochen. Das 1. Hinterleibssegment etwas länger als die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus convex, mit gerundeten Seiten, doppelt so breit als der Petiolus; das 2. Segment kaum länger als breit; die folgenden quer; Bohrer so lang wie das 1. Segment. — Schwarz, weisslich pubescent. Palpen und Mandibeln mit Ausnahme der Zähne blassgelb. Schaft in der Regel unten rötlichgelb gefleckt. Stigma im Vorderflügel bräunlichgelb, Tegulä gelblichweiss. Vorderbeine rötlichgelb mit schwarzen Hüften; die hintersten Beine schwärzlich, die Schienen an der Basis schmal weisslich, in der Mitte breit gelblich. Postpetiolus und die folgenden Segmente rot, Basis der Segmente mit schwärzlicher Rückenmakel. Die schwarzen Flecken beginnen zuweilen erst auf dem 4. Segmente.

Var. ♀. Hinterleib rot, nur die Basis des Petiolus schwarz.

L. 4—5 mm.

Nord- und Mitteleuropa.

38. **O. fusicornis** Thoms. 1887 *Omorga fusicornis* Thomson, Opusc. ent. XI, p. 1132 ♀.

Ich bemerke, dass die Art *O. fusicornis* heisst, wegen der spindelförmigen Gestalt der Fühler, nicht *O. fusicornis*, wie Dalla Torre in seinem Katalog druckt. Es liegt also kein Druckfehler vor.

„Schwarz, Mandibeln und Tegulä braun; Fühler lang, vor dem Ende etwas verdickt. Im Vorderflügel das Stigma schmal, die Areola ziemlich breit. Schenkel und Schienen rot, die hintersten Schienen an Basis und Spitze dunkel gezeichnet. Segment 2—7 an den Seiten rötlich; Bohrer kurz und ziemlich dick.

L. 5 mm.

Von Förster bei Aachen gefunden.“

39. **O. Rothi** Holmgr. 1858 *Limneria Rothii* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 56 ♀♂ | 1887 *Omorga Rothi* Thomson, Opusc. ent. XI, p. 1132 ♀♂.

Körper ziemlich schlank, lederartig, matt. Kopf nach hinten verschmälert; Gesicht weisslich behaart; Fühler etwas länger als der halbe Körper. Thorax länger als hoch, fein weisslich behaart; Metathorax hinten schwach

eingedrückt, mit feinen Leisten; Area superomedia länglich, pentagonal, hinten offen; Seitenfelder nicht scharf von einander getrennt. Areola im Vorderflügel sehr kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv ziemlich in der Mitte aufnehmend; Nervellus tief unter der Mitte undeutlich gebrochen. Hinterleib gegen das Ende deutlich zusammengedrückt; das 1. Segment so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus convex, an den Seiten gerundet; das 2. Segment um  $\frac{1}{3}$  länger als breit, das 3. wenig kürzer als breit; Bohrer etwas länger als das 1. Segment. — Schwarz; Palpen und Tegulä blassgelb. Stigma im Vorderflügel bräunlich. Beine rötlichgelb; Hüften schwarz, die vordersten an der Spitze gelblich; die hintersten Schenkel am Ende, zuweilen auch ein Längsstreif auf der Oberseite, die hintersten Schienen an Basis und Spitze und die Tarsen braun. Segment 3—7 an den Seiten rot. Bauchfalte blassgelb. Das ♂ hat einen schwärzlichen Hinterleib, auch ist die dunkle Färbung der hintersten Schenkel ausgedehnter.

L. 4—5 mm.

Nord- und Mitteleuropa; nicht allzu selten.

40. **O. ensator** Grav. 1829 *Campoplex ensator* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 576 ♀♂ | 1858 *Limneria ensator* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 72 ♀ | 1887 *Omorga ensator* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1133 ♀.

Aehnlich dem *O. multicinctus*, aber Kopf etwas aufgetrieben, nach hinten nicht verengt, Fühlerschaft ganz schwarz, Hinterleib nur an den Seiten rot und Bohrer kürzer. Von *O. Rothi* durch die Kopfbildung und Färbung der Beine verschieden.

Kopf nach hinten nicht verschmälert. Metathorax hinten schwächer eingedrückt, als bei *O. Rothi*; Seitenfelder vollständig von einander getrennt. Das 2. Hinterleibssegment wenig länger als breit. Bohrer etwas länger als das 1. Segment. — Schwarz, fein weisslich behaart. Palpen und Mandibeln mit Ausnahme der Zähne blassgelb. Stigma im Vorderflügel bräunlichgelb, Tegulä weisslich. Beine rot; Hüften und die hintersten Schenkel an Basis und Spitze schwarz; die vorderen Trochanteren und die hintersten Schienen weisslich, letztere an Basis und Spitze dunkel gezeichnet. Segment 3—7 an den Seiten rot gefleckt. Bauchfalte blassgelb.

Die von Gravenhorst angeführten Varietäten 2 und 3 beziehen sich auf verwandte Arten.

L. 5 mm.

Nord- und Mitteleuropa. — Aus *Grapholitha ocellana*.

41. **O. continuus** Thoms. 1887 *Omorga continua* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1132 ♀.

„Endabschnitt des Radius wenig länger als der Basalabschnitt. Der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle fast ein rechter. — Schwarz; Mund und Tegulä weisslich. Vorderschenkel und die Schienen rot, die hintersten Schienen an Basis und Spitze dunkel gezeichnet. Segment 3—7 an den Seiten rot.

L. 5 mm.

Schweden.“ Die Art ist mir unbekannt.

42. **O. gastroides** Grav. 1829 *Campoplex gastroides* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 538 ♀ | 1887 *Omorga gastroides* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1133 ♀.

Die Art ähnelt sehr dem *O. ensator*, aber die hintersten Schenkel sind ganz schwarz, der Schaft ist unten meist hell gezeichnet und die Area superomedia ist gestreckter. — Schwarz; Palpen und Mitte der Mandibeln blassgelb; Schaft unten meist hell gefleckt. Stigma im Vorderflügel bräunlichgelb; Tegulä weisslich. Areola unregelmässig, kurz gestielt. Beine schlank; Vorderbeine rötlichgelb, Trochanteren gelb, Hüften schwarz; die hintersten Schenkel schwarz, die Schienen weisslichgelb, hinter der Basis schmal, am Ende breit schwärzlich; Tarsen dunkelbraun, Basis des Metatarsus weisslich. Segment 3—7 an den Seiten rot; Bauchfalte gelblich. Bohrer reichlich so lang wie der halbe Hinterleib.

Kleine Art von 4 mm Länge.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

43. **O. tumidulus** Grav. 1829 *Campoplex tumidulus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 594 | 1872 *Limneria tumidula* Marshall, Cat. Brit. Hymen. p. 58 ♀ | 1887 *Omorga tumidula* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1133 ♀.

Auch diese Art ist dem *O. ensator* sehr ähnlich und unterscheidet sich hauptsächlich durch den stark convexen und rundlich verbreiterten Postpetiolus und durch die schwarzen hintersten Schenkel. — Schwarz, weisslich behaart; Palpen und Mandibeln blassgelb. Stigma im Vorderflügel bräunlichgelb; Tegulä gelblichweiss. Areola kurz gestielt, unregelmässig. Vorderbeine rot; Hüften schwarz, Trochanteren gelblich; Vorderschienen zum Teil gelblich, die mittelsten hinter der Basis und an der Spitze gebräunt. Die hintersten Beine schwärzlich, die Schenkel in der Mitte zuweilen braun; die Schienen an der Basis schmal, in der Mitte breit blassgelb oder weisslich; die Tarsen braun, der

Metatarsus an der Basis weisslich. Segment 3—6—7 an den Seiten braunrot gefleckt, auch der schmale Endrand der Rückensegmente rötlich. Bohrer so lang wie der halbe Hinterleib.

L. 6 mm.

Nord- und Mitteleuropa.

### 36. Gen. **Lathroplex** Först.

1868 Lathroplex Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 154.

Kopf kurz, nach hinten verschmälert; Fühlergeissel dick, Clypeus convex, mit kleinen Seitengruben; Mandibeln schwach. Thorax langgestreckt, Area superomedia lang, Costula vor der Mitte. Radialzelle lang und ziemlich breit; Endabschnitt des Radius wenigstens doppelt so lang als der Basalabschnitt; Areola unregelmässig, gestielt, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle ein rechter; Nervellus schräg, schwach gebrochen. Beine mit dicken Schienen, kurzen Sporen und kleinen Klauengliedern und Klauen. Das 1. Hinterleibssegment ohne Seitengrübchen; Postpetiolus ziemlich schmal; das 2. Segment lang, fein gerunzelt und ausserdem deutlich punktiert. Bohrer kurz.

**L. clypearis** Thoms. 1887 L. clypearis Thomson, Opusc. ent. XI p. 1135 ♀♂.

„Schwarz; Mund und Tegulä weisslich. Vorderbeine und die hintersten Schenkel, Schienen und Tarsen hell gefärbt, die hintersten Schenkel auf der Oberseite gebräunt, beim ♂ fast ganz schwarz. Das 2. Segment mit rötlichem Endrand.

L. 4 mm.

Schweden.“ Mir ist die Gattung noch nicht vorgekommen.

### 37. Gen. **Callidora** Först.

1868 Callidora Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 157.

Kopf von vorn gesehen dreieckig, nach hinten deutlich verschmälert; Scheitel kurz, Augen gross; Fühlergeissel beim ♀ oben mit weissem Ring; Clypeus mit deutlichen Seitengruben; Mandibeln klein. Thorax lang; Metathorax gefeldert; Area superomedia quer, hinten gewöhnlich offen; Brustseiten längsrunzlig, mit ziemlich mattem Speculum. Radialzelle breit und ziemlich kurz, Endabschnitt des Radius um die Hälfte länger als der Basalabschnitt; Areola gross, gestielt, den rücklaufenden Nerv vor der Mitte aufnehmend; Basalnerv ziemlich

steil; Nervulus schief, hinter der Gabel; Nervellus sehr schwach oder gar nicht gebrochen. Beine ziemlich kräftig; Hinter-schienen mit langen Endsporen; Klauenglied und Klauen klein. Hinterleibsstiel lang und dünn, ohne Seitengrübchen; Postpetiolus schmal, an den Seiten leicht gerundet; das 2. Segment weit länger als breit; die Luftlöcher hinter der Mitte. Bohrer die Hinterleibsspitze kaum überragend.

Die Weibchen sind an den weissen Fühlerringen leicht zu erkennen; dadurch erinnert die Gattung an *Cymodusa*. Den Männchen fehlt der Ring; sie sind an der grossen Areola und der Einmündung des rücklaufenden Nerven kenntlich; sie haben dadurch eine gewisse Aehnlichkeit mit manchen Arten von *Sagaritis*.

#### Uebersicht der Arten.

Hinterleib schwarz, das 2. Segment ohne roten Hinterrand.

##### 1. **albovincta** Holmgr.

Hinterleib schwarz, das 2. Segment hinten und zuweilen auch an den Seiten rot.

##### 2. **annellata** Thoms.

1. **C. albovincta** Holmgr. 1858 *Limneria albovincta* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 56 ♀ | 1887 *Callidora albovincta* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1136 ♀♂.

Körper fein gerunzelt, matt, ziemlich dicht weisslich pubescent. Schwarz; Palpen, Oberlippe und Mandibeln mit Ausnahme der Zähne blassgelb. Mitte der Fühlergeissel beim ♀ innen mit breitem weissen Ring. Flügel schwach getrübt, Stigma bräunlich, Tegulä gelblichweiss. Vorderbeine rötlich, Trochanteren und Hüften heller, letztere an der Basis schwärzlich; an den hintersten Beinen die Hüften und Basis der Trochanteren schwarz; Schenkel rötlich, zuweilen an der äussersten Spitze, sehr selten auch an der Basis verdunkelt; Schienen rotgelb, an Basis und Spitze gebräunt; Tarsen dunkelbraun. Der Einschnitt zwischen dem 2. und 3. Segment meist braunrot. Bauchfalte blassgelb.

L. 6–7 mm.

Nord- und Mitteleuropa; meist selten.

2. **C. annellata** Thoms. 1887 *Callidora annellata* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1136 ♀♂.

„Schwarz; Beine rot, an den hintersten Beinen die Schienen, Trochanteren und die äusserste Basis und Spitze der Schienen schwarz; das 2. Segment mit rotem Endrande, beim ♀ auch hinten an den Seiten rot. Bauchfalte blassgelb.

L. 5 mm.

Nord- und Mitteleuropa.“

Der kurzen Beschreibung füge ich hinzu, dass die Palpen, Mandibeln mit Ausnahme der Spitzen und die Tegulä blassgelb sind. Bei dem ♂ sind die vorderen Hüften und Trochanteren gelblichweiss, die Hüften an der Basis rötlich.

Ich finde keinen durchgreifenden Unterschied zwischen den beiden Arten. Thomson sagt von der *C. albovincta*: „*deuteri margine vix castaneo*“; dagegen sagt Holmgr. von seiner *albovincta*: „*Abdomen incisura secunda castanea*“. So gehören auch die Weibchen, die ich hier in Thüringen gefangen habe, besser zu *albovincta*, während die Männchen sämtlich der *annellata* entsprechen.

### 38. Gen. **Nepiera** Först.

1868 *Nepiera* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 156.

Kopf kurz, nach hinten verschmälert, etwas breiter als der Thorax; Fühler gegen das Ende wenig verdünnt, etwas länger als der halbe Körper; Clypeus am Ende abgestutzt, mit kleinen Seitengruben. Thorax lang, ziemlich stark pubescent; Schulterbeulen meist hell gefärbt; Metathorax mit feinen Leisten; Area superomedia langgestreckt, fast pentagonal, hinten offen. Areola im Vorderflügel klein, ziemlich regelmässig, kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv ziemlich in der Mitte aufnehmend; Nervellus schräg, unterhalb der Mitte sehr schwach gebrochen. Hinterleib schlank, etwas länger als Kopf und Thorax zusammen; Segmente mit hellen Endrändern und meist auch Seiten; Hinterleibsstiel schlank, mit deutlichen Seitengrübchen; Postpetiolus wenig länger als breit, mit ziemlich parallelen Seiten; das 2. Segment wenigstens um  $\frac{1}{3}$  länger als hinten breit, die Luftlöcher fast etwas hinter der Mitte; das 3. Segment etwa so lang wie breit; Bohrer so lang oder etwas kürzer als das 1. Segment.

Zu dieser Gattung wurde bisher als einzige Art die *Limneria concinna* Holmgr. gerechnet; ich glaube, dass auch die *Limneria clypeata* Brischke hierher gehört.

#### Uebersicht der Arten.

Die hintersten Schenkel an der äussersten Spitze und Basis gebräunt; die hintersten Schienen und Tarsen schwärzlich, die Schienen an der Basis schmal, in der Mitte breit weisslich. Bohrer kürzer als das 1. Segment. Schulterbeulen weisslich. 5—6 mm.

#### 1. **concinna** Holmgr.

Beine rotgelb, die vorderen Hüften und alle Trochanteren gelb, Basis der Hinterschienen breit gelblichweiss, ebenso

die Basis der 3 ersten Tarsenglieder. Clypeus und Unterseite des Fühlerschaftes gelblich.

## 2. *clypeata* Brischke.

1. **N. concinna** Holmgr. 1858 *Limneria concinna* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 84 ♀ ♂ | 1887 *Nepiera concinna* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1137 ♀ ♂.

Schwarz, weisslich pubescent. Palpen und Mandibeln gelblich, letztere mit dunklen Zähnen. Fühlerschaft in der Regel unten hell gefleckt. Schulterbeulen weisslich. Flügel kaum getrübt; Stigma bräunlich, Tegulä gelblichweiss. Vorderbeine rötlich, Hüften und Trochanteren gelblichweiss. Schienen zum Teil gelblich. Die hintersten Hüften und Trochanteren schwarz, am Ende blassgelb; Schenkel rötlich, an der äussersten Basis und Spitze gebräunt; Schienen und Tarsen schwärzlich, erstere an der Basis schmal, in der Mitte breit weisslich. Das 1. Segment meist mit rötlichem Hinterrand, die folgenden mit mehr gelblichen oder weisslichen Hinterrändern und mit meist rötlichen Seiten; Bauchfalte gelblich.

L. 5—6 mm.

Thomson sagt, dass die Art in Nord- und Mitteleuropa nicht selten sei; dem gegenüber muss ich sagen, dass mir das Tier nur selten vorgekommen ist.

2. **N. clypeata** Brischke. 1880 *Limneria clypeata* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 171 ♀ ♂.

Matt; kurz seidenartig behaart; Gesicht und Clypeus mit längerer Behaarung. Kopf nach hinten wenig verschmälert; Wangen gerundet; Fühler länger als der halbe Körper. Thorax länger als hoch; Metathorax mit 5 Feldern, Area superomedia pentagonal, hinten offen. Areola im Vorderflügel gestielt, schief, den rücklaufenden Nerv weit hinter der Mitte aufnehmend; Radius am Ende gekrümmt; Nervellus kaum gebrochen. Das 1. Segment so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus etwas gewölbt; das 2. Segment länger als breit. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeus, Unterseite des Fühlerschaftes und Tegulä gelb. Beim ♂ die Fühler unten gelbbraun. Stigma im Vorderflügel gelblich. Beine rotgelb; vordere Hüften und alle Trochanteren gelb; Basis der Hinterschienen breit gelblichweiss, ebenso die Basis der Glieder 1—3 der Hintertarsen. Hinterrand der Segmente 2—5 beim ♀ rot, beim ♂ breit gelblich.

L. 4 mm.

Deutschland. — Aus den Larven von *Nematus Valisnieri* und *Cryptocampus* gezogen.



39. Gen. **Tranosema** Först.

1868 Tranosema, Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 157.

Kopf kurz; Clypeus mit kleinen Seitengruben. Thorax etwas bucklig; Metathorax glatt oder runzlig-punktiert, seine Leisten ziemlich schwach; Speculum glänzend oder matt. Areola im Vorderflügel deutlich, unregelmässig; Nervellus ziemlich schräg, kaum gebrochen. Beine rot, mit schwarzen Hüften. Hinterleib spindelförmig, schwarz; das 1. Segment mit deutlichen Seitengruben; Postpetiolus quadratisch oder etwas länger als breit; das 2. Segment nicht länger als breit, seine Luftlöcher etwas vor der Mitte. Bohrer dick, etwa so lang wie das 1. Segment.

## Uebersicht der Arten.

1. Das 1. Segment so lang als breit, nicht quer. Speculum matt. Metathorax mit undeutlichen Leisten. Postpetiolus länger als breit. 5—6 mm.

1. **arenicola** Thoms.

Das 2. Segment etwas breiter als lang. Speculum glänzend. Postpetiolus quadratisch. 2.

2. Metathorax glänzend, Area superomedia hinten geschlossen. 5 mm.

2. **pedella** Holmgr.

Metathorax runzlig punktiert, Area superomedia kürzer, quer, hinten offen. Von gedrungenerer Gestalt als die vorhergehende Art. 5—6 mm.

3. **latiuscula** Thoms.

1. **T. arenicola** Thoms. 1887 Tranosema arenicola Thomson, Opusc. ent. XI p. 1138 ♀♂ | ? Limneria robusta Woldstedt, Bull. acad. sc. Pétersbourg XXII p. 394 ♀♂.

Gesicht des ♀ nach vorn etwas verengt; Clypeus convex. Metathorax runzlig-punktiert, mit undeutlichen Leisten; Brustseiten mit mattem Speculum. Postpetiolus etwas länger als breit; das 2. Segment nicht quer. — Schwarz; Stigma im Vorderflügel bräunlich; Tegulä weisslich. Beine rot, Hüften schwarz, Vorderhüften an der Spitze hell.

L. 5—6 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

2. **T. pedella** Holmgr. 1858 Limneria pedella Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 73 ♀♂ | 1887 Tranosema pedella Thomson, Opusc. ent. XI p. 1138 ♀♂.

Kopf nach hinten kaum verschmälert; Gesicht quer; Fühler von etwa  $\frac{2}{3}$  Körperlänge. Metathorax ziemlich

glatt und glänzend; Area superomedia hinten geschlossen, Seitenfelder geteilt; Brustseiten mit glänzendem Speculum. Hinterleib hinten wenig zusammengedrückt; das 1. Segment etwas kürzer als die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus quadratisch, wenig kürzer als der Petiolus; das 2. Segment quer. — Schwarz; Palpen und Mandibeln mit Ausnahme der Zähne gelblich. Fühlerbasis auf der Unterseite zuweilen rötlichgelb. Flügel kaum getrübt, Stigma bräunlichgelb, Tegulä gelblichweiss. Beine rötlich, Trochanteren gelblich, Hüften schwarz; Vorderhüften am Ende gelblich, sehr selten ganz hell; die hintersten Schienen an der Aussenseite zuweilen verdunkelt; die hintersten Tarsen braun.

L. 5—6 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

3. **T. latiuscula** Thoms. 1887 *Tranosema latiuscula* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1138 ♀.

Der vorhergehenden Art sehr ähnlich aber etwas breiter und grösser, der Metathorax runzlig-punktiert, die Area superomedia kürzer, quer, hinten nicht geschlossen. Die Spitze der Vorderhüften und die Trochanteren sind rot, sonst ist die Färbung der Beine wie bei *T. pedella*.

L. 5—6 mm.

Die Art wurde bei Lund im südlichen Schweden entdeckt.

#### 40. Gen. **Olesicampe** Först.

1868 *Olesicampe* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 153.  
1887 *Olesicampa* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1139.

Kopf nach hinten nicht oder kaum verschmälert, mehr oder weniger ausgeprägt kubisch; Scheitel breit; Wangen aufgetrieben, ziemlich lang; Mandibeln gelb, lang und kräftig, gegen das Ende nicht verschmälert, der untere Zahn länger als der obere; Clypeus am Ende abgestutzt, mit kleinen Seitengruben. Fühlerschaft gross, unten stets hell gezeichnet; Fühlergeissel lang, gegen das Ende, namentlich beim ♀ hell gefärbt. Thorax cylindrisch; Metathorax mit schwachen, oft sehr undeutlichen Leisten; Costula fast durchweg fehlend, die beiden Seitenfelder also von einander nicht getrennt; Area superomedia lang, pentagonal, nicht selten nur angedeutet. Tegulä fast stets weisslich. Stigma im Vorderflügel gelblich; Radialzelle nicht breit; Areola ziemlich gross, meist etwas sitzend oder nur ganz kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle

spitz; Nervulus parallelus aus der Mitte der Brachialzelle entspringend; Nervellus vertikal, nicht gebrochen. Beine kräftig, rot, die hintersten Hüften stets schwarz, die hintersten Schienen an der Basis meist mit weisslichem Ring, dahinter selten dunkel gezeichnet; Fussklauen ziemlich lang und wenigstens an der Basis gekämmt. Hinterleibsmitte fast stets mehr oder weniger ausgedehnt rot gezeichnet, das 1. Segment mit scharfem Seitenrand, Petiolus meist mit deutlichen Seitenrillen, Postpetiolus in der Regel länger als breit, an den Seiten wenig gerundet; das 2. Segment länger als breit; Bohrer nicht vorragend.

Die durchweg ziemlich grossen Arten dieser Gattung sind besonders zu erkennen an dem aufgetriebenen Kopfe, dem längeren unteren Mandibelzähne, den gegen das Ende fast stets gelblich gefärbten Fühlern und dem nicht gebrochenen Nervellus.

#### Uebersicht der Arten.

1. Tegulä schwarzbraun. Pronotum gestreift. Area supero-media kurz. Hinterleibsmitte rot. Die hintersten Schenkel ganz oder grösstenteils schwarz. 7—9 mm.

##### 1. **auctor** Grav.

Tegulä weisslich. Pronotum nicht gestreift. 2.

2. Petiolus ohne Seitengrübchen und ohne Seitenfurche. Metathorax fast ohne Leisten. Hinterleibsmitte rot; Bauchfalte gelb. Grössere Arten von 7—9 mm. 3.

Petiolus mit deutlicher Seitenfurche, meist auch mit deutlichen Seitengrübchen. Meist kleinere Arten von 5—7 mm. 6.

3. Die hintersten Schienen am Ende nicht schwarz. Speculum matt. Der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle fast ein rechter. Wangen nicht ausgehöhlt. 8—9 mm.

##### 2. **fulviventris** Gmel.

Die hintersten Schienen am Ende schwärzlich. Wangen ausgehöhlt. 4.

4. Die hintersten Schenkel rot. Das 2. Fühlerglied (Pedicellus) linsenförmig. 7—8 mm.

##### 3. **patellana** Thoms.

Die hintersten Schenkel schwarz. 5.

5. Hinterleibsmitte schmal rot. Spitze der hintersten Schienen nicht breit schwärzlich. 7—8 mm.

##### 4. **cavigena** Thoms.

Das 1. und 2. Segment am Endrande, 3. und 4. ganz, 5. zum Teil rot. Die hintersten Schienen am Ende breit schwärzlich. 8 mm.

##### 5. **binotata** Thoms.

6. Hinterleib schwarz. 7.

Mitte, selten auch das Ende des Hinterleibs rot. 8.

7. Schenkel rot; die hintersten Schienen an der äussersten Spitze schwärzlich. Bauchfalte braun. 6—7 mm.

6. **sericea** Holmgr.

Die hintersten Schenkel und die Spitze der hintersten Schienen schwärzlich. Bauchfalte gelb. 7—8 mm.

7. **alboplica** Thoms.

8. Kopf bei ♀ und ♂ hinter den Augen erweitert. Beine dick, hellrot; nur die hintersten Hüften schwarz. Hinterleibsmittle breit rot. 7—8 mm.

8. **praecox** Holmgr.

Kopf nach hinten nicht erweitert, zuweilen etwas verengt. 9.

9. Bauchfalte an der Basis schwarz oder rotbraun. Das 1. Segment meist ganz oder zum Teil rot. 10.

Bauchfalte gelb oder rot. Das 1. Segment schwarz. 13.

10. Schulterbeulen und Trochantellus blassgelb. Vorderhüften rötlichgelb. Schenkel und Schienen rot, ohne dunkle Zeichnung. 6—7 mm.

9. **longipes** Grav.

Schulterbeulen und Trochantellus nicht gelb. 11.

11. Beine und Hinterleibsmittle braunrot. Die hintersten Schenkel an der Spitze, sowie die hintersten Schienen und Tarsen schwärzlich, der Metatarsus an der Basis weiss, die Schienen in der Mitte rötlich. Bauchfalte sehr dunkel. Das 1. Segment schwarz. 8—9 mm.

10. **nigroplica** Thoms.

Beine grösstenteils rot; die hintersten Schienen höchstens an Basis und Spitze schmal dunkel gezeichnet. Kleinere Arten. 12.

12. Die hintersten Tarsen dunkel. Area superomedia länger als breit, hinten offen. 5—6 mm.

11. **pagana** Holmgr.

Die hintersten Tarsen fast ganz hell. Area superomedia breit, mit der Area basalis verschmolzen.

12. **basalis** Thoms.

13. Clypeus am Ende breit hell. Hinterleib des ♀ auch am Ende hell. Schulterbeulen weisslich. Fühler gelb, an der Basis oben schwarz. Die hintersten Schenkel schwarz; alle Trochanteren hellgelb. 14.

Clypeus schwarz, selten beim ♂ mit heller Doppelmakel. Hinterleib bei ♀ und ♂ am Ende schwarz. 15.

14. Hinterleib rot, an der Basis schwarz. Wangen nicht hell. Schienen und Tarsen gegen das Ende braun. Körper stark weisslich behaart. 6—7 mm.

13. **flavicornis** Thoms.

Endhälfte des Hinterleibs rot, mit brauner Rückenbinde. Die hintersten Hüften am Ende, sowie die Wangen hell. 6—7 mm.

14. **gracilipes** Thoms.

15. Der hinterste Trochantellus stark knotenartig vortretend. Die hintersten Schenkel rot bis braun, die hintersten Schienen am Ende breit schwarz. 5—7 mm.

15. **fulcrans** Thoms.

Der hinterste Trochantellus nicht oder kaum vortretend. 16.

16. Die vorderen Hüften ganz oder grösstenteils schwarz. 17.

Die vorderen Hüften ganz oder grösstenteils hell. Postpetiolus und das 2. Segment deutlich länger als breit. 21.

17. Die hintersten Schenkel höchstens an der Basis oder Spitze schwarz. 18.

Die hintersten Schenkel ganz schwarz. Metathorax deutlich gefeldert. 19.

18. Die hintersten Schenkel höchstens an der Spitze schwarz. Metathorax hinten nicht gefeldert. 6 mm.

16. **geniculella** Thoms.

Die hintersten Schenkel an der Basis schwarz. Metathorax mit 3 Feldern. Hinterrand von Segment 2, Segment 3 und 4 fast ganz und Seiten der folgenden rot. 6 mm.

17. **proterva** Brischke.

19. Das 2. Segment quadratisch. Vorderschenkel unten schwarzgestreift. Segment 2 am Endrand, 3 und 4 ganz rot. Die hintersten Schienen am Ende kaum verdunkelt. 5 mm.

18. **nigricoxa** Thoms.

Das 2. Segment länger als breit. Vorderschenkel höchstens an der Basis unten schwarz. Die hintersten Schienen an der Spitze schwarz. 20.

20. Endrand des 2. Segmentes und Segment 3 und 4 rot, das 3. Segment mit schwarzer Basis. Schienen rötlichgelb, die hintersten an der Spitze schwarz. 5—6 mm.

19. **retusa** Thoms.

Die ganze Endhälfte des 2. Segmentes rot. Schienen gelb, die hintersten blassgelb, am Ende schwarz. Etwas grösser als die vorhergehende Art. 6—7 mm.

20. **femorella** Thoms.

21. Die hintersten Schenkel ganz oder an Basis und Spitze schwarz. 22.  
Die hintersten Schenkel rot. 23.
22. Die hintersten Schenkel ganz schwarz. Vorderbeine und die hintersten Schienen und Tarsen gelb, am Ende breit schwarz. 7—8 mm.  
21. **simplex** Thoms.  
Die hintersten Schenkel an Basis und Spitze schwarz; Beine sonst rot. 6—7 mm.  
22. **radiella** Thoms.
23. Segment 3—7 an den Seiten rot. Beine rot, vordere Hüften gelb, mittlere an der Basis, Hinterhüften ganz schwarz; Hinterschienen bräunlich, an der Basis gelb. 6 mm.  
23. **signata** Brischke.  
Hinterleibsmittle rot. 24.
24. Fühlergeißel gelb, nur oben an der Basis schwarz. Area superomedia sehr undeutlich. Schenkel und Schienen rötlichgelb, letztere kaum dunkel gezeichnet. 5—6 mm.  
24. **subcallosa** Thoms.  
Fühlergeißel nur auf der Unterseite gelb, selten ganz schwarz. 25.
25. Die vorderen Hüften und Trochanteren weisslich. Der hinterste Trochantellus durchaus nicht verdickt. 26.  
Die vorderen Hüften und Trochanteren rötlich oder gelb. Der hinterste Trochantellus etwas verdickt. 27.
26. Tarsen weisslich, die hintersten rötlich punktiert. Geißel unten gelb. Metathorax deutlich gefeldert. 6—7 mm.  
25. **punctitarsis** Thoms.  
Schienen und Tarsen rötlich, kaum dunkel gezeichnet. Metathorax deutlich gefeldert. 5 mm.  
26. **luteipes** Thoms.
27. Geißel schwarz. Die vorderen Hüften und Trochanteren gelb. Metathorax mit deutlichen Leisten. 7—8 mm.  
27. **crassitarsis** Thoms.  
Geißel auf der Unterseite gelb. Beine weniger kräftig als bei *O. crassitarsis*; Vorderhüften an der Basis schwarz. 6—7 mm.  
28. **sternella** Thoms.

1. **O. auctor** Grav. 1829 *Campoplex auctor* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 566 ♀♂ | 1858 *Limneria auctor* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 95 ♀♂ | 1887 *Olesicampa auctor* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1140 ♀♂.

Kopf und Thorax lederartig, matt, fein behaart. Kopf nach hinten nicht verschmälert; Stirn dicht und fein runzlig-punktiert; Fühler von  $\frac{2}{3}$  Körperlänge. Pronotum gestreift; Mesopleuren ziemlich glänzend, mit poliertem Speculum; Metathorax runzlig, mit undeutlicher Felderung; Area superomedia ziemlich kurz. Areola im Vorderflügel sitzend oder mit kurzem und dickem Stiel. Hinterleib etwas länger als Kopf und Thorax zusammen; das 1. Segment etwas länger als die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus etwas länger als breit. — Schwarz; Palpen blassgelb; Mandibeln in der Mitte rötlich. Flügel etwas getrübt; Stigma bräunlich; Tegulä dunkelbraun, beim ♂ zuweilen rötlich. Beine rot, Hüften und Trochanteren schwarz, letztere am Ende rötlich; die hintersten Schenkel mehr oder weniger ausgedehnt braun oder schwärzlich gefärbt, selten ganz dunkel oder ganz rot. Das 2. Hinterleibssegment am Ende rot, das 3. rot, zuweilen mit schwarzer Makel an der Basis, das 4. und 5. rot mit dunklem Rücken, selten ganz rot; die folgenden Segmente meist an den Seiten rot, selten ganz schwarz; Bauchfalte abwechselnd braun und gelblich.

L. 7—9 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

2. **O. fulviventris** Gmel. 1790 *Ichneumon fulviventris* Gmelin, Linné: System. nat. Ed. 13, p. 2704 | 1829 *Campoplex fulviventris* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 540 ♀♂ | 1858 *Limneria fulviventris* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 86 ♀♂ | 1887 *Olesicampa fulviventris* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1140 ♀♂.

Fein lederartig, matt, fein weisslich behaart, namentlich das Gesicht. Felderung des Metathorax ziemlich undeutlich; Brustseiten mit mattem Speculum. Das 1. Segment ohne Seitengrübchen. — Schwarz, Palpen und Mandibeln mit Ausnahme der Zähne gelb. Fühlerschaft unten gelb; Geissel gegen das Ende unten rötlichgelb. Stigma im Vorderflügel bräunlichgelb, Tegulä weisslichgelb. Vorderbeine rötlich, Hüften schwarz, an der Spitze meist gelblich; Trochanteren gelb; die hintersten Beine schwärzlich, selten die Schenkel zum Teil braun oder rötlich; die hintersten Schienen rötlichgelb, nach Thomson am Ende nicht schwarz, dagegen geben Gravenhorst und Holmgren die Spitze als schwärzlich an. Die hintersten Tarsen braun, Metatarsus an der Basis hell. Beim ♂ sind die Vorderbeine mehr gelb. Segment

3 und 4, zuweilen auch der Endrand von Segment 2 und Basis von Segment 5 rot. Beim ♂ sind Segment 3 und 4 an der Basis meist verdunkelt. Bauchfalte blassgelb.

L. 8—9 mm.

Nord- und Mitteleuropa; zerstreut.

Holmgren (l. c. p. 86) beschreibt eine *Limneria audax* und hält sie möglicherweise für eine Varietät der *Limneria fulviventris*. Sie ist kräftiger gebaut und kürzer und spärlicher behaart, der Metathorax ist deutlicher gefeldert. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Unterseite des Schaftes, Tegulä, Vorderhüften ganz oder zum Teil, Trochanteren und Bauchfalte gelb. Vorderbeine sonst rötlichgelb; die hintersten Hüften, Basis der Trochanteren, Schenkel, Schienenspitzen und Tarsen schwärzlich, letztere an der Basis hell. Die Art wurde im südlichen Lappland gefunden.

3. **O. patellana** Thoms. 1887 *Olesicampa patellana* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1140 ♀♂.

Die Art ist dadurch ausgezeichnet, dass an den Fühlern der Pedicellus (2. Fühlerglied) scheiben- oder linsenartig erweitert ist. Die Beschreibung ist sonst sehr kurz. Wie bei den beiden vorigen Arten ist der Hinterleibsstiel ohne Seitengrübchen und die Felderung des Metathorax sehr undeutlich. — Schwarz; Schenkel und Schienen rot, die hintersten Schienen am Ende schwarz. Hinterleibsmittle rot; Bauchfalte gelb.

L. 7—8 mm.

Nord- und Mitteleuropa.

4. **O. cavigena** Thoms. 1887 *Olesicampa cavigena* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1140 ♀♂.

Durch die fehlenden Seitengrübchen des 1. Segmentes und die undeutliche Felderung des Metathorax mit den vorhergehenden Arten eng verwandt. Wangen hinter der Basis der Mandibeln tief ausgehöhlt. — Schwarz; Palpen, Mandibeln und Tegulä gelblich. Die vorderen Schenkel und die Schienen rötlich; alle Hüften, Basis der mittleren Trochanteren und die hintersten Schenkel, Trochanteren und Schienenspitzen schwarz. Hinterleibsmittle ziemlich schmal rot; Bauchfalte gelb.

L. 7—8 mm.

Schweden.



5. **O. binotata** Thoms. 1887 *Olesicampa binotata* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1141 ♀.

Wangen ausgehöhlt. Hinterleibsstiel ohne Seitengrübchen. Metathorax undeutlich gefeldert. — Schwarz; Palpen, Mandibeln und Tegulä blassgelb. Die vorderen Schenkel und die Schienen rot, Schenkel an der Spitze verdunkelt; die hintersten Schenkel ganz und die Spitze der Schienen breit schwarz. Die beiden ersten Segmente am Endrande, 3 und 4 ganz, 5 zum Teil rot. Bauchfalte gelb.

L. 8 mm.

Von Förster bei Aachen gefunden.

6. **O. sericea** Holmgr. 1854 *Campoplex sericeus* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV p. 15 ♀ | 1858 *Limneria sericea* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 89 ♀♂ | 1887 *Olesicampa sericea* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1141 ♀♂ | ? 1829 *Campoplex nigritarsus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 506 ♀♂ | ? *Limneria nigritarsa* Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII p. 393 ♂.

Die Art gehört zu den wenigen, bei denen der Hinterleib ganz schwarz ist. — Kopf nach hinten schwach verschmälert, wie der Thorax weisslich pubescent. Metathorax mit deutlichen Leisten, Area superomedia fünfseitig, hinten offen. Hinterleibsstiel mit deutlichen Seitengrübchen; Postpetiolus convex, mit ziemlich parallelen Seiten, länger als breit; das 2. Segment weit länger als breit, beim ♂ fast um das Doppelte; das 3. ungefähr so lang als breit, beim ♂ etwas länger. — Schwarz; Palpen und Mandibeln mit Ausnahme der Endzähne, sowie die Unterseite des Schafes blassgelb. Fühlergeissel beim ♀ gegen das Ende unten rötlichgelb. Stigma bräunlichgelb; Tegulä weisslichgelb. Vorderbeine rötlichgelb, Hüften und Trochanteren gelb, Mittelhüften selten auch die vordersten an der Basis schwarz; an den hintersten Beinen Hüften und Trochanteren schwarz, letztere am Ende gelblich; Schenkel rot, Schienen rötlich, an der äussersten Basis gelblich, dahinter zuweilen ein verloschener dunkler Fleck, die Spitze der Schienen und die Tarsen braun, die 3 ersten Tarsenglieder an der Basis hell. Die Einschnitte des Hinterleibs sind meist etwas rötlich. Bauchfalte dunkel.

L. 6—7 mm.

Nord- und Mitteleuropa.

7. **O. alboplica** Thoms. 1887 *Olesicampa alboplica* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1141 ♀♂.

Diese Art schliesst sich eng an die vorhergehende an und unterscheidet sich leicht durch die Färbung der

hintersten Beine und der Bauchfalte. Die Area superomedia ist lang, nach hinten verschmälert. Der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle ist sehr spitz. Der Hinterleibsstiel besitzt deutliche Seitengrübchen. — Schwarz; Tegulä blassgelb. Schenkel und Schienen rötlich; die hintersten Schenkel und die Spitze der hintersten Schienen schwärzlich. Bauchfalte blassgelb.

L. 7—8 mm.

Schweiz.

8. **O. praecox** Holmgr. 1858 *Limneria praecox* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 85 ♀ | 1887 *Olesicampa praecox* Thomson, Opusc. ent. XI, p. 1142 ♀♂.

Kopf stark aufgetrieben, breiter als der Thorax, in beiden Geschlechtern hinter den Augen erweitert; Schläfen breit; Wangen aufgetrieben. Thorax robust; Felderung des Metathorax ziemlich schwach; Area superomedia kaum länger als breit. Die hintersten Schenkel verdickt, der hinterste Trochantellus etwas aufgetrieben und nach unten vorstehend. Hinterleibsstiel mit deutlichen Seitengrübchen. — Schwarz, gelblichweiss pubescent; Fühlerschaft an den Seiten schwarz, oben rötlich, unten gelb. Stigma im Vorderflügel bräunlichgelb; Tegulä blassgelb. Beine rot, Vorder- und Mittelhüften und alle Trochanteren gelb, die hintersten Hüften und die hintersten Trochanteren an der Basis schwarz; die hintersten Schienen an der Basis gelblich, am Ende etwas verdunkelt. Segment 2—4 rot, 2 an der Basis schwarz; Bauchfalte gelb.

L. 7—8 mm.

Scheint bisher nur in Schweden gefunden worden zu sein; mir ist die Art nie vorgekommen.

9. **O. longipes** Müll. 1776 *Ichneumon longipes* O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. p. 159 | 1829 *Campoplex longipes* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 546 ♀♂ | 1844 *Campoplex argentatus* Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect p. 96 ♀ [non Gravenhorst] | 1858 *Limneria longipes* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 85 ♀♂ | 1887 *Olesicampa longipes* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1142 ♀♂.

Kopf nach hinten etwas verschmälert; Gesicht dicht weisslich behaart. Metathorax ziemlich deutlich gefeldert; Area superomedia gestreckt, hinten offen; Brustseiten mit glattem Speculum. Radialzelle schmal; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitz; Areola kurz gestielt. Hinterleib länger als Kopf und Thorax zusammen; Postpetiolus convex, länger als breit, mit ziemlich parallelen

Seiten; das 2. Segment um  $\frac{1}{3}$  länger als breit; das 3. etwa so lang als breit. — Schwarz; Palpen und Mandibeln mit Ausnahme der Zähne blassgelb. Fühlerschaft unten gelb; Geissel rötlichgelb, beim ♂ dunkler. Schulterbeulen in der Regel gelblich. Stigma im Vorderflügel gelblich; Tegulä weisslichgelb. Beine rot, die vordersten Hüften meist ganz, die mittleren nur am Ende gelblich, an der Basis schwarz; die hintersten Hüften ganz schwarz; Trochanteren hellgelb, die hintersten an der Basis schwarz. Vorderschienen grösstenteils, Hinterschienen nur an der Basis gelblich; selten sind die Hinterschienen am Ende etwas verdunkelt; Hintertarsen braun, an der Basis der Glieder heller. Das 1. Segment meist ausgedehnt rot gefärbt, Segment 2—4 ganz rot, selten das 2. Segment zum Teil schwarz. Bauchfalte rötlichgelb, an der Basis schwarz oder rotbraun.

L. 6—7 mm.

Nord- und Mitteleuropa; eine der häufigeren Arten dieser Gattung.

10. **O. nigroplica** Thoms. 1887 *Olesicampa nigroplica* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1143 ♀ ♂.

Die Beschreibung, welche Thomson von dieser Art gibt, ist ziemlich kurz. Die Art schliesst sich eng an *O. fulviventris* an, unterscheidet sich aber leicht durch die dunkle Bauchfalte und die deutlichen Seitengrübchen des 1. Segmentes. Schenkel und Schienen und Hinterleibsmittle sind braunrot; die Spitze der hintersten Schenkel und die hintersten Schienen und Tarsen sind schwärzlich, die Schienen in der Mitte rötlich, der Metatarsus an der äussersten Basis weisslich. Bauchfalte schwärzlich. Das 1. Segment ist nicht rot gezeichnet.

L. 8—9 mm.

Nach Thomson in Nord- und Mitteldeutschland; mir ist die Art noch nicht vorgekommen.

11. **O. pagana** Holmgr. 1858 *Limneria pagana* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 86 ♀ ♂ (partim) | 1887 *Olesicampa pagana* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1142 ♀.

Kopf nach hinten kaum verschmälert; Mandibeln mit fast gleichen, nicht sehr kräftigen Zähnen. Metathorax ziemlich deutlich gefeldert; Area superomedia länger als breit, hinten offen. Postpetiolus kaum länger als breit, kürzer und doppelt so breit als der Petiolus; das 2. Segment nur wenig länger als breit. — Schwarz; graulich be-

haart. Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich; Fühlerschaft unten gelb gefleckt, Geissel des ♀ gegen das Ende unten rötlich. Brustbeulen nicht hell gefärbt. Flügel leicht getrübt, Stigma bräunlichgelb, Tegulä weisslichgelb. Vorderbeine rot, Hüften schwarz, beim ♂ am Ende gelblich; Hinterbeine rot, Hüften und Basis der Trochanteren schwarz, die Hinterschienen zuweilen am Ende oder auch nahe der Basis etwas verdunkelt; Hintertarsen braun, an der Basis hell. Das 2. Hinterleibssegment am Ende rot, das 3. rot, meist mit schwarzer Basis, das 4. meist ganz rot, selten am Ende oder ganz schwarz. Bauchfalte hell, an der Basis verdunkelt.

Holmgrens Art umfasst wohl auch einige der von Thomson später abgetrennten Arten. Die Art im engeren Sinne ähnelt am meisten *O. longipes*, sie ist aber kleiner, die Schulterbeulen sind schwarz und das 5. Segment ist kaum rot gezeichnet.

L. 5—6 mm.

Zerstreut in Nord- und Mitteleuropa.

12. **O. basalis** Thoms. 1887 *Olesicampa basalis* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1143 ♀.

„Kopf nach hinten etwas verschmälert. Metathorax runzlig-punktiert. — Schwarz; Hinterleibsmittle und Beine grösstenteils rot. — Der *O. longipes* ähnlich und verwandt, aber Area superomedia breit und mit der Area basalis verschmolzen. In der Färbung mit *O. pagana* übereinstimmend, aber die hintersten Tarsen fast ganz hell gefärbt.

L. 6 mm.

Schweden.“

13. **O. flavicornis** Thoms. 1887 *Olesicampa flavicornis* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1143 ♀♂.

Kopf nach hinten etwas verschmälert. — Schwarz mit feiner weisslicher Behaarung. Clypeus am Ende beim ♀ breit, beim ♂ schmal gelb. Fühler gelb, an der Basis oben schwärzlich. Schulterbeulen weisslich. Beine rötlichgelb, die hintersten Hüften und Schenkel schwarz; alle Trochanteren gelb; die hintersten Schienen und Tarsen gegen das Ende braun. Hinterleib rot, nur an der Basis schwarz; Bauchfalte gelb oder rötlich.

L. 6—7 mm.

Von Thomson in Schweden, von mir in Thüringen gefunden.

14. **O. gracilipes** Thoms. 1887 *Olesicampa gracilipes* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1143 ♀♂.

„Schwarz, dicht weisslich behaart. Kopf nach hinten etwas verschmälert; Wangen wenig aufgetrieben, blassgelb; Clypeus wie bei der vorigen Art am Ende hell gefärbt. Fühler gelb, an der Basis oben schwärzlich. Brustbeulen weisslich. — Der vorhergehenden Art ähnlich, aber schlanker, namentlich auch die Beine; die Spitze der hintersten Hüften und die Wangen blassgelb. Hinterleib an der Endhälfte rötlich, mit brauner Mittelbinde. Bauchfalte gelb.

L. 6—7 mm.

Schweden; selten.“

15. **O. fulcrans** Thoms. 1887 *Olesicampa fulcrans* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1145 ♀♂.

Die Art ist ausgezeichnet durch den stark knotenartig vortretenden hintersten Trochantellus. — Kopf nach hinten nicht verschmälert. Metathorax hinten runzlig-punktiert, Area superomedia deutlich, länger als breit; Area petiolaris nicht abgegrenzt; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle nicht sehr spitz. Postpetiolus und 2. Segment deutlich länger als breit. — Schwarz. Fühler des ♀ gegen das Ende rot. Vorderschenkel rot; Vorderhüften am Ende beim ♀ kaum, beim ♂ ziemlich breit hell; die hintersten Schenkel dick, rot, braun oder schwärzlich gefärbt; Schienen gelblich, die hintersten am Ende breit schwarz. Segment 2 am Endrande, 3 und 4 und beim ♀ meist auch Segment 5 rot.

L. 5—7 mm.

Nord- und Mitteleuropa; hier in Thüringen sehr selten.

16. **O. geniculella** Thoms. 1887 *Olesicampa geniculella* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1144 ♀.

Die Art hat in Gestalt und Färbung viel Aehnlichkeit mit *O. pagana*. Kopf nach hinten nicht verschmälert, hinter der Basis der Mandibeln ausgehöhlt. Metathorax ziemlich unvollständig gefeldert; die Seitenfelder sind nicht geteilt, auch die Area petiolaris ist nicht abgegrenzt. Stigma im Vorderflügel schmal, Radius am Ende gekrümmt, der Endabschnitt fast 3 mal so lang als der Basalabschnitt; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle fast ein rechter. — Schwarz; Schenkel und Schienen rot, Vorderhüften am Ende hell; die hintersten Schenkel und Schienen am Ende schwärzlich.

L. 6 mm.

Schweden.

17. **O. proterva** Brischke. 1880 *Limneria proterva* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig, N. F. IV, p. 171 ♀.

Matt; kurz seidenhaarig, Gesicht länger behaart; Kopf kubisch, Stirn fein gerunzelt, Innenrand der Augen etwas ausgebuchtet; Fühler fast körperlang. Thorax etwas länger als hoch; Metathorax gerundet, mit 3 Feldern; Area superomedia 6-eckig, hinten offen. Areola gestielt, den rücklaufenden Nerv kurz vor dem Ende aufnehmend; Radialnerv am Ende gerade. Das 1. Hinterleibssegment so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus wenig gewölbt und gebogen, etwas länger als breit, mit parallelen Seiten; Segment 2 und 3 länger als breit. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Flügelwurzel und Tegulä blassgelb. Flügel leicht getrübt, Stigma braun. Beine rot, Hüften und Trochanteren schwarz, letztere mit gelben Spitzen; Basis der Hinterschenkel schwarz, Hinterschienen mit gelber Basis und schwarzer Spitze, Hintertarsen braun mit roter Basis. Hinterrand von Segment 2, Segment 3 und 4 fast ganz und Seiten der folgenden Segmente rot; Basis von Segment 3 und Hinterrandfleck von 4 schwarz; die folgenden Segmente mit braunen Hinterrändern; Bauchfalte rotgelb.

L. 6 mm.

West- und Ostpreussen.

18. **O. nigricoxa** Thoms. 1887 *Olesicampa nigricoxa* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1145 ♂♂.

Eine der kleinsten Arten, die durch die Form des Postpetiolus und des 2. Segmentes einen Uebergang zur Gattung *Holocremnus* bildet, doch ist der Endzahn der Mandibeln deutlich länger als der Innenzahn. — Kopf nach hinten kaum verengt; Metathorax deutlich gefeldert; Mesopleuren fein lederartig; Postpetiolus und das 2. Segment kaum länger als breit. Schwarz; Vorderschenkel rötlich, auf der Unterseite schwarz gestreift; Vorderhüften fast ganz schwarz; Schienen gelblich, die hintersten am Ende kaum verdunkelt. Der äusserste Endrand des 2. Segmentes, das 3. und 4. ganz rot.

L. 5 mm.

Schweden.

19. **O. retusa** Thoms. 1887 *Olesicampa retusa* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1144 ♀♂.

Kopf nach hinten etwas verschmälert, hinter der Basis der Mandibeln ausgehöhlt. Metathorax fein gerunzelt, mit

deutlicher Felderung. Das 2. Segment länger als breit. — Schwarz; Fühlergeissel grösstenteils rötlich gelb; Schulterbeulen schwarz. Vorderhüften am Ende beim ♀ kaum, beim ♂ ausgedehnter gelblich; Vorderschenkel rötlich, an der Basis zuweilen schwarz; die hintersten Schenkel schwarz. Schienen dunkelgelb, die hintersten am Ende schwarz, das 2. Segment am Endrande und das 3. und 4. rot, das 3. an der Basis schwarz.

L. 5—6 mm.

Schweden. Zahlreiche Stücke, die ich auf diese Art beziehe, habe ich hier in Thüringen gefangen.

20. **O. femorella** Thoms. 1887 *Olesicampa femorella* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1144 ♀♂.

Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, aber grösser, die ganze Endhälfte des 2. Segmentes rot und die Färbung der hintersten Schienen heller. — Schwarz; Hinterleibsmittle rot; Vorderschenkel rötlichgelb; Schienen gelb, die hintersten blassgelb, am Ende schwarz.

L. 6—7 mm.

Schweden.

21. **O. simplex** Thoms. 1887 *Olesicampa simplex* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1147 ♀♂.

Scheitel in beiden Geschlechtern nach hinten verschmälert. Metathorax nicht gerunzelt, mit deutlicher Felderung; Area superomedia nach hinten verschmälert. Der untere Aussenzwinkel der Discoidalzelle spitz. Postpetiolus und das 2. Hinterleibssegment deutlich länger als breit. — Schwarz; Vorderbeine rötlichgelb, an der Basis blassgelb; die hintersten Hüften, Trochanteren und Schenkel schwarz; Trochantellus, Schienen und Tarsen gelblich, die beiden letzteren am Ende breit schwärzlich. Hinterleib mit rotem Gürtel.

L. 7—8 mm.

Nord- und Mitteleuropa. — Von mir mehrfach in Thüringen gefunden.

22. **O. radiella** Thoms. 1887 *Olesicampa radiella* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1147 ♀♂.

Diese Art schliesst sich eng an die vorhergehende an, namentlich auch durch die deutliche Felderung des Metathorax. Die Area superomedia ist breiter. Der 2. Abschnitt des Radius ist am Ende gekrümmt und 3 mal so lang als der Basalabschnitt. Die hintersten Schenkel sind nur an

Basis und Spitze schwarz, die Schienen rötlich, am Ende schwärzlich, die Tarsen dunkel, nur die Basis der Glieder schmal hell.

L. 6—7 mm.

Nord- und Mitteleuropa.

23. **O. signata** Brischke. 1880 *Limneria* (*Olesicampa*?) *signata* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 168 ♀.

„Matt, kurz seidenhaarig. Kopf kubisch, Hinterleib scharf gerandet; Fühler etwa von halber Körperlänge; Thorax länger als hoch; Schildchen erhöht; Metathorax mit 3 Feldern; Area superomedia fünfeckig, hinten offen; das 1. Segment so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren, gebogen; Postpetiolus breit, mit geraden, divergierenden Seiten, ziemlich flach, mit seichter Mittelrinne. Segment 2—5 gleich breit, das 2. Segment länger als breit, das 3. quadratisch, die letzten Segmente seitlich etwas zusammengedrückt, Bohrer kaum vorragend. Areola im Vorderflügel gestielt, schief, den rücklaufenden Nerv kurz vor der Mitte aufnehmend; Nervellus nicht gebrochen. — Schwarz; Palpen und Mandibeln gelb, Schaft unten rot gefleckt. Stigma braun, Flügelwurzel und Tegulä gelb. Beine rot, die vordersten Hüften gelb, Mittelhüften an der Basis, die hintersten ganz schwarz; Trochanteren gelb, die hintersten an der Basis schwarz; die hintersten Schienen bräunlich, ihre Basis, auch die der Mittelschienen gelb; Hintertarsen braun mit roter Basis. Segment 3—7 mit roten Seiten.

L. 6 mm.

Danzig.“

24. **O. subcallosa** Thoms. 1887 *Olesicampa subcallosa* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1146 ♀♂.

Körper ziemlich schlank. Kopf nach hinten nur wenig verschmälert. Metathorax fein runzlig; Area superomedia nur schwach angedeutet. Postpetiolus und 2. Segment deutlich länger als breit. Beine schlank; der hinterste Trochantellus etwas aufgetrieben. — Schwarz; Fühlergeißel rötlichgelb, nur an der Basis oben schwärzlich. Vorderhüften gelblich. Schenkel und Schienen rötlich, die letzteren nur an der äussersten Spitze etwas verdunkelt. Hinterleibsmittle gelblich; Bauchfalte gelblich.

L. 5—6 mm.

Schweden.

Nach Thomson ähnelt die Art *O. fulcrans*, ist aber schlanker und der hinterste Trochantellus ist nur ganz schwach aufgetrieben.



25. **O. punctitarsis** Thoms. 1887 *Olesicampa punctitarsis* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1146 ♀.

Scheitel nach hinten schwach verschmälert. Metathorax mit deutlicher Felderung. Der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle ziemlich spitz. Beine, namentlich die Tarsen schlank; der hinterste Trochantellus nicht erweitert. Postpetiolus und das 2. Segment deutlich länger als breit. — Schwarz; Fühlergeissel auf der Unterseite hell. Die vorderen Hüften und Trochanteren und die Tarsen weisslich, die hintersten Tarsen rötlich punktiert; Schenkel rötlich; Schienen gelblich. Hinterleibsmittle rötlich; Bauchfalte gelblich.

Länge 6—7 mm.

Bayern. — Ich habe auch in Thüringen Stücke gefunden, die ich auf diese Art beziehe. Freilich muss ich gestehen, dass scharfe Unterschiede auch bei diesen von Thomson aufgestellten Arten nicht aufzufinden sind.

26. **O. luteipes** Thoms. 1887 *Olesicampa luteipes* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1147 ♀♂.

Von den nächstverwandten Arten schon durch die geringe Grösse verschieden. Kopf nach hinten etwas verschmälert. Metathorax kaum gerunzelt aber mit deutlichen Leisten; Area superomedia nach hinten verschmälert. Radius am Ende gerade, der Endabschnitt fast 3 mal so lang als der Basalabschnitt; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitz. Der hinterste Trochantellus nicht erweitert. Postpetiolus und das 2. Segment deutlich länger als breit. — Schwarz. Beine rötlich, die vorderen Hüften und Trochanteren und die Trochantellen gelblichweiss, die hintersten Hüften und Trochanteren schwarz; Schienen und Tarsen kaum dunkel gezeichnet. Hinterleibsmittle rötlich; Bauchfalte gelblich.

L. 5 mm.

Schweden.

Die Art ähnelt am meisten *O. simplex*, unterscheidet sich aber leicht durch die hellen Hinterschenkel.

27. **O. crassitarsis** Thoms. 1887 *Olesicampa crassitarsis* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1146 ♀♂.

Ausgezeichnet durch die beträchtliche Grösse, gedrungene Gestalt, die kräftigen Beine und die auf der Unterseite nicht hell gezeichnete Fühlergeissel. — Kopf nach hinten nicht verschmälert. Metathorax mit deutlichen Leisten. Beine kräftig, die hintersten Schenkel ziemlich kurz, der

hinterste Trochantellus etwas aufgetrieben. Hinterleib gedungen; Postpetiolus und das 2. Segment etwas länger als breit. — Schwarz. Fühlergeißel auf der Unterseite kaum heller gefärbt. Beine rötlich, die hintersten Hüften und Trochanteren schwarz; Tarsenglieder am Ende nur schwach verdunkelt. Hinterleibsmittle rötlich, auch das 2. Segment beim ♀ mit rötlichem Hinterrand. Bauchfalte gelb.

L. 7—8 mm.

Bei Lund im südlichen Schweden gefunden.

28. **O. sternella** Thoms. 1887 Olesicampa sternella Thomson, Opusc. ent. XI p. 1146 ♀♂.

Eng verwandt mit der vorhergehenden Art, aber durchschnittlich etwas kleiner, Scheitel weniger breit, Geißel mit heller Unterseite, Metathorax mit kleinerer Area superomedia, Beine weniger kräftig, Vorderhüften mit schwarzer Basis, der hinterste Trochantellus nur wenig erweitert.

L. 6—7 mm.

Wurde ebenfalls im südlichen Schweden gefunden.

#### 41. Gen. **Meloboris** (Holmgr.) Schmiedeknecht.

- 1858 Meloboris Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV p. 326 (partim).  
 1868 Meloboris Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 157 (partim).  
 1887 Meloboris Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1148 (partim).  
 1907 Meloboris Schmiedeknecht, Hymen. Mitteleurop. p. 602.

Die Gattung Meloboris hat verschiedene Wandlungen durchgemacht und wäre vielleicht eine neue Bezeichnung dafür am Platze gewesen. Von den 3 Holmgrenschen Arten ist nur *M. stagnalis* dabei geblieben. Förster begreift darunter nur Arten mit deutlich vorstehendem Bohrer, umfasst also nicht *M. incultator*, von den bei Thomson unter Meloboris aufgezählten Arten scheiden *M. dorsalis* und *crassicornis* aus.

Scheitel breit, nach hinten nicht oder kaum verschmälert; Wangen ziemlich kurz, etwas aufgetrieben; Mandibeln schwächer und kürzer als bei Olesicampe, mit gleichen Endzähnen; Clypeus mit kleinen Seitengruben; Fühlerschaft schwach, selten auf der Unterseite rötlich; Fühlergeißel lang und dünn; Augen innen nicht ausgerandet. Thorax gestreckt; Metathorax mit deutlichen Leisten, meist vollständig gefeldert; Area superomedia länger als breit, Costula vor der Mitte. Tegula hell gefärbt. Radialzelle schmal, Radius am Ende meist gebogen; Areola im Vorderflügel vorhanden; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitz; Nervellus vertikal, nicht gebrochen.

Beine ziemlich kräftig, namentlich das Klauenglied und die Klauen. Hinterleib cylindrisch, wenigstens in der Mitte rot gefärbt; das 1. Segment mit deutlichen Seitengrübchen, Postpetiolus wenig kürzer aber deutlich breiter als der Petiolus; Bohrer nur bei *M. paludicola* versteckt, bei den übrigen Arten deutlich vorragend, aber nicht länger als der halbe Hinterleib.

#### Uebersicht der Arten.

1. Der untere Aussenwinkel der Brachialzelle fast ein rechter. Fühler länger als der halbe Körper, Schaft unten rot. Gesicht des ♀ nach unten verengt. 2.

Der untere Aussenwinkel der Brachialzelle spitz. Fühler nicht oder kaum etwas länger als der halbe Körper. Gesicht des ♀ parallel. 3.

2. Rücklaufender Nerv in der Mitte der ziemlich regelmässigen Areola. 2. Segment kurz. Die hintersten Hüften in der Regel an der Basis schwarz. Analklappen des ♂ sehr gross. 5—7 mm.

#### 1. **stagnalis** Holmgr.

Rücklaufender Nerv weit hinter der Mitte der unregelmässigen Areola. 2. Segment nicht quer. Die hintersten Hüften ganz rot. Analklappen des ♂ weit kleiner als bei der vorigen Art. 4—5 mm.

#### 2. **hydropota** Holmgr.

3. Wenigstens die Vorderhüften rot oder gelblich. 4.  
Alle Hüften, sowie die hintersten Trochanteren schwarz. 8.

4. Bohrer nicht vorragend. Hinterleib des ♀ nur an der Basis schwarz. Hinterhüften meist ganz rot. 6—7 mm.

#### 3. **paludicola** Holmgr.

Bohrer wenig kürzer als der halbe Hinterleib. Hinterleibspitze meist schwarz, beim ♂ immer. Die vorderen Trochanteren gewöhnlich gelb. 5.

5. Die hintersten Hüften, zuweilen auch die Trochanteren schwarz gefleckt. Schaft schwarz. Radialzelle breit, Endabschnitt des Radius wenig länger als der Basalabschnitt. 5 mm.

#### 4. **hygrobia** Thoms.

Die hintersten Hüften ganz rot. Grössere Arten. 6.

6. Die hintersten Tarsen gegen das Ende braun. Schaft schwarz. Hinterleib nur in der Mitte breit rot. 6—7 mm.

#### 5. **velox** Holmgr.

Die hintersten Tarsen hell. Hinterleib zuweilen nur an der Basis schwarz. 7.

7. Schaft unten rötlich oder rötlichgelb. Area superomedia, Postpetiolus und das 2. Segment länger als breit. Hinterleib des ♀ grösstenteils rot. 5—7 mm.

6. **rufiventris** Grav.

Schaft unten höchstens mit rötlicher Makel. Postpetiolus quer. Area superomedia und das 2. Segment nicht länger als breit. Nur die Hinterleibsmittle breit rot. 6—8 mm.

7. **litoralis** Holmgr.

8. Segment 2 mit Ausnahme der Basis, 3 ganz, 4 mit Ausnahme des Endrandes rot. Beine einfarbig rot, Hüften schwarz. 5 mm.

8. **ischnocera** Thoms.

Hinterrand von Segment 2, Segment 3 und die Seiten der folgenden Segmente hellrot. Beine hellrot, Hüften schwarz, Trochanteren gelblich, Hinterschienen vor der Basis und an der Spitze schwärzlich. 4—5 mm.

9. **erratica** Brischke.

- I. **M. stagnalis** Holmgr. 1854 Campoplex stagnalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV p. 21 ♀♂ | 1858 Meloboris stagnalis Holmgren, l. c. II p. 101 ♀♂ | 1887 Meloboris stagnalis Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1149 ♀♂.

Kopf aufgetrieben, hinter den Augen nicht verschmälert; Gesicht behaart, beim ♀ nach unten verschmälert; Fühler länger als der halbe Körper, mit sehr dünner Geissel. Thorax schmaler als der Kopf, gestreckt, deutlich länger als hoch; Area superomedia am Ende offen, Basalabschnitt des Radius deutlich gekrümmt, Endabschnitt ziemlich gerade. Brachialzelle kurz, der untere Aussenwinkel derselben fast ein rechter. Areola ziemlich regelmässig, kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv in oder etwas vor der Mitte aufnehmend. Hinterleib etwas länger als Kopf und Thorax zusammen; Petiolus und Postpetiolus kurz; das 2. Segment beim ♀ kaum, beim ♂ nur wenig länger als breit, mit grossen Thyridien; die folgenden Segmente quer; das 7. Segment des ♀ oben ausgeschnitten; Bohrer etwas länger als das 1. Segment; Analklappen des ♂ ausserordentlich gross. — Schwarz, graulich behaart. Palpen und Mandibeln mit Ausnahme der Endzähne gelblich. Fühlerschaft unten rötlich oder gelblich. Tegula weisslich. Stigma rötlichgelb. Beine rötlich, die vorderen Hüften und Trochanteren gelblich; die hintersten Hüften an der Basis nach Thomson schwarz; dagegen gibt sie Holmgren als ganz rot an. Hinterleib rot, das 1. Segment und eine

Makel an der Basis des 2. schwarz, beim ♂ auch die Endsegmente ganz oder auf dem Rücken schwarz.

L. 5—7 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

2. **M. hydropota** Holmgr. 1858 *Limneria hydropota* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 69 ♀♂ | 1887 *Meloboris hydropota* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1149 ♀♂.

Kopf aufgetrieben, hinter den Augen etwas erweitert; Gesicht des ♀ nach unten etwas verschmälert; Fühler länger als der halbe Körper; Geißel dünn; Wangen länger als bei *M. stagnalis*, etwas aufgetrieben. Thorax gestreckt, Metathorax mit 5 Feldern, Area superomedia deutlich länger als breit. Areola im Vorderflügel unregelmässig, den rücklaufenden Nerv weit hinter der Mitte aufnehmend. Brachialzelle wie bei der vorhergehenden Art. Das 1. Segment deutlich kürzer als die hintersten Hüften und Trochanteren, das 2. Segment etwas länger als breit; Bohrer etwas kürzer als der halbe Hinterleib; Analklappen des ♂ weit kleiner als bei *M. stagnalis*. — Schwarz, graulich behaart. Palpen und Mandibeln gelb, letztere mit dunklen Zähnen. Schaft unten rötlich. Tegulä weisslich, Stigma gelblich. Beine rötlich; die hintersten Hüften in der Regel schwarz gefleckt, sehr selten ganz schwarz. (Thomson gibt bei dieser Art die hintersten Hüften als ganz rot an, während er dieselben bei *M. stagnalis* als an der Basis schwarz bezeichnet. Es scheint eine Verwechslung vorzuliegen.) Das 1. Segment schwarz mit rotem Endrand, das 2. rot, an der Basis schwarz, die übrigen Segmente rot, zuweilen oben schwarz gefleckt, die Endsegmente zuweilen ganz schwarz.

L. 4—5 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

3. **M. paludicola** Holmgr. ? 1829 *Campoplex inculcator* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 553 ♀ [non Linné. | 1858 *Limneria paludicola* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 88 ♀♂ | 1887 *Meloboris inculcator* Thomson, Opusc. ent. XI p. 1150 ♀♂.

Durch den nicht vorragenden Bohrer weicht diese Art von den übrigen auffallend ab; sie verdiente deshalb zu einer Untergattung erhoben zu werden. — Kopf nach hinten nicht verschmälert, beim ♂ eher etwas verbreitert, matt; Gesicht behaart; Fühler etwas länger als der halbe Körper, gegen das Ende wenig verdünnt. Metathorax mit 5 vollständigen Feldern, Area superomedia kaum länger als breit. Radius am Ende nur schwach gekrümmt; Areola gestielt,

den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend. Hinterleib wenig zusammengedrückt, das 1. Segment etwas länger als die hintersten Hüften und Trochanteren; das 2. etwas länger als breit, das 3. quadratisch: Bohrer kaum vorragend. — Wenig glänzend, schwarz. Palpen und Mandibeln gelblich, letztere mit dunklen Endzähnen; Schaft unten gelblich, Geissel unten bräunlich. Stigma im Vorderflügel bräunlich; Tegulä weisslichgelb. Vorderbeine rötlichgelb, Hüften gelblich; Hinterbeine rötlich, Hüften zuweilen braun gefleckt, Schienen am Ende meist gebräunt, auch die Tarsen gegen das Ende verdunkelt. Hinterleib rötlich, das 1. Segment beim ♀ an der Basis, beim ♂ meist ganz schwarz, das 2. Segment gewöhnlich an der Basis schwarz, seltener beim ♀ ganz rot, Endsegmente beim ♂ in der Regel mehr oder weniger ausgedehnt schwarz.

L. 6—7 mm.

Nord- und Mitteleuropa. — Dr. Oudemans in Amsterdam zog die Art aus *Agromyza carbonaria* in *Phragmites communis*.

4. **M. hygrobia** Thoms. 1887 *Meloboris hygrobia* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1151 ♀♂.

Körper klein; Kopf fast kubisch; Fühler fadenförmig, wenig länger als der halbe Körper; Gesicht des ♀ mit parallelen Seiten. Radialzelle breit, Endabschnitt des Radius nur wenig länger als der Basalabschnitt; der untere Aussenkinkel der Brachialzelle spitz. Postpetiolus quadratisch; das 2. Segment mit undeutlichen Thyridien. — Schwarz. Beine rötlich, die hintersten Hüften, zuweilen auch die hintersten Trochanteren schwarz gefleckt. Segment 2—5 rötlich, das 2. an der Basis schwarz. — Verwandt mit *M. hydropota*, mit der die Art von Holmgren vermengt ist, verschieden durch kürzere Fühler, schwarzen Schaft und längeren Petiolus.

L. 5 mm.

Bei Lund im südlichen Schweden gefunden.

5. **M. velox** Holmgr. 1858 *Limneria velox* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 67 ♀♂ | 1887 *Meloboris velox* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1150 ♀♂.

Kopf aufgetrieben, nach hinten nicht verschmälert; Gesicht behaart, quer, mit parallelen Seiten; Fühler etwas länger als der halbe Körper, gegen das Ende wenig verdünnt. Thorax schmaler als der Kopf, cylindrisch, fast doppelt so lang als hoch; Metathorax mit 5 Feldern, Area superomedia verlängert, schmal, am Ende offen. Radius am Ende ziem-

lich gerade; Areola kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv etwas hinter der Mitte aufnehmend; der untere Aussenkinkel der Brachialzelle spitz. Hinterleib schmal, gegen das Ende etwas zusammengedrückt, glänzend, spärlich behaart; das 1. Segment kaum so lang als die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus etwas länger als breit, wenig breiter als der Petiolus; das 2. Segment etwas länger als breit, mit undeutlichen Thyridien; das 2. Segment des ♀ nicht ausgeschnitten; Bohrer etwas länger als das 1. Segment, ziemlich gerade; Analklappen des ♂ dick. — Schwarz, mit weisslicher Behaarung. Palpen und Mandibeln gelblich, letztere mit dunklen Zähnen. Fühlerschaft schwarz. Tegulä weisslichgelb; Stigma im Vorderflügel gelblich. Beine rötlich, Vorderhüften gelblich, die hintersten Tarsen gegen das Ende verdunkelt. Das 1. Segment am Ende, das 2. und 3. ganz rot, das 4. schwarz oder an der Basis rot, die folgenden schwarz.

L. 6—7 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

6. **M. rufiventris** Grav. 1829 *Campoplex rufiventris* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 552 ♀♂ | 1858 *Limneria rufiventris* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 68 ♀♂ | 1887 *Meloboris rufiventris* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1150 ♀♂.

Kopf wie bei *M. velox* nach hinten nicht verschmälert. Metathorax gegen das Ende mit feiner Skulptur; Costula meist schwach, sodass die Seitenfelder verschmelzen. Areola im Vorderflügel kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv in oder etwas hinter der Mitte aufnehmend. Hinterleib schlank, wenig zusammengedrückt, mit feiner weisslicher Behaarung; das 1. Segment ziemlich kräftig; Postpetiolus und das 2. Segment länger als breit; das 3. quadratisch; das 7. Segment beim ♀ ausgeschnitten; Bohrer wenig kürzer als der halbe Hinterleib. — Schwarz, weisslich behaart. Palpen und Mandibeln gelb, letztere mit dunklen Zähnen. Fühlerschaft beim ♀ auf der Unterseite, beim ♂ grösstenteils rötlich. Tegulä weisslichgelb; Stigma gelblich. Beine rötlich, Vorderhüften gelblich; Tarsen gegen das Ende etwas verdunkelt. Das 1. Segment am Ende rot, das 2. Segment rot, an der Basis meist schwarz gefleckt; Segment 3—6 (♀) oder 3—5 (♂) rot; Bauchfalte gelblich.

L. 5—7 mm.

Nord- und Mitteleuropa; zuweilen nicht selten. Mit Vorliebe an Flussufern, Teichen u. s. w.

Sehr ähnlich der vorigen Art, aber dichter weisslich behaart, Fühlerschaft unten rötlich, Hinterleibsmittle aus-

gedehnter rot und der Bohrer etwas länger und mehr gekrümmt.

7. **M. litoralis** Holmgr. 1854 *Campoplex litoralis* Holmgren, Act. Holm. 20. 33 ♀♂ | 1858 *Limneria litoralis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 69 ♀♂ | 1887 *Meloboris litoralis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1150 ♀♂.

Kopf aufgetrieben, hinter den Augen nicht verschmälert; Fühler kürzer und kräftiger als bei *M. rufiventris*. Metathorax hinten mit ziemlich grober Skulptur, Costula stets deutlich und die beiden Seitenfelder deshalb nicht verschmolzen; Area superomedia nicht länger als breit, am Ende meist geschlossen. Flügelnervatur wie bei *M. rufiventris*. Postpetiolus fast etwas breiter als der Petiolus; das 2. Segment beim ♀ nicht, beim ♂ nur wenig länger als breit, das 3. Segment beim ♀ quer; Bohrer etwas länger als das 1. Segment, schwach gebogen. — Schwarz, mit weisslicher Behaarung. Palpen und Mandibeln gelblich, letztere mit dunklen Zähnen. Fühlerschaft unten meist rötlich gefleckt. Tegulä gelblichweiss; Stigma bräunlichgelb; Beine rötlich, selten die hintersten Hüften und Trochanteren braun gefleckt; Tarsen am Ende etwas verdunkelt. Das 1. Segment am Ende meist rot, Segment 2–4 rot, das 4. am Ende gewöhnlich schwarz, das 5. Segment des ♂ zuweilen zum Teil rot.

L. 6–9 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

Kräftiger als *M. rufiventris*, Schaft dunkler, Felderung des Metathorax vollständig, Area superomedia kürzer und am Ende fast stets geschlossen, Postpetiolus nicht länger als breit, sondern eher breiter als lang, das 2. Segment nicht (♀) oder nur wenig (♂) länger als breit.

8. **M. ischnocera** Thoms. 1887 *Meloboris ischnocera* Thomson Opusc. ent. XI p. 1151 ♀♂.

Diese und die folgende Art sind ausgezeichnet durch die schwarzen Hüften und hintersten Trochanteren. — Gesicht des ♀ mit parallelen Seiten; Fühlergeissel lang und dünn; Wangen etwas aufgetrieben. Brustseiten kaum punktiert. Der untere Aussenwinkel der Brachialzelle spitz; Areola breit. Schiensporen klein. Das 7. Segment des ♀ nur wenig ausgeschnitten; Bohrer etwas kürzer als der halbe Hinterleib. — Schwarz. Fühlerschaft unten nicht hell. Beine rötlich, alle Hüften und die hintersten Trochanteren schwarz. Segment 2 mit Ausnahme der Basis, 3 ganz, 4 mit Ausnahme des Endrandes rot.



L. 5 mm.

Südliches Schweden.

Man verwechsle die Art nicht mit *Diadegma crassicornis*, welch letztere Art bei anderer Auffassung des Gattungsbegriffes mit zu *Meloboris* gestellt werden könnte. Letztere hat dickere und kürzere Fühler, ausserdem längere Schienenspornen, schmalere Areola und dicht punktierte Brustseiten.

9. **M. erratica** Brischke. 1880 *Limneria erratica* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 170 ♀.

Die Art besitzt die sämtlichen charakteristischen Merkmale der Gattung *Meloboris* und stehe ich deshalb nicht an, sie bei dieser Gattung einzureihen.

„Matt; Kopf hinter den Augen nicht verschmälert; Wangen gerundet; Fühler so lang wie Kopf und Thorax; letzterer cylindrisch; Metathorax gerundet, fein gerunzelt, mit 5 Feldern. Area superomedia hinten offen. Areola im Vorderflügel gestielt, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend; Radius am Ende gebogen, Basalnerv interstitial, Nervellus nicht gebrochen. Hinterleib cylindrisch, hinten ziemlich stark zusammengedrückt; Segment 1 kaum so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren, fast gerade; Postpetiolus breiter, mit gerundeten Seiten; Segment 2 etwas länger als breit, 3 quer; Bohrer gekrümmt, so lang wie der halbe Hinterleib. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Flügelwurzeln und Tegulä gelblich. Stigma bräunlich. Beine hellrot, Hüften schwarz, Trochanteren gelblich, die hintersten mit schwarzer Basis, Hinterschienen vor der Basis und an der Spitze und die Hintertarsen schwarzbraun, letztere mit roter Basis. Hinterrand von Segment 2, Segment 3 und die Seiten der folgenden hellrot, die Hinterränder schmal rötlich.

L. 4,5 mm.

West- und Ostpreussen.“

\* \* \*

Als zweifelhaft stelle ich die folgende Art zur Gattung *Meloboris*. Es ist eine unglückliche Idee, namentlich der früheren Autoren auf einzelne Männchen aus schwierigen Gruppen neue Arten aufzustellen.

***Limneria cognata*** Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 164 ♂ (1880).

„Matt; Kopf hinter den Augen wenig verschmälert; Wangen glänzend, Fühler kräftig, nach der Spitze allmählich verdünnt, fast körperlang; Thorax länger als hoch,

Metathorax mit 5 Feldern, Area superomedia 5-seitig, hinten offen, Area posteromedia etwas vertieft, runzlig. Areola im Vorderflügel gestielt, den rücklaufenden Nerv in der Mitte aufnehmend; Radius am Ende leicht eingebogen, Nervellus nicht gebrochen. Hinterleib wenig schmaler als der Thorax, Segment 2—4 gleich breit, die folgenden etwas zusammengedrückt; Segment 1 so lang wie die Hüften und Trochanteren der Hinterbeine, fast gerade, kräftig, Postpetiolus fast quadratisch, in der Mitte mit flacher Längsfurche; Segment 2 länger als breit, 3 quadratisch. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Flügelwurzel und Tegulä gelblich. Stigma bräunlich. Beine rot, Hinterhüften schwarz, Trochanteren gelblich; hinterste mit schwarzer Basis; Hintertarsen braun mit gelber Basis. Segment 2—5 rot, Segment 2 an der Basis, 5 oben schwarz.

L. 6 mm. — Nur das ♂ bekannt.

Königsberg.“

#### 42. Genus **Angitia** (Holmgr.) Schmiedekn.

1858 Angitia Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV p. 3251 (partim).

1858 Angitia Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 106 (partim).

1887 Angitia Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1153 (partim).

1907 Angitia Schmiedeknecht, Hymen. Mitteleur. p. 602.

Während die alte von Holmgren aufgestellte Gattung Angitia nur eine einzige Art, *A. glabricula* Holmgr., umfasst, haben wir es hier mit einer ausserordentlich artenreichen Gattung zu tun, die viele Arten aufgenommen hat, welche bei der alten Gattung *Limneria* standen.

Körper klein oder mittelgross, schwarz, höchst selten die Hinterleibsmittle rot gezeichnet. Kopf nicht kubisch, meist nach hinten deutlich verschmälert; Fühler gewöhnlich fadenförmig; Schaft klein, auf der Unterseite häufig hell gezeichnet; Wangen nicht oder kaum aufgetrieben, nicht lang; Clypeus mit kleinen Seitengruben; Mandibeln klein, gegen das Ende verschmälert, mit kleinen, gleich grossen Endzähnen. Thorax cylindrisch; Seiten des Pronotums selten etwas gestreift; Metathorax meist deutlich gefeldert, hinten nicht oder nur ganz schwach der Länge nach vertieft; Basalzelle klein, meist dreieckig und gestielt, seltener quadratisch. Tegulä hell gefärbt; Stigma gewöhnlich gross und von gelblicher Färbung. Areola im Vorderflügel vorhanden, in der Regel gestielt, in den meisten Fällen etwas unregelmässig und den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend, seltener mehr regelmässig und dann gewöhnlich den rücklaufenden Nerv in oder nahe der Mitte aufnehmend; Basalnerv ziemlich

steil aufsteigend und stark gekrümmt; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitz, sehr selten fast ein rechter, z. B. bei *A. combinata*; Nervus parallelus aus der Mitte der Brachialzelle entspringend; Nervellus mehr oder weniger vertikal, nicht gebrochen. Beine nicht kräftig, die hintersten Schienen kaum gedörnelt; Klauen mehr oder weniger deutlich gekämmt. Trochantellus in der Regel blassgelb gefärbt; die hintersten Schienen sehr häufig weisslich oder blassgelb, mit einem dunklen Ring nahe der Basis und mit dunklen Enden. Das 1. Segment mit Seitengrübchen; Postpetiolus etwa so lang als breit, mit mehr oder weniger geraden Seiten; des 2. Segment gewöhnlich weit länger als das dritte, mit unscheinbaren Thyridien; das 7. Segment beim ♀ gewöhnlich ausgeschnitten; Bohrer gekrümmt, bei den meisten Arten etwa von halber Hinterleibslänge; Bohrerklappen ziemlich dick.

Die Hauptmerkmale dieser Gattung würden also die folgenden sein: Körper klein oder mittelgross; Clypeus mit kleinen Seitengrübchen; Metathorax gefeldert, hinten nie mit deutlichem Längseindruck. Areola im Vorderflügel vorhanden; Basalnerv steil; Nervellus vertikal, nicht gebrochen. Seiten des Postpetiolus gerade oder nur schwach gerundet; Bohrer fast stets weit vorstehend.

Thomson rechnet noch die Gattung *Diocetes* zu *Angitia*; sie unterscheidet sich sofort durch die fehlende Areola; freilich finden sich Uebergänge, wie z. B. *Angitia vestigialis*. Eng verwandt ist die Gattung *Omorgus*; viele Arten dieser Gattung haben einen hinten der Länge nach eingedrückten Metathorax; der Postpetiolus ist an den Seiten deutlich gerundet und der Nervellus zeigt immer eine Spur von Brechung. Freilich gehört langjährige Uebung dazu, diese subtilen Unterschiede zu erfassen; ein Vereinigen dieser schwierigen Gattungen zu einer einzigen, etwa *Limneria*, würde die Schwierigkeiten nicht beseitigen, sie würden bei Bestimmung der Art dieselben sein.

#### Uebersicht der Arten.

1. Flügel mit sehr kleiner, zuweilen rudimentärer oder ganz fehlenden Areola. Costula nicht vorhanden. 2.

Flügel mit deutlicher Areola. 3.

2. Bohrer etwas länger als der halbe Hinterleib, stark gekrümmt. Kopf nach hinten verschmälert. Beine rötlich, Hüften schwarz, die vorderen an der Spitze und die Trochanteren gelb. 5 mm.

47. **vestigialis** Ratzeb.

Bohrer kürzer als der Petiolus. Kopf nach hinten nicht verschmälert. Beine gelbrot, an der Basis schwarz. Fühler am Ende perlschnurförmig. 5 mm.

50. **monilicornis** Thoms.

3. Das 2. Segment kurz. Die hintersten Schienen in der Mitte nicht weisslich. 4.

Das 2. Segment nicht kurz oder die hintersten Schienen in der Mitte weisslich. 10.

4. Die mittleren Segmente rot oder rot gerandet. 5.  
Hinterleib ganz schwarz. 6.

5. Segment 2 am Endrande, 3 ganz, 4 an der Vorderhälfte rot. Schenkel und Schienen rötlich. Costula deutlich. 4—5 mm.

42. **rufata** Bridgm.

Segment 2—4 am Endrand rot. Schaft unten, Vorderhüften an der Spitze und Trochanteren weisslich. 5 mm.

48. **macrostoma** Thoms.

6. Schenkel und Schienen rot, die hintersten Schenkel an der Basis mit den Trochanteren schwarz. 5 mm.

49. **punctipes** Thoms.

Die hintersten Schienen an Basis und Spitze dunkel. 7.

7. Schaft unten hell. Fühler gegen das Ende verdickt. Bohrer etwas kürzer als das 1. Segment. Beine rotgelb, Hüften schwarz oder braun. 4 mm.

45. **clavicornis** Brischke.

Schaft schwarz. Fühler gegen das Ende nicht auffallend verdickt. 8.

8. Costula verwischt. Körper kräftig und gedrungen. Schenkel und Klauenglieder verdickt; Klauen deutlich gekämmt. 5 mm.

43. **latungula** Thoms.

Costula deutlich. Körper weniger gedrungen. 9.

9. Schenkel rot, an der Basis unten schwarz. Schienen gelblich, die hintersten an Basis und Spitze schwarz. 5 mm.

44. **curvicauda** Holmgr.

Schenkel und Schienen rot, erstere an der Basis nicht schwarz. Hinterschienen an der Spitze und vor der gelblichen Basis schwärzlich. 5—7 mm.

46. **varians** Brischke.

10. Gesicht des ♀ nach unten stark verschmälert. Das 2. Segment lang. Endabschnitt des Radius kaum länger als der Basalabschnitt; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle fast ein rechter. Schaft schwarz. Die hintersten Schenkel wenigstens an beiden Enden dunkel; die hintersten Schienen blassgelb, doppelt dunkel gezeichnet. 5—6 mm.

35. **combinata** Holmgr.

Gesicht des ♀ nach unten nicht auffallend verschmälert oder mit anderer Flügelnervatur oder Zeichnung. 11.

11. Kopf nach hinten nicht verschmälert. 12.

Kopf nach hinten verschmälert, 32.

12. Das 2. Segment kurz. Kleine Arten von 3—4 mm Länge. Fühler fast von Körperlänge. Geissel sehr dünn, behaart. Die hintersten Schienen in der Mitte, sowie Trochanteren und Vorderhüften weiss. Hinterhüften schwarz. Bohrer kurz. 13.

Das 2. Segment deutlich länger als breit. 15.

13. Hinterleibsmittle mehr oder weniger ausgedehnt rot. Bohrer von Länge des Postpetiolus.

39. **micrura** Thoms.

Hinterleib schwarz, in der Mitte nicht rot gezeichnet. 14.

14. Schaft unten gelblich, Geissel unten rostrot. Beine rötlich. Bohrer doppelt so lang als der Postpetiolus.

40. **anura** Thoms.

Schaft und Geissel auf der Unterseite nicht oder kaum heller gezeichnet. Beine schlank, rötlichgelb, die hintersten Schenkel an der Basis oben schwarz. Bohrer von Länge des Petiolus.

41. **nana** Grav.

15. Körper auffallend schlank; Hinterleib linear, rot gezeichnet, das 2. Segment lang. Fühler dünn, fast von Körperlänge. Area superomedia lang. Areola sitzend. Bohrer kaum vorragend. 16.

Körper viel robuster. Bohrer mehr oder weniger vorragend. 17.

16. Nur der Fühlerschaft unten hell. Segment 2—5 am Ende und Beine rotgelb, die hintersten Hüften schwarz, die vorderen weisslich. 4—5 mm.

51. **alternans** Grav.

Fühlerschaft unten und Basalhälfte der Geissel rötlich. Hinterleibsfärbung ungefähr wie bei der vorhergehenden Art. 4—5 mm.

52. **ruficornis** Bridgm.

17. Rücklaufender Nerv vor der Mitte der Areola. Die hintersten Schenkel an der Basis schwarz, die hintersten Schienen weisslich, doppelt dunkel gezeichnet. Costula deutlich. 5—6 mm.

29. **areolaris** Holmgr.

Rücklaufender Nerv hinter der Mitte der Areola. 18.

18. Hinterleib stark zusammengedrückt, gegen das Ende glänzend und glatt. Bohrer dick, stark gekrümmt, meist wenig länger als der Petiolus; dieser kurz und breit. Costula fehlt. Rücklaufender Nerv kurz vor dem Ende der Areola. (Angitia Holmgr.) 19.

Hinterleib gegen das Ende nicht auffallend glatt und glänzend. Petiolus lang und dünn, weit schmaler als der Postpetiolus. Bohrer meist länger. 24.

19. Die hintersten Schienen einfarbig hell. 20.

Die hintersten Schienen an Basis und Spitze dunkel, selten nur an der Spitze. 21.

20. Bohrer so lang wie der Petiolus. Beine gelb, die vorderen Trochanteren und teilweise auch die Hüften weisslich. 5 mm.

1. **insectator** Grav.

Bohrer fast von halber Hinterleibslänge. Schaft unten hell Areola im Vorderflügel breit, fast sitzend. 5 mm.

5. **coleophorarum** Ratzeb.

21. Beine rot, Hüften schwarz, Trochanteren gelb, Spitze der hintersten Schienen braun, ihre Basis gelblich. Areola im Vorderflügel sitzend. Bohrer fast so lang wie das 1. Segment. 4 mm.

6. **occulta** Brischke.

Die hintersten Schienen doppelt dunkel gezeichnet, in der Mitte meist gelblich oder weiss. (Angitia glabricula Holmgr.) 22.

22. Schenkel und Schienen rot, Schenkel unten an der Basis schwarz. Bohrer länger als der Petiolus. 5 mm.

4. **elongata** Thoms.

Beine rot und hellgelb; die hintersten Schienen blassgelb oder weisslich. Bohrer so lang wie der Petiolus. 23.

23. Die hintersten Schienen weisslich, eine Makel nahe der Basis und die Spitze breit schwärzlich. 5 mm.

2. **parvula** Grav.

Wie die vorige Art aber die hintersten Schienen gelblich mit dunkler Zeichnung. 4—5 mm.

3. **annulicrus** Thoms.

24. Kleine Arten von nur 4 mm Länge. Hinterleib ziemlich dicht und fein behaart. Die hintersten Schienen in der Mitte nicht weisslich. Costula fehlend. Rücklaufender Nerv kurz vor dem Ende. 25.

Grössere Arten von 5—6 mm Länge. Areola im Vorderflügel schief, rücklaufender Nerv hinter der Mitte. Die hintersten Schienen kaum mit dunkler Zeichnung. Plica braun. 28.

25. Beine trüb gelbrot, Vorderschenkel unten an der Basis, die hintersten Schenkel auch oben schwärzlich; die hintersten Schienen dunkel gezeichnet.

9. **sordipes** Thoms.

Die hintersten Schenkel gelb oder rot. 26.

26. Metathoraxleisten verwischt. Beine gelblich, Hüften und die hintersten Trochanteren schwarz; die vorderen Trochanteren gelb.

10. **rimator** Thoms. 4

Metathoraxleisten deutlich. 27.

27. Metathorax ziemlich glänzend. Beine gelblich, Hüften und die hintersten Trochanteren schwarz.

7. **truncata** Thoms.

Metathorax weniger glänzend. Beine rötlich, Hüften und die hintersten Trochanteren schwarz.

8. **subbuccata** Thoms.

28. Die hintersten Schienen in der Mitte weiss oder blassgelb. Vordere Trochanteren hellgelb. 29.

Schenkel und Schienen rot. 30.

29. Mitte der hintersten Schienen weiss. Schenkel rötlich, Schienen gelblich.

31. **claripennis** Thoms.

Mitte der hintersten Schienen blassgelb. Schenkel und Schienen rötlich. Speculum matt. Costula fehlend.

33. **specularis** Thoms.

30. Costula fein aber deutlich. Flügel etwas getrübt; Radius an der Basis deutlich gekrümmt. Mesopleuren ziemlich glänzend. Area superomedia quer. Schaft schwarz. Die hintersten Schienen nicht oder kaum dunkel gezeichnet.

30. **rufipes** Grav.

Costula nicht vorhanden. 31.

31. Körper ziemlich schlank. Das 2. Segment weit länger als breit. Die vorderen Trochanteren citrongelb.

32. **majalis** Grav.

Körper gedrunken. Bohrerklappen dick. Das 2. Segment wenig länger als breit.

34. **crassiseta** Thoms.

32. Thorax bucklig; Speculum matt; Costula nicht vorhanden. Die hintersten Schienen in der Mitte breit weiss, mit langen Sporen. 33.

Thorax nicht bucklig; Speculum mehr oder weniger glänzend. 35.

33. Schaft unten hell. Hüften schwarz. Stigma blassgelb. Areola klein. Bohrer so lang wie der Postpetiolus. 5 mm.

38. **brevivalvis** Thoms.

Schaft schwarz. Wenigstens die Vorderhüften hell. 34.

34. Die hintersten Schienen schwarz, in der Mitte breit weiss. Schenkel und Vorderschienen rötlich, Hüften an der Spitze weisslich. 5 mm.

36. **interrupta** Holmgr.

Beine rötlichgelb, die hintersten Schienen weiss, an Basis und Spitze rostrot; Trochanteren und Basis der Mittelhüften schwarz. 5 mm.

37. **lacticrus** Thoms.

35. Rücklaufender Nerv in oder kurz hinter der Mitte der ziemlich regelmässigen Areola. Die vorderen Trochanteren blassgelb. Bohrer ungefähr von halber Hinterleibslänge. 36.

Rücklaufender Nerv kurz vor dem Endwinkel der Areola. Bohrer meist kürzer als der halbe Hinterleib. Endabschnitt des Radius deutlich länger als der Basalabschnitt. Der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitz. 41.

36. Das 3. Segment an den Seiten rot gefleckt. 37. Hinterleib ganz schwarz. 39.

37. Schenkel und Schienen rotgelb, ungefleckt. Bohrer von  $\frac{1}{3}$  Hinterleibslänge. 5 mm.

15. **lateralis** Grav.

Die hintersten Schienen hell, doppelt dunkel gezeichnet. 38.

38. Schaft unten hell. Auch das 2. Segment oft an den Seiten hell. Stigma braun. 5 mm.

13. **chrysosticta** Gmel.

Schaft unten schwarz. Schenkel rötlich, Schienen und Vorderhüften weisslich, die hintersten Schienen doppelt dunkel gezeichnet. Costula fehlend. 5 mm.

14. **monospila** Thoms.



39. Postpetiolus stark bucklig. Beine rot, Hüften schwarz, die äusserste Spitze der Hinterschienen braun. Bohrer etwas länger als das 1. Segment. 5 mm.

11. **gibbula** Brischke.

Postpetiolus nicht auffallend bucklig. Die hintersten Schienen in der Mitte weisslich oder gelblich. 40.

40. Schaft unten hell. Die hintersten Schenkel an der Basis, zuweilen auch am Ende schwarz. Die hintersten Schienen weisslich, doppelt dunkel gezeichnet. Stigma blass. Costula deutlich. 5 mm.

12. **fenestralis** Holmgr.

Schaft und Trochanteren schwarz. Die hintersten Schienen schwarz, in der Mitte breit blassgelb, an der Basis schmal hell. Kräftiger als *A. fenestralis*. 5—6 mm.

16. **trochanterata** Thoms.

41. Hinterleibsmittle rot gezeichnet. 42.

Hinterleib schwarz. 45.

42. Die hintersten Schienen weiss, doppelt schwarz gezeichnet. Unterseite des Schaftes und Vorderhüften blassgelb. 5—6 mm.

cfr. 21. **armillata** Grav. var.

Die hintersten Schienen rötlich, meist dunkel gezeichnet. 43.

43. Metathoraxleisten verwischt. Kopf und Thorax weiss behaart. Hinterleibsmittle braunrot gezeichnet. 6—7 mm.

22. **polyzona** Thoms.

Metathorax mit deutlicher Felderung. Kopf und Thorax nicht auffallend weisslich behaart. 44.

44. Körper glänzend und wenig behaart. Brustseiten glatt. Bohrer fast so lang wie der Hinterleib. Die mittleren Hinterleibssegmente rötlich, mit schwarzer Makel an der Basis oder nur am Ende rötlich. 5 mm.

23. **maculata** Grav.

Körper matt, fein behaart. Hinterrand von Segment 1 schmal, von 2—4 breit rot. Schenkel und Schienen rötlich, Spitze der Hinterschienen und die Hintertarsen braun. 6 mm.

24. **agilis** Brischke.

45. Kopf verlängert. Metathorax ohne Felder. Beine rot, Hüften und hintere Trochanteren schwarz, Spitze der Hinterschienen braun. 6 mm.

19. **rostralis** Brischke.

Kopf nicht verlängert. Metathorax mehr oder weniger gefeldert. 46.

46. Schenkel und Schienen rötlich; die hintersten Schienen doppelt dunkel gezeichnet. Schaft schwarz. 47.

Die hintersten Schienen weisslich, vor der Basis und am Ende schwarz gezeichnet. 48.

47. Körper schlank. Postpetiolus und das 3. Segment um die Hälfte länger als breit. 5 mm.

18. **tenuipes** Thoms.

Körper gedrungener. Postpetiolus und das 3. Segment nicht um die Hälfte länger als breit. 5—7 mm.

20. **contracta** Brischke.

48. Grössere Arten von 5—6 mm Länge. Bohrer etwa von halber Hinterleibslänge. Das 7. Segment beim ♀ eingeschnitten. 49.

Kleine Arten von 4 mm Länge. Bohrer höchstens doppelt so lang als der Postpetiolus. Das 7. Segment beim ♀ höchstens schwach ausgerandet, nur bei *A. tibialis* stärker. 50.

49. Costula fehlend oder ganz undeutlich. Schaft schwarz. Beine rötlich, Hüften und Trochanteren grösstenteils schwarz, die hintersten Schienen weisslich, nahe der Basis und am Ende schwärzlich.

17. **cerophaga** Grav.

Costula deutlich. Schaft unten, sowie Vorderhüften gelb. Beine rötlich, die vorderen Hüften und Trochanteren fast ganz gelb; die hintersten Schienen gelblichweiss, doppelt dunkel gezeichnet.

21. **armillata** Grav.

50. Bohrer nur so lang wie der Postpetiolus. 51.

Bohrer doppelt so lang wie der Postpetiolus. 52.

51. Hinterschenkel nicht schwarz gezeichnet. Postpetiolus etwa so lang als breit.

26. **virginalis** Grav.

Hinterschenkel gewöhnlich an Basis und Spitze schwarz. Postpetiolus schlank, deutlich länger als breit. Durchschnittlich kleiner als *A. virginalis*.

27. **gracilis** Grav.

52. Das 3. Segment deutlich länger als breit. Vorderhüften fast ganz hell. Das 7. Segment ausgeschnitten.

25. **tibialis** Grav.

Sehr ähnlich der vorigen Art, aber das 3. Segment fast quer.

28. **holopyga** Thoms.

Thomson hat versucht, die im Habitus so verschiedenen Arten der vorliegenden Gattung in die folgenden 10 Gruppen zu bringen, in die ich auch die von Thomson nicht angeführten Arten eingereiht habe.

**1. Gruppe.** Hinterleib schwarz, stark von der Seite zusammengedrückt, gegen das Ende glatt und glänzend; Bohrer stark gekrümmt, mit kräftigen Klappen, meist wenig länger als der Petiolus, dieser kurz und dick und wenig schmaler als der Postpetiolus; das 2. Segment lang. Fühler länger als der halbe Körper; Schaft meist schwarz; Geissel dünn, fadenförmig. Kopf nach hinten nicht oder kaum verschmälert, Gesicht mit parallelen Seiten, Wangen schwach aufgetrieben, Mandibeln klein. Thorax lang; Area supero-media kurz; Costula fehlend. Areola im Vorderflügel meist gestielt, klein, den rücklaufenden Nerv kurz vor dem Ende aufnehmend. (*Angitia glabricula* Holmgr.)

**1. A. insectator** Schrank. 1781 *Ichneumon insectator* Schrank, Enum. Insect. Austr. p. 370 ♀ | 1829 *Campoplex insectator* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 481 ♀ | 1872 *Limneria insectator* Marshall, Cat. Brit. Hymen. p. 57 | 1887 *Angitia insectator* Thomson, Opusc. Entom. p. 1154 ♀♂.

Schwarz; Gesicht weisslich behaart; Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich; Fühler wenig kürzer als der Körper. Tegulä blassgelb; Stigma bräunlichgelb. Areola im Vorderflügel klein und unregelmässig, lang gestielt. Beine rötlichgelb, Hüften und die hintersten Trochanteren schwarz, Vorderhüften beim ♀ an der Spitze, beim ♂ ganz hell. Hinterleib so lang als Kopf und Thorax, etwas schmaler als der Thorax; Petiolus kurz und dick; Postpetiolus länger als breit, etwas länger als der Petiolus; Bohrer so lang wie der letztere.

L. 5 mm.

Durch ganz Europa verbreitet aber überall selten.

**2. A. parvula** Grav. 1829 *Campoplex parvulus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 489 ♀ | 1872 *Limneria parvula* Marshall, Cat. Brit. Hymen. p. 57 | 1887 *Angitia parvula* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1155 ♀.

Schwarz; Fühler wenig kürzer als der Körper; Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich. Tegulä gelblichweiss; Stigma bräunlich; Areola im Vorderflügel unregelmässig, schräg, kurz gestielt. Vorderbeine rötlichgelb, Trochanteren weisslich, Hüften schwarz; an den hintersten Beinen Hüften und Trochanteren schwarz, Schenkel rötlich, am Ende schwärzlich, Schienen weisslichgelb, eine Makel nahe der Basis und Spitze schwärzlich, Tarsen braun, das 1. Glied

an der Basis hell. Hinterleib etwas länger und schmaler als Kopf und Thorax zusammen; Petiolus dick, Postpetiolus ungefähr quadratisch, etwas breiter und um die Hälfte kürzer als der Petiolus; das 2. Segment cylindrisch, doppelt so lang als breit. Bohrer etwa so lang wie der Petiolus

L. 5 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

3. **A. annulicrus** Thoms. 1887 *Angitia annulicrus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1155 ♀♂.

Thomson gibt von dieser Art die folgende kurze Beschreibung:

„Schwarz; Beine teilweise rot und gelb gezeichnet, die hintersten Schienen gelblich, eine Makel nahe der Basis und die Spitze ziemlich breit schwärzlich. Kopf nach hinten leicht verengt. Bohrer so lang wie der Petiolus.

L. 4—5 mm.

Südliches Schweden.“

4. **A. elongata** Thoms. 1887 *Angitia elongata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1155 ♀.

„Schwarz, auch die Mandibeln. Schenkel und Schienen rot, Schenkel unten an der Basis mit schwarzer Makel, die hintersten Schienen nahe der Basis mit dunklem Ring, am Ende schwarzbraun. Bohrer länger als der Petiolus.

L. 5 mm.

Südliches Schweden.“

5. **A. coleophorarum** Ratzeb. 1852 *Campoplex coleophorarum* Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III p. 90 ♀♂ | 1887 *Angitia coleophorarum* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1155 ♀♂.

Ratzeburg gibt von dieser Art eine ausserordentlich dürftige Beschreibung; er scheint auch verschiedene Arten vermengt zu haben, denn er erwähnt Stücke mit fehlender Areola; auch die Angaben über die Wirte deuten darauf hin; er zog Stücke aus sacktragenden und minierenden Räupchen, speziell aus *Lithocolletis syringella*. Thomson gibt die folgende Beschreibung: „Schwarz, Schaft unten und Beine hell, die hintersten Hüften schwarz; Bohrer fast so lang wie der halbe Hinterleib. Areola im Vorderflügel breit, fast sitzend.

L. 5 mm.

Deutschland, Schweden.“

6. **A. occulta** Brischke. 1880 *Limneria occulta* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 162 ♀.

Kopf und Thorax matt, Kopf nach hinten nicht verschmälert; Fühler kürzer als der Körper, Thorax cylindrisch, Metathorax mit 3 Feldern, Area superomedia hinten offen, Area posteromedia etwas vertieft. Areola sitzend, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend; Endabschnitt des Radius gekrümmt. Hinterleib glänzend, vom 3. Segment an seitlich zusammengedrückt, das 1. Segment kräftig, fast so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus gewölbt, mit fast parallelen Seiten; das 2. Segment länger als breit, die folgenden quer; Bohrer fast so lang wie das 1. Segment, stark nach oben gekrümmt. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Flügelwurzel und Tegulä gelblich. Stigma hellbraun. Beine rot, Hüften schwarz, die vordersten mit gelber Spitze; Trochanteren gelb, die hintersten mit schwarzer Basis; Spitze der Hinterschienen und der Glieder der Hintertarsen braun, Basis der Hinterschienen und der Hintertarsen gelblich.

L. 4 mm.

Ost- und Westpreussen. — Wurde aus dem Sacke von *Coleophora currucipennella* erzogen.

2. **Gruppe.** Kopf mit den Fühlern, Metathorax und Areola im Vorderflügel wie bei der vorhergehenden Gruppe, aber Thorax weniger verlängert; Hinterleib etwas spindelförmig, fast doppelt so lang als der dünne Bohrer, fein seidenartig behaart, Petiolus weniger dick und etwas länger, dagegen das 2. Segment kürzer; Stigma im Vorderflügel breiter; die hintersten Schienen in der Mitte nicht weisslich. Körper klein, etwa 4 mm lang. Die Beschreibungen der 4 von Thomson aufgestellten Arten dieser Gruppe sind ausserordentlich kurz.

7. **A. truncata** Thoms. 1887 *Angitia truncata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1155 ♀♂.

„Schwarz; Beine rötlichgelb, Hüften und die hintersten Trochanteren schwarz; Clypeus am Ende abgestutzt.

L. 3 mm.

Schweden; nicht selten.“

8. **A. subbuccata** Thoms. 1887 *Angitia subbuccata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1156 ♀♂.

„Schwarz, Beine rötlich, Hüften und die hintersten Trochanteren schwarz; Wangen aufgetrieben.

Von der vorigen Art verschieden durch die aufgetriebenen Wangen und den weniger glänzenden Metathorax.

L. 4 mm.

Schweden; nicht selten.“

Ich habe in Thüringen zahlreiche Stücke gefangen, die ich auf diese Art beziehe; einen sicheren Unterschied von den verwandten Arten finde ich freilich nicht, was bei Thomson'schen Arten sehr begreiflich ist.

9. **A. sordipes** Thoms. 1887 *Angitia sordipes* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1156 ♀.

„Schwarz, Beine schmutzig rötlichgelb, Wangen etwas aufgetrieben, Bohrer fast etwas länger als der halbe Hinterleib. — Wie die vorhergehenden beiden Arten, aber Stigma bräunlichgelb, Schenkel und Schienen trüb rötlich, die vorderen Schenkel unten an der Basis, die hintersten auch oben schwarz, die hintersten Schienen schmutzig gelblich, dunkel gezeichnet.

L. 4 mm.

Schweden.“

10. **A. rimator** Thoms. 1887 *Angitia rimator* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1156 ♀.

„Schwarz; Beine rötlichgelb, Hüften und die hintersten Trochanteren schwarz, Scheitel leicht ausgerandet. — Von den verwandten Arten abweichend durch die gelblichen Trochanteren, nur ganz schwach angedeutete Felderung des Metathorax, breiteres Stigma und das etwas ausgerandete 6. Segment.

L. 4 mm.

Schweden.“

3. **Gruppe.** Kopf nach hinten verschmälert. Fühlerschaft auf der Unterseite meist hell gezeichnet. Die hintersten Schienen meist weisslich, selten rötlich, in der Regel nahe der Basis und am Ende dunkel gezeichnet. Bohrer gewöhnlich ziemlich weit vorstehend.

11. **A. gibbula** Brischke. 1880 *Limneria gibbula* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 159 ♀.

„Matt; Kopf nach hinten verschmälert, Fühler von halber Körperlänge; Thorax etwas länger als hoch, Metathorax fein lederartig, etwas glänzend, mit je 2 Seitenfeldern, Area supero- und posteromedia verschmolzen, breit, letztere schwach vertieft. Areola kurz gestielt, rücklaufender Nerv

in der Mitte mündend; Radius am Ende fast gerade. Das 1. Segment kaum so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren, Postpetiolus stark bucklig angeschwollen; das 2. Segment etwas länger als breit, das 3. quer, die folgenden Segmente seitlich zusammengedrückt; Bohrer etwas länger als das 1. Segment. — Schwarz; Palpen und Mandibeln rot; Tegulä gelblich, Stigma bräunlichgelb. Beine rot, Hüften schwarz, Trochanteren rötlichgelb, die hintersten mit schwarzer Basis, Basis der Hinterschienen gelblich, die äusserste Spitze sowie die der Hintertarsen-Glieder braun.

L. 5 mm.

Ost- und Westpreussen.“

Ich bin nicht ganz sicher, ob man die Art hierher oder wegen des buckligen Postpetiolus zur Gattung Omorgus zu stellen hat. Brischke gibt zwar den Nervellus als nicht gebrochen an, aber es gibt Omorgus-Arten, wo die Brechung sehr undeutlich ist.

12. **A. fenestralis** Holmgr. 1858 *Limneria fenestralis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 59 ♀♂ | 1887 *Angitia fenestralis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1156 ♀♂.

Wenig glänzend, fein weisslich pubescent. Kopf quer, nach hinten etwas verschmälert; Gesicht quer, behaart; Fühler länger als der halbe Körper, gegen das Ende schwach verdünnt. Thorax cylindrisch; Metathorax deutlich gefeldert, Area superomedia hinten meist offen, Costula deutlich. Radius am Ende leicht gekrümmt; Areola ziemlich regelmässig, den rücklaufenden Nerv in oder kurz hinter der Mitte aufnehmend. Hinterleib schmal, beim ♀ gegen das Ende leicht zusammengedrückt; Postpetiolus ziemlich convex, etwa so lang als breit, mit parallelen Seiten; das 2. Segment deutlich länger als breit, das 3. etwa so lang als breit, beim ♂ auch das 4. Segment; Bohrer so lang wie der halbe Hinterleib, gekrümmt. — Schwarz. Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich; Schaft unten blassgelb gefleckt, Tegulä gelblichweiss; Stigma gelblich. Beine rötlich, Vorderhüften und Trochanteren gelb, die Hüften an der Basis meist schwarz; die hintersten Hüften schwarz, die hintersten Schenkel an Basis und Spitze meist verdunkelt, die Schienen gelblichweiss, ein Halbring nahe der Basis und die Spitzen dunkel; Tarsen braun, die Basis der Glieder heller.

L. 5 mm.

Durch ganz Europa verbreitet und überall häufig. — Die Art lebt mit Vorliebe in Raupen von Kleinschmetterlingen. Nach ihrer Häufigkeit zu schliessen, muss sie zahlreiche Wirte haben.

13. **A. chrysosticta** Gmel. 1790 *Ichneumon chrysostictus* Gmelin, Linné: Syst. Nat. Ed. 13. p. 2721 | 1829 *Campoplex chrysostictus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 522 ♀♂ [excl. Var. 2] | 1858 *Limneria chrysosticta* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 60 ♀♂ | 1887 *Angitia chrysosticta* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1157 ♀♂.

Wenig glänzend, fein weisslich behaart; Kopf nach hinten etwas verschmälert. Thorax cylindrisch, Metathorax vollständig gefeldert. Areola im Vorderflügel ziemlich regelmässig, den rücklaufenden Nerv etwas hinter der Mitte aufnehmend. Postpetiolus etwa so lang als breit, mit parallelen Seiten; das 2. Segment deutlich länger als breit; Bohrer so lang wie der halbe Hinterleib. — Schwarz; Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich. Tegulä weisslich; Stigma bräunlichgelb. Vorderbeine rötlichgelb, Hüften und Trochanteren hellgelb, Hüften an der Basis meist schwärzlich; an den hintersten Beinen die Hüften und Basis der Trochanteren schwarz, Schenkel rot, Schienen in der Mitte gelblich, nahe der Basis und am Ende braun; Tarsen dunkel. Das 3. Segment, selten auch das 4. oder auch das 2. mit rötlicher Seitenmakel.

L. 5—6 mm.

Ueber ganz Europa verbreitet, aber nicht so häufig als *A. fenestralis*. — Als Wirt führt Ratzeburg *Lithocolletis syringella* an.

14. **A. monospila** Thoms. 1887 *Angitia monospila* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1157 ♀.

„Schwarz; Schenkel rötlich, Schienen weisslich, die hintersten doppelt dunkel gezeichnet. — Mit den beiden vorhergehenden Arten eng verwandt aber Wangen sehr kurz, Scheitel stark verengt, Metathorax ohne Costula, Vorderhüften weisslich, die hintersten Trochanteren mit schwarzem Punkt; das 3. Segment mit roter Seitenmakel.

L. 5 mm.

Südliches Schweden.“

15. **A. lateralis** Grav. 1829 *Campoplex lateralis* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 467 ♀ | 1872 *Limneria lateralis* Marshall, Cat. Brit. Hymen. p. 57 | 1887 *Angitia lateralis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1157 ♀.

Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich. Tegulä weisslichgelb; Stigma ziemlich schmal, gelblich. Beine rötlichgelb, Hüften und Basis der hintersten Trochanteren



schwarz. Eine Seitenmakel des 3. Segmentes, zuweilen auch die Endwinkel des 2. Segmentes braunrot. Bohrer kaum  $\frac{1}{3}$  der Hinterleibslänge.

L. 5 mm.

Von den rotgezeichneten Arten dieser Gruppe ausgezeichnet durch die einfarbigen, nicht dunkel gezeichneten Schenkel und Schienen.

16. **A. trochanterata** Thoms. 1887 *Angitia trochanterata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1157 ♀♂ | ? 1858 *Limneria volubilis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 65 ♀♂.

„Schwarz; Schenkel und Schienen rötlich, die hintersten Schenkel an der Basis schwarz; die hintersten Schienen schwarz, an der Basis kaum, in der Mitte breit gelblich. — Etwas grösser als *A. fenestralis*, aber sonst dieser sehr ähnlich. Schaft schwarz, Trochanteren schwarz, der vordere Trochantellus blassgelb. Mesopleuren glänzend, dicht punktiert.

L. 5 mm.

Schweden.“

*Limneria volubilis* Holmgr. ist eine sehr zweifelhafte Art; es ist nicht einmal sicher, ob dieselbe zu *Angitia* gehört, oder vielleicht zu *Omorgus* oder *Eulimneria*.

17. **A. cerophaga** Grav. 1829 *Campoplex cerophagus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 470 ♀♂ | 1858 *Limneria majalis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 60 ♀ | 1872 *Limneria cerophaga* Marshall, Cat. Brit. Hymen. p. 55 | 1887 *Angitia cerophaga* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1158 ♀♂.

Kopf nach hinten etwas stärker verschmälert als bei *A. fenestralis*. Metathorax meist mit undeutlicher Costula, an der Basis matt. Endabschnitt des Radius deutlich länger als der Basalabschnitt, Areola ziemlich unregelmässig, den rücklaufenden Nerv kurz vor dem Endwinkel aufnehmend; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitz. Bohrer kürzer als der halbe Hinterleib. — Schwarz. Fühlerschaft unten nicht hell gefleckt. Tegulä weisslich; Stigma bräunlichgelb. Vorderbeine rötlichgelb, Hüften grösstenteils schwarz, Trochanteren blassgelb; die hintersten Hüften und Trochanteren schwarz, letztere am Ende gelb, Schenkel rötlich, Schienen weisslich, nahe der Basis und am Ende schwärzlich; Tarsen braun, an der Basis hell.

L. 5 mm.

Nord- und Mitteleuropa; nicht selten. — Aus Larven der Blattwespengattung *Emphytus*.

Sehr ähnlich der *A. fenestralis*, hauptsächlich verschieden durch den schwarzen Fühlerschaft und die verschiedene Form der Areola und Einmündung des rücklaufenden Nerven.

18. **A. tenuipes** Thoms. 1887 *Angitia tenuipes* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1158 ♀.

„Schwarz, Schenkel und Schienen rötlich, die hintersten Schienen an Basis und Spitze dunkel gezeichnet. — Metathorax mit deutlicher Costula. Flügelnervatur wie bei der vorhergehenden Art. Körper schlank, Postpetiolus und das 2. Segment um die Hälfte länger als breit. Bohrer kürzer als der halbe Hinterleib.“

L. 5 mm.

Von Thomson nach schwedischen Exemplaren beschrieben. Ich habe zahlreiche Stücke, die ich nur auf diese Art beziehen kann, hier in Thüringen gefangen; sie ist hier eine der häufigsten *Angitia*-Arten.

19. **A. rostralis** Brischke. 1880 *Limneria rostralis* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 160 ♀.

„Matt. Kopf hinter den Augen verschmälert, Gesicht etwas schmaler als die Stirn, Raum zwischen Augen und Mandibeln breit, Clypeus etwas breiter als gewöhnlich, vorn gerundet. Thorax länger als hoch, Metathorax gerundet, ohne Felder. Areola kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend; Nervellus nicht gebrochen. Das 1. Segment so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren, Postpetiolus etwas gewölbt, länger als breit, mit parallelen Seiten; das 2. Segment wenig länger als breit, das 3. quer, die folgenden seitlich zusammengedrückt; Bohrer von halber Hinterleibslänge, gekrümmt. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Flügelwurzel und Tegulä gelblich; Stigma braun. Beine rot, Hüften schwarz, die vorderen an der Spitze rot, die hinteren Trochanteren fast ganz schwarz; Spitze und äusserste Basis der Hinterschienen und Hintertarsen braun.“

L. 6 mm.

Ost- und Westpreussen.“

20. **A. contracta** Brischke. 1880 *Limneria contracta* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 158 ♀♂.

„Matt. Kopf quer, hinter den Augen kaum verschmälert. Gesicht beim ♀ etwas schmaler als die Stirn, Fühler fast körperlang. Thorax länger als hoch, Metathorax gerundet, mit je zwei Seitenfeldern. Areola klein, kurz gestielt, den

rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend; Nervellus nicht gebrochen. Hinterleib zusammengedrückt, das 1. Segment kürzer als die hintersten Hüften und Trochanteren, gerade, Postpetiolus wenig breiter als der Petiolus, mit parallelen Seiten, das 2. Segment länger als breit; Bohrer gekrümmt, so lang wie das 1. Segment. — Schwarz, Palpen gelblich; Tegulä schwarzbraun (ob immer?), Stigma braun. Beine rot, alle Hüften und die hintersten Trochanteren schwarz; Basis und Spitze der Hinterschienen und die Hintertarsen schwarzbraun, letztere beim ♀ mit gelber Basis. Bauchfalte vorn gelb, hinten schwarz und gelb.

L. ♀ 7, ♂ 5 mm.

Ost- und Westpreussen.“

21. **A. armillata** Grav. 1829 *Campoplex armillatus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 514 ♂ | 1829 *Campoplex chrysostictus* var. 2 Gravenhorst, l. c. p. 524 ♀♂ | 1858 *Limneria armillata* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 61 ♀♂ | 1887 *Angitia armillata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1158 ♀♂.

Kopf kurz, nach hinten deutlich verschmälert; Gesicht etwas schmaler als die Stirn, quadratisch; Wangen sehr kurz; Fühler ziemlich dick, fadenförmig, etwas länger als der halbe Körper. Thorax gedrungen; Metathorax deutlich gefeldert, Costula kräftig, Area superomedia wenigstens beim ♀ breiter als lang, hinten meist offen. Radius am Ende ziemlich gerade, Areola gestielt, den rücklaufenden Nerv nicht weit hinter der Mitte aufnehmend. Hinterleib gegen das Ende zusammengedrückt, das 1. Segment etwas kürzer als die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus convex, nicht oder nur wenig länger als breit; das 2. Segment länger als breit, mit deutlichen Gastrocölen, das 3. quadratisch; Bohrer wenig länger als das 1. Segment. — Schwarz, fein weisslich behaart. Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich. Fühlerschaft unten hell gefleckt. Beine rötlich, die vorderen Hüften und Trochanteren fast ganz gelb; die hintersten Hüften und Trochanteren schwarz, die Trochanteren an der Spitze gelb; die hintersten Schienen gelblichweiss, nahe der Basis aussen und am Ende braun, innen mehr rötlich; Tarsen braun, Glied 1—3 an der Basis weisslich. Hinterleibssegmente hell gerandet.

Var. Segment 2—3—4 mit rötlicher Seitenmakel.

L. 5—6 mm.

Verbreitet über ganz Nord- und Mitteleuropa. — Wurde aus Raupen von Kleinschmetterlingen gezogen, namentlich aus *Yponomeuta*-Arten.

22. **A. polyzona** Thoms. 1887 *Angitia polyzona* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1159 ♂.

Kopf und Thorax ziemlich stark weisslich pubescent; Clypeus am Ende abgestutzt; Fühlergeissel lang und kräftig. Metathorax ohne deutliche Leisten. Bohrer kräftig, etwas länger als der halbe Hinterleib. — Schwarz; Schaft unten hell gezeichnet, Beine rötlich. Segment 2 und 3 an den Seiten braunrot, Segment 4—7 beim ♀ braunrot, 4—6 mit schwarzer Rückenmakel, beim ♂ Segment 4—7 grösstenteils schwarz.

L. 6—7 mm.

Wurde bei Marseille gefunden.

23. **A. maculata** Grav. 1829 *Campoplex maculatus* Gravenhorst, Ichneum. Eur III p. 536 ♀ | 1872 *Limneria maculata* Marshall, Catal. Brit. Hymen. p. 57 | 1887 *Angitia maculata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1157. ♀.

Ziemlich glatt, glänzend. Fühlergeissel ziemlich lang und dick. Brustseiten glatt, Metathorax mit deutlicher Costula. Areola im Vorderflügel etwas unregelmässig, gestielt, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend. Hinterleib so lang als Kopf und Thorax zusammen, schmaler als der letztere, Postpetiolus oval, mit Längsfurche, doppelt so breit als der Petiolus; das 6. Segment ausgerandet; Bohrer deutlich länger als der halbe Hinterleib, wenig kürzer als dieser. — Schwarz. Palpen, Mitte der Mandibeln und Unterseite des Schaftes gelblich. Tegulä weisslichgelb, Stigma gelblich. Die vorderen Hüften und Trochanteren gelb, Mittelhüften schwarz, an der Spitze gelb, die hintersten Hüften ganz gelb; Schenkel rötlich, die hintersten Kniee schwärzlich; Schienen blassgelb, die hintersten nahe der Basis und am Ende gebräunt, an der äussersten Basis weisslich; Hintertarsen dunkel, an der Basis hell. Das 2. Segment am Endrand, sowie Segment 3—6—7 braunrot, mit schwarzer Rückenmakel.

L. 5 mm.

Südeuropa; selten.

24. **A. agilis** Brischke. 1880 *Limneria agilis* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 168 ♂.

„Matt, seidenhaarig. Kopf hinter den Augen wenig verschmälert; Fühler länger als der halbe Körper. Thorax fast cylindrisch; Metathorax gerunzelt, mit 5 Feldern, Area superomedia sechseckig, geschlossen. Areola klein und schief, lang gestielt, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend, Radius am Ende gekrümmt, Nervellus nicht gebrochen. Das 1. Segment etwas länger als die

hintersten Hüften und Trochanteren, ziemlich dünn, gerade; Postpetiolus wenig breiter als der Petiolus, länger als breit, Luftlöcher etwas vortretend; das 2. Segment fast doppelt so lang als breit, das 3. länger als breit. — Schwarz; Palpen, Mitte der Mandibeln und Tegulä gelblich. Stigma braun. Beine rot, Hüften schwarz, Trochanteren gelb, die hintersten mit schwarzer Basis; Spitze der Hinterschienen und die Hintertarsen braun. Hinterrand von Segment 1 sehr schmal, von 2—4 breit rot; bei Segment 4 nur die Basis schmal schwarz; Bauchfalte gelb.

L. 6 mm. — ♀ nicht bekannt.

Ost- und Westpreussen.

25. **A. tibialis** Grav. 1829 *Campoplex tibialis* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 468 ♀ | 1872 *Limneria tibialis* Marshall, Catal. Brit. Hymen. p. 58 | 1887 *Angitia tibialis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1159 ♀♂.

Kopf nach hinten deutlich verschmälert; Fühlergeissel lang und ziemlich dünn. Areola ziemlich unregelmässig, meist kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend. Das 7. Segment ausgeschnitten; Bohrer etwa so lang wie  $\frac{1}{3}$  des Hinterleibs. — Schwarz; Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich. Tegulä weisslich, Stigma gelblich. Beine rötlich, Vorderhüften und Trochanteren gelblich, die Mittel- und Hinterhüften und hinterste Trochanteren schwarz; die hintersten Schienen weisslichgelb, nahe der Basis und am Ende schwärzlich; Tarsen braun, das 1. Glied mit weisslicher Basis.

L. 4—5 mm.

Zerstreut in Nord- und Mitteleuropa.

26. **A. virginalis** Grav. 1829 *Campoplex virginalis* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 472 ♀ | 1882 *Limneria virginalis* Bridgman, Trans. Ent. Soc. London p. 150 | 1887 *Angitia virginalis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1160 ♀♂.

Kopf nach hinten verschmälert; Clypeus am Ende abgestutzt; Fühler schlank, etwas länger als der halbe Körper. Metathorax deutlich gefeldert, an der Basis matt. Areola im Vorderflügel unregelmässig, gestielt, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend. Hinterleib etwas länger und schmaler als Kopf und Thorax; Postpetiolus quadratisch, kürzer und doppelt so breit als der Petiolus; Bohrer so lang als der Postpetiolus. — Schwarz; Fühlerschaft unten braun. Tegulä weisslichgelb; Stigma bräunlichgelb. Hüften und hinterste Trochanteren schwarz. Schenkel rötlich, Schienen gelblich, die hintersten weisslich, nahe der Basis und am Ende schwärzlich; Tarsen weisslich, die Spitzen der Glieder braun.

L. 5 mm.

Nord- und Mitteleuropa; nicht häufig. — Aehnelt wie die vorige Art sehr der gemeinen *A. fenestralis*.

27. ***A. gracilis*** Grav. 1829 *Campoplex gracilis* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 511 ♂ | 1880 *Limneria gracilis* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 150 ♂ | 1884 *Limneria gracilis* (? Gravenhorst) Bridgman, Trans. Ent. Soc. London p. 427 ♀♂.

Anmerk. Thomson (Opusc. Entom. XI p. 1167) beschreibt eine *A. gracilis* Holmgr. = *ruficornis* Bridgm. Es scheint ein Fehler in der Namenbezeichnung vorzuliegen, denn Holmgren hat gar keine *A. gracilis* beschrieben.

Gravenhorst beschreibt nur das ♂; Bridgman dagegen beide Geschlechter. — Kopf quer, nach hinten deutlich verschmälert. Thorax schlank, fast doppelt so lang als hoch; Metathorax gestreckt, mit 5 Feldern, Area superomedia lang, hinten offen. Areola gestielt oder fast sitzend, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend. Hinterleib schlank; Postpetiolus etwa doppelt so breit als der Petiolus, beim ♀ mit etwas gerundeten, beim ♂ mit mehr parallelen Seiten; das 2. Segment um  $\frac{1}{3}$  länger als breit, beim ♂ doppelt so lang als breit; das 3. beim ♀ quadratisch, beim ♂ etwas länger als breit; Bohrer von  $\frac{1}{6}$  Hinterleibslänge. — Schwarz; Mandibeln gelblich. Tegulä weisslich, Stigma bräunlichgelb. Vorderhüften und Trochanteren gelb; Schenkel rötlich, Hinterschenkel oft an der Basis und am Ende braun; Vorderschienen gelblich, die hintersten weisslich, nahe der Basis und am Ende schwärzlich; Hintertarsen dunkel, an der Basis heller.

L. 4—5 mm.

Mittleres Europa. — Nach Bridgman lebt die Art in *Gracilaria stigmatella*.

Die Art ähnelt sehr der *A. virginalis*, ist aber kleiner, die Hinterschenkel sind in der Regel an Basis und Spitze schwarz, Vorderhüften, beim ♂ auch die Mittelhüften gelb; der Postpetiolus ist schlank, deutlich länger als breit, bei *A. virginalis* ist derselbe etwa so lang als breit, mit deutlich vorstehenden Luftlöchern; die Area superomedia ist lang und schmal, bei *A. virginalis* dagegen quer.

28. ***A. holopyga*** Thoms. 1887 *Angitia holopyga* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1160 ♀.

Thomson gibt von dieser Art die folgende ausserordentlich kurze Beschreibung: „Schwarz, Beine zum Teil rot (pedibus rufovariis), Bohrer doppelt so lang als der Postpetiolus, das

3. Segment fast quer. — Der *A. tibialis* sehr ähnlich, durch das kurze 3. Segment hauptsächlich verschieden.

L. 4 mm.

Wurde bei Lund im südlichen Schweden gefunden.“

- 4. Gruppe.** Körper von Mittelgrösse. Kopf nach hinten nicht oder nur wenig verschmälert. Fühlerschaft meist schwarz. Areola im Vorderflügel gewöhnlich unregelmässig, schief, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend, bei *A. areolaris* ziemlich regelmässig, mit dem rücklaufenden Nerv vor der Mitte. Hinterleib schwarz; Bohrer von halber Länge desselben.

29. ***A. areolaris*** Holmgr. 1858 *Limneria areolaris* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 59 ♀ | 1887 *Angitia areolata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1160 ♀♂.

Kopf nach hinten etwas verschmälert. Metathorax fein behaart, deutlich gefeldert, Area superomedia lang, hinten offen; Brustseiten fein runzlig-punktiert, mit kleinem Speculum. Areola im Vorderflügel gross, kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv etwas vor der Mitte aufnehmend. Das 1. Hinterleibssegment so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus etwa so lang als breit, mit parallelen Seiten, fast 3 mal so breit als der Petiolus; das 2. Segment deutlich länger als breit, das 3. quadratisch; Bohrer etwas länger als das 1. Segment. — Schwarz, fein weisslich behaart. Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich. Tegulä weisslichgelb, Stigma gelblich. Hüften schwarz; vordere Trochanteren gelb; Schenkel rötlich, die hintersten an der Basis und meist auch am Ende schwärzlich; Schienen gelblich, die hintersten weisslich, nahe der Basis und am Ende dunkel gezeichnet; die hintersten Tarsen dunkel, mit heller Basis.

L. 5—6 mm.

Zerstrent in Nord- und Mitteleuropa. — Aus Sendungen des Vorsitzenden der Reblauskommission, Herrn E. H. Rübsaamen, habe ich gesehen, dass die Art mit Vorliebe bei *Conchylis ambiguella* Hb. (Einbindiger Traubenwickler, Heuwurm) lebt; sie ist also für den Rebenbau sehr nützlich.

30. ***A. rufipes*** Grav. 1829 *Campoplex rufipes* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 461 ♀ | 1829 *Campoplex difformis* Gravenhorst, l. c. p. 458 (partim) | 1838 *Porizon erucator* Zetterstedt, Insect. Lappon. I p. 394 ♀♂ | 1854 *Campoplex fumipennis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXX p. 12 ♀♂ | 1858 *Limneria erucator* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 58 ♀♂ | 1872 *Limneria rufipes* Marshall, Catal. Brit. Hymen. p. 58 | 1887 *Angitia rufipes* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1168 ♀♂.

Matt, fein graulich behaart. Kopf nach hinten nur wenig verschmälert; Fühler etwas länger als Kopf und Thorax

zusammen. Thorax robust, Mesopleuren ziemlich glänzend; Metathorax hinten runzlig - punktiert; Area superomedia quer, Costula dünn aber deutlich. Areola im Vorderflügel schräg, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend; Radius an der Basis gekrümmt. Hinterleib zusammengedrückt; das 1. Segment so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus convex, mit geraden Seiten; das 2. Segment länger als breit; Bohrer fast etwas länger als der halbe Hinterleib. -- Schwarz; Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich; Schaft unten nicht hell. Tegulä gelblichweiss. Flügel ziemlich getrübt, Stigma gelblich. Beine rot, Hüften und Basis der Trochanteren, auch der hinterste Trochantellus schwarz; die hintersten Schienen kaum dunkel gezeichnet, die Sporen weisslich; die hintersten Tarsen am Ende verdunkelt. Das 2. Segment nicht selten mit rötlichem Endrand; Bauchfalte ziemlich dunkel.

L. 6—7 mm.

Nord- und Mitteleuropa; ziemlich häufig. — Als Wirte werden angegeben: *Cladius albipes* (Brischke), *Eupithecia castigata* (Bignell), *Tortrix laevigana*, *Coleophora vibiciella* (Rondani) und *Nothris verbascella* (Brischke). Die Art erinnert sehr an die Gattung *Omorgus*.

31. **A. claripennis** Thoms. 1887 *Angitia claripennis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1161 ♀♂.

„Schwarz; Schenkel gelbrot, Schienen rötlichgelb, die hintersten in der Mitte gelblich. — Sehr ähnlich der vorhergehenden Art, aber die vorderen Hüften an der Spitze und die Trochanteren hellgelb; Metathorax mit feinerer Skulptur und Flügel hyalin.

L. 5—7 mm.

Schweden.“

32. **A. majalis** Grav. 1829 *Campoplex majalis* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 462 ♀♂ | 1880 *Limneria majalis* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 150 ♀♂ | 1880 *Angitia majalis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1161 ♀♂.

Die Beschreibung, welche Gravenhorst von dieser Art gibt, ist ziemlich schwankend, ausserdem führt er noch 5 Varietäten an, sodass es schwer hält, über die Art in das Klare zu kommen. Die Beschreibung lautet: Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich, Flügel etwas getrübt, beim ♀ zuweilen hyalin; Tegulä weisslich, Stigma bräunlichgelb. Areola gestielt oder fast sitzend. Beine rötlich, Hüften schwarz, die vordersten am Ende zuweilen hell; vordere Trochanteren



gelb; die hintersten Schienen rötlich oder gelblich, meist nahe der Basis und am Ende dunkel gezeichnet; die hintersten Schenkel beim ♀ zuweilen an der Spitze, seltener auch an der Basis schwarz. Bohrer etwa so lang wie der halbe Hinterleib. -- Thomson beschreibt die Art wie folgt: „Schwarz, Schenkel schlank, diese und die Schienen rot. — Der *A. claripennis* sehr ähnlich, aber schmaler, Costula sehr undeutlich, Bohrer von halber Hinterleibslänge, das 2. Segment und der Postpetiolus länger, das 6. Segment beim ♀ nicht ausgeschnitten; die vorderen Trochanteren hellgelb, alle Hüften und die hintersten Trochanteren schwarz.

L. 5—6 mm.“

Scheint durch ganz Europa verbreitet zu sein. Aus Thüringen besitze ich zahlreiche Stücke, die ich auf diese Art beziehe.

33. **A. specularis** Thoms. 1887 *Angitia specularis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1162 ♀.

„Körper weniger schlank als bei *A. majalis*. Metathorax ohne Costula; Mesopleuren fein runzlig, Speculum matt. Hüften schwarz, Spitze der vorderen mit den Trochanteren hellgelb; Schenkel und Schienen rötlich, die hintersten Schienen aussen in der Mitte breit weisslich, überdies ein weisslicher Ring an der Basis.

L. 5—6 mm.

Schweden.“

34. **A. crassiseta** Thoms. 1887 *Angitia crassiseta* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1162 ♀.

„Körper kurz und gedrungen; Schenkel und Schienen rot. — Aehnelt durch die Färbung der Beine der *A. rufipes*, aber der Thorax ist kürzer und die Costula fehlt; das 2. Segment ist nur wenig länger als breit und die Bohrerklappen sind ungewöhnlich dick.

L. 5—6 mm.

Wurde bei Lund im südlichen Schweden entdeckt.“

5. **Gruppe.** Gesicht des ♀ verengt. Endabschnitt des Radius kaum länger als der Basalabschnitt; der untere Aussenkinkel der Discoidalzelle fast ein rechter. Schiensporen an Länge unter sich ziemlich gleich. Bohrer dünn und ziemlich gerade, von  $\frac{1}{3}$  Hinterleibslänge.

35. **A. combinata** Holmgr. 1858 *Limneria combinata* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 62 ♀♂ | 1887 *Angitia combinata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1162 ♀♂.

Ausgezeichnet hauptsächlich durch das schmale Gesicht, die schlanken Beine und das ziemlich verlängerte 2. Segment. Kopf nach hinten wenig verschmälert; Gesicht behaart, schmaler als die Stirn. Thorax länger als hoch, an den Seiten ziemlich glänzend; Metathorax mit 5 vollständigen Feldern, selten die Area superomedia hinten offen. Areola im Vorderflügel, annähernd dreieckig, kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv etwas hinter der Mitte aufnehmend. Hinterleib gegen das Ende zusammengedrückt; Postpetiolus quadratisch oder etwas länger als breit, wenig convex; das 2. Segment mindestens um  $\frac{1}{2}$  länger als breit; Bohrer etwas länger als das 1. Segment. — Schwarz, fein graulich behaart. Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich. Tegulä weisslich. Flügel schwach getrübt, mit gelblichem Stigma. Hüften und hinterste Trochanteren schwarz, vordere Trochanteren gelb; Schenkel rot, vordere meist an der Basis, die hintersten an Basis und Spitze, selten fast ganz braun oder schwärzlich; Schienen gelblich, die hintersten nahe der Basis und am Ende gebräunt; Tarsen dunkel, an der Basis hell. Bauchfalte hellgelb.

L. 5—6 mm.

Nord- und Mitteleuropa; hier und da nicht selten.

6. **Gruppe.** Kopf nach hinten deutlich verschmälert. Thorax ziemlich bucklig; Speculum matt oder kaum glänzend; Metathorax ohne Costula. Areola im Vorderflügel schräg, gestielt; Radius mit langem Endabschnitt; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitz. Die hintersten Schienen in der Mitte breit weiss, mit langen Sporen. Bohrer von halber Hinterleibslänge, bei *A. brevis* so lang wie der Postpetiolus.

36. **A. interrupta** Holmgr. 1858 *Limneria interrupta* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 62 ♀♂ | 1887 *Angitia interrupta* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1162 ♀♂.

Kopf quer, nach hinten verschmälert. Thoraxseiten schwach glänzend; Seitenfelder des Metathorax verschmolzen, Area superomedia 5seitig, fast etwas breiter als lang. Postpetiolus beim ♀ etwas kürzer als breit, beim ♂ quadratisch, mit parallelen Seiten; das 2. Segment um  $\frac{1}{2}$  länger als breit. Bohrer so lang wie der halbe Hinterleib. — Schwarz, weisslich behaart. Palpen und Mitte der Mandibeln gelb. Tegulä gelblichweiss; Stigma bräunlichgelb.

Vorderbeine rötlichgelb, Hüften zum Teil schwarz, Trochanteren gelb; an den hintersten Beinen Hüften und Trochanteren schwarz, Schenkel rot, Schienen gelblichweiss, an der Basis selbst und am Ende schwärzlich. Tarsen dunkel.

L. 5 mm.

Aus Nord- und Mitteleuropa bekannt. — Nach Brischke in *Scopula crataegella*.

37. **A. lacticus** Thoms. 1887 *Angitia lacticus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1163 ♀.

„Schwarz, Beine rötlichgelb; die hintersten Schienen weiss, an Basis und Spitze rostrot. Trochanteren und Basis der Mittelhüften schwarz.

L. 5 mm.

Schweden.“

38. **A. brevis** Thoms. 1887 *Angitia brevis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1163 ♀.

„Kopf nach hinten deutlich verschmälert; Fühler lang, behaart, gegen das Ende verdünnt. Metathorax ohne Costula. Areola im Vorderflügel klein und schräg. Bohrer so lang wie der Postpetiolus. — Schwarz. Beine rot und gelb, Hüften und die hintersten Trochanteren schwarz. Unterseite des Schaftes, Stigma und Bauchfalte gelblich.

L. 5 mm.

Schweden.“

7. **Gruppe.** Sehr kleine Arten von nur 3—4 mm Länge. Kopf nach hinten nicht oder nur wenig verschmälert; Fühler fast von Körperlänge, Geissel sehr dünn, fadenförmig, fein behaart. Areola im Vorderflügel schief. Die hintersten Schenkel dick, rot; die hintersten Schienen in der Mitte, alle Trochanteren und die Vorderhüften weisslich. Das 2. Segment und der Bohrer kurz.

39. **A. micrura** Thoms. 1887 *Angitia micrura* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1164 ♀♂.

Die von Thomson gegebene Beschreibung ist ausserordentlich kurz:

„Schwarz, Beine rötlichgelb und weisslich, die hintersten Hüften schwarz. Hinterleibsmittle mehr oder weniger ausgedehnt rot gezeichnet. Bohrer so lang wie der Postpetiolus.

L. 3—4 mm.

Schweden und Frankreich.“

40. **A. anura** Thoms. 1887 *Angitia anura* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1164 ♀♂.

Auch von dieser Art ist die Beschreibung sehr kurz:

„Schwarz, Beine rötlichgelb und weisslich, die hintersten Hüften schwarz. Unterseite des Schaftes gelblich, Geissel unten rostrot. Bohrer fast doppelt so lang als der Postpetiolus.

L. 3—4 mm.“

Von Thomson in Schweden, von Kriechbaumer in Bayern gefunden. — Wurde aus in Blättern von *Lonicera minierenden* Räupchen gezogen.

41. **A. nana** Grav. 1829 *Campoplex nanus* Gravenhoist, Ichneum. Eur. III p. 469 ♀ | 1872 *Limneria nana* Marshall, Cat. Brit. Hymen. p. 57 | 1887 *Angitia nana* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1164 ♀♂.

„Schwarz. Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich. Tegulä weisslich, Stigma bräunlichgelb. Beine schlank, rötlichgelb; Hüften und hinterste Trochanteren schwarz; die hintersten Schenkel an der Basis oben schwärzlich; Mittelschienen nahe der Basis und am Ende verdunkelt, die hintersten Schienen weisslich, nahe der Basis und am Ende schwärzlich; die hintersten Tarsen gelblich, die Spitze der Glieder dunkel. Hinterleib etwas länger und schmaler als Kopf und Thorax; Postpetiolus etwas aufgetrieben, länger als breit, so lang und doppelt so breit als der Petiolus; Bohrer von  $\frac{1}{4}$  Hinterleibslänge.

L. 3—4 mm.“

Aus Deutschland, England und Schweden bekannt.

- 8. Gruppe.** Thorax nicht robust. Areola im Vorderflügel schief. Die hintersten Schienen in der Mitte nicht weisslich. Das 2. Segment des ♀ meist kurz, das 7. Segment nicht ausgeschnitten. Bohrer länger als der Petiolus.

42. **A. rufata** Bridgm. 1884 *Limneria rufata* Bridgman, Trans. Ent. Soc. London p. 429 ♀♂ | 1887 *Angitia rufata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1165 ♀♂.

Kopf quer, hinter den Augen verschmälert. Fühler fast von Körperlänge; Gesicht mit weisslicher Behaarung; Mandibeln klein. Metathorax mit deutlicher Costula, Area superomedia fünfseitig, kaum länger als weit, hinten offen. Areola im Vorderflügel veränderlich, fast sitzend aber auch deutlich gestielt, der Aussennerv oft verloschen; rücklaufender Nerv hinter der Mitte mündend. Postpetiolus kürzer als der Petiolus und  $2\frac{1}{2}$  mal breiter,  $\frac{1}{3}$  länger als breit, an seiner Basis mit Spur einer Längsfurche; das

2. Segment etwa  $\frac{1}{3}$  länger als breit, das 3. quer; Bohrer von  $\frac{1}{3}$  Hinterleibslänge. — Schwarz; Mandibeln gelb. Stigma bräunlich. Beine rot; Vorder- und Mittelhüften gewöhnlich an der Basis gebräunt, gegen das Ende gelblich; die hintersten Hüften schwarz; Trochanteren gelb, die hintersten dunkel gefleckt; die äusserste Basis der hintersten Schienen gelblich, das Ende leicht gebräunt; die Spitze der Tarsenglieder verdunkelt. Das Ende des 2. Segmentes, das 3. ganz und das 4. grösstenteils rot.

L. 4—5 mm.

Aus England und Schweden bekannt. — Wurde aus *Choreutes scintillulana* gezogen.

43. **A. latungula** Thoms. 1887 *Angitia latungula* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1165 ♀♂.

Körper ziemlich gedrungen; Kopf rundlich; Mandibeln klein; Metathorax an der Basis ziemlich glänzend, mit undeutlicher Costula; Klauenglied und Klauen kräftig, letztere gekämmt; beim ♀ das 2. Segment nicht länger als breit. — Schwarz; Mandibeln braun. Schenkel und Schienen rötlich, die vorderen Trochanteren gelb, die hintersten Schienen doppelt dunkel gezeichnet.

L. 5 mm.

England, Frankreich.

44. **A. curvicauda** Holmgr. 1858 *Limneria curvicauda* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 74 ♀♂ | 1880 *Limneria curvicauda* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 164 ♀♂ | 1887 *Angitia curvicauda* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1166 ♀♂.

Körper ziemlich kurz und gedrungen. Metathorax mit ziemlich deutlicher Costula, Area superomedia am Ende offen. Das 2. Segment beim ♀ nicht, beim ♂ nur ganz wenig länger als breit; Bohrer etwas kürzer als das 1. Segment. — Schwarz, mit graulicher Behaarung; Mund und Tegulä gelblich; Unterseite des Schaftes mit kleiner heller Makel. Stigma im Vorderflügel bräunlichgelb. Schenkel trüb rötlich, an der Basis unten schwärzlich, an den Hinterschenkeln die dunkle Färbung ausgedehnter; Schienen trüb rötlichgelb, die hintersten nahe der Basis und an der Spitze deutlich gebräunt; die vorderen Trochantellen hellgelb.

L. 5 mm.

Lappland; nach Förster auch in der Schweiz.

45. **A. clavicornis** Brischke. 1880 *Limneria clavicornis* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 162 ♀.

„Matt; Kopf hinter den Augen wenig verschmälert, mit gerundeten Wangen; Fühler länger als der halbe Körper, nach der Spitze hin verdickt. Thorax cylindrisch, Metathorax etwas verlängert, mit 5 Feldern, Area superomedia hinten offen; Areola im Vorderflügel schief, den rücklaufenden Nerv an der Spitze aufnehmend; Radius am Ende gekrümmt; Nervellus nicht gebrochen. Hinterleib gegen das Ende zusammengedrückt; das 1. Segment etwas kürzer als die hintersten Hüften und Trochanteren, gerade, Postpetiolus nicht viel breiter als der Petiolus; das 2. Segment so lang wie breit, mit deutlichen Thyridien; das 3. Segment länger als breit; Bohrer etwas kürzer als das 1. Segment. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Unterseite des Schaftes, Tegulä und Bauchfalte gelb. Flügel hyalin mit hellbraunem Stigma. Beine rotgelb, Hüften schwarz oder rotbraun. Trochanteren gelblich, Hinterschienen an der Spitze und vor der Basis bräunlich, Hintertarsen braun.

Var. ♀. Das 2. Segment braun.

L. 4 mm. — ♂ nicht bekannt.

Bei Danzig von Brischke aufgefunden.“

46. **A. varians** Brischke. 1880 *Limneria varians* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 153 ♀♂.

„Matt; Kopf nach hinten wenig verschmälert; Augen neben den Fühlern etwas ausgebuchtet, letztere etwas länger als der halbe Körper. Thorax vorn erhöht, länger als hoch, Metathorax gerundet, mit je 2 Seitenfeldern, Area superomedia breit dreieckig, hinten offen. Areola im Vorderflügel länger oder kürzer gestielt, rücklaufender Nerv hinter der Mitte mündend; Radius am Ende gerade, Nervellus nicht gebrochen. Hinterleib seitlich breit beilförmig zusammengedrückt; das 1. Segment kürzer als die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus mit fast parallelen Seiten; das 2. Segment beim ♀ nicht länger als breit, beim ♂ etwas länger; das 3. Segment quer, Bohrer etwas länger als das 1. Segment, gekrümmt. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Flügelwurzel und Tegulä gelb; Stigma hellbraun, beim ♂ dunkler. Beine rot, Hüften und Basis der hinteren Trochanteren schwarz, vordere Trochanteren und Spitze der hintersten gelb, Hinterschienen an der Spitze und hinter der gelben Basis schwärzlich, Mitteltarsen mit dunklen Gliederspitzen, Hintertarsen schwarzbraun, Glied 1 und 2 mit heller Basis.

L. ♀ 7, ♂ 5 mm.

Von Brischke bei Danzig aufgefunden. Das ♀ wurde aus einer Noctua-Raupe gezogen.“

47. **A. vestigialis** Ratzeb. 1852 Campoplex vestigialis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III p. 88 ♀♂ | 1880 Limneria vestigialis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 164 ♀♂ | 1887 Angitia vestigialis Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1166 ♀♂.

Die Art ist besonders durch 2 Merkmale ausgezeichnet: Die Areola im Vorderflügel ist sehr klein, schräg und langgestielt, indem der Aussennerv sehr klein und rudimentär ist; zuweilen verschwindet er fast ganz. Ein zweites Merkmal ist der stark gekrümmte Bohrer, der etwa halb so lang als der Hinterleib ist. Kopf nach hinten etwas verschmälert; Metathorax ohne Costula; Area superomedia hinten offen. Postpetiolus mit fast parallelen Seiten; das 2. Segment beim ♀ kaum länger als breit. — Schwarz; Schenkel und Schienen rötlich; die vorderen Hüften an der Spitze, die vorderen Trochanteren und alle Trochantellen hellgelb; die hintersten Schienen nahe der Basis und am Ende dunkel gezeichnet.

L. 5 mm.

Nördliches und mittleres Europa. — Man erhält die Art aus Weidengallen, die von Nematus (Pontania) hervorgerufen werden. — Die Angabe Brischke's, dass er die Art auch aus Tortrix laevigana, Retinia resinana und Phyllotoma microcephala erhalten habe, erscheint mir fraglich.

48. **A. macrostoma** Thoms. 1887 Angitia macrostoma Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1166 ♀.

„Gedrungen; schwarz; Bohrer von Länge des 1. Segmentes, Endrand von Segment 2—4, die dicken Schenkel und die Schienen rötlich. — In der Flügelbildung der A. vestigialis ähnlich aber Stigma braungelb. Unterseite von Schaft und Pedicellus, das Ende der Vorderhüften und die Trochanteren weisslich, die hintersten Trochanteren mit schwärzlichem Punkte. Die Tarsen und der hinterste Trochantellus ziemlich dick. Metathorax ohne Costula.

L. 5 mm. — ♂ nicht bekannt.

In der Nähe von Lund im südlichen Schweden aufgefunden.“

49. **A. punctipes** Thoms. 1887 Angitia punctipes Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1166 ♂.

„Schwarz; Schenkel und Schienen rötlich, die hintersten Schenkel an der Basis und die Trochanteren schwarz;

Bohrer so lang wie das 1. Segment. — Aehnelt der *A. macrostoma* durch den breiten nach hinten nicht verschmälerten Scheitel, aber der Hinterleib ist nicht hell gezeichnet und die Beine sind anders gefärbt. Auch mit *A. latungula* verwandt, aber Klauen nicht gekämmt und Mandibeln kräftiger.

L. 5 mm. — ♂ unbekannt.

Südliches Schweden.

**9. Gruppe.** Fühler an der Spitze perlschnurförmig, kürzer als der halbe Körper. Areola im Vorderflügel nicht vollständig ausgebildet, zuweilen fast fehlend. Scheitel nach hinten nicht verschmälert. Metathorax gerunzelt, ohne Costula.

50. **A. monilicornis** Thoms. 1887 *Angitia monilicornis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1167 ♀♂.

„Schwarz, Beine rötlichgelb, an der Basis schwarz, Bohrer etwas kürzer als das 1. Segment; Hinterleib des ♀ gegen das Ende seitlich zusammengedrückt. Schiensporen kurz und gekrümmt.

L. 5 mm.

Lapland.“

**10. Gruppe.** Körper klein und sehr schlank. Kopf mit breitem Scheitel, nach hinten rundlich verschmälert; Fühler fast von Körperlänge, mit sehr dünner Geissel; Gesicht des ♀ verschmälert; Wangen nicht aufgetrieben; Mund klein. Thorax gestreckt, Area superomedia verlängert. Areola im Vorderflügel fast sitzend oder annähernd fünfseitig. Hinterleib linear, in der Mitte rot gezeichnet; das 2. Segment lang, mit sehr grossen Thyridien; Bohrer kaum vorstehend.

51. **A. alternans** Grav. 1829 *Campoplex alternans* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 537 ♀ | 1872 *Limneria alternans* Marshall, Catal. Brit. Hymen. p. 55 ♀ | 1880 *Meloboris alternans* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 174 ♀ | 1887 *Angitia alternans* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1167 ♀♂.

Schwarz; Palpen und Mandibeln hellgelb. Fühlerschaft unten gelblich. Tegulä weisslichgelb, Stigma gelblich. Beine rötlichgelb, die vorderen Hüften und Trochanteren weisslichgelb, die hintersten Hüften schwarz, die hintersten Schienen an Basis und Spitze kaum dunkel gezeichnet. Hinterleib so lang als Kopf und Thorax, etwas schmaler als der Thorax, am Ende zusammengedrückt; Postpetiolus



fast quadratisch, etwas kürzer und wenig breiter als der Petiolus; Segment 2—4 am Ende rot, 5 rot, an der Basis schwarz. Bohrer kurz vorstehend, nach oben gekrümmt.

L. 4—5 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

52. **A. ruficornis** Bridgm. 1884 *Limneria ruficornis* Bridgman, Trans. Ent. Soc. London p. 429 ♀ | 1887 *Angitia gracilis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1167 [non Gravenhorst] | 1901 *Angitia glabricula* Dalla Torre, Catal. Hymen. III p. 129 [non Holmgren].

Anmerk. Thomson nennt die Art *Angitia gracilis* Holmgr. Ich habe bereits bei *A. gracilis* Grav. erwähnt, dass Holmgren gar keine *Angitia gracilis* beschrieben hat. Mit *A. glabricula* Holmgr. hat die Art gar nichts zu tun, diese Art begreift die ganze erste Gruppe der *Angitia*-Arten. — Was nun die Art selbst betrifft, so erscheint mir ihre Stellung bei *Angitia*, zu welcher Gattung sie Thomson rechnet, sehr zweifelhaft. Meiner Meinung nach gehört das Tier wohl besser zu *Olesicampe*. Schon Bridgman sagt, dass sie sehr nahe *Limneria* (*Olesicampe*) *longipes* komme; man rechne dazu das dicht weiss behaarte Gesicht, die Gestalt der Areola, die rote Hinterleibsmittle und den nicht vorstehenden Bohrer und man wird zugeben müssen, dass die Art mindestens eben so nahe *Olesicampe* als *Angitia* steht.

„Kopf nach hinten etwas verschmälert; Gesicht quer, mit parallelen Seiten und silberweisser Behaarung; Clypeus nicht vom Gesicht getrennt; Zähne der Mandibeln von gleicher Länge; Fühler des ♂ fast von Körperlänge, beim ♀ weit kürzer. Thorax länger als breit, Metathorax gestreckt, Area superomedia länger als breit, Seitenfelder von einander getrennt, zuweilen aber auch verschmolzen. Thomson sagt, dass die Costula fehle. Areola im Vorderflügel sitzend oder fast sitzend; rücklaufender Nerv in oder dicht hinter der Mitte mündend. Beine schlank. Postpetiolus länger als breit, doppelt so breit als der Petiolus; das 2. Segment etwa  $\frac{1}{3}$  länger als breit, beim ♂ noch länger; das 3. Segment etwa so lang als breit; Bohrer so lang wie ein Drittel des 1. Segmentes. — Schwarz; Basalhälfte der Fühler und Unterseite des Schaftes rötlichgelb; Mund, Mandibeln und Schulterbeulen gelb. Stigma im Vorderflügel bräunlichgelb. Beine rötlich; Vorder- und Mittelhüften, sowie Trochanteren gelb; die hintersten Hüften schwarz. Endrand von Segment 2, Segment 3 und 4 fast ganz, und Endrand der folgenden Segmente rötlich.

Var. ♂. Fühler dunkler. Endrand von Segment 2—4 rot.

L. 4—5 mm.

Die Art wurde in England entdeckt; sie wurde aus *Elachista cerussella* gezogen. — Nach Thomson kommt sie

auch in Schweden vor, wenn die betreffenden Stücke hierher gehören. Nach Thomson ist das Gesicht beim ♀ sehr stark verschmälert, die Schenkel sind zuweilen gebräunt, die hintersten Schienen sind trüb gelb, am Ende braun.

### 43. Gen. *Anilastus* Först.

1868 *Anilastus* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 157.

1887 *Anilasta* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1170.

Körper mittelgross, nicht schlank, sondern mehr oder weniger kräftig. Kopf von vorn gesehen annähernd dreieckig, in der Regel deutlich nach hinten verengt; Gesicht selten mit dichter weisser Behaarung; Wangen ziemlich lang, nicht aufgetrieben; Augen innen ausgerandet; Fühler meist lang und ziemlich dick; Schaft selten unten hell gezeichnet; Clypeus convex, vorn abgerundet, mit sehr kleinen Seitengruben; Mandibeln mit gleichen Endzähnen. Thorax kräftig, höher als breit; Metathorax meist deutlich gefeldert; Area superomedia gewöhnlich breiter als lang. Stigma im Vorderflügel schmal, Areola vorhanden, meist klein und schräg; der untere Aussenswinkel der Discoidalzelle spitz; Basalnerv in der Regel nicht steil, sondern mehr oder weniger schräg; nur bei wenigen Arten steil aufsteigend, wie bei der Gattung *Angitia*; Nervus parallelus aus der Mitte der Brachialzelle; Nervellus fast vertikal, nicht gebrochen. Beine ziemlich schlank, Schienen nicht selten aussen fein gedörnelt, Klauenglied und Klauen nicht sehr kräftig, letztere mehr oder weniger deutlich gekämmt. Hinterleib nicht selten in der Mitte rot gezeichnet, von der Seite zusammengedrückt, das 1. Segment mit deutlichen Seitengruben, Postpetiolus deutlich breiter als der Petiolus, annähernd quadratisch, mit geraden Seiten; das 2. Segment nicht quer, nicht oder nur wenig länger als das 3. Segment; Bohrer nur wenig vorstehend, die Klappen gegen das Ende verbreitert. — Die früher zu *Anilastus* gerechneten Arten mit fehlender Areola bilden die Gattung *Eriborus* Först.

Von *Angitia* unterscheidet sich *Anilastus* hauptsächlich durch den grösseren und kräftigeren Körper, die Form des Kopfes, die ausgerandeten Augen, den mehr schräg gestellten Basalnerv, das Längenverhältnis von Segment 2 und 3 und den kurzen nach hinten verbreiterten Bohrer.

#### Uebersicht der Arten:

1. Kopf und Thorax schwarz, höchstens Wangen oder Clypeus mit heller Zeichnung. 2.

Augenränder wenigstens an der Stirn oder am Scheitel hell gezeichnet, ausserdem die Schulterbeulen, zuweilen

auch der Clypeus oder Thorax weiss gezeichnet. Hinterleibsmittle rot gefärbt. 39.

2. Fühler kurz und dick, den Thorax wenig überragend; Schaft auf der Unterseite meist schwarz. Scheitel nach hinten selten verengt, Areola klein, gestielt. Schenkel rot. Bauchfalte schwarz oder rotbraun. 3.

Fühlergeissel lang. Scheitel nach hinten stark verengt. 9.

3. Hinterleibsmittle rot oder kastanienbraun. 4.

Hinterleib schwarz, höchstens das 3. Segment mit brauner Seitenmakel. Bohrer kürzer als der Postpetiolus. 7.

4. Bohrer kaum vorragend. Schenkel und Schienen einfarbig rot, höchstens beim ♂ die hintersten Schienen am Ende etwas verdunkelt. Schaft meist unten hell. 5.

Bohrer mindestens so lang als der Postpetiolus. Die hintersten Schienen meist nahe der Basis und am Ende verdunkelt. Schaft unten nicht hell. 6.

5. Stigma im Vorderflügel dunkel. Metathorax am Ende fast abgestutzt, mit undeutlichen Leisten. Körper kurz und gedrungen. Postpetiolus sehr breit. 7—8 mm.

1. **horticola** Grav.

Stigma im Vorderflügel hell. Areola im Vorderflügel unregelmässig; rücklaufender Nerv fast interstitial. Hinterleibsmittle braunrot. 7—8 mm.

2. **sicarius** Grav.

6. Bohrer fast so lang wie das 1. Segment. Fühler und Beine kurz. Kopf nach hinten kaum verschmälert. Das 2. Segment wie alle übrigen quer. 7—8 mm.

3. **rapax** Grav.

Bohrer kaum so lang als der Postpetiolus. Kopf nach hinten deutlich verschmälert. Das 2. Segment eher etwas länger als breit. Die hintersten Schienen an der Basis weiss. 6—7 mm.

4. **notatus** Grav.

7. Schienen gelblich, die hintersten am Ende breit schwärzlich, an der Basis kaum verdunkelt. Leisten des Metathorax undeutlich. Das 3. Segment zuweilen mit brauner Seitenmakel. Bohrer kürzer als der Postpetiolus. 7—8 mm.

5. **tenuicosta** Thoms.

Schenkel und Schienen einfarbig rötlich. 8.

8. Bohrer wenig kürzer als der Postpetiolus. Rücklaufender Nerv kurz hinter der Mitte. Hinterleib ziemlich dicht behaart. Trochanteren schwarz. 6—7 mm.

6. **ebeninus** Grav.

Bohrer kaum vorragend. Rücklaufender Nerv fast interstitial. Die vorderen Trochanteren rot. 6 mm.

7. **carbonarius** Ratzeb.

9. Hinterleib mehr oder weniger ausgedehnt rot gefärbt. 10. Hinterleib ganz schwarz. Bohrer nicht oder kaum vorragend. Gesicht meist dicht weisslich behaart. 22.

10. Bauchfalte weisslich oder gelblich. Schaft unten blassgelb. Thorax weisslich behaart. Der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle sehr spitz. Kleine Arten. 11.

Bauchfalte schwärzlich oder braun. Schaft meist ganz schwarz. 12.

11. Bohrer und Trochanteren weisslich, die hintersten Hüften bis über die Mitte schwarz. Metathoraxleisten verwischt. 6 mm.

20. **tricinctus** Holmgr.

Hüften schwarz. Metathoraxleisten deutlich, nur die Costula verwischt. 6 mm.

21. **discedens** n. sp.

12. Augen sehr tief ausgerandet. Hinterleib und Beine rot, beide nur an der Basis schwarz. Das 2. Segment lang. 8 mm.

39. **orbator** Grav.

Augen weniger tief ausgerandet. Hinterleib nur in der Mitte rot gezeichnet. 13.

13. Tegulä weiss oder gelblich. Speculum meist glänzend. 14. Tegulä schwarz. Speculum matt. 21.

14. Beine gelblich rot, Hüften schwarz, Trochanteren gelblich. Hinterrand von Segment 1 und 2, 3 ganz, 4 an der Basis braunrot. Area superomedia hinten geschlossen. 5 mm.

8. **alienus** Brischke.

(Nur das ♂ bekannt.)

Beine mit anderer Zeichnung; die hintersten Schienen wenigstens am Ende schwärzlich. 15.

15. Auch die Endsegmente ganz oder zum Teil rot. 16.

Nur die mittleren Segmente rot gezeichnet, das 5. höchstens an den Seiten. 17.

16. Hinterleib rot, Segment 1—3 an der Basis schwarz. Fühlerschaft unten und Schulterbeulen gelb. Vorderhüften und Schienen gelb, die hintersten Schienen am Ende braun. Schenkel rot, die vorderen gelbrot. 8 mm.

9. **Försteri** Tschek.

Das 2. Segment am Ende und die folgenden an den Seiten ausgedehnt braunrot. Schienen braunrot, die hintersten an Basis und Spitze schwärzlich. 6—7 mm.

10. **caedator** Grav.

17. Beine rot, Hüften, Trochanteren, Basis und Spitze der hintersten Schienen und die hintersten Tarsen schwarz. Metathoraxleisten schwach, Area superomedia hinten offen. Bohrer wenig vorragend. 18.

Die hintersten Schienen aussen weiss gezeichnet. Die mittleren Segmente nur am Endrande oder an den Seiten rot. 19.

18. Segment 1 und 2 mit rotem Endrand, Segment 3 und 4 ganz, 5 an den Seiten rot. Postpetiolus scharf abgesetzt, indem die Luftlöcher stark vorspringen. Die hintersten Schienen nur an der Basis und äussersten Spitze schwarz. 5 mm.

11. **thuringiacus** n. sp.

Segment 3—5 nur an den Seiten rot. Postpetiolus nicht scharf abgesetzt, weit länger als breit. Die schwarze Zeichnung der hintersten Schienen ausgedehnter und mehr verschwommen. 6—7 mm.

12. **rufovariatus** n. sp.

19. Segment 2 und 3, seltener 1—3—4 mit rotem Endrand. Die hintersten Schienen innen rot, aussen schwarz, in der Mitte breit weiss. Beim ♂ die vorderen Trochanteren gelb. 5—7 mm.

13. **ruficinctus** Grav.

Segment 2 und 3 höchstens an den Seiten rotbraun. 20.

20. Schienen und vordere Trochanteren weiss, die hintersten Schienen doppelt dunkel gezeichnet. Beim ♂ die vorderen Hüften weisslich. 5—6 mm.

14. **albicus** Thoms.

Aehnlich der vorhergehenden Art aber Schaft unten hell; die hintersten Schienen nur am Ende schwarz. Speculum matt. Bohrer so lang wie der Postpetiolus. 5—6 mm.

15. **Barretti** Bridgm.

21. Schenkel und Schienen rot, die hintersten Schienen an Basis und Spitze, sowie die Hintertarsen schwärzlich. Segment 2 am Ende, 3—5 ganz oder grösstenteils rot. Bohrer kaum vorstehend. 6—7 mm.

16. **dolosus** Grav.

Schenkel und Schienen einfarbig rot. Segment 2—4 rot, beim ♂ nur zum Teil. Bohrer fast so lang wie der Postpetiolus. 6—7 mm.

17. **ruficus** Thoms.

22. Tegulä schwarz. Schenkel und Schienen einfarbig rot. Das 2. Segment kaum länger als am Ende breit. Bohrer kaum vorragend. Klauen gekämmt. 8—9 mm.

19. **pectinatus** Thoms.

Tegulä weiss. Kleinere Arten von höchstens 7 mm Länge. 23.

23. Bauchfalte gelblichweiss. 24.

Bauchfalte dunkel. 28.

24. Trochanteren, Schienen und Tarsen grösstenteils weiss; die hintersten Tarsen schwarz, Basis von Glied 1 und 2 weiss. 5 mm.

22. **albicans** Brischke.

Schienen und Tarsen nicht so ausgedehnt weiss gezeichnet. 25.

25. Costula verwischt. Beine rötlichgelb, die hintersten Trochanteren und die Hüften schwarz, Vorderhüften an der Spitze und die vorderen Trochanteren weisslichgelb. 6 mm.

26. **boops** Thoms.

Costula deutlich oder Beine anders gezeichnet. Die hintersten Schienen meist an Basis und Spitze dunkel. 26.

26. Beine rot, Hüften und hintere Trochanteren schwarz, Hintertarsen braun. Area superomedia hinten geschlossen. Schaft unten hell. 6 mm.

23. **clausus** Brischke.

Die hintersten Schenkel schwarz. Die hintersten Schienen doppelt dunkel gezeichnet. 27.

27. Schaft unten gelb. Seitenleisten der Area superomedia ganz undeutlich. Die vorderen Hüften und Trochanteren weisslich. 6 mm.

24. **inquinatus** Holmgr.

Schaft schwarz. Seiten der Area superomedia deutlich. Vorderhüften zum grössten Teil schwärzlich; Vorderschenkel und die Schienen rötlich, Vorderschenkel an der Basis unten mit schwarzer Linie. 6 mm.

25. **varicoxa** Thoms.

28. Hinterbeine grösstenteils schwarz, nur die Schienen in der Mitte breit gelblich. 29.

Alle Schenkel hell gefärbt. 30.

29. Wangen und Clypeus schwarz. Area superomedia breit, Vorderhüften gelblichweiss, die mittelsten an der Basis schwarz. Mittelschenkel unten mit schwarzer Linie. 7—8 mm.

28. **tricolor** Ratzeb.

Wangen und Clypeus gelblichweiss. Metathoraxleisten verwischt; Area superomedia nur angedeutet, schmal. Vorderhüften an der Basis, die übrigen Hüften ganz schwarz. Mittelschenkel ganz rötlich, ohne schwarze Linie. 7—8 mm.

29. **pallidirostris** n. sp.

30. Schaft unten ganz oder zum Teil hell. 31.

Schaft unten nicht hell gezeichnet. 33.

31. Schulterbeulen und Beine mit Hüften rötlichgelb. Hinter-schienen an Basis und Spitze und Hintertarsen schwärzlich. 6—7 mm.

27. **coxator** Thoms.

Schulterbeulen und Hüften schwarz. 32.

32. Die hintersten Schienen kaum dunkel gezeichnet. Area superomedia hinten geschlossen. 6 mm.

cf. 23. **clausus** Brischke.

Die hintersten Schienen rötlich, an der Basis breit weisslich, am Ende gebräunt. Metathorax der Länge nach ausgehöhlt, die Aushöhlung beiderseits von starker Längsleiste begrenzt. Area superomedia hinten offen. 7 mm.

30. **forticostatus** n. sp.

33. Das 2. Segment doppelt so lang als breit. Schienen gelblich, die hintersten an Basis und Spitze schwärzlich. 34.

Das 2. Segment nicht doppelt so lang als breit. 35.

34. Schulterbeulen schwarz. Bohrer kaum vorragend. 7 mm.

18. **longulus** Thoms.

Schulterbeulen weiss. Bohrer von  $\frac{1}{4}$  Hinterleibslänge. 7 mm.

cf. 32. **coxalis** Brischke.

35. Vorderhüften weisslich, die hintersten Hüften schwarz. Die hintersten Schienen weiss, an Basis und Spitze breit schwarz. Bohrer kaum vorragend. 7 mm.

31. **melaleucus** n. sp.

Vorder- und Hinterhüften gleich gefärbt. 36.

36. Hüften rot. Die hintersten Schenkelspitzen, Schienen und Tarsen schwarz, Schienen in der Mitte weiss. Schulterbeulen hell. 7—8 mm.

32. **coxalis** Brischke.

Hüften schwarz. Die hintersten Schienen rötlich, in der Mitte nicht weiss. 37.

37. Die hintersten Schienen an der Basis weiss, am Ende schwärzlich. Area superomedia lang und schmal, hinten offen. Sehr kleine Art. 4—5 mm.

33. **prussicus** Brischke.

Beine rot, Hüften und Basis der Trochanteren schwarz, Hintertarsen braun mit roter Basis. 38.

38. Metathorax deutlich und vollständig gefeldert; Area postero-media stark vertieft und seitlich umleitet. Die hintersten Schienen nur am Ende dunkel. 7 mm.

34. **vulgaris** Tschek.

Metathorax undeutlich gefeldert, Seitenfelder nicht von einander geschieden; Area posteromedia nicht oder wenig vertieft. Die hintersten Schienen an Basis und Spitze verdunkelt. 6 mm.

35. **Brischkei** Bridgm.

39. Die hintersten Tarsen weiss geringelt. 2 Längsbinden des Mesonotums, die beiden Schildchen und die Augenränder gelblichweiss. Metathorax und Brustseiten braunrot gefleckt. Bohrer fast von halber Hinterleibslänge. 7 mm.

36. **picticollis** Thoms.

Die hintersten Tarsen schwärzlich. Thorax nur mit hellen Schulterbeulen. Bohrer kaum vorragend. 40.

40. Segment 2 und 3 gelb gerandet. Gesicht des ♀ weiss. Metathorax fast ohne Leisten. Hinterbeine schwärzlich, Trochantellus und Mitte der Schienen breit weisslich. 7 mm.

37. **facialis** Thoms.

Hinterleibsmitte rot. Gesicht des ♀ nicht weiss. 41.

41. Bauchfalte braun. Beine an der Basis schwarz. Clypeus beiderseits mit weissem Fleck; Augenränder am Scheitel mit gelblichweissem Längsfleck. Beim ♂ das ganze Gesicht weisslichgelb. 7—8 mm.

38. **quadrinotatus** Thoms.

Bauchfalte weisslich. Palpen, Mitte der Mandibeln, Clypeus, Spitze der Wangen und Stirnseiten gelblich. Schaft unten rötlichgelb. Vorderbeine rötlich; Hüften schwarz. Mittelschienen gegen die Basis gelblich; an den hintersten



Beinen die Hüften schwarz, Schenkel rot, Schienen und Tarsen schwärzlich, Schienen unterhalb der Basis mit breitem weisslichen Ring. 6—7 mm.

cf. *Echthronomas ochrostoma* Holmgr.

- 1. Gruppe.** Kopf und Thorax schwarz. Fühler ziemlich kurz und dick, den Thorax wenig überragend; Schaft meist ganz schwarz, Scheitel meist nach hinten nicht oder wenig verengt. Areola klein, gestielt. Schenkel rot. Hinterleib schwarz oder in der Mitte rot. Bauchfalte schwarz oder rotbraun.

- 1. A. horticola** Grav. 1829 *Campoplex horticola* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 567 ♂ | 1887 *Anilasta horticola* Thomson, Opusc. Entom, XI p. 1169 ♀ ♂.

Körper kurz und gedrungen, schwach behaart. Thorax kräftig, Metathorax am Ende fast abgestutzt, mit schwachen Leisten. Areola unregelmässig, kurz gestielt. Schenkel verdickt. Hinterleib nach hinten wenig zusammengedrückt; Postpetiolus sehr breit, etwa 3 mal so breit als der Petiolus; Bohrer nicht vorragend. — Schwarz; Mandibeln in der Mitte und Palpen gelblich. Fühlerschaft unten zuweilen hell gefleckt. Stigma im Vorderflügel bräunlichgelb; Tegulä weisslich. Schenkel und Schienen rötlich, die hintersten Schienen namentlich beim ♂ am Ende verdunkelt. Segment 1 am Ende, 2 und 3 ganz, 4 an der Basis und meist auch an den Seiten rot.

L. 7—8 mm.

Nord- und Mitteleuropa. Die Art scheint selten zu sein; mir ist noch kein Stück vorgekommen, das ich auf dieselbe beziehen könnte.

- 2. A. sicarius** Grav. 1829 *Campoplex sicarius* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 551 ♀ | 1880 *Limneria sicaria* Brischke Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 166 ♀ | 1887 *Anilasta sicaria* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1169 ♀ ♂ | 1858 *Limneria dubitata* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 78 ♀.

Körper fein weisslich behaart. Fühler kaum von halber Körperlänge. Areola im Vorderflügel unregelmässig, kurz gestielt; rücklaufender Nerv fast interstitial. Hinterleib gegen das Ende zusammengedrückt; Bohrer kaum vorragend. — Schwarz; Palpen und Mitte der Mandibeln rötlichgelb; auch die Unterseite des Schaftes rötlich oder gelblich. Stigma im Vorderflügel gelblich; Tegulä weisslich. Schenkel und Schienen rötlich. Segment 1 am Ende, 2—4 und Basis oder Seitenflecken von 5 braunrot.

L. 7—8 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

3. **A. rapax** Grav. 1829 *Campoplex rapax* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 568 ♀♂ | 1829 *Campoplex crassicornis* Gravenhorst l. c. p. 565 (partim) | 1858 *Limneria brevicornis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 66 ♀ | 1887 *Anilasta rapax* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1169 ♀♂.

Körper robust, fein punktiert, wenig glänzend, fein graulichweiss behaart. Kopf nach hinten kaum verengt; Wangen und Schläfen etwas aufgetrieben; Fühler kurz, kaum so lang als der halbe Körper; Gesicht quer. Area superomedia hinten offen; Brustseiten dicht runzlig-punktiert. Areola im Vorderflügel gestielt, den rücklaufenden Nerv etwas hinter der Mitte aufnehmend. Beine kurz und kräftig. Hinterleib etwas länger als Kopf und Thorax zusammen; Postpetiolus fast breiter als lang, doppelt so breit als der Petiolus; das 2. Segment quer; Bohrer nicht oder nur wenig kürzer als das 1. Segment. — Schwarz; Mandibeln braunrot. Stigma im Vorderflügel gelblich; Tegulä weisslich. Schenkel rötlich, Schienen trüb rötlichgelb, die hintersten Schienen nahe der Basis und am Ende meist schwach verdunkelt; Tarsen gegen das Ende verdunkelt. Segment 1 am Ende, 2–4 ganz braunrot, 4 zuweilen mit dunklem Endrand.

L. 7–8 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

4. **A. notatus** Grav. 1829 *Campoplex notatus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 570 ♀♂ (excl. Var. I) | *Limneria notata* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 78 ♀♂ | 1887 *Anilasta notata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1169 ♀♂.

Sehr ähnlich der vorhergehenden Art und hauptsächlich durch den kürzeren Bohrer und den nach hinten mehr verengten Kopf verschieden.

Körper kräftig, wenig glänzend, bräunlichgrau behaart. Kopf quer, nicht aufgetrieben sondern nach hinten deutlich verschmälert. Metathorax fein gerunzelt; Area superomedia hinten offen; Seitenfelder meist deutlich von einander geschieden. Areola im Vorderflügel gestielt; rücklaufender Nerv hinter der Mitte. Hinterleib etwas länger als Kopf und Thorax zusammen, gegen das Ende schwach zusammengedrückt; das 1. Segment nicht länger als die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus convex, an den Seiten ziemlich gerundet; das 2. Segment weniger länger als breit; Bohrer so lang wie der Postpetiolus. — Schwarz; Palpen und meist auch Mitte der Mandibeln rötlich oder gelblich; Gesicht weisslich behaart. Flügel leicht getrübt; Stigma gelblich; Tegulä weisslich. Beine rötlich; Hüften und Trochanteren schwärzlich, die vordersten am Ende

hell; Vorderschienen gelblich; die hintersten Schienen an der äussersten Basis weiss, dahinter und am Ende meist verdunkelt; die hintersten Tarsen braun, der Metatarsus an der Basis weisslichgelb. Segment 2—4 mehr oder weniger ausgedehnt braunrot gefärbt, auch der Endrand des 1. und die Seiten des 5. Segmentes gewöhnlich rot.

L. 6—7 mm.

Die Art ist die häufigste aus dieser Gruppe und findet sich in ganz Nord- und Mitteleuropa; hier in Thüringen tritt sie namentlich im Spätsommer auf.

5. **A. tenuicosta** Thoms. 1887 *Anilasta tenuicosta* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1170 ♀♂.

Von den vorhergehenden Arten durch den schwarzen Hinterleib, von den beiden folgenden Arten dieser Gruppe durch die Färbung der Beine verschieden.

Leisten des Metathorax undeutlich. Bohrer etwas kürzer als der Postpetiolus. — Schwarz, auch die Mandibeln. Schenkel rot, Schienen gelblich, die hintersten am Ende breit schwärzlich, an der Basis kaum verdunkelt. Das 3. Segment zuweilen mit brauner Seitenmakel.

L. 7—8 mm.

Nördliches Schweden und Schweiz.

6. **A. ebeninus** Grav. 1829 *Campoplex ebeninus* Gravenhorst. Ichneum. Eur. III p. 480 ♀♂ (partim) | 1854 *Limneria melanaria* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV p. 37 | 1858 *Campoplex melanarius* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 37 ♀♂ | 1887 *Anilasta ebenina* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1170 ♀♂.

Kopf quer, nach hinten verengt; Stirn flach, fein gerunzelt; Gesicht schwach erhaben, fein und ziemlich dicht behaart. Thorax robust, matt; Metathorax deutlich gefeldert, hinten der Länge nach schwach eingedrückt; Area superomedia in der Regel hinten offen. Areola im Vorderflügel gestielt; rücklaufender Nerv etwas hinter der Mitte derselben mündend. Endsporen der Schienen sehr lang; Klauen gekämmt, Hinterleib ziemlich glänzend, dicht weisslich pubescent, gegen das Ende zusammengedrückt; das 1. Segment kaum länger als die hintersten Hüften, seine Luftlöcher etwas vortretend; das 2. Segment etwas länger als hinten breit, gegen die Basis fein gerunzelt, mit deutlichen Thyridien; das 3. und 4. Segment quadratisch, die folgenden quer; das 7. am Ende ausgeschnitten; Bohrer fast kürzer als der Postpetiolus. — Schwarz; Palpen und Mitte der Mandibeln rötlich. Flügel schwach getrübt,

Stigma und Tegulä bräunlich. Beine rot, Hüften und Basis der Trochanteren schwarz; die Spitze der hintersten Schienen und die Tarsen verdunkelt.

L. 6—7 mm.

Nord- und Mitteleuropa; nicht häufig. — Nach Mocsary bei *Orgyia ericae* Germ.

7. **A. carbonarius** Ratzeb. 1844 *Campoplex carbonarius* Ratzeburg, *Ichneum. d. Forstinsect.* I p. 93 ♀♂ | 1887 *Anilasta carbonaria* Thomson, *Opusc. Entom.* XI p. 1170 ♀.

Die Art ist, wie bereits Ratzeburg erwähnt, der vorhergehenden sehr ähnlich; sie unterscheidet sich besonders durch den kaum vorragenden Bohrer und den fast interstitialen rücklaufenden Nerv. Auf das letztere Merkmal kann wohl kein allzugrosses Gewicht gelegt werden. Die Felderung des Metathorax ist deutlich. — Schwarz; Schenkel und Schienen, sowie die vorderen Trochanteren und alle Trochantellen rötlich.

L. 6 mm.

Nord- und Mitteleuropa. — Die Art wurde aus folgenden Wirten gezogen: *Cidaria pyraliata*, *Boarmia roboraria* und *Amphidasys prodromaria*.

2. **Gruppe.** Kopf und Thorax schwarz, höchstens Wangen oder Clypeus mit heller Zeichnung. Fühler länger als der halbe Körper, mit schlanker Geissel. Scheitel nach hinten deutlich verengt. Stigma im Vorderflügel meist dunkel.

8. **A. alienus** Brischke. 1880 *Limneria aliena* Brischke, *Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F.* IV p. 169 ♂.

„Matt; Kopf hinter den Augen verschmälert. Metathorax gerunzelt, mit 5 Feldern; Area superomedia fünfseitig, geschlossen. Areola kurz gestielt, schief viereckig, den rücklaufenden Nerv vor dem Ende aufnehmend; Radius am Ende etwas gekrümmt; Nervellus nicht gebrochen. Hinterleib glänzend, kurz behaart, das 1. Segment etwas länger als Hüften und Trochanteren, gekrümmt; Postpetiolus wenig breiter als der Petiolus; das 2. Segment so lang wie hinten breit, das 3. quadratisch, die folgenden zusammengedrückt. — Schwarz; Palpen fast weiss; Mandibeln rotgelb; Fühlerschaft unten rötlich. Stigma hellbraun; Tegulä gelb. Beine gelblich rot; Hüften schwarz, die vordersten unten rot; Trochanteren gelblich, die hintersten mit schwarzem Basalfleck; Hinterrand der Segmente 1 und 2, Segment 3 ganz, und Basis von 4 braunrot; Bauchfalte rot.

L. 5 mm. — ♀ nicht bekannt.

Deutschland: Königsberg.

9. **A. Försteri** Tschek. 1871 *Limneria Försteri* Tschek, Verh. zool. boot. Ges. Wien XXI p. 59 ♀.

Kopf kurz, nach hinten verschmälert; Wangen schmal; Gesicht und der am Ende abgerundete Clypeus dicht mit silberglänzenden Haaren bedeckt; Augen leicht ausgerandet; Stirn flach; Fühler länger als der halbe Körper, die 2 ersten Geißelglieder von gleicher Länge. Thorax namentlich an den Seiten silberhaarig; Mesonotum vorn schwach dreilappig, sehr dicht punktiert, glanzlos: Area superomedia mit der posteromedia verschmolzen, letztere nicht eingedrückt; die beiden Seitenfelder durch schwache Leiste getrennt. Endabschnitt des Radius ziemlich gerade; Areola kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv fast in der Mitte aufnehmend; Nervellus nicht gebrochen. Der längere Schiensporn der Hinterbeine etwa so lang wie der halbe Metatarsus; Fussklauen bis zur Mitte gekämmt. Hinterleib von oben gesehen länglich spindelförmig, schmaler als der Thorax; das 1. Segment länger als die Hinterhüften mit den Trochanteren; Postpetiolus um die Hälfte breiter als der Petiolus, länger als breit, mit ziemlich geraden Seiten; das 2. Segment etwas länger als breit, gegen das Ende nur sehr wenig erweitert, fein lederartig; Bohrer kurz vorstehend. — Schwarz; Mund, Fühlerschaft unten, Tegulä, die vordersten Hüften zum Teil, die vorderen Trochanteren, die hintersten am Ende, die Basis der hintersten Tarsen und die Schienen gelblich, die hintersten am Ende dunkel; Vorderschenkel rötlichgelb, die hintersten Schenkel und der Hinterleib rot, Segment 1—3 an der Basis schwarz. Schulterbeulen hell. Stigma im Vorderflügel bräunlichgelb.

L. 7—9 mm.

Insel Rhodus.

10. **A. caedator** Grav. 1829 *Campoplex caedator* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 561 ♀ | 1872 *Limneria caedator* Marshall, Catal. Brit. Hymen. p. 55 | 1876 *Limneria caedator* Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Petersburg XXII p. 393 ♀.

Kopf nach hinten stark verschmälert; Fühler fadenförmig, wenig kürzer als der Körper. Thorax etwas schmaler als der Kopf; Metathorax gerunzelt, ziemlich deutlich gefeldert; Area superomedia fast hexagonal, so lang als breit; Area posteromedia flach. Areola im Vorderflügel kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv fast in der Mitte aufnehmend. Hinterleib etwas länger als Kopf und Thorax zusammen; das 1. Segment gekrümmt, so lang als die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus etwas aufgetrieben; das 2. Segment etwas länger als breit, das 3. quadratisch; Bohrer sehr kurz. — Wenig glänzend, graulich behaart,

schwarz; Palpen, Mitte der Mandibeln, Tegulä, vordere Trochanteren und Spitze der hintersten gelblich. Flügel schwach getrübt, Stigma bräunlichgelb. Beine rot, die hintersten Hüften, Basis der hintersten Trochanteren und Basis und Spitze der hintersten Schienen und die hintersten Tarsen schwärzlich; auch die Mittelschienen an Basis und Spitze gebräunt; Vorderhüften an der Basis schwärzlich oder braun. Das 2. Segment am Ende, das 3. fast ganz, das 4. an den Seiten und zuweilen auch an der Basis, die folgenden an den Seiten braunrot.

L. 6—7 mm.

Mitteleuropa. — Hier in Thüringen in einzelnen Jahren häufig, dann wieder längere Zeit fehlend.

11. **A. thuringiacus** n. sp.

Kopf quer und kurz, nach hinten stark verschmälert; Fühler wenig kürzer als der Körper. Thorax gedrungen; Metathorax fein runzlig, ziemlich deutlich gefeldert; Area superomedia so lang wie breit, hinten offen; Area postero-media flach, Mesopleuren mit schwach glänzendem Speculum. Radius am Ende gerade; Areola gestielt, ziemlich regelmässig, den rücklaufenden Nerv kurz hinter der Mitte aufnehmend; Basalnerv ziemlich steil aufsteigend. Beine schlank, Schienen mit sehr langen Endsporen. Hinterleib etwas länger als Kopf und Thorax zusammen; das 1. Segment länger als die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus etwas länger als breit, scharf abgesetzt, indem die Luftlöcher stark vorspringen; das 2. Segment  $\frac{1}{4}$  länger als hinten breit, das 3. quadratisch, das 4. wenig kürzer als breit; Bohrer wenig vorstehend. — Matt, fein graulich pubescent, schwarz; Palpen und Mandibeln gelblich; Tegulä weisslich; Stigma bräunlich. Beine rot, Hüften und Trochanteren schwarz, Trochantellen gelblich; die hintersten Schienen hinter der Basis und an der äussersten Spitze, sowie die hintersten Tarsen schwärzlich. Segment 1 mit schmalen, 2 mit breitem roten Endrand, 3 und 4 ganz, 5 an den Seiten rot, Endsegment am Endrand rötlich durchschimmernd; Bauchfalte rotbraun.

L. 5 mm. — ♂ nicht bekannt.

Ein ♀ von Blankenburg in Thüringen.

12. **A. rufovariatus** n. sp.

Aehnlich der vorhergehenden Art aber grösser, Areola von anderer Form, das 2. und 3. Segment länger und Hinterleib und Hinterschienen anders gezeichnet.

Kopf quer, nach hinten stark verschmälert; Fühler wenig kürzer als der Körper; Gesicht wenig behaart. Metathorax

runzlig punktiert; Felderung ziemlich undeutlich, namentlich die Area superomedia hinten und an den Seiten fast ohne Leisten; der abschüssige Raum des Metathorax flach; Brustseiten mit ziemlich glänzendem Speculum. Areola schmal und lang gestielt, den rücklaufenden Nerv fast am Ende aufnehmend. Beine schlank; Schienen mit sehr langen Endsporen. Hinterleib schwach glänzend, fein und dünn behaart, gegen das Ende stark zusammengedrückt; Postpetiolus schwach abgesetzt, ohne vorspringende Luftlöcher, deutlich länger als breit und kaum doppelt so breit als der Petiolus; das 2. Segment reichlich um die Hälfte länger als hinten breit, das 3. etwas länger als breit, das 4. quadratisch; Bohrer nach hinten stark verbreitert, etwa so lang als der Postpetiolus. — Matt, fein graulich pubescent, schwarz; Palpen und Mandibeln gelblich. Flügel schwach getrübt, Stigma gelblich; Tegulä weisslich, an der Basis braun. Beine rötlich, Hüften und Basis der hintersten Trochanteren schwarz, die vorderen Trochanteren, zum Teil auch die Vorderschienen gelblich, die hintersten Schienen an der Basis und am Ende breit verschwommen dunkelbraun, auch die hintersten Tarsen braun. Segment 3—5 an den Seiten breit rot, bei Segment 4 und 5 ist die rote Zeichnung so ausgedehnt, dass nur auf dem Rücken an der Basis eine grosse Makel dunkel erscheint.

L. 6—7 mm. — ♂ nicht bekannt.

Zwei gleich gezeichnete ♀♀ aus der Umgebung von Blankenburg in Thüringen.

13. **A. ruficinctus** Grav. 1829 *Campoplex ruficinctus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 580 ♀♂ | 1858 *Limneria ruficincta* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 79 ♀♂ | 1887 *Anilasta rufocincta* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1170 ♀♂ | 1829 *Campoplex notatus* var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Eur. II p. 572 ♂ | 1844 *Campoplex rapax* Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II p. 97 ♀♂ [non Gravenhorst].

Ausgezeichnet durch die charakteristische Färbung der hintersten Schienen und des Hinterleibs.

Kopf klein, kurz, nach hinten stark verschmälert; Augen innen deutlich ausgerandet; Fühler von  $\frac{3}{4}$  Körperlänge; Gesicht ziemlich dicht gelblichweiss behaart; Wangen lang. Thorax oben matt, an den Seiten schwach glänzend, mit poliertem Speculum; Metathorax gerunzelt, Area superomedia hinten meist offen; Costula undeutlich, die übrigen Leisten kräftig. Endabschnitt des Radius lang und gerade; Areola gestielt, den rücklaufenden Nerv etwas hinter der Mitte aufnehmend. Beine schlank; Schiensporen lang. Hinterleib ziemlich glänzend, schwach behaart, nach hinten deutlich zusammengedrückt; Postpetiolus fast 3 mal so

breit als der Petiolus, mit ziemlich geraden Seiten; das 2. Segment um die Hälfte länger als hinten breit, das 3. nur wenig länger als breit, das 4. quadratisch; Bohrer kurz vorstehend. — Schwarz; Fühler unten bräunlich; Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich. Stigma im Vorderflügel bräunlichgelb; Tegulä weisslich. Hüften und Basis der Trochanteren schwarz; Schenkel und Vorderschienen rötlich; die hintersten Schienen unterhalb der Basis und an der Spitze auf der Hinterseite breit schwärzlich, an der Basis und in der Mitte breit weisslich, auf der Unterseite namentlich gegen das Ende rötlich; die hintersten Tarsen schwärzlich, Basis des Metatarsus und die Schiensporen weisslich. Beim ♂ die vorderen Trochanteren gelblich. Segment 2 und 3 hinten und an den Seiten breit rot gefärbt, zuweilen auch Segment 1 und 4 mit rotem Endrand; Bauchfalte braunrot.

Var. Hinterleib schwarz, nur das 2. und 3. Segment hinten und an den Seiten schmal rot gezeichnet.

L. 5—7 mm.

Die häufigste Art und über fast ganz Europa verbreitet; sie wurde aus folgenden Lepidopteren gezogen: *Earias clorana*, *Dianthoecia echii*, *D. porphyrea*, *D. cucubali*, *Cucullia tanacetii*, *Ellopia fasciaria*, *Hecatera serena*, *Anarta myrtili*.

14. **A. albicus** Thoms. 1887 *Anilasta albicus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1171 ♀♂.

„Schwarz, Beine mit rötlicher und weisser Zeichnung. — Der vorhergehenden Art sehr ähnlich aber Hinterleib weniger von der Seite zusammengedrückt, Segment 2 und 3 kürzer, kaum etwas verschwommen rötlich gezeichnet; alle Trochantellen, die vorderen Trochanteren und die Schienen weiss, die hintersten Schienen doppelt schwärzlich gezeichnet; beim ♂ die vorderen Hüften fast ganz hell.

L. 5—6 mm.

Von Dr. Kriechbaumer in München aus *Thecla betulae* gezogen.“

15. **A. Barretti** Bridgm. 1881 *Limneria Barretti* Bridgman, Trans. Ent. Soc. London p. 158 ♀; T. 8 F. 14 | 1887 *Anilasta Barretti* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1171 ♀♂.

Die Art schliesst sich eng an die beiden vorhergehenden an, in der Färbung der Schienen hat sie viel Ähnlichkeit mit *A. albicus*; von beiden unterscheidet sie sich namentlich durch das matte Speculum; auch die helle Unterseite des Fühlerschaftes ist ein gutes Kennzeichen.



Kopf nach hinten stark verschmälert; Fühler schlank, länger als der halbe Körper. Speculum matt. Hinterleib schwach glänzend, fein und dünn behaart; das 7. Segment beim ♀ eingeschnitten; Bohrer so lang wie der Postpetiolus. — Schwarz; Fühlerschaft unten hell. Stigma im Vorderflügel bräunlichgelb; Tegulä weisslich. Hüften und hintere Trochanteren schwarz; Schenkel rötlich; Trochantellen, vordere Trochanteren und Schienen weisslich, letztere am Ende schwarz. Segment 2 und 3 an den Seiten braunrot.

L. 5—6 mm.

England und Schweden. Wurde von Bridgman aus *Oxyptilus teucris* gezogen.

16. **A. dolosus** Gray. 1829 *Campoplex dolosus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 573 ♀♂ | 1858 *Limneria dolosa* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 79 ♀♂ | 1887 *Anilasta dolosa* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1172 ♀♂.

Diese und die folgende Art unterscheiden sich von den rot gezeichneten *Anilastus*-Arten in erster Linie durch die wenigstens beim ♀ schwarzen Flügeldecken.

Kopf quer und kurz, nach hinten stark verschmälert; Fühler schlank, etwas länger als der halbe Körper; Augen innen deutlich ausgerandet. Thorax schmaler als der Kopf, länger als hoch, matt, fein pubescent, namentlich an den Seiten; Metathorax ziemlich undeutlich gefeldert, Seitenfelder mit einander meist verschmolzen; Area superomedia hinten offen. Radius am Ende ziemlich gerade; Areola klein, gestielt, den rücklaufenden Nerv fast in der Mitte aufnehmend. Beine schlank; Schiensporen lang. Hinterleib schmal, länger als Kopf und Thorax zusammen; das 1. Segment wenig gekrümmt; Postpetiolus länger als breit, mit ziemlich geraden Seiten; das 2. Segment etwa um  $\frac{1}{3}$  länger als breit, mit deutlichen Gastrocölen; das 3. quadratisch; Bohrer kaum vorstehend. — Schwarz, dicht graulich pubescent; Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich; Flügel leicht getrübt; Stigma bräunlich; Tegulä schwärzlich. Vorderbeine gelbrot, Hüften und Basis der Trochanteren schwarz; an den hintersten Beinen, Hüften und Trochanteren schwarz, Schenkel rot, Schienen rötlich, an der äussersten Basis und am Ende schwärzlich, Tarsen gegen das Ende braun. Das 2. Segment am Ende, das 3. bis 5. ganz oder zum grössten Teil rot, das 6. zuweilen an den Seiten rot.

L. 6- 7 mm.

Nord- und Mitteleuropa; nicht häufig.

17. **A. ruficrus** Thoms. 1887 *Anilasta ruficrus* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1172 ♀♂.

Wie die vorhergehende unterscheidet sich auch die vorliegende Art von den übrigen am Hinterleib rot gezeichneten durch die schwärzlichen Flügeldecken. Von der vorhergehenden Art weicht sie hauptsächlich ab durch die einfarbig roten Schienen. — Metathorax mit feiner Skulptur und schwacher Felderung. Radius am Ende gekrümmt; Areola ziemlich regelmässig. Das 2. Segment um die Hälfte länger als an der Basis breit, mit deutlichen Thyridien; Bohrer etwas kürzer als der Postpetiolus. — Schwarz; Palpen und Mitte der Mandibeln weisslichgelb. Stigma im Vorderflügel braun; Tegulä schwärzlich. Schenkel und Schienen rot. Segment 2—4 beim ♀ fast ganz, beim ♂ nur zum Teil rot.

L. 6—7 mm.

Nord- und Mitteleuropa.

18. **A. longulus** Thoms. 1887 *Anilasta longula* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1171 ♀.

Die Art ist ausgezeichnet durch das lange zweite Segment, welches doppelt so lang als breit ist.

Kopf kurz und quer, nach hinten deutlich verschmälert; Augen innen deutlich ausgerandet; Fühler dünn, von  $\frac{3}{4}$  Körperlänge. Metathorax schwach gefeldert; Area supero-media hinten offen; Brustseiten mit glänzendem Speculum. Areola im Vorderflügel gestielt, schmal, den rücklaufenden Nerv ziemlich weit hinter der Mitte aufnehmend; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle sehr spitz. Schenkel ziemlich verdickt. Hinterleib schmal, stets von der Seite zusammengedrückt, schwach glänzend, fein graulich pubescent; das 2. Segment doppelt so lang als hinten breit; Bohrer nur wenig vorstehend. — Schwarz; Palpen, Mandibeln in der Mitte und Tegulä weisslich. Stigma im Vorderflügel gelblich. Schenkel rot; Trochantellen, vordere Trochanteren und Schienen gelblich, die hintersten Schienen an der Basis schmal, am Ende ziemlich breit schwärzlich. Hinterleib schwarz; Bauchfalte braun.

L. 7 mm.

Nord- und Mitteleuropa; in Thüringen von mir mehrfach gefangen.

19. **A. pectinatus** Thoms. 1887 *Anilasta pectinata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1171 ♀.

Eine der grössten Anilastus-Arten. Kopf und Thorax wie bei der vorhergehenden Art; Mesopleuren runzelig-

punktiert. Fussklauen deutlich gekämmt. Hinterleib gedrungener als bei *A. longulus*, das 2. Segment kaum länger als hinten breit; Bohrer nur ganz wenig vorstehend. — Schwarz; Palpen und Mandibeln rotbraun. Stigma braun, Tegulä schwarz. Schenkel und Schienen rot. Bauchfalte rotbraun.

L. 8—9 mm.

Von Thomson in Schweden aufgefunden; von mir in verschiedenen Exemplaren auch in Thüringen gefunden.

20. **A. tricinctus** Holmgr. 1858 *Limneria tricincta* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 80 ♀ | 1887 *Anilasta leucomera* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1172 ♀ | ? 1829 *Campoplex tricinctus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 530 ♂.

Von den Arten der zweiten Gruppe ausgezeichnet durch die helle Bauchfalte und darin mit *A. discedens* übereinstimmend. Beide unterscheiden sich von einander durch die Färbung der Hüften und die Felderung des Metathorax.

Kopf nach hinten deutlich verschmälert; Gesicht quadratisch, behaart; Fühler dünn, länger als der halbe Körper, fein behaart; Augen innen leicht ausgerandet. Thorax namentlich an den Seiten behaart; Metathorax fein runzlig, mit undeutlicher Felderung; Area superomedia hinten breit offen. Radius am Ende ziemlich gerade; Areola sehr kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv kurz hinter der Mitte aufnehmend; der untere Aussenwinkel der Diskoidalzelle sehr spitz. Beine schlank, die hintersten im Verhältnis lang. Hinterleib gegen das Ende von der Seite zusammengedrückt; das 1. Segment kräftig, fast etwas kürzer als die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus etwa so lang als breit; das 2. Segment länger als breit, mit sehr deutlichen Thyridien; das 3. quadratisch; Bohrer nur wenig vorstehend. — Schwarz; Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich. Fühler braun, gegen das Ende unten rötlich; Schaft und Pedicellus unten gelblich. Flügel leicht getrübt, Stigma braun; Tegulä weisslich. Vorderbeine rötlich, Hüften und Trochanteren weisslich; an den hintersten Beinen Hüften und Trochanteren schwärzlich, am Ende gelblichweiss; Schenkel rot, mit dunkler Spitze; Schienen weisslich, an der Basis und an der Spitze schwärzlich; Tarsen braun, die 3 ersten Glieder an der Basis weisslich. Endrand von Segment 1, Endhälfte oder Enddrittel von 2 und Segment 3 rot, letzteres mit schwarzer Rückenmakel; Bauchfalte weisslich.

L. 6 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

Welches Tier Gravenhorst unter *Campoplex tricinatus* beschrieben hat, ist nicht ganz klar. Thomson (Opusc. Entom. XI p. 1172) hält ihn für eine *Olesicampe*. Die Beschreibung passt aber auch ganz gut auf die vorliegende Art. Läge eine Notiz über die Kopfbildung vor, so wäre jeder Zweifel gehoben. Holmgren's *Limneria tricineta* ist ohne Zweifel ein *Anilastus* und ich ziehe deshalb diese Bezeichnung der Thomson'schen vor.

21. **A. discedens** n. sp.

Körper graulich pubescent, matt, nur der Hinterleib gegen das Ende schwach glänzend. Kopf nach hinten deutlich verengt; Fühler länger als der halbe Körper, dünn; Augen innen schwach ausgerandet; Gesicht weisslich behaart. Metathoraxleisten fein aber deutlich, nur die *Costula* verwischt; *Area superomedia* hinten offen; Brustseiten mit schwach glänzendem *Speculum*. Basalnerv ziemlich steil; Endabschnitt des *Radius* lang, ziemlich gerade; *Areola* schräg, lang gestielt, den rücklaufenden Nerv ziemlich weit hinter der Mitte aufnehmend; *Nervulus* fast interstitial. Beine schlank, die hintersten im Verhältnis weit stärker und länger. Hinterleib gegen das Ende breit zusammengedrückt, wenig länger als Kopf und Thorax zusammen; das 1. Segment ziemlich kräftig, *Postpetiolus* so lang wie breit, mit schwach vorspringenden Luftlöchern; das 2. Segment fast um die Hälfte länger als hinten breit, das 3. etwas länger als breit, das 4. quadratisch; Bohrer kurz vorragend. — Schwarz; Fühler dunkelbraun, gegen das Ende rötlich; Schaft unten weisslich; Palpen und Mandibeln gelblichweiss. Flügel kaum getrübt, *Stigma* gelblich; *Tegulä* weisslich. Beine rötlich, Vorderbeine zum Teil gelblich; Hüften und Basis der hintersten *Trochanteren* schwarz; Spitze der vordersten Hüften und die vorderen *Trochanteren* gelblichweiss. Spitze der hintersten Schenkel schmal schwärzlich; die hintersten Schienen an der äussersten Basis weisslich, dahinter und am Ende dunkelbraun; die hintersten Tarsen braun, der *Metatarsus* an der Basis breit, die folgenden Glieder nur schmal weisslich. Das 1. Segment mit schmalem roten Endrand; das 2. Segment am Endrande und an den Seiten hinten rot, das 3. Segment rot, an der Basalhälfte oben schwarz; die folgenden Segmente rot, oben schwärzlich, die Endränder rötlichweiss; Bauchfalte weisslichgelb,

L. 6 mm.

Ich fing ein Exemplar Mitte August an heissen Sandwänden bei dem Dorfe Schwarza in der Nähe von Blankenburg in Thüringen.

22. **A. albicans** Brischke. 1880 *Limneria albicans* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 158 ♀.

Matt; Kopf kurz, nach hinten etwas verschmälert. Thorax bucklig, wenig länger als breit; Metathorax ziemlich kurz, mit 3 Feldern; Area superomedia fünfseitig, hinten offen; Area posteromedia gerunzelt. Areola im Vorderflügel gestielt, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend; Radius am Ende gerade. Hinterleib etwas schmaler als der Thorax, hinten etwas zusammengedrückt; Postpetiolus quadratisch; Segment 2 länger als breit, 3 quer; Bohrer kaum vorragend. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Flügelwurzel und Tegulä gelblichweiss; Stigma dunkelbraun. Beine rot; Hüften schwarz; Trochanteren weiss, die hintersten mit schwarzer Basis; Schienen weiss, die mittleren an der Spitze und hinter der Basis rot; Hinterschienen hinter der Basis und an der Spitze schwärzlich; die vordersten Tarsen weiss, Hintertarsen schwärzlich, Basis von Glied 1 und 2 weiss.

L. 5 mm. — ♂ nicht bekannt.

Aus der Umgebung von Danzig.

23. **A. clausus** Brischke. 1880 *Limneria clausa* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 154 ♀.

Matt, fein und kurzhaarig; Gesicht mit längerer Behaarung; Kopf hinter den Augen verschmälert; Augen innen ausgerandet; Fühler länger als der halbe Körper. Thorax länger als hoch; Metathorax gerundet, mit 5 Feldern; Area superomedia fünfseitig, quer, hinten geschlossen; Area posteromedia breit. Areola gestielt, bei einem ♀ im rechten Flügel fehlend; rücklaufender Nerv hinter der Mitte mündend; Radius am Ende gerade. Das 1. Segment so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus hinter den vorragenden Luftlöchern mit parallelen Seiten; das 2. Segment etwas länger als breit, das 3. quadratisch; Bohrer kaum vorragend. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, ein Fleck auf der Unterseite des Fühlerschaftes, Flügelwurzel und Tegulä gelblich. Stigma im Vorderflügel braun. Beine rot, Hüften und die hintersten Trochanteren schwarz; vordere Trochanteren gelb; Schiendornen weiss; Hintertarsen braun. — Cocon cylindrisch, runzlig, weiss mit schwarzen Flecken an den Enden.

L. 6 mm. — ♂ nicht bekannt.

Aus der Umgebung von Danzig.

24. **A. inquinatus** Holmgr. 1858 *Limneria inquinata* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 75 ♀ | ? 1880 *Limneria inquinata* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 164 ♂ | 1887 *Anilasta inquinata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1173 ♀.

Matt; Kopf quer, nach hinten stark verschmälert, von vorn gesehen dreieckig erscheinend; Gesicht dicht weisslich behaart; Fühler dünn, länger als der halbe Körper; Augen innen ausgerandet; Mandibeln klein. Thorax etwas schmaler als der Kopf; Metathorax mit feinen Leisten; Costula ziemlich undeutlich; Seitenfelder der Area superomedia fast verwischt; Brustseiten mit glänzendem Speculum. Radius mit langem Endabschnitt; Areola schief, gestielt. Die hintersten Beine im Verhältnis lang, mit verdickten Schenkeln. Hinterleib weisslich pubescent, nach hinten deutlich zusammengedrückt; das 1. Segment wenig gekrümmt, etwas kürzer als die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus convex, länger als breit; das 2. Segment länger als breit, mit deutlichen Thyridien; das 3. quadratisch; Bohrer nur ganz wenig vorstehend. — Schwarz; Palpen und Mandibeln gelblich. Fühler schwarzbraun, Schaft unten weisslich. Flügel hyalin; Stigma gelblich; Tegulä gelblichweiss. Vorderbeine rötlichgelb, Hüften und Trochanteren weisslich; die hintersten Hüften schwarz, am Ende meist wie die Trochanteren gelblich; Schenkel schwärzlich, zuweilen zum Teil rötlich; Schienen rötlich, an der Basis und am Ende schwärzlich; Tarsen braun, an der Basis hell. Das 2. Segment mit rötlichem Einschnitt. Bauchfalte weisslich.

Brischke beschreibt an der angeführten Stelle ein ♂, das er selbst mit Fragezeichen zu *A. inquinatus* stellt. Das Stigma ist braun, Hinterschenkel rot, Hinterhüften schwarz, rot gefleckt; Hinterschienen schwarz mit weisser Mitte.

L. 6 mm.

Zerstreut in Nord- und Mitteleuropa; hier in Thüringen selten.

25. **A. varicoxa** Thoms. 1887 *Anilasta varicoxa* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1173 ♀♂.

Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, aber Area superomedia kürzer und mit deutlichen Seitenleisten; Fühlerschaft unten nicht hell; Beine schwärzlich; Vorderschenkel rötlichgelb, unten an der Basis mit schwarzer Linie; Schienen rötlich, an der Basis und Spitze schwärzlich.

L. 6 mm.

Schweden.

26. **A. boops** Thoms. 1887 *Anilasta boops* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1173 ♀.

Kopf nach hinten stark verschmälert; Gesicht weiss behaart; Fühler dünn, länger als der halbe Körper. Metathorax mit undeutlicher Costula; Brustseiten mit glänzendem Speculum. — Schwarz. Tegulä weisslich, Beine rötlichgelb, Hüften und die hintersten Trochanteren schwarz; die vorderen Trochanteren und die Spitzen der Vorderhüften hellgelb. Bauchfalte weisslich.

L. 6 mm. — ♂ unbekannt.

Bei Lille in Frankreich aufgefunden.

Die Art ist von den verwandten ausgezeichnet durch die Färbung der Beine.

27. **A. coxator** Thoms. 1887 *Anilasta coxator* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1173 ♀♂.

Ausgezeichnet durch helle Schulterbeulen und Hüften und die dunkle Bauchfalte.

Kopf wie bei den vorhergehenden Arten nach hinten deutlich verschmälert; Gesicht weisslich behaart. Brustseiten mit glänzendem Speculum. Bohrer etwas kürzer als der Postpetiolus. — Schwarz; Unterseite von Schaft und Pedicellus, Tegulä und Schulterbeulen weisslich. Beine rötlichgelb, die hintersten Trochanteren, die hintersten Schienen an Basis und Spitze und die Tarsen schwärzlich, Bauchfalte dunkel.

L. 6—7 mm.

Von Thomson in Schweden, von Kriechbaumer bei München gefunden.

28. **A. tricolor** Ratzeb. 1844 *Campoplex tricolor* Ratzeburg, Ichneum. d. Forstins. I p. 94 ♂ | 1852 *Campoplex tricolor* Ratzeburg, I. c. III p. 85 | 1880 *Limneria tricolor* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 166 ♀♂ | 1887 *Anilasta tricolor* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1173 ♀♂.

Ausgezeichnet von den Arten dieser Gruppe durch die grösstenteils schwarz gefärbten Hinterbeine und die dunkle Bauchfalte. — Kopf nach hinten stark verschmälert; Fühler dünn, länger als der halbe Körper; Metathorax mit schwachen Leisten, Area superomedia breit. Areola im Vorderflügel klein und schief. — Schwarz; Palpen, Mandibeln und Tegulä weisslich. Vorderbeine gelblich; an den Mittelbeinen die Basis der Hüften und ein Streif auf der Unterseite der Schenkel schwarz; die hintersten Beine schwarz, die breite Mitte der Schienen und die Unterseite der Tarsen gelblichweiss. Bauchfalte dunkel.

L. 7—8 mm.

Nord- und Mitteleuropa. — Brischke zog die Art aus *Abraxas grossulariata*.

29. **A. pallidirostris** n. sp.

Die Art ist leicht kenntlich durch die helle Färbung von Clypeus und Wangen und bildet dadurch einen Uebergang zur nächsten Gruppe. — Körper fein weisslich pubescent; Kopf und Thorax matt; Hinterleib schwach glänzend Kopf quer, nach hinten stark verengt, von vorn gesehen dreieckig; Augen innen deutlich ausgerandet; Fühler lang und dünn. Metathorax fein gerunzelt, der hintere Raum mit Spuren von Querrunzlung; Felderung sehr undeutlich; Area superomedia nur angedeutet, hinten offen; Costula unvollständig; Brustseiten ziemlich glänzend, fein punktiert; Speculum matt. Endabschnitt des Radius doppelt so lang als der Basalabschnitt; Areola gross, schräg, gestielt, den rücklaufenden Nerv fast im Endwinkel aufnehmend; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle sehr spitz. Die hintersten Beine im Verhältnis lang und kräftig. Hinterleib gegen das Ende zusammengedrückt; Postpetiolus etwa so lang als breit, mit gerundeten Seiten, das 2. Segment um die Hälfte, das 3. nur wenig länger als breit, das 4. und 5. quadratisch; Bohrer kaum vorragend. — Schwarz; Schaft und Pedicellus unten verschwommen braunrot; Palpen, Mandibeln, ein grosser Wangenfleck und fast der ganze Clypeus gelblichweiss. Flügel deutlich getrübt; Stigma gelblich; Tegulä und der Hinterrand der Schulterbeulen weisslich. Hüften schwarz, die vordersten weisslich, an der Basis schwarz; Trochanteren gelblich, die hintersten an der Basis schwarz; Vorder- und Mittelschenkel rötlich, die hintersten schwarz; Schienen gelblichweiss, die hintersten mehr weisslich, letztere an Basis und Spitze breit schwarz; die langen Schiensporen weisslich; die hintersten Tarsen gegen das Ende gebräunt. Hinterleibssegmente am Endrand rötlich schimmernd; Bauchfalte braun, mit hellen Einschnitten.

L. 7—8 mm.

Ich besitze ein ♀, das aus der Umgebung von Triest stammt.

30. **A. forticostatus** n. sp.

Ausgezeichnet durch die Bildung des Metathorax und die Färbung der Hinterschienen.

Körper robust, matt, nur der Hinterleib schwach glänzend. Kopf nach hinten verschmälert; Gesicht ziemlich dünn weisslich behaart; Augen innen schwach ausgerandet; Fühler ziemlich kräftig, länger als der halbe Körper. Thorax gedrungen, kaum länger als hoch; Metathorax der Länge



nach ausgehöhlt; die Aushöhlung von starken Leisten beiderseits eingefasst; diese beiden Leisten sind an der Basis einander genähert und parallel, dann bilden sie eine kurze, hinten offene Area superomedia, dann gehen sie noch weiter auseinander, sodass die Area posteromedia viel breiter erscheint. Die Aushöhlung zeigt Spuren von Querrunzung. Brustseiten runzlig-punktiert; Speculum poliert. Endabschnitt des Radius fast doppelt so lang als der Basalabschnitt; Areola klein, schräg, kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv kurz vor dem Endwinkel aufnehmend; Basalnerv steil und ziemlich gerade; Nervulus weit hinter der Gabel; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitz. Beine kräftiger als bei den verwandten Arten. Hinterleib nach hinten stark zusammengedrückt; Postpetiolus fast 3 mal so breit als der Petiolus, an den Seiten leicht gerundet, etwa so lang als breit, an der Basis oben mit Längsfurche, hinter der Mitte schwach eingeschnürt; das 2. Segment wenig länger als das dritte, um  $\frac{1}{4}$  länger als hinten breit; Bohrer kurz vorragend. — Schwarz; Palpen, Mandibeln und Schaft unten am Ende gelblichweiss. Flügel nur leicht getrübt; Stigma braun; Tegulä weisslich. Beine rötlich; Hüften schwarz, die Spitze der vordersten und die Trochanteren gelblichweiss, die hintersten an der Basis schwarz; die hintersten Schenkel am Ende gebräunt; die hintersten Schienen rötlich, an der Basis breit weisslich; die rötliche Färbung wird im Enddrittel dunkelbraun, auch die Oberseite ist etwas gebräunt. Bauchfalte schwärzlich, mit hellen Einschnitten.

L. 7 mm. — ♂ unbekannt.

Ein ♀ von Blankenburg in Thüringen; Mitte Juni um Fichten schwärmend.

### 31. *A. melaleucus* n. sp.

Von den verwandten Arten ausgezeichnet durch die Färbung der Hüften. — Kopf nach hinten deutlich verschmälert; Fühler länger als der halbe Körper. Metathorax mit schwachen Leisten. Hinterleib nach hinten zusammengedrückt; Bohrer kaum vorragend. — Schwarz; Palpen und Mandibeln gelblichweiss; Fühlerschaft unten nicht hell gezeichnet. Flügel schwach getrübt; Stigma bräunlichgelb; Tegulä weisslich. Beine rötlich; Vorderhüften weisslich, die hintersten Hüften schwarz; Vorderschienen gelblich, die hintersten weiss, an Basis und Spitze breit schwarz; Bauchfalte schwärzlich, mit hellen Einschnitten.

L. 7 mm.

Ein ♀ aus der Umgebung von Blankenburg in Thüringen.

32. **A. coxalis** Brischke. 1880 *Limneria coxalis* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 151 ♀♂.

Kopf und Thorax kurz weisshaarig. Kopf nach hinten verschmälert, etwas breiter als der Thorax; Fühler kräftig, nach der Spitze allmählich dünner werdend, Glied 3 und 4 gleich lang; Augen innen sehr wenig ausgerandet. Metathorax gerundet, mit feinen Leisten; Costula vollständig fehlend; Area superomedia halbelliptisch, hinten offen; Brustseiten fein runzlig-punktiert, ziemlich glänzend; Speculum mit stärkerem Glanz. Endabschnitt des Radius gerade, doppelt so lang als der Basalabschnitt; Areola ziemlich klein, schräg, gestielt, den rücklaufenden Nerv nahe am Endwinkel aufnehmend; Basalnerv ziemlich schräg; Nervulus fast interstitial; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle sehr spitz. Hinterbeine kräftig; Hinter-schienen mit feinen Borstenhaaren besetzt. Hinterleib fein weisslich pubescent, schwach glänzend, gegen das Ende etwas von der Seite zusammengedrückt; das 1. Segment kräftig; Postpetiolus mit geraden Seiten, etwas länger als breit, doppelt so breit als der Petiolus; das 2. Segment um die Hälfte länger als hinten breit, nach der Basis ziemlich stark verschmälert; das 3. Segment nur wenig länger als breit, das 4. quadratisch; Bohrer dünn, so lang wie das 1. Segment. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Schulterbeulen, Flügelwurzel und Tegulä gelblichweiss. Stigma braun. Beine rot, die vorderen Hüften, Trochanteren, die Aussen-seite der Schienen und die Tarsen mehr gelblich; die hintersten Schenkel mit brauner Spitze; die hintersten Schienen weiss, an Basis und Spitze breit schwarz; Schien-sporen weisslich; die hintersten Tarsen schwärzlich; Bauch-falte dunkel, mit hellen Einschnitten.

L. 7—8 mm.

Von Brischke bei Danzig entdeckt und zwar aus Tortrix-Raupen gezogen; von mir mehrfach in Thüringen gefunden.

Ich glaubte früher, dass *A. coxalis* Brischke nicht von *A. coxator* Thoms getrennt werden könnte. Ich besitze jetzt beide Arten aus Thüringen und sehe, dass beide Arten scharf geschieden sind. *A. coxator* ist kleiner und zarter und unterscheidet sich schon leicht durch den fast ganz hell gefärbten Schaft; die vorderen Hüften sind mehr gelb, statt rot, die hintersten Schienen unreiner weiss; ferner ist bei *A. coxator* der Bohrer kürzer als der Postpetiolus, während er bei *A. coxalis* so lang wie das 1. Segment ist.

33. **A. prussicus** Brischke. 1880 *Limneria prussica* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 161 ♀.

Matt, kurz und fein pubescent. Kopf nach hinten verschmälert; Fühler länger als der halbe Körper. Thorax länger als hoch; Metathorax mit 3 Feldern, Area superomedia lang und schmal, mit der ziemlich schmalen Area posteromedia verschmolzen. Areola sitzend, schräg, den rücklaufenden Nerv kurz vor der Spitze aufnehmend. Das 1. Segment wenig gekrümmt, so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus etwas länger als breit, mit parallelen Seiten; das 2. Segment etwas länger als breit; Bohrer gekrümmt, kaum vorragend. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Flügelwurzel und Tegulä gelblichweiss. Stigma bräunlichgelb. Beine rotgelb, die vorderen Hüften und Trochanteren gelb, Hinterhüften und die Basis der hinteren Trochanteren schwarz; die hintersten Schienen mit weisslicher Basis und brauner Spitze; die hintersten Tarsen braun mit weisslicher Basis. Hinterrand von Segment 3 und 4 zuweilen rötlich.

L. 4—5 mm.

Von Brischke bei Danzig, von mir in verschiedenen Exemplaren in Thüringen gefunden. — Wurde aus einer *Cimbex*-Larve erzogen.

34. **A. vulgaris** Tschek. 1871 *Limneria vulgaris* Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI p. 61 ♀♂ | 1880 *Limneria vulgaris* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 150 ♀ | 1880 *Limneria carbonaria* Brischke, l. c. p. 161 ♀.

Körper graulich-pubescent. Kopf kurz, hinter den Augen verschmälert und leicht gerundet; Wangen und Schläfen sehr schmal; Clypeus vorn gerundet; Gesicht weisshaarig; Augen innen schwach ausgerandet; Stirne ziemlich flach, wie das Mesonotum dicht lederartig - punktiert, glanzlos; Fühler etwas länger als der halbe Körper, an der Spitze verdünnt, das 1. Geisselglied länger als das zweite. Metathorax gewölbt, kurz, hinten steil abfallend, runzlig; Area superomedia kurz, durch eine schwache Leiste von der Area posteromedia getrennt; diese stark vertieft, seitlich umleistet. Brischke an der angeführten Stelle gibt an, dass die Area superomedia auch hinten breit offen sein kann. Endabschnitt des Radius ziemlich gerade; Areola gestielt, den rücklaufenden Nerv fast in der Mitte aufnehmend. Der längere Sporn der Hinterschienen etwas länger als der halbe Metatarsus, das letzte Fussglied der Hinterbeine etwas länger als das vorletzte, kürzer als das dritte; Fussklauen nicht gekämmt. Hinterleib vom Rücken

gesehen beim ♀ verlängert spindelförmig, beim ♂ mehr linear; das 1. Segment so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus convex, fast doppelt so breit als der Petiolus, länger als breit, an den Seiten schwach gerundet; das 2. Segment länger als breit; Bohrer wenig kürzer als das 1. Segment. — Schwarz; Palpen, Mandibeln und Tegulä weisslichgelb. Beine gelbbrot; Hüften und Basis der hintersten Trochanteren schwarz; die Spitze der hintersten Schienen und die hintersten Tarsen mit Ausnahme der Basis braun.

L. 6—7 mm.

Mittleres Europa; nach Tschek in Oesterreich ziemlich häufig.

35. **A. Brischkei** Bridgm. 1882 *Limneria Brischkei* Bridgman, Trans. Ent. Soc. London p. 153 ♀ | 1883 *Limneria Brischkei* Bignell, Entomologist XVI p. 69.

Kopf und Thorax zerstreut weisslich pubescent. Kopf hinter den Augen verschmälert; Augen kaum ausgerandet; Fühler etwas kürzer als der Körper; das 1. Geisselglied fast 4 mal so lang als breit, länger als das zweite. Thorax länger als hoch; Felderung des Metathorax undeutlich; Area superomedia ungefähr so lang als breit, Seitenfelder nicht geteilt; Seiten des Metathorax stark behaart. Areola kaum gestielt, den rücklaufenden Nerv kurz hinter der Mitte aufnehmend. Hinterleib namentlich an den Seiten mit glänzender weisser Behaarung; das 1. Segment schlank; Postpetiolus etwa doppelt so breit als der Petiolus, länger als breit, mit vortretenden Luftlöchern; das 2. Segment ein Drittel länger als breit; Bohrer kurz, nur ein Drittel so lang als das 1. Segment. — Schwarz. Stigma und Flügelnervatur schwärzlich. Beine rot, Hüften, Trochanteren und die äusserste Basis und Spitze der Hinterschienen schwarz; vordere Trochanteren gelb.

L. 6 mm. — ♂ unbekannt.

England. — Wurde aus *Agrotis triangulum* gezogen.

Die Art ähnelt sehr *A. vulgaris* Tschek (*carbonarius* Brischke); die Unterschiede sind aus der Tabelle ersichtlich.

3. **Gruppe.** Augenränder wenigstens an der Stirn oder am Scheitel hell gezeichnet, ausserdem die Schulterbeulen, zuweilen auch der Clypeus oder Thorax weiss gezeichnet. Augen deutlich ausgerandet. Die hintersten Schienen fein gedörnelt, schwarz, in der Mitte breit weiss, mit langen weissen Endsporen. Hinterleibsmittle rot gezeichnet. Südliche Arten.

36. **A. picticollis** Thoms. 1887 *Anilasta picticollis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1174 ♀.

Die Art ist ausgezeichnet durch die reiche helle Zeichnung von Kopf und Thorax, durch die weiss geringelten Tarsen und den langen Bohrer.

Kopf nach hinten verschmälert; Fühler etwas länger als der halbe Körper. Speculum poliert. Bohrer fast von halber Hinterleibslänge. — Schwarz; Orbiten fast ganz weiss, nur hinten oben unterbrochen; Clypeus mit breiter gelblichweisser Binde; zwei Längsbinden des Mesonotums, Schildchen und Hinterschildchen gelblich; je 2 Flecken beiderseits auf dem Metathorax und ein grösserer Fleck vor dem Speculum braunrot. Beine rötlich, Hüften und die hintersten Trochanteren schwarz, die Trochantellen und vorderen Trochanteren gelblichweiss; die hintersten Schienen schwarz, in der Mitte breit weiss; die hintersten Tarsen schwärzlich, weiss geringelt. Hinterleibsmitte rot.

L. 7 mm. — ♂ nicht bekannt.

Ein ♀ aus dem nördlichen Italien.

37. **A. facialis** Thoms. 1887 *Anilasta facialis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1174 ♀.

Die Art ist ausgezeichnet durch das auch beim ♀ weisse Gesicht, die Färbung der Beine und des Hinterleibs und den ungefelderten Metathorax.

Kopf nach hinten verschmälert; Fühler von Körperlänge. Metathoraxleisten fast fehlend. Bohrer kaum vorragend. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Gesicht und Stirnseiten, sowie Schulterbeulen weisslich. Vorderbeine rötlich, die hintersten schwarz, Trochantellus und die Mitte der Schienen breit gelblich; die hintersten Tarsen schwärzlich. Endrand von Segment 2 und 3 ziemlich breit gelbrot. Bauchfalte hell.

L. 7 mm. — ♂ unbekannt.

Südfrankreich.

38. **A. quadrinotatus** Thoms. 1887 *Anilasta quadrinotata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1174 ♀.

Körper kräftig und gedrunen. Kopf nach hinten deutlich verschmälert; Augen innen ausgerandet; Fühler länger als der halbe Körper. Metathorax mit deutlicher Felderung, die beiden Seitenfelder von einander getrennt; Area supero-media kurz, hinten offen; Brustseiten runzlig - punktiert, ziemlich glänzend. Bohrer kurz vorragend. — Schwarz; Palpen, Mitte der Mandibeln, Schulterbeulen und Tegulä weisslich. Seitenflecken des Clypeus und ein Längsfleck

beiderseits auf dem Scheitel neben den Augen gelblichweiss. Beine rot; Hüften und die hintersten Schienen und Tarsen schwärzlich, die Schienen in der Mitte breit weiss. Hinterleibsmittle rot; Bauchfalte braun. Beim ♂ Gesicht ganz weiss.

L. 7—8 mm.

Thomson beschreibt die Art nach Exemplaren aus Frankreich. Ich habe sie einzeln in Südeuropa, so z. B. mehrfach in Griechenland und Spanien, ebenso in Aegypten und Algerien gefunden.

Man verwechsle *A. quadrinotatus* nicht mit *Echthronomas ochrostoma*, die Unterschiede sind in der Bestimmungstabelle angegeben.

4. **Gruppe.** Augen innen stark ausgerandet. Mandibeln fast winkelig gebogen. Hinterleib lang und schmal, mit Ausnahme der Basis rot gefärbt; Bohrer fast versteckt.

39. **A. orbator** Grav. 1829 *Campoplex orbator* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 558 ♀ | 1887 *Anilasta orbator* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1175 ♀.

Die Art steht durch den auch am Ende rot gefärbten Hinterleib ganz vereinzelt da; auch die tief ausgerandeten Augen und der gestreckte Hinterleib, namentlich das lange 2. Segment sind für die Art charakteristisch.

Kopf und Thorax fein graulich behaart; Fühler deutlich länger als der halbe Körper. Areola im Vorderflügel unregelmässig, dreieckig, kurz gestielt. Hinterleib länger als Kopf und Thorax, schmaler als der Thorax, deutlich zusammengedrückt; Postpetiolus convex, etwas länger als breit, kürzer und doppelt so breit als der Petiolus; das 2. Segment weit länger als breit; Bohrer kaum vorstehend. — Schwarz; Palpen und Mandibeln gelblichweiss. Flügel kaum getrübt, Stigma bräunlichgelb, Tegula gelblichweiss. Beine rot, Hüften und Trochanteren schwarz. Hinterleib rot, Petiolus schwarz; Bauchfalte braunrot.

L. 8 mm. — ♂ unbekannt.

Gravenhorst beschrieb die Art nach einem Exemplar von Genua, Thomson gibt als Fundort Süddeutschland an. Mir ist die Art nie vorgekommen.

\* \* \*

Als fraglich, da nur im männlichen Geschlecht beschrieben, stelle ich zu *Anilastus* die folgende von Brischke beschriebene Art:

**Limneria longicornis** Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 161 ♂.

♂ Matt, kurz weisshaarig, besonders Gesicht und Thorax. Kopf kubisch, an Pyracmon erinnernd; Mandibeln breit, Fühler fast körperlang, mit verdünnter Spitze und abgesetzten Gliedern. Thorax länger als hoch; Metathorax gerundet, runzlig, mit 5 Feldern, Area superomedia sechseitig, breit, hinten offen. Areola kurz gestielt, schief, den rücklaufenden Nerv weit hinter der Mitte aufnehmend; Nervellus nicht gebrochen. Hinterleib oben fast gleichbreit, am Ende etwas zusammengedrückt; das 1. Segment so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren, kräftig; Postpetiolus etwas länger als breit, mit parallelen Seiten und flacher Mittelrinne; das 2. Segment länger als breit. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, ein Fleck auf der Unterseite des Fühlerschaftes, Flügelwurzel und Tegulä weisslichgelb. Stigma braun. Beine rot, Hinterhüften schwarz, Trochanteren gelb, die hintersten mit schwarzer Basis; die hintersten Schienen mit gelber Basis und brauner äusserster Spitze, Basis der Hintertarsen gelb, das letzte Glied aller Tarsen schwarzbraun.

L. 7 mm. — ♀ nicht bekannt.

Von Brischke bei Danzig gefunden. Schmarotzt nach dem Autor wahrscheinlich bei *Sesia formicaeformis*.

#### 44. Gen. **Holocremnus** Först.

1868 *Holocremnus* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 157.

1887 *Holocremna* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1176.

Körper von Mittelgrösse. Kopf nach hinten nicht oder nur wenig verschmälert; Augen innen wenig oder nicht ausgerandet; Fühlerschaft auf der Unterseite meist hell gezeichnet, Geissel lang und dünn; Wangen aufgetrieben und ziemlich lang; Clypeus am Ende breit abgerundet, mit kleinen Seitengruben; Mandibeln kurz und kräftig, mit gleichen Endzähnen. Thorax bucklig, von der Seite wenig zusammengedrückt; Seiten des Prothorax sehr selten gestreift; Metathorax mit kräftigen Leisten; Costula häufig fehlend; Area superomedia in der Regel kurz, mit stets deutlichen Seitenleisten aber hinten meist offen. Endabschnitt des Radius meist gerade, weit länger als der gebogene Basalabschnitt; Stigma schmal, meist dunkel; Areola ziemlich breit, unregelmässig, kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitz; Nervellus nicht gebrochen. Beine ziemlich kräftig; Schienen kaum gedörnelt;

Klauenglied und Klauen ziemlich klein, letztere gekämmt. Hinterleib am Ende an den Seiten und unten meist rötlich gefärbt; Petiolus mit deutlichen Seitengrübchen; Postpetiolus deutlich abgesetzt und viel breiter als der Petiolus, an den Seiten nicht selten punktiert, nicht oder wenig länger als breit; das 2. Segment ungefähr so lang oder nur wenig länger als breit, mit deutlichen Thyridien; das 3. Segment wenig kürzer als das vorhergehende; Bohrer nicht oder nur wenig vorstehend.

Die Arten leben, wie es scheint, ausschliesslich in Blattwespenlarven, namentlich aus den Gattungen *Cimbex*, *Lophyrus* und *Nematus*.

*Holocremnus* ist von allen Untergattungen der alten Gattung *Limneria* diejenige, welche am schwierigsten zu erkennen ist. Am meisten besitzt sie Aehnlichkeit mit *Olesicampe*, die Arten von *Holocremnus* sind jedoch durchschnittlich kleiner, der Kopf ist kürzer und nicht kubisch, der Clypeus ist am Ende abgerundet, die Zähne der Mandibeln gleich; das Stigma im Vorderflügel ist meist dunkel, das 2. Segment selten deutlich länger als breit; auch ist der Hinterleib bei *Holocremnus* meist nur hinten an den Seiten rot. Von *Anilastus* unterscheidet sich *Holocremnus* am besten durch die Form des Kopfes und die aufgetriebenen Wangen; mit *Angitia* könnten nur die Männchen verwechselt werden; Kopfform und Hinterleibs-färbung geben auch hier die Unterschiede. Ich will jedoch nicht unterlassen zu betonen, dass es gerade hier zur Herausfindung der Unterschiede eines sehr geübten Auges bedarf.

#### Uebersicht der Arten:

1. Die hintersten Schenkel schwarz. 2.  
Die hintersten Schenkel höchstens an der Basis oder Spitze schwarz. 4.

2. Kopf nach hinten fast verbreitert. Stigma braun. Beine rot, Hüften, Mittelschenkel zum Teil, Hinterschenkel fast ganz schwarz. 7 mm.

#### 1. **incrassator** Holmgr.

Kopf nach hinten nicht erweitert. Stigma gelblich. Die hintersten Schienen gelblich, nahe der Basis und am Ende verdunkelt. 3.

3. Vorderbeine rötlich, Hüften und Trochanteren gelblich, Hüften nur an der Basis schwarz. Fühlerschaft unten hell gefleckt. Areola kurz gestielt oder fast sitzend. 5 mm.

#### 2. **vexatus** Holmgr.



Mittel- und Hinterschenkel, sowie alle Hüften schwarz, Mittelschenkel an der Spitze meist rötlich. Fühlerschaft unten nicht hell. Areola sehr klein und schief, lang gestielt. 4—5 mm.

3. **alpinus** Roman.

4. Hinterleibsstiel lang und schmal. Kopf nach hinten deutlich verschmälert. Metathorax mit deutlicher Costula. Hinterleibssegmente vom 3. an an den Seiten rot gefleckt. Beine rötlich, die vorderen Hüften und Trochanteren gelblich; die hintersten Hüften, Kniee und Basis und Spitze der Schienen schwärzlich. 5 mm.

4. **sordidellus** Holmgr.

Hinterleibsstiel gedrungener. Kopf nach hinten selten deutlich verschmälert. 5.

5. Mandibeln, Tegulä und Hüften, meist auch Basis der Schenkel schwarz. Wangen lang. Hinterleibsmittle 6.

Mandibeln, Tegulä und Basis der Beine nicht gleichzeitig schwarz. Costula undeutlich oder fehlend. 8.

6. Postpetiolus mit Längsrinne. Beine rot, Hüften und Trochanteren schwarz. Endrand von Segment 2 und die folgenden Segmente rot, Endsegmente oben dunkel gefleckt. 6 mm.

5. **canaliculatus** Grav.

Postpetiolus ohne deutliche Längsrinne, höchstens mit punktförmiger Grube. 7.

7. Postpetiolus mit tiefer punktförmiger Grube. Beine rot, Hüften und Trochanteren schwarz. Nach Thomson auch die Basis der Schenkel schwarz. 6—7 mm.

6. **errabundus** Grav.

Postpetiolus ohne punktförmige Grube. Beine rot, Hüften, Trochanteren und Basis der Schenkel schwarz. 6 mm.

7. **errans** Holmgr.

8. Mesopleuren fein runzlig-punktiert; Speculum matt. Mandibeln kurz, wenig länger als breit, mit stumpfen Zähnen. Tegulä hell. Trochantellen blassgelb. Bauchfalte braun. Grössere Arten von 7—9 mm. 9.

Mesopleuren fein runzlig oder lederartig, kaum punktiert; Speculum ziemlich glänzend. Mandibeln ziemlich lang, mit spitzen Zähnen. Kleine oder höchstens mittelgrosse Arten. 15.

9. Die vorderen Hüften und Trochanteren schwarz, die letzteren beim ♂ gelb. Area superomedia kurz, fünfseitig. Hinterleibsmittle braunrot. 7 mm.

8. **heterogaster** Thoms.

Die vorderen Hüften gelb, höchstens an der Basis schwarz. 10.

10. Hinterschenkel wenigstens am Ende schwärzlich. 11.

Hinterschenkel ganz rot. 12.

11. Fühler und Hinterleib gegen das Ende zu rötlich. Stigma schwärzlich. Metathorax mit deutlichen Leisten, Costula verwischt. 7—8 mm.

9. **cothurnatus** Holmgr.

Fühler und Hinterleib schwarz. Schaft unten hell gefleckt. 5—7 mm.

10. **nematorum** Tschek.

12. Hinterleib ganz schwarz. 13.

Hinterleibssegmente, besonders die letzten, an den Seiten rot. 14.

13. Schaft unten und Vorderhüften gelblich. Schenkel und Schienen rot, die hintersten Schienen an der Basis weisslich, am Ende braun. Die beiden Seitenfelder des Metathorax verschmolzen. 7—8 mm.

11. **Ratzeburgi** Tschek.

Schaft schwarz. Die hintersten Schienen hellgelb, an Basis und Spitze schwarz. 7—8 mm.

12. **seniculus** Grav.

14. Die vorderen Hüften ganz gelb. Area superomedia breit, halbkreisförmig. 7—8 mm.

13. **clandestinus** Holmgr.

Wie die vorhergehende Art, aber die vorderen Hüften an der Basis schwarz. 8—9 mm.

14. **frutetorum** Thoms.

15. Schulterbeulen und Vorderhüften wenigstens an der Basis schwarz. Trochantellen citrongelb. Schenkel und Schienen rot, letztere zuweilen gelblich; Hinterschienen an der Spitze, meist auch nahe der Basis dunkel, meist mit weissem Basalring. Spitzen der hintersten Schenkel zuweilen schwarz. 16.

Schulterbeulen, Unterseite des Schaftes und Vorderhüften blassgelb. 22.

16. Hinterleib schwarz, höchstens das 2. Segment mit rotem Einschnitt. 17.

Hinterleib in der Mitte oder am Ende mehr oder weniger ausgedehnt rot gezeichnet. 18.

17. Area superomedia über doppelt so lang als breit. Areola im Vorderflügel sehr lang gestielt. Flügel fast wasserhell. Die hintersten Tarsen nicht weissgeringelt. 6 mm.

15. **vitripennis** Holmgr.

Area superomedia kürzer. Die hintersten Tarsen schwarz, weissgeringelt. Beim ♀ die Hüften und die hintersten Schenkel an Basis und Spitze schwarz. 4—5 mm.

16. **tarsator** Thoms.

18. Kopf stark aufgetrieben wie bei Olesicampe. Bauchfalte braun. Das 2. Segment länger als breit. Hinterleib hinten an den Seiten braunrot. 6—7 mm.

17. **buccatus** Thoms.

Kopf nicht aufgetrieben. Bauchfalte ganz oder grösstenteils hell. Das 2. Segment fast quer. Kleinere Arten. 19.

19. An den hintersten Tarsen wenigstens der Metatarsus mit breiter weisser Basis. 20.

Die hintersten Tarsen nicht weiss geringelt. 21.

20. Stigma gelb. Die drei ersten Glieder der hintersten Tarsen weiss, am Ende schwarz. Das 2. Segment quer; Bauchfalte hell. 5 mm.

18. **annulitarsis** Thoms.

Stigma braun. Die hintersten Tarsen schwarz, Basis des Metatarsus weiss. Nervulus postfurkal, schief. 5 mm.

19. **curtigena** Thoms.

21. Hinterleibsseiten gegen das Ende braunrot. Schenkel und Schienen gelbrot, letztere oft ohne dunkle Zeichnung. 4—5 mm.

20. **vetulus** Holmgr.

Hinterleib grösstenteils rot. Schenkel und Schienen rötlich, die hintersten Schienen doppelt dunkel gezeichnet. 5 mm.

21. **sinuatus** Thoms.

22. Stigma braun. Bauchfalte ganz oder wenigstens an der Basis dunkel. Mandibeln meist kurz. Die hintersten Tarsen dunkel, an der Basis weiss. 23.

Stigma und Bauchfalte gelblich. 25.

23. Körper gedrungen. Postpetiolus und das 2. Segment fast quer. Die hintersten Schenkel am Ende, die hintersten

Schienen nahe der Basis und am Ende dunkel. Das 2. Segment am Ende, das 3. an den Seiten, die übrigen unten rot. 7 mm.

22. **erythropygus** Holmgr.

Körper schlanker. Postpetiolus und das 2. Segment nicht quer. Schenkel am Ende nicht schwarz. 24.

24. Die hintersten Schienen in der Mitte gelblich. Bauchfalte braun. 6—7 mm.

23. **melanogaster** Thoms.

Die hintersten Schienen rötlich, nahe der Basis und am Ende dunkel gezeichnet. 5—6 mm.

24. **Bergmanni** Thoms.

25. Kopf nach hinten wenig verschmälert. Die hintersten Schienen gelblich, am Ende und meist auch nahe der Basis verdunkelt, an der äussersten Basis weisslich. Beim ♂ die hintersten Hüften braunrot, Trochanteren weisslich, Tarsen weisslich geringelt.

25. **hyalinatus** Holmgr.

Kopf nach hinten deutlich verschmälert. Die hintersten Schienen kaum dunkel gezeichnet. 26.

26. Wangen kaum aufgetrieben. Beine ziemlich schlank. Brustseiten matt, Speculum wenig glänzend. Die hintersten Tarsen hell, die Glieder am Ende wenig verdunkelt. 6 mm.

26. **argentatus** Grav.

Wangen stärker aufgetrieben. Beine dicker als bei *H. argentatus*; Schiensporen sehr ungleich. Im Uebrigen der vorhergehenden Art sehr ähnlich. 6 mm.

27. **spiraeeae** Thoms.

Es ist nicht möglich, die einander so ähnlichen *Holcremnus*-Arten in natürliche Gruppen zu zerlegen; man ist deshalb mehr auf die Zeichnung angewiesen. Ich nehme die folgenden 4 Gruppen an, wie sie sich schon aus der Bestimmungstabelle ergeben.

- 1. Gruppe.** Die hintersten Schenkel schwarz. Tegulä gelblich-weiss. Metathorax ohne deutliche Costula.

1. **H. incrassator** Holmgr. 1854 *Campoplex incrassator* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV p. 18 ♀♂ | 1858 *Limneria incrassata* Holmgren, l. c. II p. 89 ♀♂ | *Holcremna incrassator* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1177 ♀♂ | ? 1848 *Campoplex transiens* Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II p. 84.

Die Art gehört zu den grösseren der Gattung und ist ausgezeichnet durch Kopf- und Fühlerbildung und die

Färbung der Hinterbeine. Körper kräftig und gedrungen. Kopf aufgetrieben, nach hinten etwas erweitert; Scheitel wenig ausgerandet; Wangen und Schläfen aufgetrieben; Augen kaum ausgerandet; Fühler kurz, nicht länger als der halbe Körper, gegen das Ende wenig verdünnt. Thorax länger als hoch, durch feine Punktierung matt; Seitenfelder des Metathorax verschmolzen; Area superomedia fünfseitig am Ende offen. Brustseiten punktiert, ziemlich glänzend. Endabschnitt des Radius am Ende gerade; Areola kurz und dick gestielt, seltener fast sitzend, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend. Hinterleib etwas länger als Kopf und Thorax, schwach glänzend, fein behaart, gegen das Ende von der Seite zusammengedrückt; Postpetiolus an den Seiten abgerundet und punktiert, oben zuweilen mit Grübchen oder Eindrücken; das 2. Segment wenig länger als breit, an der Basis fein gerunzelt; Bohrer kaum vorstehend. — Schwarz; Palpen und Mandibeln gelblich; Fühler gegen das Ende unten rostrot; Schaft unten meist mit heller Makel. Stigma braun, Tegulä gelblichweiss. Vorderbeine rötlich, Hüften schwarz; Mittelschenkel an der Basis gebräunt; die hintersten Hüften, Trochanteren und Schenkel schwarz, die Schenkel zuweilen braun oder zum Teil rötlich; Schienen und Tarsen rötlich, die Schienen meist an der Basis und am Ende schwärzlich. Segment 1 und 2 mit rötlichem Endrande, die folgenden Segmente braunrot, auf dem Rücken dunkel, seltener zum grössten Teil schwärzlich; Bauchfalte gelblich.

L. 7 mm.

Selten im nördlichen und mittleren Europa.

2. **H. vexatus** Holmgr. 1858 *Limneria vexata* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 92 ♀♂ | 1887 *Holocremna vexata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1182 ♀.

Matt; fein graulich pubescent. Kopf nach hinten etwas verschmälert; Fühler länger als der halbe Körper. Seitenfelder des Metathorax mit einander verschmolzen; Area superomedia fünfseitig, hinten offen. Areola im Vorderflügel kurz gestielt oder fast sitzend, den rücklaufenden Nerv fast im Endwinkel aufnehmend. Das 2. Hinterleibssegment etwas länger als breit; Bohrer kaum vorstehend. — Schwarz; Schaft unten hell gefleckt; Palpen und Mandibeln gelblich. Stigma bräunlichgelb; Tegulä, zuweilen auch Schulterbeulen weisslich. Vorderbeine rötlichgelb, Hüften und Trochanteren gelb, die<sup>6</sup> Hüften meist mit schwarzer Basis; die hintersten Hüften, Trochanteren und Schenkel schwärzlich, letztere am Ende rötlich; die hin-

tersten Schienen rötlichgelb, am Ende und meist auch nahe der Basis braun; Tarsen dunkel, Glied 1—3 mit heller Basis. Hinterleib schwarz, selten einige Segmente mit rötlichen Einschnitten; Bauchfalte gelblich.

5 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

3. **H. alpinus** Roman. 1909 *Holocremna alpina* Roman, Naturw. Untersuch. d. Sarekgeb. in Schwed.-Lappland IV p. 357 ♀♂.

Kopf so breit wie der Thorax, dick, nach hinten nicht verschmälert; Gesicht dünn behaart; Fühler von  $\frac{3}{4}$  Körperlänge, Geißel 21 gliedrig; Wangen kurz, schwach glänzend. Thorax deutlich länger als hoch; Area superomedia nach vorn stark konvergierend, hinten offen; Costula fehlend; Brustseiten fein gerunzelt; Speculum schwach glänzend. Radius am Ende gekrümmt; Areola sehr klein und schief, lang gestielt, beim ♂ rudimentär oder fehlend; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitz. Beine kräftig, Klauen klein, nur an der Basis mit 2 oder 3 steifen Borsten. Hinterleib schwach glänzend, vom 3. Segmente an leicht von der Seite zusammengedrückt; das 1. Segment kaum länger als die hintersten Hüften und Trochanteren zusammen; Postpetiolus quadratisch, mit geraden Seiten; das 2. Segment um  $\frac{1}{4}$  länger als hinten breit; das 3. Segment etwas kürzer als das zweite; Bohrer etwa halb so lang als das 1. Segment stark nach oben gekrümmt. — Schwarz; Palpen und Mandibeln gelblich. Flügel kaum getrübt; Stigma rötlichgelb, dunkel gerandet; Tegulä weisslich. Die vordersten Beine gelbrot, Hüften und Klauenglied schwarz; Mittel- und Hinterbeine schwarz, mit gelblichen Schienen, Mittelschenkel am Ende zuweilen rot, Mittelschienen an der Spitze, die hintersten nahe der Basis und am Ende schwärzlich; Basalhälfte des Metatarsus weisslich. Hinterleib schwarz, die vorderen Baucheinschnitte gelblich.

L. 4—4,5 mm.

Sarekgebirge in Schwedisch-Lappland.

2. **Gruppe.** Hinterleibsstiel lang und schmal. Kopf nach hinten deutlich verschmälert. Metathorax mit deutlicher Costula. Schenkel rötlich. Hinterleib an den Seiten rot gefleckt.

4. **H. sordidellus** Holmgr. 1858 *Limneria sordidella* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 82 ♀♂ | 1887 *Holocremna sordidella* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1177 ♀♂.

Kopf nach hinten deutlich verschmälert. Die beiden Seitenfelder des Metathorax deutlich von einander getrennt,

Costula also scharf ausgeprägt; Area superomedia fünfseitig, quer, am Ende offen; Brustseiten etwas glänzend. Endabschnitt des Radius am Ende ziemlich gekrümmt. Hinterleibsstiel lang und schmal; Postpetiolus länger als breit, wenig convex, kaum doppelt so breit als der Petiolus; das 2. Segment nicht viel länger als breit, gegen die Basis zu ziemlich stark verschmälert und deutlich gerunzelt; Bohrer kaum vorragend. — Schwarz, bräunlichgrau pubescent; Palpen und Mandibeln gelblich. Fühlerschaft unten hell. Flügel schwach getrübt, Stigma braun, Tegulä gelblichweiss. Vorderbeine rötlich, Hüften und Trochanteren gelblich; an den hintersten Beinen die Hüften schwarz; Trochanteren gelblich, beim ♂ an der Basis schwarz; Schenkel und Schienen rötlich, die Schenkel an der Spitze, die Schienen in der Regel an Basis und Spitze gebräunt; Tarsen dunkel. Das 2. Segment mit rotem Endrand, die folgenden Segmente mit braunroter Seitenmakel, seltener fast ganz dunkel; zuweilen auch das 3. Segment hinten breit rot; Bauchfalte gelblich.

L. 5 mm.

Nord- und Mitteleuropa. Scheint im Norden häufiger zu sein; hier in Thüringen ist die Art sehr selten.

3. **Gruppe.** Kopf nach hinten nicht verbreitert, aber kaum verschmälert; Wangen lang. Mandibeln kurz und kräftig, wenig hell gezeichnet. Tegulä schwärzlich. Schenkel rot. Hinterleibsmittle rot gefärbt.

5. **H. canaliculatus** Grav. 1829 *Campoplex canaliculatus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 560 ♀ | 1858 *Limneria canaliculata* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 83 ♀ | 1880 *Limneria canaliculata* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 165 ♀♂ | 1887 *Holocremna canaliculata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1177 ♀♂.

Kopf nach hinten kaum verschmälert; Fühler wenig länger als Kopf und Thorax zusammen, gegen das Ende verdünnt; Wangen lang. Seitenfelder des Metathorax undeutlich von einander getrennt; Area superomedia länglich pentagonal, am Ende offen. Areola im Vorderflügel klein und unregelmässig, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend; Stigma ziemlich gross. Das 1. Hinterleibssegment nur sehr leicht gebogen; Postpetiolus etwa so lang als breit, mit Längsrinne, die nach Brischke auch fehlen kann, vorausgesetzt, dass Brischke nicht andere Arten mit der vorliegenden zusammengeworfen hat; das 2. Segment kaum länger als breit, gegen die Basis wenig verschmälert, mit deutlichen Thyridien; Bohrer nicht vor-

stehend. — Schwarz; Palpen gelblich; Mandibeln schwärzlich, in der Mitte heller. Tegulä ebenfalls braun oder schwärzlich. Beine rötlich, Hüften und Trochanteren schwarz. Endrand von Segment 2 und die folgenden Segmente rot, Endsegmente oben dunkel gefleckt.

6 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten. — Brischke will die Art aus *Nematus fraxini* erzogen haben; nach Thomson erzog sie Kriechbaumer aus *Nematus appendiculatus*.

6. **H. errabundus** Grav. 1829 *Campoplex errabundus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 559 ♀ | 1887 *Holocremna errabunda* Thomson, Opusc. Entom, XI p. 1177 ♀♂.

Diese und die folgende Art sind kaum von einander zu trennen, auch von *H. canaliculatus* ist der Unterschied sehr schwierig. Nach Gravenhorst sind an den Beinen nur die Hüften und Trochanteren schwarz, während nach Thomson auch die Basis der Schenkel schwarz ist; bei *H. errans* soll die Schenkelbasis breit schwarz sein. — Kopf nach hinten wenig verschmälert; Fühler deutlich länger als der halbe Körper; Wangen lang; Mandibeln kurz und kräftig. Areola im Vorderflügel unregelmässig, kurz gestielt. Hinterleib gegen das Ende von der Seite zusammengedrückt; Postpetiolus etwa so lang als breit, kürzer, aber mehr als doppelt so breit als der Petiolus, oben mit tiefer, punktförmiger Grube; Bohrer nicht vorstehend. — Schwarz; Palpen rötlich; Mandibeln in der Mitte braunrot. Stigma bräunlich; Tegulä dunkelbraun oder schwärzlich. Beine rot, Hüften und Trochanteren schwarz. Wie bereits erwähnt, gibt Thomson die Schenkelbasis schwarz an, auch die hintersten Schienen sollen am Ende dunkel sein. Das 1. Segment schwarz, am Ende bräunlich; Segment 2—5 rot, 6 und 7 braun.

L. 6—7 mm.

Bisher nur aus Deutschland bekannt. Die Art scheint nach Gravenhorst gar nicht wieder gefunden worden zu sein.

7. **H. errans** Holmgr. 1858 *Limneria errans* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 83 ♀ | 1887 *Holocremna errans* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1177 ♀.

Ich habe bereits bei der vorigen Art erwähnt, dass es nicht gut möglich ist, einen scharfen Unterschied zwischen dieser und der vorigen Art zu machen. Von *H. canaliculatus* unterscheidet sich die Art nach Holmgren durch die Bildung des Postpetiolus, welcher weder Längsfurche noch Grube aufweist.



Kopf nach hinten kaum verschmälert. Seitenfelder des Metathorax nicht scharf von einander geschieden; Area superomedia kurz, Hinterleib gegen das Ende stark zusammengedrückt und breit abgestutzt; 2. Segment kaum länger als breit; Bohrer nicht vorstehend. — Körper matt, graulich pubescent, schwarz; Palpen rötlich. Stigma im Vorderflügel braun, Tegulä schwärzlich. Beine rot, Hüften, Trochanteren und Basis der Schenkel breit schwarz, die hintersten Schenkel und Schienen auch am Ende gebräunt; Tarsen gegen das Ende verdunkelt. Hinterleib rot, das 1. Segment mit Ausnahme des Endrandes schwarz; Segment 5—7 an den Seiten schwärzlich.

L. 6 mm.

Nord- und Mitteleuropa; selten.

4. **Gruppe.** Mesopleuren fein runzlig-punktiert, mit mattem Speculum. Kopf nach hinten nicht oder nur wenig verschmälert. Mandibeln kurz, wenig länger als breit, mit stumpfen Zähnen. Costula fehlend oder undeutlich. Tegulä hell. Schenkel rot. Trochantellen hellgelb. Hinterleib schwarz oder rot gezeichnet; Bauchfalte braun. Grössere Arten.

8. **H. heterogaster** Thoms. 1887 *Holocremna heterogaster* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1178 ♀♂.

Kopf nach hinten kaum verschmälert. Metathorax deutlich gefeldert; Costula undeutlich; Area superomedia kurz fünfseitig. — Schwarz; Palpen, Mandibeln und Tegulä gelblich. Flügel hyalin, Stigma braun. Beine rötlich, alle Hüften und Trochanteren schwarz; beim ♂ die vorderen Trochanteren gelb. Hinterleibsmitte braunrot.

Thomson gibt von der Art eine nur sehr kurze Beschreibung. Nach ihm ist sie sehr ähnlich *H. cothurnatus* und *clandestinus*, von denen sie sich besonders durch die schwarzen Vorderhüften unterscheidet.

L. 7 mm.

Nach Thomson wurde die Art in Norddeutschland gefunden; ich kenne sie nicht.

9. **H. cothurnatus** Holmgr. 1858 *Linneria cothurnata* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 90 ♀♂ | 1887 *Holocremna cothurnata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1178 ♀♂ | 1844 *Campoplex argentatus* Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I p. 96 ♀♂ (non Gravenhorst).

Kopf nach hinten kaum verschmälert; Fühler deutlich länger als der halbe Körper, gegen das Ende verdünnt. Metathorax deutlich gefeldert; Costula meist nur schwach,

zuweilen aber auch deutlich. Holmgren sagt: Metathorax areis lateralibus 4 completis. Area superomedia kurz dreieckig oder halbkreisförmig. Areola im Vorderflügel kurz gestielt oder fast sitzend, den rücklaufenden Nerv hinter der Mitte aufnehmend; der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle nicht sehr spitz. Hinterleib gegen das Ende von der Seite zusammengedrückt; das 2. Segment wenig länger als breit; Bohrer versteckt. — Matt, fein graulich pubescent, schwarz; Palpen und Mandibeln gelblich; Fühler gegen das Ende unten rötlich, beim ♂ weniger; Schaft bei beiden Geschlechtern unten gelblich. Flügel schwach getrübt; Stigma braun; Tegulä gelblichweiss. Beine rötlich; die vorderen Hüften, Trochanteren und Kniee gelblich; Mittelhüften selten mit schwärzlicher Basis; die hintersten Hüften und Trochanteren schwarz; die Schienen an der äussersten Basis weisslich, unterhalb davon und am Ende braun; auch die Spitze der hintersten Schenkel in der Regel verdunkelt; die hintersten Tarsen braun, der Metatarsus an der Basis weisslich. Hinterleib gegen das Ende braunrot, auf dem Rücken schwärzlich.

L. 7—8 mm.

Nord- und Mitteleuropa; gehört zu den häufigeren *Holcremnus*-Arten. Wurde aus verschiedenen *Lophyrus*-Arten gezogen, nach Brischke auch aus *Nematus* Brischkei.

10. **H. nematorum** Tschek. 1871 *Limneria nematorum* Tschek, Verh. zool. boot. Ges. Wien XXI p. 65 ♀♂.

Kopf etwas aufgetrieben, nach hinten kaum verschmälert; Fühler von  $\frac{2}{3}$  Körperlänge. Seitenfelder des Metathorax mit einander verschmolzen; Area superomedia annähernd fünfeckig oder dreieckig, nicht länger als breit, hinten offen oder undeutlich geschlossen. Radius am Ende leicht eingebogen; Areola sitzend oder kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv kurz hinter der Mitte aufnehmend. Bohrer kaum vorragend. — Schwarz; Palpen, Mandibeln und Fleck auf der Unterseite des Schaftes gelblich. Flügel ziemlich hyalin; Stigma braun; Tegulä weisslich. Beine rötlich, die vorderen Hüften und Trochanteren gelblich; an den hintersten Beinen Hüften schwarz, Schenkel in der Regel an Basis und Spitze verdunkelt; Schienen an der äussersten Basis hell, dahinter und am Ende braun; Tarsen braun, an der Basis hell. Bauchfalte gelblich.

L. 5 mm.

Niederösterreich. — Die Art wurde aus verschiedenen auf der Fichte lebenden *Nematus*-Larven gezogen.

Nahe verwandt scheint *H. vitripennis* Holmgr. zu sein; derselbe unterscheidet sich durch die lange Area superomedia.

11. **H. Ratzeburgi** Tschek. 1871 *Limneria Ratzeburgi* Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI p. 64 ♀♂ | 1844 *Campoplex seniculus* Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I p. 96 [non Gravenhorst].

Kopf nach hinten kaum verschmälert; Fühler von  $\frac{2}{3}$  Körperlänge; Clypeus vorn gestutzt; Gesicht quer. Thorax länger als hoch; Metathorax kurz, gleich von der Basis an abschüssig; die beiden Seitenfelder mit einander verschmolzen; Area superomedia sehr kurz und breit, halbkreisförmig, am Ende meist offen. Areola im Vorderflügel klein und gestielt, beim ♂ kleiner und länger gestielt als beim ♀; rücklaufender Nerv kurz hinter der Mitte mündend. Das 1. Hinterleibssegment kaum so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus quadratisch, noch einmal so breit wie der Petiolus, wenig convex, mitten mit einer kurzen Längsfurche; das 2. Segment wenig länger als breit; Bohrer kaum vorstehend. — Schwarz; Palpen, Mandibeln und Unterseite des Fühlerschaftes gelblich. Stigma im Vorderflügel braun; Tegulä gelblichweiss. Die vorderen Hüften und Trochanteren gelblich; die hintersten Hüften schwarz; Schenkel und Schienen rot, die hintersten Schienen an der Basis weisslich, am Ende braun.

L. 7—8 mm.

Die Art wurde von Tschek in Niederösterreich entdeckt und zwar wurde sie aus *Lophyrus polytomus* gezogen. Ich zog eine ganze Reihe von Stücken aus Puppen von *Trichiosoma lucorum* aus Mitteldeutschland, zusammen mit *Spilocryptus cimbicis*.

12. **H. seniculus** Grav. 1829 *Campoplex seniculus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 473 ♂ | 1871 *Campoplex seniculus* (Grav. und Ratzeb.) Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI p. 63 | 1872 *Limneria seniculus* Marshall, Catal. Brit. Hymen. p. 58 ♀ | 1880 *Casinarina senicula* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 147 ♀ | 1909 *Casinarina senicula* Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Fasc. 21 p. 1626 ♀♂.

Ich habe dieses sehr fragliche Tier schon einmal an der erwähnten Stelle beschrieben und möge man daselbst die nähere Beschreibung nachlesen. Ich habe dabei schon erwähnt, dass mir die Stellung dieser Art bei *Casinarina* sehr bedenklich sei und dass man es vielleicht mit einer *Angitia* zu tun habe. Jetzt bei der Bearbeitung der Gattung *Holocremnus* wurde es mir klar, dass die *Limneria Ratzeburgi* Tschek nur zur Gattung *Holocremnus* gestellt werden kann und nun zweifle ich auch nicht, dass der *Campoplex seniculus* Grav. zu derselben Gattung gehört. Beide Arten sind eng mit einander verwandt. Auf die Unterschiede der beiden hat zuerst Tschek aufmerksam gemacht; er sagt an der oben citierten Stelle; „Ratzeburg hat im 1. Bande

seiner Ichneumoniden der Forstinsecten p. 96 einen Campoplex als *C. seniculus* Grav. beschrieben; der aus *Lophyrus nemorum* gezogen worden war. Denselben Gast erhielt ich in 3 männlichen und 5 weiblichen Exemplaren aus *Lophyrus polytomus* Hart., aber ich kann mich nicht überzeugen, dass dieses wirklich der *C. seniculus* Grav. sei. Gravenhorst lag zur Beschreibung ein einzelnes Männchen, Ratzeburg ein Weibchen vor; jenes hat den Fühlerschaft unten schwarz, dieses gelb oder weisslich. Gravenhorst sagt von den Beinen: „*Pedes coxis nigris, anticis subtus flavis; trochanteribus anterioribus flavis, posticis nigris; femoribus rufis, anticis subtus flavicantibus; tibiis anterioribus flavis, apicem versus dilute rufis, posticis albo-flavis, apice et basi nigris, spinis albidis.*“ Ratzeburg hingegen: „Beine rötlich braun und nur Hüften, Schenkelhöcker und Hinterschienen - Basis weisslich, Hinterhüften und Tarsen schwarz.“ Wie viel man auch auf Rechnung der Geschlechtsverschiedenheit bringen mag — allzuviel darf dieses bei den Campoplegiden nicht betragen — der Unterschied zwischen beiden Schilderungen ist augenfällig. Von der von Gravenhorst angeführten auffallenden Bildung des Pospetiolus (segmento primo parte antica triplo latiore quam petiolus) erwähnt Ratzeburg nichts. Aus diesen Gründen halte ich mich für berechtigt, den Campoplex *seniculus* Ratzeb. neu zu benennen (*Limneria Ratzeburgi*).“

Die Grösse gibt Gravenhorst auf etwa 8—9 mm an. Das einzige ♂, welches der Beschreibung zu Grunde lag, wurde bei Reinsdorf in Schlesien auf *Chaerophyllum bulbosum* gefangen. — Brischke gibt an, dass er die Art aus *Orgyia gonostigma* gezogen habe; freilich ist es fraglich, ob dies der wirkliche *Holocremnus seniculus* war.

13. **H. clandestinus** Holmgr. 1858 *Limneria clandestina* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 90 ♀♂ | 1887 *Holocremna clandestina* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1178 ♀♂ | ? 1838 *Campoplex retextus* Hartig, Jahresber. Fortsch. Forstw. I. P. 2 p. 272 ♀ | ? 1844 *Campoplex retextus* Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I p. 94 ♀.

Die Art schliesst sich eng an *H. cothurnatus* an, aber der Pospetiolus ist glänzender, weniger gewölbt, mit geraden, fast parallelen Seiten; ferner ist der Hinterleib von dunklerer Färbung, namentlich gegen das Ende, auch sind die hintersten Schenkel am Ende nicht schwärzlich.

Seitenfelder des Metathorax undeutlich von einander getrennt; Area superomedia halbkreisförmig, am Ende offen. — Matt; graulich pubescent; schwarz; Palpen, Mandibeln, Fühlerschaft unten und Tegulä gelblich. Stigma im Vorderflügel braun. Beine rötlich, die vorderen Hüften und Tro-

chanteren gelblich, die hintersten Hüften und Basis der Trochanteren schwarz; die hintersten Schienen rötlich, an der äussersten Basis weisslich, unterhalb davon und am Ende schwärzlich; zuweilen fehlt der dunkle Fleck nahe der Basis; die hintersten Tarsen braun. Das 2. Segment oft mit rötlichem Endrand, das 3. gewöhnlich an den Seiten, seltener auch hinten rot; die folgenden Segmente gewöhnlich auf der Bauchseite verschwommen rot.

L. 7—8 mm.

Nord- und Mitteleuropa; nicht häufig.

14. **H. frutetorum** Thoms. 1887 *Holocremna frutetorum* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1178 ♀♂.

Kopf nach hinten kaum verschmälert; Scheitel breit; Wangen kurz und aufgetrieben; Fühler länger als der halbe Körper. Metathorax ohne oder mit undeutlicher Costula; Area superomedia breit, halbmondförmig; Mesopleuren runzlig-punktiert, mit nur schwach glänzendem Speculum. — Schwarz, Palpen und Mandibeln gelblich. Stigma im Vorderflügel braun; Tegulä weisslich. Beine rötlich; vordere Hüften gelb, an der Basis schwarz; die hintersten Hüften und Basis der hintersten Trochanteren schwarz; Schenkel am Ende nicht schwarz; Schienen an der äussersten Basis weisslich, unterhalb davon und am Ende schwärzlich. Endsegmente nach unten und die ganzen Bauchsegmente braunrot.

L. 8—9 mm.

Die Art wurde im mittleren Deutschland entdeckt; sie wurde aus *Lophyrus frutetorum* gezogen.

5. **Gruppe.** Mesopleuren fein runzlig oder lederartig, kaum punktiert, mit glänzendem Speculum. Mandibeln länger als an der Basis breit, mit spitzen Zähnen. Schenkel rot. Hinterleib schwarz oder mit roter Zeichnung.

15. **H. vitripennis** Holmgr. 1858 *Limneria vitripennis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 92 ♀♂.

Diese Art würde sich besonders auszeichnen durch die lange und schmale Area superomedia, die hyalinen Flügel und die langgestielte Areola.

Kopf nach hinten nicht verschmälert, mit aufgetriebenen Wangen; Fühler von  $\frac{2}{3}$  Körperlänge, fadenförmig, gegen das Ende kaum verdünnt. Thorax etwas schmaler als der Kopf, länger als hoch, fein behaart; Metathorax fein gerunzelt, Costula fehlend, selten schwach angedeutet; Area

superomedia schmal, über doppelt so lang als breit, hinten offen. Brustseiten lederartig. Radius an der Basis und am Ende leicht gekrümmt; Areola klein und schief, lang gestielt, den rücklaufenden Nerv fast im Endwinkel aufnehmend. Fussklauen an der Basis gekämmt. Hinterleib gegen das Ende von der Seite zusammengedrückt; das 1. Segment etwa so lang als die hintersten Hüften und Trochanteren zusammen; Postpetiolus quadratisch oder etwas länger als breit, an den Seiten leicht gerundet; das 2. Segment um  $\frac{1}{3}$  länger als hinten breit, mit deutlichen Thyridien; Bohrer nicht vorstehend. — Matt, fein graulich pubescent, schwarz; Palpen und Mandibeln gelblich; Fühler beim ♀ mehr braun, beim ♂ schwärzlich; Unterseite des Schaftes meist mit gelblicher Makel. Flügel hyalin, Stigma bräunlichgelb; Tegulä gelblichweiss. Vorderbeine rötlich, Hüften und Trochanteren gelblich, Hüften an der Basis schwarz; die hintersten Hüften und Trochanteren schwarz, Schenkel rot, Schienen gelblich, nahe der Basis und am Ende schwärzlich; Tarsen dunkel, an der Basis hell. Das 2. Segment mit rötlichem Einschnitt; Bauchfalte braun und gelb.

L. 6 mm.

Die Art wurde bei Quickjock in Lappland gefunden.

16. **H. tarsator** Thoms. 1887 *Holocremna tarsator* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1180 ♀♂.

Eine der kleinsten Arten. Körper gedrungen. Kopf nach hinten kaum verschmälert; Mandibeln mit scharfen Endzähnen. Metathorax ohne Costula; Area superomedia ziemlich gestreckt (Thomson sagt nur, dass sie gestreckter ist als bei dem ähnlichen *H. annulitarsis*); Mesopleuren fein lederartig gerunzelt, ohne Punktierung; Speculum ziemlich glänzend. Nervulus interstitial. Postpetiolus länger als breit. — Schwarz; Palpen und Mandibeln gelblich. Stigma bräunlichgelb; Tegulä weisslich. Beim ♂ der Fühlerschaft unten hell gefleckt. Beine rötlich, beim ♀ alle Hüften und die Basis und Spitze der hintersten Schenkel und Schienen schwarz, die Schienen an der äussersten Basis weisslich; Mittel- und Hintertarsen schwarz, weiss geringelt. Beim ♂ Vorderhüften gelblich, Schenkel ungefleckt, Schienen an der Spitze kaum verdunkelt. Hinterleib ganz schwarz; Bauchfalte braun.

L. 4—5 mm.

Die Art wurde in Norddeutschland gefunden.

Durch die weissgeringelten Hintertarsen ist die Art dem

*H. annulitarsis* sehr ähnlich; bei letzterem ist Segment 3 und 4 hinten breit rot, die Area superomedia und der Postpetiolus sind kürzer und die Bauchfalte heller.

17. **H. buccatus** Thoms. 1887 *Holocremna buccata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1180 ♀.

Von den rot gezeichneten Arten dieser Gruppe ausgezeichnet durch die Kopfbildung, das deutlich länger als breite 2. Segment, die dunkle Bauchfalte und die ansehnlichere Grösse.

Körper kräftig. Kopf, namentlich die Wangen, stark aufgetrieben wie bei der Gattung *Olesicampe*; Mandibeln kräftig; Fühler lang und ziemlich dick. Metathorax ohne Costula; Brustseiten lederartig, mit ziemlich glänzendem Speculum. Postpetiolus und das 2. Segment deutlich länger als breit. — Schwarz; Fühlerschaft unten nicht hell. Palpen und Mandibeln gelblich. Tegulä gelblichweiss. Schenkel und Schienen rötlich, die hintersten Schienen doppelt dunkel gezeichnet. Hinterleib gegen das Ende an den Seiten braunrot; Bauchfalte braun.

L. 6—7 mm.

Südliches Schweden.

18. **H. annulitarsis** Thoms. 1887 *Holocremna annulitarsis* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1179 ♀♂.

Körper klein und gedrungen. Kopf nach hinten kaum verschmälert. Metathorax ohne Costula; Brustseiten lederartig, matt, mit ziemlich glänzendem Speculum. Die hintersten Schiensporen an Länge unter sich fast gleich. Das 2. Segment etwas breiter als lang. — Schwarz; Palpen und Mandibeln gelblich; Fühlerschaft beim ♀ schwarz oder unten mit weisslichem Punkt. Stigma im Vorderflügel gelblich; Tegulä gelblichweiss. Beine rötlich, die vorderen Hüften und Trochanteren gelblich, die Hüften an der Basis schwarz; Hinterhüften schwarz; die hintersten Schienen rötlich, am Ende kaum schwärzlich; die 3 ersten Glieder der hintersten Tarsen weisslich, am Ende schwarz. Segment 3 und 4 hinten breit rot gerandet, die folgenden Segmente gegen das Ende rötlich; Bauchfalte hell.

L. 5 mm.

Südliches Schweden.

Durch die weiss geringelten Hintertarsen hat die Art grosse Aehnlichkeit mit *H. tarsator*. Ueber die Unterschiede der beiden Arten vergleiche man bei der letzterwähnten Art.

19. **H. curtigena** Thoms. 1887 *Holocremna curtigena*, Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1179 ♀♂.

Der vorigen Art sehr ähnlich und durch folgende Merkmale unterschieden: Fühler länger, Wangen kürzer. Stigma braun, Nervulus postfurcal, schräg, die vorderen Trochanteren citrongelb, die hintersten Tarsen schwarz, nur die Basis des Metatarsus weisslich, die mittleren Segmente am Endrande, die Endsegmente an den Seiten braunrot; Bauchfalte an der Basis dunkel.

L. 5 mm.

Südliches Schweden.

20. **H. vetulus** Holmgr. 1858 *Limneria vetula* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 91 ♀♂ | 1887 *Holocremna vetula* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1180 ♀♂.

Körper schlanker als bei den verwandten Arten. Kopf nach hinten nicht verschmälert; Fühler länger als der halbe Körper, fadenförmig; gegen das Ende kaum verdünnt; Wangen wenig aufgetrieben. Thorax kaum schmaler als der Kopf, länger als hoch; Seitenfelder des Metathorax mit einander verschmolzen oder durch eine schwache Costula geschieden; Area superomedia ziemlich gestreckt, fünfseitig, hinten offen. Beine schlank. Hinterleib am Ende zusammengedrückt; das 1. Segment leicht gekrümmt, etwa so lang als die hintersten Hüften und Trochanteren; Postpetiolus so lang als breit, beim ♂ eher etwas länger, mit geraden, ziemlich parallelen Seiten, das 2. Segment wenig länger als breit, mit deutlichen Thyridien; Bohrer kaum vorstehend. — Schwarz; Gesicht graulich behaart, Palpen und Mandibeln gelblich. Fühlerschaft in beiden Geschlechtern unten hell gefleckt; Geissel beim ♀ gegen das Ende unten rötlich. Thorax ganz schwarz. Flügel leicht getrübt; Stigma braun; Tegulä gelblich. Vorderbeine rot, Hüften und Trochanteren gelb, selten die Hüften an der Basis schwarz; die hintersten Hüften und Trochanteren schwarz, Schenkel rot, zuweilen an der äussersten Spitze verdunkelt; Schienen gelbrot, an der äussersten Basis weisslich, zuweilen am Ende verdunkelt. Nach Thomson sind die hintersten Schenkel und Schienen ungefleckt; die hintersten Tarsen bräunlich, Metatarsus an der Basis heller. Das 2. Hinterleibssegment mit rötlichem Einschnitt, die Endsegmente unten und oft auch an den Seiten braunrot.

L. 4—5 mm.

Die Art wurde in Lappland gefunden.



21. **H. sinuatus** Thoms. 1887 *Holocremna sinuata* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1180 ♀.

Die Art scheint eng verwandt mit *H. vetulus* zu sein; sie würde sich besonders durch die zweilappigen Acetabula und durch den reicher rot gezeichneten Hinterleib unterscheiden.

Kopf nach hinten kaum verschmälert; Fühler länger als der halbe Körper; Wangenleiste deutlich gebuchtet. Metathorax mit ziemlich deutlicher Costula; Acetabula hinter den Vorderhüften zweilappig. Hinterleibsstiel ziemlich schmal. — Schwarz; Palpen und Mandibeln gelblich. Tegulä gelblichweiss. Beine rötlich, Hüften schwarz; die hintersten Schienen doppelt dunkel gezeichnet. Hinterleib grösstenteils rot. (Eine genauere Angabe über die Verteilung der roten Färbung fehlt.) Bauchfalte weisslich.

L. 5 mm.

Südliches Schweden.

22. **H. erythropygus** Holmgr. 1858 *Limneria erythropyga* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 91 ♀♂ | 1880 *Limneria erythropyga* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 166 ♀♂ | 1887 *Holocremna erythropyga* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1181 ♀.

Mit *H. erythropygus* beginnt eine Reihe von Arten, welche ausgezeichnet sind durch helle Schulterbeulen, Vorderhüften und Unterseite des Schaftes.

Körper ziemlich gedrunken. Kopf nach hinten kaum verschmälert; Fühler kräftig, länger als der halbe Körper; Wangen nur wenig aufgetrieben; Mandibeln kurz und kräftig. Seitenfelder des Metathorax durch schwache Costula von einander getrennt; Area superomedia ziemlich schmal, fünfseitig, am Ende offen; Brustseiten ziemlich glänzend, zerstreut punktiert. Areola kurz gestielt. Hinterleib gegen das Ende von der Seite zusammengedrückt; das 1. Segment etwas länger als die hintersten Hüften und Trochanteren, ziemlich gerade; Postpetiolus quer, wenig convex, mit fast geraden Seiten; das 2. Segment kaum länger als breit; Bohrer nicht vorstehend. — Schwarz; Gesicht weisslich behaart; Palpen und Mandibeln gelblich. Fühler schwärzlich, Schaft unten gelblich gefleckt. Schulterbeulen gelblich, sehr selten dunkel. Flügel schwach getrübt; Stigma braun; Tegulä gelblichweiss. Beine rötlich, Vorderhüften und Trochanteren gelblich, selten die Hüften an der Basis schwarz gefleckt; die hintersten Hüften und Basis der Trochanteren schwarz; die hintersten Schenkel zuweilen am Ende verdunkelt; die hintersten Schienen an der äussersten Basis weisslich, dahinter und am Ende verdunkelt,

in der Mitte zuweilen rötlichgelb; die hintersten Tarsen dunkelbraun, Basis des Metatarsus oder auch der nächstfolgenden Glieder weisslich. Hinterleib schwarz; das 2. Segment oft mit rötlichem Einschnitt, das 3. Segment gewöhnlich an den Seiten rot gefleckt, die Endsegmente meist unten rötlich; Bauchfalte an der Basis braun.

Var. 1 ♀♂. Die hintersten Schienen fast ganz rot.

Var. 2 ♀♂. Kleiner; die hintersten Schenkel an der äussersten Basis und Spitze braun.

Var. 3 ♀. Fühlerschaft ganz schwarz.

L. 7 mm.

Nord- und Mitteleuropa. Mir ist die Art nie vorgekommen. Brischke will sie aus *Tenthredo*-Larven gezogen haben; es ist freilich wieder sehr fraglich, ob er die Holmgren'sche Art vor sich gehabt hat. So sagt er, der Postpetiolus sei länger als breit, während derselbe nach Holmgren quer ist.

23. **H. melanogaster** Thoms. 1887 *Holocremna melanogaster* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1181 ♀.

Durch das dunkle Stigma und die dunkle Bauchfalte, sowie durch die kurzen und kräftigen Mandibeln ist diese Art der vorigen sehr ähnlich, aber der Körper ist gestreckter, die Brustseiten sind fein gerunzelt, der Postpetiolus und das 2. Segment sind nicht quer, die Schenkel sind weniger dick und mehr rötlichgelb, die hintersten Schienen in der Mitte gelblich, die letzten Bauchsegmente sind rötlich.

L. 6—7 mm.

Südliches Schweden.

Ich habe in Thüringen mehrere Stücke gefangen, die ich zur Not auf diese Art beziehen kann, aber sie können auch der *H. hyalinatus* sein. Gedruckt nehmen sich die Gegensätze „Stigma und Bauchfalte braun“ und „Stigma und Bauchfalte gelblich“ ja ganz gut aus, aber in der Wirklichkeit weiss man nicht, für welche Frage man sich zu entscheiden hat.

24. **H. Bergmanni** Thoms. 1887 *Holocremna Bergmanni* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1182 ♀♂.

Wie die beiden vorigen besitzt diese Art ein dunkles Stigma und eine wenigstens an der Basis dunkle Bauchfalte; nach Thomson liegt der Hauptunterschied in den schwächeren Mandibeln. Das ist nun freilich ein sehr subtiles Merkmal; schon besser würde sich die Art unterscheiden lassen durch den bis über die Mitte hinaus weisslich gezeichneten Metatarsus.

Körper ziemlich schlank. Kopf nach hinten etwas verschmälert. Brustseiten vor dem Speculum deutlich gestreift. Beine schlank, die hintersten Schienen mit ungleichen Endsporen. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, Unterseite des Schaftes und Schulterbeulen gelblich. Stigma im Vorderflügel dunkel; Tegulä gelblichweiss. Beine rötlich, die vorderen Hüften und Trochanteren gelblich; die hintersten Hüften und Basis der Trochanteren schwarz; die hintersten Schienen rötlich, doppelt dunkel gezeichnet; die hintersten Tarsen braun, der Metatarsus bis über die Mitte hinaus weisslich. Hinterleib gegen das Ende hin an den Seiten rötlich; Bauchfalte an der Basis braun.

L. 5—6 mm.

Lund in Schweden. Wurde aus *Nematus Bergmanni* gezogen.

25. **H. hyalinatus** Holmgr. 1858 *Limneria hyalinata* Holmgr. Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 93 ♀ ♂ | 1880 *Limneria hyalinata* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 166 ♀ ♂ | ? 1844 *Campoplex pubescens* Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I p. 96 | ? 1852 *Campoplex pubescens* Ratzeburg, l. c. III p. 86 | 1887 *Holocremna pubescens* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1182 ♀ ♂.

Ich kann mich nicht entschliessen für diese Art den Namen *H. pubescens* Ratzeb. zu gebrauchen, wie es Thomson tut. Die Beschreibung, welche Ratzeburg gibt, ist ausserordentlich nichtssagend, zumal bei einer so schwierigen Gattung, wie es *Holocremnus* ist.

Körper dicht weisslich pubescent. Kopf nach hinten kaum verschmälert; Fühler wenig kürzer als der Körper; Seitenfelder des Metathorax nicht von einander getrennt; Area superomedia fünfseitig, etwas länger als breit, hinten offen. Areola im Vorderflügel kurz gestielt, Postpetiolus und das 2. Segment etwas länger als breit. — Schwarz; Palpen, Mandibeln, ein Fleck auf der Unterseite des Schaftes und Schulterbeulen gelblich. Fühlergeissel des ♀ gegen das Ende unten rötlich. Stigma im Vorderflügel rötlichgelb, Tegulä gelblichweiss. Beine rötlich, die vorderen Hüften und Trochanteren gelblich, die Hüften zuweilen an der Basis schwärzlich; die hintersten Hüften und Basis der Trochanteren schwarz; die hintersten Schienen gelblich, an der äussersten Basis weisslich, unterhalb davon meist verdunkelt, am Ende schwärzlich; die hintersten Tarsen braun, die ersten Glieder mit weisslicher Basis. Beim ♂ sind die hintersten Hüften braunrot. Nach Holmgren beschränkt sich die helle Zeichnung des Hinterleibs auf den schmalen Endsaum des 2. Segmentes; nach Thomson

ist die ganze Hinterleibsmittle braunrot. Brischke sagt, dass beim ♂ das 2. Segment rot mit schwarzer Basis ist, und dass die Segmente 3—5—6 ganz rot sind. Die Bauchfalte ist nach Thomson gelblich, nach Holmgren abwechselnd gelb und braun. Man sieht wieder, wie unsicher alle diese Arten sind.

L. 5—6 mm.

Nord- und Mitteleuropa. — Die Art lebt in *Cimbex* und verwandten Gattungen.

26. **H. argentatus** Grav. 1829 *Campoplex argentatus* Gravenhorst, *Ichneum. Eur.* III p. 543 ♀ (partim) | 1858 *Limneria argentata* Holmgren, *Svensk. Vet.-Akad. Handl.* II p. 81 ♀ ♂ | 1887 *Holocremna argentata* Thomson, *Opusc. Entom.* XI p. 1181 ♀ ♂.

Die von Gravenhorst und Holmgren unter *H. argentatus* beschriebene Art ist nicht scharf umgrenzt, namentlich die dazu gestellten Varietäten sind kaum zu deuten; die Art ist also im Sinne Thomson's aufzufassen. Von den bisherigen verwandten Arten mit hellen Schulterbeulen und heller Bauchfalte würde sie sich besonders durch den nach hinten deutlich verschmälerten Kopf und die kaum dunkel gezeichneten Hinterschienen unterscheiden. Ueber die Unterschiede von der eng verwandten *H. spiraeae* vergleiche man bei dieser.

Kopf wenig aufgetrieben, nach hinten verschmälert; Fühler länger als der halbe Körper; Mandibeln nicht kräftig; Gesicht weisslich behaart. Thorax länger als hoch, weisslich pubescent; Metathorax mit ziemlich deutlicher Costula; Area superomedia breit, fünfeckig, hinten offen; Brustseiten fast matt, Speculum wenig glänzend. Areola im Vorderflügel kurz gestielt oder sitzend, den rücklaufenden Nerv nicht weit hinter der Mitte aufnehmend. Hinterleib gegen das Ende zusammengedrückt; Postpetiolus beim ♀ fast etwas breiter als lang, beim ♂ quadratisch; das 2. Segment kaum länger als breit; Bohrer kaum vorragend. — Schwarz; Palpen, Mandibeln und Schulterbeulen gelblich; Fühler gegen das Ende unten rötlich; Schaft unten gelblich, seltener nur mit hellem Fleck. Flügel schwach getrübt, Stigma bräunlich; Tegulä gelblichweiss. Beine rötlichgelb, die vorderen Hüften und Trochanteren gelb. Die hintersten Hüften gibt Gravenhorst als rötlich oder schwarz (Var. 1 „*coxis omnibus nigris*“) an; auch Thomson gibt sie als hell an; dagegen sind sie nach Holmgren schwarz (*posticis coxis et basi trochanterum nigris*). Die hintersten Schienen sind nach Gravenhorst nahe der Basis und am Ende dunkel, an der äussersten Basis weisslich; die hintersten Tarsen

sind dunkelbraun, nur die Basis des Metatarsus hell. Dagegen sind die hintersten Schienen nach Thomson kaum dunkel gezeichnet; ebenso sind die hintersten Tarsen hell, die Spitzen der Glieder schwach verdunkelt. Also auch hier herrscht wieder viele Unklarheit. Endrand des 2. Segmentes rot; das 3. rot, oben an der Basis mit schwarzer Makel, die folgenden Segmente rot, auf dem Rücken schwarz gefleckt, oder schwarz, nach unten zu rot.

L. 6 mm.

Nord- und Mitteleuropa. — Als Wirte sind folgende Blattwespen bekannt: *Lophyrus pallidus*, *laricis*, *frutetorum*, *variegatus*, *similis* und *pini*, *Cladius uncinatus* und *Croesus septentrionalis*.

27. **H. spiraeae** Thoms. 1887 *Holocremna spiraeae* Thomson, Opusc. Entom. XI p. 1182 ♀.

Die von Thomson gegebene Beschreibung ist sehr kurz: „Schwarz, Hinterleibsende an den Seiten und Beine gelbrot. — Dem *H. argentatus* sehr ähnlich, aber Wangen stärker aufgetrieben, Beine dicker und die Endsporen der Schienen sehr ungleich.

L. 6 mm.“

Wurde von Dr. Kriechbaumer aus *Nematus spiraeae* gezogen.

## 6. Tribus **Paniscini**.

1900 Paniscini, Tribe VI, Ashmead, Smith's Insects of New Jersey, p. 582.

Oberflächlich betrachtet haben die Paniscinen eine grosse Aehnlichkeit mit den Ophioninen; die Mehrzahl von ihnen stimmt nicht allein in der rotgelben Färbung mit ihnen überein, sondern auch in den grossen Nebenaugen, die, wie bereits bei den Ophioninen erwähnt ist, auf eine nächtliche Lebensweise schliessen lassen. Das Vorhandensein einer Areola im Vorderflügel und die dadurch bedingte ganz andere Einmündung der rücklaufenden Nerven lässt beide Tribus sofort unterscheiden. Die rotgelbe Färbung der Paniscinen ist der Grund gewesen, dass die älteren Systematiker dieselben stets in die Nähe der Ophioninen gestellt haben, bei genauerer Prüfung ergibt sich jedoch, dass dieselben auch in enger Verwandtschaft zu der Unterfamilie der Tryphoninen stehen; so ist namentlich die Gattung *Absyrtus* eng mit *Perilissus* verwandt, wofern man von den dicht gekämmten Klauen absieht. Immerhin liegt noch lange kein zwingender Grund vor, die Tribus von ihrem altgewohnten Platze zu

entfernen und zu den Tryphoninen zu stellen und möchte ich gerade Neulinge in der Systematik vor solchen umstürzlerischen Ideen warnen. Auch mit den Mesochorinen ergibt sich eine grosse Verwandtschaft; letztere besitzen jedoch in der charakteristischen Areola und in den Analanhängen der Männchen so ausgezeichnete Merkmale, dass eine Trennung sehr leicht ist. Einen Uebergang zwischen beiden Tribus vermittelt die eigentümliche Gattung *Plesiophthalmus* Först. (*Cidaphus* aut.) Da die Männchen dieser Gattung die die Gattung *Mesochorus* auszeichnenden Analanhänge besitzen, gehört *Plesiophthalmus* besser zu dieser Tribus. Schwieriger ist ein scharfer Unterschied zwischen den Paniscinen und Banchinen; letztere sind schon sattsam durch die gedrungene Gestalt und andere Färbung ausgezeichnet, ausserdem besitzen sie einen deprimierten Hinterleibsstiel, eine grosse, mehr oder weniger rhombische Areola, falls eine solche vorhanden ist, und in der Regel einfache Klauen. Die Paniscinen haben eine gestreckte Radialzelle und ein langes und schmales Stigma. Die Parapsidenfurchen sind stets deutlich vorhanden; die Felderung des Metathorax ist unvollständig, oft nur durch Querleisten angedeutet; die Luftlöcher des Metathorax sind meist länglich. Die Klauen sind dicht und lang gekämmt. Der Hinterleib ist in der Regel deutlich von der Seite zusammengedrückt. Die Luftlöcher des 1. Segmentes sind vor, selten in der Mitte. Die Arten sind gross oder mittelgross, fast durchweg von rötlich-gelber Färbung.

#### Uebersicht der Gattungen.

1. Vorderflügel ohne Areola. Schildchen convex, an den Seiten nicht oder nur an der Basis ganz schwach gerandet. Die einzige Art, *O. Johnsoni* Ashm., ist ohne Beschreibung und ohne Angabe des Vaterlandes (jedenfalls Nordamerika) angeführt.

#### ***Opheltoides* Ashm.**

(Canad. Entomol. XXXII, 1900, p. 95.)

Areola im Vorderflügel deutlich vorhanden, nur bei *Parabatus* zuweilen fehlend; in diesem Falle Seiten des Schildchens ganz oder grösstenteils gerandet.

2. Kopf gross und aufgetrieben, mit breiten Wangen. Schildchen an den Seiten nicht gerandet. Metathorax sehr unegal durch hohe Leisten, Höcker und Seitenzähne, an der Basis mit tiefer Querfurchen. Grosse bräunlich gelbrote Arten mit dunkler Hinterleibsspitze und gelblichen oder bräunlichen Flügeln.

#### 1. ***Opheltes* Grav.**

Kopf nicht oder wenig aufgetrieben, mit schmalen Wangen. Schildchen wenigstens an der Basis gerandet. Färbung vorwiegend ockergelb. 3.

3. Luftlöcher des Metathorax rund. Der untere Zahn der Mandibeln länger als der obere. Der 2. Abschnitt des Radius eine fast gerade Linie und mit dem 1. Abschnitt an der Areola keinen scharfen Winkel bildend. Der rücklaufende Nerv mündet etwas vor dem Ende der Areola.

2. **Absyrtus** Holmgr.

Luftlöcher des Metathorax meist länglich. Der obere Zahn der Mandibeln länger als der untere. Der 2. Abschnitt des Radius an der Basis, also an der Areola, steil nach oben geschwungen und mit dem 1. Abschnitt einen rechten Winkel bildend. Der rücklaufende Nerv meist interstitial. 4.

4. Nervulus interstitial, sehr selten etwas vor der Gabel. Scheitel und Wangen hinten nicht durch eine Leiste abgegrenzt. Areola zuweilen fehlend.

3. **Parabatus** Thoms.

Nervulus weit hinter der Gabel. Hinterhaupt durch eine Leiste abgegrenzt. Areola stets vorhanden.

4. **Paniscus** Grav.

# 1. Gen. **Opheltes** Holmgr.

1858 Opheltes Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV p. 323.  
1860 Netelia Gray, Ann. and. Mag. Nat. Hist. V, p. 341.

Kopf gross und aufgetrieben, nach hinten verbreitert, hinten scharf gerandet und breit und tief ausgeschnitten; Augen innen kaum ausgerandet, nackt; Nebenaugen gross; Stirn glatt und glänzend, leicht eingedrückt; die inneren Orbiten leistenartig erhaben; Fühler von Körperlänge, allmählich zugespitzt; Schaft am Ende schräg abgestutzt; das 1. Geisselglied so lang wie die beiden folgenden zusammen; Gesicht glänzend, zerstreut und grob punktiert, in der Mitte der Länge nach erhöht, beiderseits davon eingedrückt; Wangen ziemlich lang und etwas aufgetrieben; Clypeus nicht deutlich vom Gesicht getrennt, am Ende abgestutzt; Mandibeln breit und kräftig, mit 2 gleichen Endzähnen; Maxillarpalpen fadenförmig; das vorletzte Glied der Labialpalpen beilförmig. Thorax robust, zerstreut punktiert, glänzend; Parapsidenfurchen deutlich, vorn tief; Mesopleuren hinten mit grob gekerbter Querfurchen; Schildchen vorn mit tiefer, scharfgerandeter Querfurchen, das Schildchen selbst wie bei Trogus pyramidenförmig erhaben. Zwischen Hinter-schildchen und Metathorax ein tiefer Querspalt; Metathorax

kurz, mit groben wulstartigen Leisten; vorn in der Mitte spitz höckerartig erhaben; von diesem Höcker laufen nach hinten 2 Leisten, welche die kleine und schmale, in der Mitte etwas verbreiterte Area superomedia einfassen; Area posteromedia halbkreisförmig, napfartig vertieft, glatt und glänzend, von einer hohen Kante umgeben. Die beiden hohen Längsleisten des Metathorax laufen hinten in eine Querlamelle aus. Luftlöcher verlängert. Stigma und Radialzelle lang; Radius an Basis und Spitze geschwungen; Areola klein, fast regelmässig fünfseitig, den rücklaufenden Nerv etwas hinter der Mitte aufnehmend; Basalnerv schräg und fast gerade; Discocubitalnerv einen Bogen bildend; Nervulus interstitial; Nervellus schräg nach aussen gestellt, deutlich über der Mitte gebrochen und einen deutlichen Nerv aussendend. Beine schlank; Schienenspornen etwa von  $\frac{1}{3}$  Schienenlänge; Klauen dicht und lang gekämmt. Hinterleib glatt und glänzend, gestielt, vom 2. Segment an deutlich von der Seite zusammengedrückt; das 1. Segment länger als die hintersten Hüften und Trochanteren, mit spaltenartigen Seitengrübchen; Luftlöcher wenig vor der Mitte; die folgenden Segmente deutlich länger als breit; das letzte Bauchsegment fast das Hinterleibsende erreichend; Bohrer kurz vorstehend, mit breiten Klappen.

Flügel stark gelblich getrübt, gegen den Endsaum mehr graulich. Stigma einfarbig rotgelb. Radialzelle unterhalb des Stigma nicht streifig getrübt.

1. **glaucopertus** L.

Flügel stark bräunlich getrübt, an der Basis gelblich. Stigma rotgelb, gegen die Spitze bräunlich. Radialzelle unterhalb des Stigma mit rauchigem Längsstreif.

2. **fuscipennis** Grav.

1. **O. glaucopertus** L. 1758 *Ichneumon glaucopertus* Linné, Syst. Nat. Ed. 10. p. 566 | 1798 *Ophion glaucopertus* Fabricius, Suppl. entom. Syst. p. 236 | 1829 *Paniscus glaucopertus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 633 ♀ | 1858 *Opheltes glaucopertus* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 30 ♀ | 1874 *Campoplex flavipennis* Provancher, Le Natural. Canad. VI p. 143 ♀.

Der ganze Körper rotgelb, der Thorax mehr bräunlich gelbrot. Fühlerspitzen bräunlich. Schwarz sind: Stirn, der Raum, in welchem die Ocellen stehen und der obere Teil des Hinterkopfes. Mesonotum meist mit 3 dunklen Längsstreifen, wovon der mittelste meist schwärzlich ist; schwarz sind am Thorax der grösste Teil des Prothorax und die untere Hälfte von Meso- und Metathorax, ebenso die Querspalte zwischen den beiden. In der Regel ist der ganze Metathorax schwarz und nur oben ein Quersfleck



rostgelb. Flügel stark gelblich getrübt, gegen den Endsaum graulich; Stigma rostgelb, Nervatur vorwiegend dunkelbraun, sonst rostgelb. Die hintersten Hüften an der Basis unten gewöhnlich schwarz gefleckt. Hinterleibsende, in der Regel vom 5. Segmente an schwarz, das 5. Segment gewöhnlich an der Basis und unten rotgelb.

L. 22—26 mm.

Fast ganz Europa; ausserdem auch in Nordamerika. Nach meinen Beobachtungen fliegt die Art sehr spät im Jahre; ich habe sie hier in Thüringen noch Ende Oktober um Erlenbüsche fliegend angetroffen. Ich habe das Tier mehrfach auf der Veranda meines Hauses abends an der Lampe gefangen, ein Beweis, dass das Tier auch in Bezug auf seine Lebensweise zu den Ophioninen, speziell Paniscinen zu stellen ist. — Opheltes lebt in verschiedenen Cimbex-Arten; sicherlich ist diese auffallende Schlupfwespe da, wo es viele Cimbex gibt, häufig; hier in Thüringen ist sie selten. In Nordamerika lebt sie bei Cimbex americanus Leach.

2. **O. fuscipennis** Grav. 1829 Paniscus fuscipennis Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 635 ♀.

Die Art unterscheidet sich von der vorhergehenden nur durch die Färbung der Flügel, wenigstens habe ich keinen anderen Unterschied herausgefunden. Es ist das eines von den zahlreichen Beispielen, dass sonst gleiche Tiere, namentlich zahlreiche Ichneumoniden, auch Arten der Bienengattung Sphecodes, ich erinnere auch an Bombus hortorum var. argillaceus, im Norden helle, im Süden dunkle Flügel haben. Sollen wir sie als geographische Formen derselben Art auffassen oder beanspruchen sie bereits den Wert einer eigenen Art? — Ich finde, dass bei O. fuscipennis die Grundfärbung ein etwas dunkleres Rot ist. Die Flügel sind nur an der Basis gelblich, sonst rauchig graubraun, mit schwachem violetten Schimmer. Das Stigma ist rostgelb, an der Basis heller, gegen das Ende bräunlich. Die Radialzelle ist unterhalb des Stigmas in einem schmalen Streifen gelblich und darunter ist wieder ein rauchiger dunkler Streif.

Die Art scheint durchweg etwas kleiner als O. glaucopterus zu sein; sie gehört dem Süden an. Gravenhorst hatte seine Exemplare von Oberitalien. So oft ich nach Bozen gekommen bin, so oft habe ich auch Opheltes fuscipennis am Calvarienberg gefangen.

2. Gen. **Absyrtus** Holmgr.

1858 Absyrtus Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV p. 323.

Kopf quer, schwach aufgetrieben, ähnlich wie bei Perilissus gebildet; Augen gross, bis fast zur Mandibelbasis reichend, innen leicht ausgerandet; Nebenaugen gross; Fühler dünn, fadenförmig, länger als der Körper; Schaft schräg abgestutzt; Gesicht quer, flach, wie Stirn und Scheitel matt; Clypeus vom Gesicht getrennt, nach vorn stehend, am Ende abgestutzt, schwach glänzend; Seitengruben klein; der untere Zahn der Mandibeln länger als der obere; Palpen lang, fadenförmig. Thorax glatt und ziemlich glänzend, etwas schmaler als der Kopf; Metathorax fast ohne Felderung, nur hinten mit Spuren von Längs- und Querleisten; Luftlöcher rundlich; Brustseiten glatt und glänzend. Flügel gross und breit; Stigma halb elliptisch; Radius etwas vor der Mitte des Stigma entspringend; Basal- und namentlich der Endabschnitt des Radius gerade, nicht wie bei Parabatus und Paniscus geschwungen; beide Abschnitte bilden an der Areola einen sehr flachen, etwas abgerundeten Winkel; Areola klein, unregelmässig, gestielt, den rücklaufenden Nerv kurz vor dem Endwinkel aufnehmend; Basal- und Cubitalnerv parallel; Nervus parallelus aus der Mitte der Brachialzelle entspringend; Nervulus hinter der Gabel; Nervellus postfurkal, wenig über der Mitte gebrochen und einen deutlichen Nerv aussendend. Beine schlank; Endsporen der Schienen nicht die Mitte des Metatarsus erreichend; Klauenglied und Klauen klein, letztere dicht gekämmt. Hinterleib gestielt, glatt und glänzend, fein weisslich pubescent, beim ♀ hinten nur wenig zusammengedrückt, am Ende breit abgestutzt; das 1. Segment gerade, etwa  $\frac{1}{3}$  der Hinterleibslänge ausmachend, an den Seiten gerandet; Luftlöcher etwas vor der Mitte; das 2. Segment um die Hälfte länger als breit, wenig länger als das 3. Segment; das 4. quadratisch; das letzte Bauchsegment pflugscharförmig absteigend, die Spitze des Hinterleibs erreichend; Bohrer kurz vorstehend, das Hinterleibsende kaum überragend.

**A. luteus** Holmgr. 1858 Absyrtus luteus Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV p. 323 ♀♂.

Das ganze Tier rötlichgelb, von gleicher Färbung wie Ophion und Paniscus, nur Augen, Nebenaugen, der Raum zwischen diesen, Spitzen der Mandibeln und eine Makel hinter der Basis der Vorderflügel schwarz. Flügel leicht gelblich getrübt, Stigma gelb; Nervatur gelblich, an der Basis des Vorderflügels schwärzlich.

L. 8—12 mm.

Nord- und Mitteleuropa. — Hier in Blankenburg in Thüringen im Spätsommer an grasigen, etwas feuchten

Orten, namentlich zwischen Erlen, ein sehr häufiges Tier. Sicherlich wird dasselbe vielfach übersehen und verwechselt. Die Art hat grosse Aehnlichkeit mit *Perilissus pallidus*, wohl auch mit *Alexeter* (*Mesoleptus*) *testaceus*. Bei diesen beiden sind die Klauen nicht gekämmt, sondern zeigen höchstens einige scharfe Börstchen. *Perilissus pallidus* zeigt auf dem Metathorax immer eine feine Felderung, namentlich eine *Area superomedia*; *Mesoleptus testaceus* hat eine durchweg mehr rötlichere Färbung. *Parabatus* und *Paniscus* unterscheiden sich sofort durch den an der Basis stark geschwungenen Endabschnitt des Radius. — Ueber die Lebensweise ist noch nichts bekannt.

### 3. Gen. **Parabatus** Thoms.

1888 *Parabatus* Thomson, Opusc. Entom. XII p. 1194.

Anmerk. Ich habe bereits in meinen „Die Hymenopteren Mitteleuropas“ ausgesprochen, dass *Parabates* Förster gar nichts mit der vorliegenden Gattung zu tun hat. Was freilich Förster unter *Parabates* verstanden hat, ist schwer zu sagen.

Kopf hinten ohne scharfe, den Hinterkopf abgrenzende Leiste, sondern hinten abgerundet; Augen gross, innen tief ausgebuchtet; Nebenaugen sehr gross, fast an die Augen stossend; Fühler borstenförmig, länger als der Körper, rostgelb, selten gegen das Ende braun; Schaft ausgeschnitten, *Pedicellus* ziemlich gross, *Annellus* deutlich; das 1. Geisselglied etwas, aber nicht um die Hälfte länger als das folgende Glied; Wangen sehr kurz; Mandibeln schwach, der obere Endzahn spitz, der untere klein und weit von der Spitze entfernt; Palpen lang, *Clypeus* mit tiefen Seitengruben, vom Gesicht nur schwach getrennt. Thorax ziemlich gedrungen; *Mesonotum* mit deutlichen *Parapsidenfurchen* wenigstens bis zur Mitte; Seiten des Schildchens gerandet, selten nur an der Basis; Metathorax kurz, mit runden oder kurz ovalen Luftlöchern, gewöhnlich hinten ohne Seitenquerkiele. Flügel gross, hyalin, *Stigma* ziemlich breit; *Areola* meist vorhanden; Endabschnitt des Radius an seiner Basis, also an der *Areola*, ziemlich steil aufsteigend; Cubitalnerv mit dem Basalnerv convergierend; Nervus parallelus oberhalb der Mitte aus der Brachialzelle entspringend; Nervulus interstitial oder kurz vor oder hinter der Gabel stehend; im Unterflügel die *Abcissula* doppelt so lang als der rücklaufende Nerv; Nervellus stark schräg nach aussen gestellt. Beine schlank; Schienen mit zerstreuten Dörnchen; Schienenspornen lang und ungleich, die hintersten Tarsen blassgelb oder weisslich; Endglied der Tarsen wenig länger als das vorhergehende Glied; Klauen dicht und lang gekämmt. Hinterleib

weniger stark zusammengedrückt als bei *Paniscus*; das 1. Segment an den Seiten nicht gerandet, mit tiefen, fast durchscheinenden Seitengruben; Luftlöcher am Ende des ersten Drittels liegend; das 2. Segment an den Seiten fast ganz, das 3. wenigstens bis zu den Luftlöchern gerandet; Bohrer meist sehr kurz oder versteckt. Männchen mit grossen Analklappen.

Es könnte wie bei so vielen Gattungen die Frage aufgeworfen werden, ob das nicht immer deutliche Vorhandensein oder Fehlen der Hinterhauptsleiste und die etwas schwankende Stellung des Nervulus genügt, um die beiden Gattungen *Parabatus* und *Paniscus* von einander zu trennen. Wem diese Unterscheidungsmerkmale nicht genügen, der mag die *Parabatus*-Arten mit zu *Paniscus* rechnen, aber er mag nicht behaupten, dass *Parabatus* und zahlreiche andere Gattungen nicht aufrecht erhalten werden können.

Wie bei *Ophion* herrscht bei den Arten von *Parabatus* und *Paniscus* eine ungemeine Einförmigkeit in Skulptur und Färbung. So stösst die Unterscheidung der Arten auf fast unüberwindliche Schwierigkeiten, besonders wenn man auch aussereuropäisches Material mit verarbeiten will. Ich habe in Java zahlreiche Exemplare gefangen, die ich von europäischen Arten absolut nicht unterscheiden kann.

#### Uebersicht der Arten.

1. Stigma braun bis schwärzlich. Areola im Vorderflügel fehlend, höchstens der Aussennerv oben oder unten angedeutet. Mesonotum meist mit Andeutung von 3 dunklen Längsstreifen. Bohrer so lang wie das 1. Segment. 5—7 mm.

##### 1. **nigricarpus** Thoms.

Stigma blassgelb, selten bräunlichgelb. Areola sehr selten fehlend. 2.

2. Kopf und Thorax mit ausgedehnter blassgelber oder weisslicher Zeichnung. 3.

Kopf und Thorax ohne oder mit undeutlicher hellerer Zeichnung. 6.

3. Kopf und Thorax mit schneeweissen Zeichnungen. Areola lang gestielt oder unvollständig, zuweilen ganz fehlend. Bohrer fast so lang wie das 1. Segment. Kleinere Art von 7—8 mm. Länge.

##### 2. **millieratae** Kriechb.

Kopf und Thorax mit blassgelben Zeichnungen. Areola meist deutlich ausgeprägt. Grössere Arten. 4.

4. Grosse Art von 15 mm Länge. Mesonotum ohne dunkle Zeichnung. Grundfärbung des Körpers, namentlich des Thorax nicht rotgelb, sondern reiner gelb.

3. **pallescens** n. sp.

Kleinere Arten von höchstens 13 mm Länge. Mesonotum mit 3 mehr oder weniger deutlichen dunklen Längsstreifen. 5.

5. Stigma bräunlichgelb. Kleinere Art von 9—11 mm.

4. **tarsatus** Brischke.

Stigma blassgelb. Grössere Art von 12—13 mm.

5. **gansuanus** Kok.

6. Mesonotum mit 3 dunklen Längsbinden. Mittelbrust schwarz gezeichnet. Metathorax hinten ohne Querleisten an den Seiten. Hintertarsen weisslich. Bohrer kaum vortretend. 7—10 mm.

6. **virgatus** Grav.

Mesonotum ohne deutliche dunkle Längsbinden. Mittelbrust nicht schwarz gezeichnet. 7.

7. Kleine Art von 6—8 mm. Metathorax abgerundet, hinten an den Seiten ohne Spur einer Querleiste. Klauen den Petiolus kaum überragend, Schildchen undeutlich gerandet.

7. **latungula** Thoms.

Grössere Arten von 10—15 mm. Metathorax hinten an den Seiten mit einer deutlichen Querleiste. Klauen den Pulvillus um das Doppelte überragend. Schildchen an den Seiten deutlicher gerandet. Die hintersten Tarsen weisslich. 8.

8. Nervulus interstitial. Bohrer deutlich vortretend.

8. **cristatus** Thoms.

Nervulus ziemlich weit vor der Gabel. Bohrer kaum vortretend.

9. **Franki** Brauns.

1. **P. nigricarpus** Thoms. 1888 *Parabatus nigricarpus* Thomson, *Opusc. Entom.* XII p. 1196 ♀ | 1889 *Parabatus nigricarpus* Brauns, *Arch. Naturg. Mecklenb.* XLIII p. 80 | 1899 *Paniscus* (*Parabatus*) *nigricarpus* Kokujew, *Horae Soc. Ent. Ross.* XXXIV p. 139.

Diese Art ist ausgezeichnet durch zierlichen Körper, dunkles Stigma, fehlende Areola und langen Bohrer.

Körper weit schlanker und zierlicher als bei den folgenden Arten, vielleicht mit Ausnahme von *P. tarsatus* Brischke. Kopf kurz, nach hinten rundlich verschmälert; Augen

gross, bis fast zur Mandibelbasis reichend, innen deutlich ausgerandet; Fühler weit länger als der Körper. Stirn und Schenkel schwach glänzend, Gesicht matt. Schildchen an den Seiten nicht gerandet; Metathorax glatt und ziemlich glänzend, mit rundlichen Luftlöchern, hinten beiderseits ohne Querleiste. Aussennerv der Areola im Vorderflügel fehlend, meist ist aber oben ein kleiner Ansatz davon vorhanden; Nervulus interstitial oder kurz hinter der Gabel; Nervus parallelus weit über der Mitte aus der Brachialzelle entspringend. Beine sehr schlank. Hinterleib gegen das Ende stark zusammengedrückt, bis an das Ende des 3. Segmentes seitlich gerandet; Bohrer so lang wie das 1. Segment. — Kopf blass zitrongelb, der übrige Körper blass ockergelb, Hinterleib mehr in das Bräunliche. Die 3 dunklen Längshinden des Mesonotums, welche Thomson als regelmässig vorhanden angibt, sind bei zahlreichen Exemplaren von hier nur angedeutet; das Gleiche ist der Fall mit der dunklen Färbung hinter der Basis des 1. Segments. Augen und Nebenaugen schwarz, der Raum zwischen den Nebenaugen (Stemmatium) meist braun. Hinter der Basis der Vorderflügel ein schwarzer Punktfleck. Schildchen und Metathorax bei einzelnen Arten verdunkelt. Flügel fast hyalin, Stigma braun bis schwärzlich.

L. 5—7 mm.

Die Art wurde zuerst von Thomson in Schweden aufgefunden. In vielen Gegenden scheint die Art ganz zu fehlen oder wenigstens sehr selten zu sein. Hier bei Blankenburg in Thüringen findet sie sich ausschliesslich an feuchten und schattigen Stellen im Grase zwischen Erlen in der Nähe der Schwarza; an solchen Oertlichkeiten ist das Tier in manchen Jahren durchaus keine Seltenheit.

2. **P. millieratae** Kriechb. 1897 *Parabatus millieratae* Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII p. 316 ♀♂.

♀ Blass rötlichgelb; von schneeweisser Färbung sind: Mund zum Teil, Gesicht, die hinteren Orbiten breit, Prothorax, Flecken der Brustseiten, 2 Linien des Mesonotums und die Seiten des Schildchens. Stigma gross, blassgelb, schmal dunkel umgrenzt; Areola im Vorderflügel lang gestielt, meist unvollständig, in einzelnen Fällen ganz fehlend. Bohrer fast so lang wie das 1. Segment.

L. 6—7 mm.

♂ Die vorderen Hüften und Trochanteren und die hintersten Hüften unten und am Ende weiss; die hintersten Tarsen gelb, die Spitze der Glieder braun.

L. 7—8 mm.

Die Art wurde aus Raupen der seltenen und fast verschollenen *Eupithecia millierata* Stgr. gezogen; die Raupen selbst stammten von Cannes an der Riviera.

Ich möchte zu dieser Art bemerken, dass sie vielleicht als eine südliche Form des *P. tarsatus* Brischke aufgefasst werden könnte, bei welcher die blassgelbe Färbung weiss geworden ist. Ich komme darauf, weil auch *P. tarsatus* aus verschiedenen *Eupithecia*-Arten gezogen worden ist.

### 3. *P. pallescens* n. sp.

Ich würde das als neue Art beschriebene Stück für eine abweichende Färbung des *P. cristatus* gehalten haben, wenn nicht die hinteren Querleisten des Metathorax vollständig fehlten.

♂ Kopf kurz, nach hinten etwas verschmälert; Stirn und Scheitel glänzend, Gesicht matt; Augen innen ausgerandet; Nebenaugen fast an die Augen stossend; Fühler kräftig, etwas länger als der Körper. Mesonotum schwach glänzend, der übrige Thorax matt; Schildchen mit sehr schwachen Seitenleisten; Metathorax mit länglichen Luftlöchern, hinten an den Seiten ohne Querleisten. Nervulus interstitial; Nervus parallelus weit über der Mitte der Brachialzelle entspringend. Klauen den Pulvillus weit überragend. Hinterleib wie bei *P. cristatus*. — Kopf, Thorax und Beine blassgelb, Fühler und hinterste Schenkel rötlichgelb, der Hinterleib noch dunkler rotgelb, so wie bei den gewöhnlichen *Ophion*- und *Paniscus*-Arten gefärbt; Mesonotum mehr rötlichgelb, sodass nur die Nähte blassgelb bleiben; auch die Unterseite des Thorax und der Metathorax verschwommen rötlichgelb gezeichnet. Hintertarsen gelblich-weiss. Flügel leicht getrübt; Stigma rötlichgelb; Nervatur braun, an der Flügelbasis fast schwärzlich.

L. 25 mm.

Ein Männchen aus der Umgebung von Blankenburg in Thüringen.

4. *P. tarsatus* Brischke. 1880 *Paniscus tarsatus* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV p. 138 ♀♂ | 1889 *Parabatus tarsatus* Bridgman, Trans. Entom. Soc. London p. 420 | 1899 *Paniscus* (*Parabatus*) *tarsatus* Kokujew, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV p. 130.

Körper schlank. Kopf hinter den Augen schmaler; Fühler von Körperlänge, die Glieder 3 und 4 von gleicher Länge. Mesonotum mit deutlichen Parapsidenfurchen, fast dreilappig, Metathorax ohne Leisten. Areola im Vorderflügel sitzend oder gestielt, zuweilen fast fehlend. Beine schlank. Bohrer so lang wie das 1. Segment. — Rötlichgelb; Augen

und Nebenaugen schwarz; Palpen, Mandibeln mit Ausnahme der schwarzen Zähne, Clypeus, Gesicht, äussere Augenränder, Tegulä, Fleck unter den Flügeln, meistens auch die Seitennähte gelb, der Mittellappen des Mesonotums und oft auch ein Streif beiderseits braunschwarz; zuweilen ist das Mesonotum ganz rötlichgelb; beim ♂ ist die Mittelbrust zuweilen braunschwarz. Stigma bräunlichgelb. Hintertarsen weisslich, Basis des Metatarsus rötlichgelb. Bohrer braun.

L. 9—11 mm.

Nord- und Mitteleuropa; hier in Thüringen einzeln. — Aus Raupen von *Drepana falcula* und *unguicula*, *Eupithecia absynthiaria*, *exiguaria*, *lariciaria*, *succenturiaria* und *castigaria*.

5. **P. gansuanus** Kok. 1906 *Parabates gansuanus* Kokujew, *Revue Russe d'Entom.* p. 166 ♂.

Kopf nach hinten rundlich verschmälert; Nebenaugen gross, an die Augen stossend; Augen bis zur Mandibelbasis reichend; Gesicht matt, deutlich punktiert, ziemlich flach, nur in der Mitte schwach erhaben; Clypeus am Ende abgerundet, mit schwarzen Seitengrübchen. Thorax dünn behaart, fein und zerstreut punktiert, schwach glänzend; Mesonotum ziemlich matt, mit tiefen, bis über die Mitte reichenden Parapsidenfurchen; Schildchenseiten bis fast zur Mitte leicht gerandet; Metathorax mit ovalen Luftlöchern; Seitenleisten hinten fehlend. Flügel breit; Stigma ziemlich schmal; Areola dreieckig, den rücklaufenden Nerv im Endwinkel aufnehmend. Beine schlank, das vorletzte Glied der hintersten Tarsen doppelt so lang als breit. Hinterleib fast doppelt so lang als Kopf und Thorax zusammen, seitlich bis zu den Luftlöchern des 3. Segments gerandet; das 1. Segment in der Mitte mit Längsfurche, das 2. Segment in der Mitte der Basis eingedrückt; Analklappen sehr gross. — Rötlichgelb; Kopf fast ganz gelb; Mesonotum mit undeutlichen hellen Linien; Mesopleuren zum Teil blassgelb; 3 Längsstreifen des Mesonotums und die Schildchenränder bräunlich; Flügel hyalin, mit gelblichem, fast durchsichtigem Stigma. Die hintersten Tarsen blassgelb.

L. 12—13 mm. — ♀ unbekannt.

Die Art wurde in China und zwar in der Provinz Gansu (bei Atu-lunva) aufgefunden.



6. **P. virgatus** Fourcr. 1785 *Ichneumon virgatus* Fourcroy, Entom. Paris. II. p. 401 | 1829 *Paniscus virgatus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 625 ♀♂ | 1888 *Parabatus virgatus* Thomson, Opusc. Entom. XII p. 1197 ♀♂ | 1889 *Parabatus virgatus* Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII p. 80 ♀♂.

Diese nicht seltene Art ist eine der leicht kenntlichsten, ausgezeichnet durch die 3 dunklen Längsflecken des Mesonotums, den dunklen Brustfleck, die fehlenden Seitenleisten des Metathorax und den kaum vorstehenden Bohrer.

Kopf und Thorax schwach glänzend, Gesicht matt. Kopf kurz, nach hinten rundlich verschmälert; Augen innen deutlich ausgerandet; Nebenaugen gross, an die Augen stossend; Fühler länger als der Körper, dünn. Schildchen-seiten nur bis zur Mitte schwach gerandet; Metathorax mit rundlichovalen Luftlöchern, hinten mit fehlenden oder ganz schwachen Querleisten an den Seiten. Flügel gross und breit; Areola dreieckig, kurz gestielt, der rücklaufende Nerv meist ausserhalb der Areola mündend; Nervulus interstitial oder dicht hinter der Gabel mündend; Nervus parallelus weit über der Mitte aus der Brachialzelle entspringend. Beine ziemlich kräftig. Hinterleib fein pubescent, ziemlich glänzend, von der Seite zusammengedrückt; Bohrer nicht vorragend. — Die Grundfärbung ist bei dieser Art im allgemeinen dunkler, also mehr gelbrot als bei den verwandten Arten; die Augenränder und meist auch das Schildchen sind in der Regel etwas heller. Das Mesonotum besitzt 3 dunkle Längsstreifen, wovon der mittlere hintere abgekürzt ist, ebenso hat die Mittelbrust einen grossen braunen Querfleck. Nicht selten treten auch auf den hinteren Hinterleibssegmenten verschwommene, dunkle Flecke auf, beim ♂ ist zuweilen das ganze Hinterleibsende dunkel. Flügel schwach getrübt mit rötlichgelbem Stigma. Die hintersten Tarsen sind stets gelblichweiss.

Die Art schwankt sehr in der Grösse, die etwa 7—14 mm beträgt; im Durchschnitt ist sie kleiner als *P. cristatus*.

Eine der häufigsten Arten und über ganz Europa verbreitet; von mir auch in Algerien gefunden.

Als Wirte werden angeführt: *Odontopera bidentata*, *Eupithecia absynthiata* und *succenturiata*, *Drepana unguicula*, *Dicranura bifida*, *Cosmia trapezina*, *Hadena pisi*, *Catocala promissa* und *Halias prasinana*.

7. **P. latungula** Thoms. 1888 *Parabatus latungula* Thomson, Opusc. Entom. XII p. 1196 ♀♂ | 1889 *Parabatus latungula* Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII p. 81 ♀♂ | 1899 *Paniscus* (*Parabatus*) *latungula* Kokujew, Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV p. 136.

Die Art stimmt im Grossen und Ganzen mit *P. virgatus* überein, sie ist aber viel kleiner, überhaupt die kleinste

bekannte *Parabatus*-Art und es fehlen ihr die charakteristischen dunklen Zeichnungen. Das Schildchen ist an den Seiten fast gar nicht gerandet; der Metathorax zeigt hinten an den Seiten keine Spur von Querleisten; die Luftlöcher sind rundlich. Die hintersten Schiensporen erreichen die Mitte des Metatarsus, das vorletzte Tarsenglied ist wenig länger als breit, die Klauen überragen kaum den Pulvillus. Bohrer wie bei *P. virgatus* nach oben geschlagen, nicht vorstehend. — Das ganze Tier ist gelbrot, Gesichtsseiten und Orbiten, wie bei *P. virgatus* gewöhnlich verschwommen blassgelb; die hinteren Rückensegmente zeigen zuweilen dunklere Flecken; die hintersten Tarsen sind beim ♀ wenig heller gefärbt; beim ♂ deutlicher. Flügel mit blassgelbem Stigma.

L. 6—8 mm.

Schon Brauns sagt, dass *P. latungula* die häufigste Art ist, das trifft auch für Thüringen zu. Man trifft die Art meist gesellig an; sie umschwärmt mit Vorliebe im Mai und Juni das junge Laub, namentlich von Buche und Ahorn. — Ueber die Wirte ist nichts Sicheres bekannt, wahrscheinlich dürften es dieselben oder verwandte Lepidopteren wie bei *P. virgatus* sein.

8. ***P. cristatus*** Thoms. 1888 *Parabatus cristatus* Thomson, Opusc. Entom. XII p. 1197 ♀ ♂ | 1889 *Parabatus cristatus* Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII p. 81 | 1899 *Paniscus* (*Parabatus*) *cristatus* Kokujew, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV p. 136.

*P. cristatus* ist die grösste Art, überdies ausgezeichnet durch die deutlichen Querleisten am Ende des Metathorax, das ziemlich deutlich gerandete Schildchen und die gleichmässige Färbung. Mit *Parabatus*-Arten kann sie nicht verwechselt werden, eher hat sie noch Aehnlichkeit mit den grösseren, gleichmässig rotgelb gefärbten *Paniscus*-Arten.

Körper kräftig und gedrungen, ziemlich stark glänzend. Kopf kurz, nach hinten nicht verschmälert, sondern nur abgerundet; Augen innen deutlich ausgerandet; Nebenaugen gross, bis fast an die Augen reichend; Fühler kräftig, etwas länger als der Körper; Gesicht und Clypeus zerstreut punktiert, ziemlich stark glänzend. Thorax fein weisslich pubescent; Schildchen an den Seiten deutlich gerandet, Metathorax mit Spuren feiner Querstreifung, hinten an den Seiten mit gebogener Querleiste; die Luftlöcher oval. Areola dreieckig, kurz gestielt; der rücklaufende Nerv in der Regel etwas ausserhalb der Areola mündend; Nervulus interstitial. Die hintersten Klauen fast doppelt

so lang als der Pulvillus. Hinterleib fein gelblich pubescent, deutlich von der Seite zusammengedrückt; das 1. Segment mit starken Seitengrübchen (Glymmen); das 3. Segment nur bis zu den Luftlöchern mit Seitenrand; Bohrer ziemlich weit vorragend. — Das ganze Tier rotgelb, Kopf, namentlich Augenränder, meist auch die Nähte des Mesonotums und das Schildchen unbestimmt gelb gezeichnet; beim ♂ ist oft der ganze Vorderkopf grösstenteils gelb. Augen und Nebenaugen schwarz. Flügel leicht gelblichgrau getrübt, Stigma rostgelb. Die hintersten Tarsen weisslich.

L. 10—15 mm.

Nord- und Mitteleuropa. Nach Thomson ist die Art in Schweden selten; hier in Thüringen ist das Tier durchaus nicht selten; ich weiss Jahre, wo die Art geradezu in Menge auftrat. Ueber die Wirte ist nichts Genaues bekannt.

9. **P. Franki** Brauns. 1889 Parabatus Franki Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII p. 80 ♀ | 1899 Parabatus Franki Kokujew, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV p. 136 ♀ nota.

Brauns sagt von dieser Art Folgendes: „Diese von mir aufgestellte und meinem verehrten Freunde, Herrn Eisenbahnsekretär Frank in Erfurt, gewidmete Art bildet durch die Einmündung des Nervulus (derselbe steht weit vor der Gabel) eine eigentümliche Uebergangsform zu Paniscus. Durch dieses auffallende Kennzeichen unterscheidet sie sich namentlich von *P. cristatus* Thoms., dem sie in der Grösse gleichkommt und mit dem sie auch die deutlichen Seitenleistchen des Metathorax gemein hat; allein bei *P. cristatus* ragt der Bohrer bedeutend vor, bei *P. Franki* nicht; bei letzterem mündet ferner der rücklaufende Nerv bedeutend hinter der Areola ein, das Schildchen ist nur bis etwa zur Mitte gerandet. Herr Frank erbeutete nur ein Weibchen bei Erfurt.“

Obwohl mein Wohnort, Blankenburg in Thüringen, nicht weit von Erfurt liegt und wir *Parabatus* und *Paniscus* in Menge hier haben, ist mir die Art noch nicht vorgekommen.

#### 4. Gen. **Paniscus** Schrank.

1802 *Paniscus* Schrank, Fauna Boica II. P. 2. p. 316.

Kopf nach hinten selten erweitert; Nebenaugen oft von den Augen entfernt; Hinterkopf durch eine bis zu den Wangen herablaufende Leiste vom Vorderkopf getrennt. Metathorax

nicht selten sehr fein quergestreift, mit ovalen Luftlöchern. Nervulus deutlich und meist weit hinter der Gabel stehend. Schienen an der Aussenseite mit feinen Dörnchen besetzt; Fussklauen weit länger als der Pulvillus. Hinterleibsstiel im allgemeinen länger als bei *Parabatus*; Bohrer stets deutlich vorragend.

Die Unterschiede zwischen *Parabatus* und *Paniscus* sind bei der ersteren Gattung auseinander gesetzt; bei den kleineren Arten und Exemplaren ist die Hinterhauptsleiste oft wenig ausgeprägt. — Ich habe bereits bei *Ophion* und *Parabatus* ausgesprochen, dass eine scharfe Artunterscheidung bei diesen in Plastik und Färbung so einförmigen Gattungen kaum möglich ist, ich habe auch bereits erwähnt, dass diese Einförmigkeit sich nicht blos auf die Paläarkten beschränkt, dass z. B. die zahlreichen *Paniscus*, die ich auf Java gefangen habe, sich in keiner Weise von den Europäern unterscheiden.

#### Uebersicht der Arten.

1. Seitengrübchen (Glymmen) des 1. Segmentes schwarz. 2. Seitengrübchen des 1. Segmentes nicht schwarz. 8.
2. Kopf, Thorax und Hüften schwarz. Stigma braun. Fühler kürzer als der Körper. Metathorax hinten mit starken Querleisten. 14 mm.

##### 1. **Grumi** Kok.

Kopf, Thorax und Hüften nicht gleichzeitig schwarz. Stigma in der Regel hell. 3.

3. Thorax nicht weiss gezeichnet. Fühler kürzer als der Körper, schwärzlich, an der Basis hell. 4. Thorax weiss gezeichnet. 6.

4. Das 1. Segment in der Mitte mit Längsfurche. Kopf hinter den Augen erweitert. Fühler schwärzlich, mit heller Basis. Nebenaugen nicht an die Augen stossend. Thorax ziemlich glänzend. Nervulus weit hinter der Gabel. 6 mm.

##### 2. **dilatatus** Thoms.

Das 1. Segment ohne Längsfurche. Kopf nach hinten nicht erweitert. 5.

5. Beine rotgelb, die hintersten Schenkel und Schienen nicht verdunkelt. Seitenleisten am Ende des Metathorax verwischt oder fehlend. Stigma gelblich. Mesonotum und Brust zuweilen mit dunkler Zeichnung. Kleinere Art von 6—10 mm.

##### 3. **brachycerus** Thoms.

Die hintersten Schenkel und Schienen verdunkelt. Metathorax hinten an den Seiten mit starken Querleisten. Stigma dunkel. Raum zwischen den Nebenaugen, Hinterleibsspitze und Bauch schwärzlich. Grosse Art von 16 mm.

4. **Ahnger**i Kok.

6. Schildchen an den Seiten nicht gerandet. Gelbrot, reichlich weiss gezeichnet. Metathorax glatt, fast ohne alle Leisten. 15 mm.

5. **elegans** Szepl.

Schildchen an den Seiten gerandet. 7.

7. Metathorax zum grossen Teil schwarz. Mesonotum mit weissen Linien. 10 mm.

6. **Schirjajewi** Kok.

Metathorax kaum dunkel gezeichnet. Mesonotum ohne weisse Linien. 10 mm.

7. **genalis** Kok.

8. Der Raum zwischen den Nebenaugen (Stemmatium) nicht schwarz. 9.

Der Raum zwischen den Nebenaugen schwarz. 20.

9. Stigma bräunlich, kaum durchscheinend. Kopf nach hinten verschmälert. Mesonotum matt; Schildchen bis an das Ende gerandet. Metathorax mit deutlichen Querleisten. 13—14 mm.

8. **fuscicarpus** Kok.

Stigma gelb, durchscheinend. 10.

10. Hinterleib schwarz, nur an der Basis rötlich. Der ganze Körper, namentlich auch der Metathorax glänzend. Kopf und Thorax reich gelblichweiss gezeichnet. 10 mm.

9. **pharaonum** n. sp.

Hinterleib höchstens am Ende verdunkelt. Körper weniger stark glänzend. 11.

11. Seiten des Schildchens nur an der Basis gerandet. Thorax oft weiss gezeichnet. 12.

Seiten des Schildchens bis fast zur Spitze gerandet. 16.

12. Nervulus weit hinter der Gabel stehend und ziemlich schief. 13.

Nervulus kurz hinter der Gabel stehend und ziemlich gerade. 14.

13. Das 1. Segment in der Mitte mit Längsfurche. Das 4. Fühlerglied kurz, doppelt so lang wie breit, etwa so lang wie der Schaft. 8—10 mm.

10. **turanicus** Kok.

Das 1. Segment in der Mitte ohne Längsfurche. Das 4. Fühlerglied 3 mal so lang als breit, fast doppelt so lang als der Schaft. 10—12 mm.

11. **Thomsoni** Brauns.

14. Hintertarsen gelblichrot. Mesonotum mit 4 weisslichgelben Längslinien, auch Schildchen, Metathorax und Brustseiten hell gezeichnet. Metathorax hinten mit Seitenleisten, die in der Mitte durch eine feine Linie verbunden sind. Bis 12 mm.

12. **longipes** Brauns.

Hintertarsen weisslich. Querleisten des Metathorax nicht mit einander verbunden. 15.

15. Das 2. Geisselglied ziemlich dick, doppelt so lang wie breit. Fühler rötlich. Thorax deutlich weiss gezeichnet; Parapsidenfurchen kurz und tief. Flügel hyalin; Nervulus senkrecht und nicht weit hinter der Gabel. 7—10 mm.

13. **nomas** Kok.

Das 2. Geisselglied weniger dick, fast 3 mal so lang wie breit. Fühler rötlich, Endglieder braun. Thorax weniger deutlich weiss gezeichnet; Parapsidenfurchen länger. Flügel etwas getrübt; Nervulus weiter hinter der Gabel. 11 mm.

14. **ineditus** Kok.

16. Thorax deutlich gelblichweiss gezeichnet. Kopf nach hinten stark verschmälert; Wangen fast fehlend. Die Querleisten am Ende des Metathorax kaum angedeutet. Nervulus schief, ziemlich weit hinter der Gabel.

15. **Semenowi** Kok.

Thorax nicht oder nur sehr wenig weisslich gezeichnet. 17.

17. Metathorax hinten an den Seiten ohne Querleisten. Mesonotum glänzend; Parapsidenfurchen kurz. Nervulus weit hinter der Gabel, schief. Kopf nach hinten fast verschmälert; das 2. Geisselglied mindestens um die Hälfte länger als der Schaft. 8—14 mm.

16. **gracilipes** Thoms.

Metathorax hinten an den Seiten mit deutlichen Querleisten. 18.

18. Kopf nach hinten nicht verschmälert; das 2. Geisselglied nicht oder kaum länger als der Schaft. Nervulus weit hinter der Gabel, schief. 10—12 mm.

17. **capito** Kok.

Kopf nach hinten verschmälert; das 2. Geisselglied weit länger als der Schaft. 19.

19. Mesonotum matt, mit ziemlich langen Parapsidenfurchen. Kopf nach hinten nur wenig verschmälert. 10—15 mm.

18. **opaculus** Thoms.

Mesonotum glänzend, mit kurzen und tiefen Parapsidenfurchen. Kopf nach hinten stark verschmälert. 10 mm.

19. **montanus** Kok.

20. Kopf nach hinten stark erweitert; Fühler gegen das Ende verdunkelt. Mesonotum matt; Metathorax quer nadelrissig, hinten mit deutlichen Querleisten. Rotgelb, mit dunklem Ocellenfeld, zuweilen auch Mesonotum und Hinterleibsspitze verschwommen dunkel gezeichnet. Eine der grössten Arten, 14—22 mm.

20. **cephalotes** Holmgr.

Kopf nach hinten nicht erweitert, sondern meist verschmälert. 21.

21. Stigma bräunlich, kaum durchscheinend. Mesonotum matt; Schildchen bis über die Mitte hinaus gerandet. 9—10 mm.

21. **Silantjewi** Kok.

Stigma gelb, durchscheinend. 22.

22. Schildchenseiten nur bis zur Mitte gerandet. Scheitel mit schwarzem Fleck. Thorax zum grossen Teil schwarz. 11 mm.

22. **causicus** Kok.

Schildchenseiten bis fast zur Spitze gerandet. 23.

23. Querleisten am Ende des Metathorax ganz undeutlich oder fehlend. Nervulus in der Regel weit hinter der Gabel, ziemlich schief. Kleine Art von nur 7—10 mm.

13. **rossicus** Kok.

Querleisten am Ende des Metathorax sehr deutlich. Nervulus näher hinter der Gabel, mehr senkrecht. Grössere Arten. 24.

24. Das 3. Segment und die folgenden breiter als lang. Das 1. Segment ziemlich breit. 13 mm.

24. **rufescens** Tosqu.

Das 3. und 4. Segment weit länger als breit. Das 1. Segment schlank. 14—16 mm. 25.

25. Mesonotum matt. Hinterleibsende oft schwarz. Durchschnittlich grösser als die folgende Art.

25. **testaceus** Grav.

Mesonotum ziemlich glänzend. Hinterleibsende nicht schwarz.

26. **ocellaris** Thoms.

1. **P. Grumi** Kok. 1906 *Paniscus Grumi* Kokujew, Revue Russe d'Entom. p. 165 ♀♂.

Die Art ist ausgezeichnet durch die schwarze Färbung von Kopf, Fühlern, Thorax, Glymmen und Hüften und durch das braune Stigma.

Kopf nach hinten verschmälert; Nebenaugen gross, an die Augen stossend; Wangen fast fehlend; Gesicht ungefähr quadratisch, deutlich punktiert, ziemlich matt, in der Mitte convex, unterhalb der Fühler mit einem länglichen Grübchen; Clypeus ziemlich zerstreut punktiert; Fühler kürzer als der Körper, das 2. Geisselglied um die Hälfte länger als der Schaft. Thorax ziemlich matt, weisslich pubescent, Mesonotum und Schildchen mit kaum sichtbarer, Mesopleuren mit deutlicher Punktierung; Parapsidenfurchen ziemlich tief, bis zur Mitte reichend; Schildchenseiten bis an das Ende gerandet; Metathorax fein quergestreift, mit ovalen Luftlöchern, hinten an den Seiten mit kräftigen Querleisten. Nervulus nicht weit hinter der Gabel, fast senkrecht. Beine ziemlich schlank. Hinterleib fast doppelt so lang als Kopf und Thorax zusammen; das 1. Segment oben ohne Längsfurche. — Kopf, Palpen, Fühler, Thorax, Hüften und Klauenglieder schwarz; Augenränder gelb; Clypeus, Mandibeln, Hinterleib und Beine rötlichgelb; Spitze der Mandibeln, die äusserste Basis des Hinterleibs, die Glymmen, Tegulä, Stigma und die Basis der Trochanteren braun.

L. 14 mm.

Die Art wurde in China bei Sando-ho und in Transkaspien bei Aschabad gefunden.

2. **P. dilatatus** Thoms. 1888 *Paniscus dilatatus* Thomson, Opusc. Entom. XII p. 1200 ♀ | 1889 *Paniscus dilatatus* Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII p. 83 ♀ | 1899 *Paniscus dilatatus* Kokujew, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV p. 128 ♀ nota | 1858 *Paniscus fuscicornis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 32 ♀♂ (partim).

Kopf nach hinten verbreitert; Nebenaugen nicht gross, von den Augen ziemlich weit entfernt; Wangen kurz, aber deutlich; Fühler kürzer als der Körper, das 2. Geisselglied kaum länger als der Schaft; Clypeus durch eingedrückte Linie vom Gesicht getrennt. Thorax ziemlich glänzend; Parapsidenfurchen die Mitte des Mesonotums nicht erreichend; Metathorax kurz, quergestrichelt, vor dem Ende mit schwachen Seitenleisten. Nervulus weit hinter der Gabel. Schenkel ziemlich dick. Das 1. Hinterleibssegment nicht lang, mit deutlicher Längsfurche in der Mitte, etwas gekrümmt und nach hinten erweitert; das 2. Segment



wenig länger als hinten breit. — Rotgelb; Fühler schwärzlich, mit heller Basis. Flügel hyalin, Stigma gelblich. Das 1. Segment mit schwarzen Seitengrübchen.

L. 6 mm.

Die Art scheint auf Nordeuropa beschränkt zu sein. Brauns kannte sie nicht und auch mir ist sie nie vorgekommen.

3. **P. brachycerus** Thoms. 1888 *Paniscus brachycerus* Thomson, Opusc. Entom. XII p. 1201 ♀♂ | 1889 *Paniscus brachycerus* Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII p. 83 | 1899 *Paniscus brachycerus* Kokujew, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV p. 128 nota ♀♂ | 1858 *Paniscus fuscicornis* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 32 ♀♂ (partim).

Die Art ist mit der vorigen eng verwandt; wie bei dieser sind die Seitengrübchen des 1. Segmentes schwarz; die Fühler sind kürzer als der Körper, das 2. Geißelglied ist beim ♀ nicht, beim ♂ nur ganz wenig länger als der Schaft. Durch folgende Merkmale ist sie von *P. dilatatus* verschieden: Kopf nach hinten nicht verschmälert, sondern mit geraden Seiten; Thorax länger, Querleisten des Metathorax undeutlich oder ganz fehlend; das 1. und 2. Hinterleibssegment lang, das 1. ohne Längsfurche, das 2. fast doppelt so lang als hinten breit. — Von dem ähnlichen *P. gracilipes* unterscheidet sich die vorliegende Art durch die schwarzen Seitengrübchen des 1. Segmentes, durch das kürzere 2. Geißelglied und durch die kräftigeren Beine.

Var. ♀♂. Unterseite des Thorax, zuweilen auch Mesonotum und Hinterleibsende mit verschwommener dunkler Zeichnung.

L. 6 mm.

Auch diese Art ist nur aus Schweden bekannt; sie wurde in Schonen und Oeland gefunden.

4. **P. Ahngeri** Kok. 1906 *Paniscus Ahngeri* Kokujew, Revue Russe d'Entom. p. 165 ♀.

Kopf nach hinten rundlich verschmälert, glänzend; Nebenaugen von den Augen etwas entfernt; Fühler kürzer als der Körper, das 2. Geißelglied um die Hälfte länger als der Schaft; Gesicht undeutlich punktiert, fast matt, in der Mitte etwas convex; Clypeus durch eine tiefe Linie vom Gesicht getrennt, sparsam punktiert, glänzend, am Ende abgerundet. Thorax glänzend; Mesonotum und Schildchen kaum sichtbar punktiert; Metathorax vorn fein querrissig, am Ende breit glatt und stark glänzend, mit ovalen Luftlöchern und starken Querleisten. Nervulus ziemlich weit hinter der Gabel, vertikal. Klauen ziemlich kurz und nicht dicht gekämmt. Hinterleib kaum doppelt so breit als Kopf

und Thorax zusammen. — Rötlichgelb; Ocellenraum, Fühler, Stigma und Nervatur, Glymmen, Hinterleibsspitze und Bauch schwärzlich; Augenränder gelblich, die inneren schmal; Palpen und die hintersten Schenkel und Schienen verdunkelt.

L. 16 mm. — ♂ unbekannt.

Die Art wurde bei Missune in Nordpersien gefunden.

5. **P. elegans** Szepl. 1905 *Paniscus elegans* Szepligeti, Ann. Mus. Nat. Hungar. III p. 540 ♀.

Kopf mit schmalem Scheitel; Fühler kürzer als der Körper; Gesicht in der Mitte buckelartig vortretend; Clypeus schmal und breit, vom Gesicht geschieden, vorn leicht gebuchtet. Thorax besonders an den Seiten granlich pubescent; Mesonotum glänzend, Parapsidenfurchen nur vorn ausgebildet; Schildchen nicht gerandet; Mesopleuren längs der Mitte etwas vertieft und hier fein runzlig; Metathorax fast glatt, ohne alle Kiele. Innere Seite des Stigma bedeutend kürzer als die äussere, Nervulus weit hinter der Gabel und ziemlich schief. — Rot, reichlich weiss gezeichnet; Fühlergeissel braun. Seiten von Brust und Hinterleib dunkel gefleckt. Flügel hyalin, Stigma rein gelb, Nerven schwarz. Glymmen schwarz.

L. 15 mm. — ♂ unbekannt.

Die Art wurde in der Oase Gafsa im Süden von Tunesien aufgefunden.

6. **P. Schirjajewi** Kok. 1899 *Paniscus Schirjajewi* Kokujew, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV p. 129 ♂.

Kopf nach hinten kaum verbreitert; Ocellen von den Augen entfernt; Fühler kürzer als der Körper, das 2. Geisselglied nicht länger als der Schaft; Wangen kurz aber deutlich; Clypeus grob punktiert, in der Mitte eingedrückt. Mesonotum glänzend, zerstreut und fein punktiert, mit kurzen Parapsidenfurchen; Schildchen bis an das Ende gerandet; Metathorax fein querrissig, ohne Querleisten; Mesopleuren fein punktiert, glänzend. Nervulus sehr schief, nicht weit hinter der Gabel. Das 1. Segment ohne Längsfurche. — Rötlichgelb; Ocellenraum nicht schwarz; Augenränder, Gesicht grösstenteils und Clypeus weisslich; Fühler schwarz, Schaft hell. Mesonotum mit hellen Längslinien. Brust, Brustseiten und Metathorax schwarz gezeichnet. Flügel hyalin, Stigma blassgelb. Beine rötlichgelb, Tarsen gegen das Ende verdunkelt. Hinterleibsende unten gebräunt; Seitengrübchen des 1. Segmentes schwärzlich.

L. 10 mm. — ♀ unbekannt.

Die Art wurde bei Petropawlowsk in Westsibirien gefunden.

Verwandt mit *P. dilatatus*, aber Kopf nach hinten kaum verbreitert, Nervulus nicht weit hinter der Gabel, das 1. Segment ohne Längsfurche und der Thorax schwarz und gelb gezeichnet; auch dem *P. brachycerus* und *genalis* verwandt, aber Fühler mit Ausnahme des Schaftes schwarz, Mesonotum mit hellen Längsstreifen und Brust und Metathorax grösstenteils schwarz.

7. **P. genalis** Kok. 1899 *Paniscus genalis* Kokujew, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV p. 129 ♀.

Kopf nach hinten erweitert; Ocellen von den Augen entfernt; Stirn stark glänzend; Fühler lang, Geissel 43-gliedrig, das 2. Glied kaum länger als der Schaft; Wangen deutlich; Clypeus vom Gesicht getrennt, punktiert. Mesonotum glänzend, mit kurzen aber tiefen Parapsidenfurchen; Schildchen bis an das Ende gerandet; Metathorax mit schwachen Querleisten. Nervulus weit hinter der Gabel. Hinterleib kurz. — Rotgelb; Orbiten heller gelb; Fühler schwarz, an der Basis hell. Mesonotum ohne helle Zeichnung. Metathorax oben an der Basis und an den Seiten, sowie das Mesosternum hinten schwarz. Flügel hyalin, Stigma gelblich, durchscheinend, Tegulä und Flügelwurzel weisslich. Hinterleib an der äussersten Basis und auf der Bauchseite verdunkelt, Seitengrübchen des 1. Segmentes schwarz.

L. 10 mm.

Transkaukasien.

Durch die kurzen Parapsidenfurchen und die schwarzen Glymmen dem *P. dilatatus*, *brachycerus* und *Schirjajewi* verwandt, von *P. dilatatus* verschieden durch das nicht mit Längsfurche versehene 1. Segment und die schwarze Thoraxzeichnung; von *P. brachycerus* verschieden durch die Zeichnung des Thorax und den nach hinten erweiterten Kopf; von *P. Schirjajewi* durch das nicht hell gezeichnete Mesonotum und den weniger reich schwarz gezeichneten Thorax. Verwandt ist die Art auch mit *P. gracilipes*, aber verschieden durch die schwarzen Glymmen, das kurze 2. Geisselglied und die von den Augen entfernten Ocellen.

Das ♂ war Kokujew unbekannt. Szepligeti (Ann. Mus. Nat. Hungar. III. 1905. p. 540) führt eine Varietät davon an; die Beschreibung lautet: „Brust, Mesopleuren, Metathorax, Basis des 1. Segmentes, Hüften, Hinterleib unten und 3 Flecken des Mesonotums braun bis schwarz. Nervus parallelus sehr hoch entpringend. Stigma bräunlichgelb. Transkaspien: Aschabad.“

8. **P. fuscicarpus** Kok. 1899 *Paniscus fuscicarpus* Kokujew, *Horae Soc. Entom. Ross.* XXXIV p. 129 und 137 ♀♂.

Kopf nach hinten verschmälert; Nebenaugen an die Augen stossend; Gesicht fast quadratisch, punktiert; Wangen fehlend; Clypeus punktiert, in der Mitte eingedrückt. Mesonotum matt, mit tiefen Parapsidenfurchen; Schildchen bis an das Ende gerandet; Metathorax mit deutlichen Querleisten. Flügel breit, Nervulus nicht weit hinter der Gabel, fast senkrecht. Klauen lang gekämmt. Hinterleib fast doppelt so lang als Kopf und Thorax zusammen, das 1. Segment beim ♀ mit Längsfurche, beim ♂ convex; das 2. Segment hinter der Mitte mit feiner, vertiefter Querlinie. — Rötlichgelb; auch der Ocellenraum hell. Flügel hyalin, Stigma bräunlich, kaum durchscheinend; Tegulä und Flügelwurzel weisslich, Beine und Hinterleib rötlichgelb, auch die Glymmen hell.

L. 13—14 mm.

Südrußland.

Dem *P. opaculus* ähnlich und verwandt, aber die Ocellen an die Augen stossend, das Stigma bräunlich und das 1. Hinterleibssegment beim ♀ mit Längsfurche. Durch die Färbung des Stigma auch dem *P. Silantjewi* ähnlich, aber Körper fast doppelt so gross, Ocellenraum nicht schwarz, Nervulus nicht so weit hinter der Gabel, das 1. Segment beim ♀ mit Längsfurche und das Gesicht des ♂ nicht blassgelb gefärbt.

9. **P. pharaonum** n. sp.

Der ganze Körper stark glänzend, sehr dünn weisslich pubescent. Kopf nach hinten rundlich verschmälert; Nebenaugen von den Augen abstehend; Fühler etwas kürzer als der Körper, das 2. Geisselglied um die Hälfte länger als der Schaft; Gesicht und Clypeus glänzend, zerstreut punktiert; Clypeus durch eine tiefe Linie vom Gesicht getrennt, am Ende seicht ausgerandet. Thorax gedrunen, wenig länger als hoch; Parapsidenfurchen kaum bis zur Mitte des Mesonotums reichend; Schildchen an den Seiten bis fast an das Ende fein gerandet; Metathorax wie poliert, ohne alle Leisten; Brustseiten fein punktiert, glänzend. Nervulus nicht weit hinter der Gabel; Areola dreieckig, kurz gestielt; der rücklaufende Nerv deutlich ausserhalb der Areola mündend. Beine kräftig; Klauenglied gross; Klauen weit länger als der Pulvillus. Hinterleib kurz und gedrunen, um ein Viertel länger als Kopf und Thorax zusammen, an den Seiten bis an das Ende des 3. Segmentes gerandet; das 1. Segment gedrunen, das 2. und 3. Segment etwa so

lang als breit, die folgenden stark von der Seite zusammengeedrückt; Bohrer nur kurz vorstehend. — Kopf weissgelb; Fühler, ein schmaler Längsstreif in der Gesichtsmitte, Clypeusnaht und Hinterkopf gelbrot. Mesonotum, Schildchen und Hinterschildchen weissgelb; Mesonotum mit 3 breiten gelbroten Längsstreifen, Schildchen mit rötlichem Längsstreif in der Mitte; der übrige Thorax gelbrot, Prothorax und Mesopleuren weissgelb gefleckt. Flügel schwach gelblichweiss getrübt; Tegulä, Flügelwurzel und Costa weisslich, Subcosta schwärzlich; Stigma blassgelb, in der Mitte verschwommen rötlich; Flügelnerve braun oder schwärzlich. Beine gelbrot, die hintersten Tarsen nicht heller; Kniee schmal weisslich. Hinterleib braunschwarz, das 1. Segment und die Seiten des 2. verschwommen rötlich, die folgenden Segmente mit rötlichem Endsaum; Bauch schwarzbraun, mit gelblichen Einschnitten.

L. 10 mm.

Ich fing ein ♀ bei Heliopolis in Unterägypten.

10. **P. turanicus** Kok. 1899 *Paniscus turanicus* Kokujew, *Horae Soc. Entom. Ross.* XXXIV p. 130 und 144 ♀.

Kopf nach hinten wenig verschmälert; Augen fast die Mandibelbasis erreichend; Ocellen von den Augen entfernt; Stirn stark glänzend; Fühler kürzer als der Körper, Geissel 40gliedrig, das 2. Glied kurz, nur doppelt so lang als breit, etwa so lang wie der Schaft. Mesonotum glänzend, mit kurzen aber tiefen Parapsidenfurchen; Schildchen nur an der Basis gerandet; Metathorax mit feinen aber deutlichen Querleisten. Nervulus schräg, weit hinter der Gabel. Hinterleib wenig länger als Kopf und Thorax zusammen; das 1. Segment oben mit Längsfurche; Bohrer weit vorstehend. — Rötlichgelb; Ocellenraum, die breiten Augenränder und Seiten des Clypeus weisslich; Fühler ganz rötlich. Vier Längsstreifen des Mesonotums, Seiten des Schildchens und Flecken der Brustseiten weisslich. Flügel hyalin; Stigma gelblich; Tegulä weisslich. Das 1. Segment mit hellen Seitengrübchen.

L. 8–10 mm.

Auf dem Kopet-dagh in der Nähe von Aschabad in Transkaspien.

Durch das kurze 2. Geisselglied, das glänzende Mesonotum, die kurzen Parapsidenfurchen und den weit hinter der Gabel stehenden Nervulus dem *P. dilatatus* und *brachycerus* verwandt, aber Kopf nach hinten etwas verschmälert, Schildchen nur an der Basis gerandet, Kopf, Thorax

und Schildchen weiss gezeichnet, das 1. Segment mit Längsfurche und mit hellen Seitengrübchen. Von *P. Thomsoni*, *gracilipes* und *ineditus* abweichend durch das kurze 2. Geisselglied, die Stellung des Nervulus und den weiss gezeichneten Thorax. Sehr ähnlich auch dem *P. Semenowi*, aber Schildchen nur an der Basis gerandet und Ocellen von den Augen entfernt. Von *P. nomas* verschieden durch den weit hinter der Gabel stehenden, schiefen Nervulus und durch das mit Längsfurche versehene 1. Segment.

11. ***P. Thomsoni*** Brauns. 1889 *Paniscus Thomsoni* Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII p. 85 ♀.

„Die Art ist leicht kenntlich an der gelbweissen Zeichnung. Kopf etwas nach hinten verengt; Nebenaugen kaum von den Augen abstehend; Wangen deutlich; Clypeus deutlich getrennt, an den Seiten gelblich, wie die Augen ringsum und der Nebenaugenraum. Zweites Geisselglied der roten Fühler fast doppelt so lang wie der Schaft. Mesonotum glänzend, schwach punktiert; Schildchen nur an der Basis gerandet; Metathorax matt, schwach gerunzelt; Mesonotum mit 4 weissgelben Längslinien, die Kiele vor dem Schildchen, die Seitenränder des Schildchens, Flecken am Vorderrande des Prothorax und einige an den Brustseiten ebenfalls weissgelb. Hinterleib, wie das ganze Tier sonst, rotgelb; Petiolus lang, Seitengrübchen desselben hell; Bohrer ziemlich vorragend. Flügel mit blassgelbem Stigma; Nervulus weit hinter der Gabel und schief. Beine schlank, rot. Nervellus postfurcal, über der Mitte gebrochen.

L. 8—9 mm.

2 ♀ aus Messina, ein drittes aus der Schweiz, das letztere Exemplar gezogen aus *Eupithecia inotata*. Später ist die Art auch aus Norddeutschland (Rostock) nachgewiesen worden.“

12. ***P. longipes*** Brauns. 1889 *Paniscus longipes* Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII p. 85 | 1899 *Paniscus longipes* Kokujew, Horae Soc. Entom. XXXIV p. 129 nota.

Die Art ist bedeutend grösser als die vorhergehende, mit der sie eng verwandt ist. Die Bildung des Kopfes und auch die Zeichnung ist dieselbe; der Clypeus zeigt 2 deutliche gelbe Punkte. Die Zeichnung des Thorax ist ebenso, aber reicher, namentlich zeigen die Brustseiten mehr Flecke und auch der Metathorax ist gezeichnet, sowie das Hinterschildchen. Der Metathorax ist quergestrichelt und seine beiden Seitenleisten in der Mitte durch eine zarte Linie verbunden, hinter derselben ziemlich glänzend.

Die Flügel haben ein gelbes Stigma, der Nervulus ist ziemlich gerade und liegt nicht so weit hinter der Gabel, wie bei der vorigen Art; Nervellus wie bei *P. Thomsoni*. Beine schlank und sehr lang, namentlich die hintersten, von gelbroter Färbung.

L. Bis 14 mm.

Brauns besass die Art von Montpellier. — Ich besitze verschiedene Exemplare aus Puppen, die von Zara in Dalmatien stammten. Die Art scheint also dem Süden anzugehören.

13. **P. nomas** Kok. 1899 *Paniscus nomas* Kokujew, Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV p. 130 und 146 ♀♂.

Kleine Art. Kopf nach hinten stark verschmälert; Schläfen schmal; Wangen fehlend; Ocellen gross, an die Augen stossend; Stirn glänzend; Fühlergeissel beim ♀ mit 45, beim ♂ mit 41 Gliedern, das 2. Geisselglied kaum länger als der Schaft, nur doppelt so lang als breit; Gesicht nach unten verschmälert; Clypeus deutlich vom Gesicht getrennt. Thorax glänzend, Parapsidenfurchen kurz aber tief; Schildchen nur an der Basis gerandet; Querleisten des Metathorax dünn aber deutlich. Nervulus nicht weit hinter der Gabel, vertikal. — Blassgelb, Kopf und Thorax mit weisser Zeichnung; Clypeus beiderseits mit dunklem Punkt; Fühler rötlich. Flügel hyalin, Tegulä und Flügelwurzel weisslich; Stigma gelblich, durchscheinend. Tarsen weisslich, die Spitze der Glieder verdunkelt. Hinterleib beim ♀ leicht gebräunt, beim ♂ nur gegen das Ende hin.

L. 7–10 mm.

Transkaspien.

Durch die helle Färbung der Glymmen, des Ocellenraums und des Stigma und durch das nur an der Basis gerandete Schildchen verwandt mit *P. turanicus*, *Thomsoni*, *longipes* und *ineditus*. Von *P. turanicus* und *Thomsoni* verschieden durch den nicht weit hinter der Gabel stehenden, senkrechten Nervulus; von *P. longipes* durch die weisslichen Tarsen, von *P. ineditus* durch das dickere und kürzere 2. Geisselglied, die helle Zeichnung des Thorax und die kürzeren Parapsidenfurchen. Die Art ist auch *P. Semenowi* und *gracilipes* ähnlich, weicht aber durch das nur an der Basis gerandete Schildchen ab.

14. **P. ineditus** Kok. 1899 *Paniscus ineditus* Kokujew, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV p. 131 und 140 ♂.

Kopf nach hinten deutlich verschmälert; Augen sehr gross; Ocellen an die Augen stossend; Stirn stark glänzend;

Fühler wenig kürzer als der Körper, Geissel 43 gliedrig, das 2. Geisselglied etwas länger als der Schaft; Wangen fehlend; Clypeus durch tiefe Linie vom Gesicht getrennt. Mesonotum fast matt; Schildchen nur an der Basis gerandet; Metathorax fein querrissig, mit schwachen aber deutlichen Querleisten; Mesopleuren glänzend. Nervulus vertikal, etwas weiter hinter der Gabel als bei *P. nomas*. Hinterleib fast doppelt so lang als Kopf und Thorax zusammen; das 1. Segment hinten mit Längsfurche. — Blass rötlichgelb; Fühler gegen das Ende etwas verdunkelt. Thorax weniger deutlich hell gezeichnet als bei *P. nomas*. Flügel schwach getrübt; Stigma gelblich, durchscheinend. Die hintersten Tarsen weisslich. Das 1. Segment mit hellen Seitengrübchen.

L. 11 mm.

Transkaukasien.

Die Art scheint eng verwandt mit *P. nomas* zu sein; die Unterschiede sind in der Tabelle angegeben; ich finde sie ausserordentlich geringfügig.

15. **P. Semenowi** Kok. 1899 *Paniscus Semenowi* Kokujew, *Horae Soc. Entom. Ross.* XXXIV p. 131 und 145 ♀♂.

Kopf nach hinten stark verengt; Augen gross und stark hervortretend; Nebenaugen gross, an die Augen stossend; Fühlergeissel mit 43—46 Gliedern, das 2. kaum länger als der Schaft; Gesicht punktiert, oben mit Grube; Wangen fehlend; Clypeus durch tiefe Linie vom Gesicht getrennt. Mesonotum glänzend, mit kurzen Parapsidenfurchen; Schildchenseiten bis an das Ende gerandet; Metathorax fein querrissig, die Querleisten schwach oder fehlend. Nervulus schief, ziemlich weit hinter der Gabel. Das 1. Segment zuweilen mit Längsfurche. — Rötlichgelb, Kopf und Thorax deutlich gelblichweiss gezeichnet; Grube oberhalb der Gesichtsmitte braun; Fühler schwarz, an der Basis rötlich, zuweilen nur an der Spitze schwärzlich. Flügel hyalin, Stigma gelblich, durchscheinend, Tegulä weisslich. Tarsen nicht weisslich. Seitengrübchen des 1. Segmentes blass.

L. 9—13 mm.

Transkaspien: Mulla-kary; Rapetek.

Durch die helle Zeichnung verwandt mit *P. turanicus*, *nomas*, *Thomsoni*, *longipes* und *ineditus*, verschieden durch das bis an das Ende gerandete Schildchen; von *P. capito* verschieden durch den nach hinten verschmälerten Kopf, von *P. opaculus*, *montanus* und *gracilipes* durch die deutliche Zeichnung des Mesonotums.



16. **P. gracilipes** Thoms. 1888 *gracilipes* Thomson, Opusc. Entom. XII p. 1201 ♀♂ | 1889 *Paniscus gracilipes* Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII p. 84 | 1899 *Paniscus gracilipes* Kokujew, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV p. 131.

Kopf nach hinten etwas verschmälert; Nebenaugen von den Augen kaum abstehehend; das 2. Geißelglied mindestens um die Hälfte länger als der Schaft; Clypeus durch eine tiefe Linie vom Gesicht getrennt. Mesonotum ziemlich glänzend; Parapsidenfurchen nicht bis über die Mitte hinausgehend; Metathorax hinten ohne oder mit ganz schwachen Querleisten. Nervulus weit hinter der Gabel und sehr schief. Beine, namentlich die Schenkel, schlank. Petiolus lang. — Rotgelb; Fühler gegen das Ende braun. Seitengrübchen des 1. Segmentes hell.

L. 8—14 mm.

*P. gracilipes* ist weit verbreitet und nicht selten; hier in Thüringen ist sie die häufigste *Paniscus*-Art; dasselbe sagt Thomson von Schweden.

17. **P. capito** Kok. 1899 *Paniscus capito* Kokujew, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV p. 132 und 141 ♀.

Kopf nach hinten nicht verschmälert; Nebenaugen von den Augen entfernt; Fühlergeißel 42—44gliedrig, das 2. Glied nur doppelt so lang als breit, kaum länger als der Schaft; Schläfen breit; Wangen fast fehlend; Gesicht nach unten etwas verbreitert. Mesonotum glänzend, mit kurzen aber tiefen Parapsidenfurchen; Schildchen bis an das Ende gerandet; Metathorax fein querrissig, mit deutlichen Querleisten. Nervulus schief, weit hinter der Gabel. Hinterleib fast doppelt so lang als Kopf und Thorax zusammen. — Rötlichgelb; Ocellenraum nicht schwarz; Fühler schwarz, gegen die Basis rötlichgelb. Mesosternum hinten schwarz gezeichnet. Flügel hyalin; Stigma gelblich, durchscheinend; Tegulä weisslich. Hinterleib mit hellen Glymmen; Bauchseite verdunkelt.

? Var. *sibiricola* Kokujew l. c. p. 142. Bauch nicht braun. Mesonotum mit verschwommenen hellen Linien.

L. 10—12 mm. ♂ unbekannt.

Die Stammform wurde in Transkaukasien, die fragliche Varietät in Westsibirien gefunden.

Die Art ist von dem ähnlichen *P. gracilipes* verschieden durch den nach hinten nicht verschmälerten Kopf, durch das kurze 2. Geißelglied und durch die deutlichen Querleisten des Metathorax; von *P. montanus* durch die Kopfbildung und

durch das kürzere 2. Geisselglied; von *P. genalis* durch die hellen Glymmen und den oben nicht schwarz gezeichneten Thorax.

18. **P. opaculus** Thoms. 1888 *Paniscus opaculus* Thomson, Opusc. Entom. XII p. 1199 ♀ | 1889 *Paniscus opaculus* Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII p. 84 | 1899 *Paniscus opaculus* Kokujew, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV p. 132.

*P. opaculus* und *ocellaris* sind wohl kaum anders als Formen des *P. testaceus* aufzufassen; *P. opaculus* würde ausgezeichnet sein durch den nicht schwarzen Nebenaugenraum und die zwar grossen, aber nicht an die Augen stossenden Nebenaugen. Ueber diese Unterscheidungsmerkmale kann man freilich sehr bald in Zweifel kommen.

Thomson gibt von *P. opaculus* die folgende Beschreibung: „Dem *P. melanurus* Thoms. (= *P. testaceus* aut.) durch das matte Mesonotum und die starken Querleisten des Metathorax ähnlich, aber etwas kleiner, Hinterleibsspitze und Stenitium nicht schwarz, Nebenaugen, wenn auch gross, nicht an die Augen stossend; von *P. ocellaris*, dilatatus, brachycerus und gracilipes verschieden durch den nicht weit hinter der Gabel stehenden Nervulus, das matte Mesonotum, die hellen, an der Spitze verdunkelten Fühler, die viel kräftigeren Querleisten des Metathorax und die blassgelben hintersten Tarsen.

Länge bis 12 mm.“

Die Art dürfte dieselbe Verbreitung wie *P. testaceus* haben.

19. **P. montanus** Kok. 1899 *Paniscus montanus* Kokujew, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV p. 132 ♀.

Kopf nach hinten deutlich verschmälert; Nebenaugen von den Augen etwas entfernt; Wangen sehr kurz; Clypeus punktiert, durch tiefe Linie vom Gesicht getrennt; das 2. Glied der Fühlergeissel fast 3 mal so lang als breit, um die Hälfte länger als der Schaft. Mesonotum glänzend, mit kurzen aber tiefen Parapsidenfurchen; Schildchen bis an das Ende gerandet; Metathorax fein querrissig, mit deutlichen Querleisten. Nervulus schräg, weit hinter der Gabel. Hinterleib fast doppelt so lang als Kopf und Thorax zusammen. — Rötlichgelb; Ocellenraum und Orbiten blassgelb; Clypeus mit braunen Seitenpunkten. Mesonotum mit undeutlichen hellen Linien. Flügel hyalin, Stigma gelblich, durchscheinend; Tegulä weisslich. Seitengrübchen des 1. Segmentes hell.

L. 10 mm. — ♂ unbekannt.

Ein ♀ dieser Art wurde auf dem Pamir in Centralasien gefunden. — Durch die hellgefärbten Glymmen und den Ocellenraum, durch das bis an das Ende gerandete Schildchen und den schiefen, weit hinter der Gabel stehenden Nervulus mit *P. gracilipes* und *capito* verwandt; von dem ersteren verschieden durch das hell gezeichnete Mesonotum und die deutlichen Querleisten des Metathorax; von *P. capito* verschieden durch den deutlich nach hinten verschmälerten Kopf und das viel längere 2. Geisselglied.

20. **P. cephalotes** Holmgr. 1858 *Paniscus cephalotes* Holmgr., Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 31 ♀♂ | 1880 *Paniscus cephalotes* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 138 ♀♂ | 1889 *Paniscus cephalotes* Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII p. 83 | 1899 *Paniscus cephalotes* Kokujew, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV p. 133.

Kopf aufgetrieben, hinter den Augen erweitert, mit breiten Schläfen; Fühler ungefähr von Körperlänge. Mesonotum ziemlich matt; Schildchen breit, an den Seiten nicht ganz bis zur Spitze gerandet; Metathorax quer nadelrissig, hinten mit deutlichen Querleisten. — Rotgelb, mit schwärzlichem Ocellenraum; Fühler gegen das Ende bräunlich. Mesonotum und Hinterleibsspitze zuweilen verschwommen dunkel.

Die grösste Art, 14–22 mm, und dadurch schon kenntlich. Aus Nord- und Mitteleuropa nachgewiesen. Sie scheint besonders bei *Harpyia vinula* zu schmarotzen; Brischke führt ausserdem als Wirte an: *Cucullia asteris*, *scrophulariae*, *abrotani*, *argentea*, *thapsivaga*, *balsamitae*; *Acronycta tridens*, *psi*, *megacephala*; *Gastropacha populi*. — Die schwarzen, glänzenden Eier werden oft sehr zahlreich zwischen die Segmente der Raupen gelegt und die jungen Maden bohren sich in den Körper derselben hinein. Bei grossen Raupen, z. B. bei der von *Harpyia vinula*, entwickeln sich mehrere Maden, welche im Raupenge-spinnste zusammenhängende Cocons, manchmal über ein Dutzend, verfertigen. Der Cocon selbst ist elliptisch, in der Mitte etwas aufgetrieben, schwarz. (Brischke.)

21. **P. Silantjewi** Kok. 1899 *Paniscus Silantjewi* Kokujew, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV p. 135 u. 138 ♀♂.

Kopf nach hinten wenig verschmälert; Ocellen an die Augen stossend; Stirn glänzend; Fühler von Körperlänge, Geissel 45gliedrig, das 2. Glied wenig länger als der Schaft; Wangen fehlend; Clypeus convex, zerstreut punktiert. Mesonotum matt, mit langen Parapsidenfurchen; Schildchen bis über die Mitte hinaus gerandet; Querleisten des Metathorax sehr undeutlich; Mesopleuren ziemlich glänzend.

Nervulus etwas schief, nicht sehr weit hinter der Gabel. Beine schlank. Hinterleib um die Hälfte länger als Kopf und Thorax zusammen. — Rötlichgelb; Ocellenraum schwarz; Fühler gegen das Ende verdunkelt, beim ♂ das Gesicht blassgelb. Flügel hyalin, Stigma bräunlich, kaum durchscheinend. Seitengrübchen des 1. Segmentes hell.

L. 9—10 mm.

Südrussland.

Durch das braune Stigma sehr ähnlich dem *P. fuscicarpus*, aber weit kleiner, Ocellenraum schwarz, Gesicht des ♂ blassgelb, Nervulus schief und etwas weiter hinter der Gabel, das 1. Segment ohne Längsfurche. Von allen übrigen *Paniscus*-Arten durch das dunkle Stigma verschieden.

22. ***P. caucasicus*** Kok. 1899 *Paniscus caucasicus* Kokujew, Horae Soc. Entom. XXXIV p. 134 und 140 ♀♂.

Kopf nach hinten stark verschmälert; Ocellen an die Augen stossend, beim ♂ etwas entfernt; Stirn glänzend; Fühler schlank, fast von Körperlänge, gegen das Ende stark verdünnt, Geissel 51gliedrig, das 2. Glied um die Hälfte länger als der Schaft; Gesicht fast quer; Wangen kurz aber deutlich; Clypeus deutlich vom Gesicht getrennt, matt. Mesonotum und Mesopleuren ziemlich glänzend; Schildchen kaum bis über die Mitte hinaus gerandet; Metathorax fein querrissig, hinten mit feinen Querleisten. Nervulus senkrecht, nicht weit hinter der Gabel. Beine schlank. Hinterleib fast doppelt so lang als Kopf und Thorax zusammen; das 1. Segment ohne Längsfurche. — Rötlichgelb; Ocellenraum und Scheitel dahinter schwarz; Augenränder gelb; Fühler gegen das Ende braun. Thorax grösstenteils schwarz; Parapsidenfurchen rötlich, hinten in einer gelblichen Grube zusammenlaufend. Flügel hyalin, Stigma gelblich, durchscheinend. Die hintersten Tarsen weisslich. Seitengrübchen des 1. Segmentes hell.

L. 11 mm.

Transkaukasien.

Durch den nach hinten verschmälerten Kopf, den schwarzen Ocellenraum, die langen Parapsidenfurchen, das helle Stigma und den vertikalen, nicht weit hinter der Gabel stehenden Nervulus ist diese Art dem *P. testaceus* sehr ähnlich; sie weicht ab durch geringere Körpergrösse, den gefleckten Scheitel, den grösstenteils schwarzen Thorax und das nur bis zur Mitte gerandete Schildchen.

23. **P. rossicus** Kok. 1899 *Paniscus rossicus* Kokujew, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV p. 134 und 139 ♀♂.

Kopf nach hinten kaum verschmälert; Nebenaugen wenig von den Augen entfernt; Stirn ziemlich glänzend; Fühler dünn, von Körperlänge; Geissel 43gliedrig, das 2. Glied um die Hälfte länger als der Schaft; Gesicht fast matt, zerstreut punktiert: Clypeus deutlich vom Gesicht getrennt, schwach glänzend, zerstreut punktiert. Mesonotum ziemlich matt, mit langen Parapsidenfurchen; Schildchen bis fast an das Ende gerandet; Metathorax ohne Querleisten. Nervulus ziemlich schief, weit hinter der Gabel. Hinterleib fast doppelt so lang als Kopf und Thorax zusammen. — Rötlichgelb; Ocellenraum schwarz, Gesicht zuweilen gelb; Fühler gegen das Ende verdunkelt. Flügel hyalin, Stigma gelblich, durchscheinend. Die hintersten Tarsen beim ♂ gelblichweiss. Hinterleib gegen das Ende nicht selten verdunkelt; das 1. Segment mit hellen Seitengrübchen.

L. 7—10 mm.

Die Art ist verbreitet in Mittel-, Ost- und Südostrussland.

Die Art ähnelt, namentlich durch den schrägen und weit hinter der Gabel stehenden Nervulus und die fehlenden Querleisten des Metathorax sehr dem *P. gracilipes*, unterscheidet sich aber durch den schwarzen Ocellenraum und die langen Parapsidenfurchen.

24. **P. rufescens** Tosqu. 1896 *Paniscus rufescens* Tosquinet, Ichneum. d'Afrique p. 409 ♀♂.

Kopf nach hinten verschmälert; Nebenaugen von den Augen ziemlich weit abstehend; Stirn convex, sehr glänzend; Fühler schlank, so lang wie der Körper; Gesicht fein punktiert, in der Mitte mit starker Erhöhung. Thorax kurz und bucklig; Mesonotum fein punktiert; Schildchen an den Seiten bis zur Spitze gerandet; Metathorax fein querrissig, hinten an den Seiten mit kleiner Querleiste; Luftlöcher länglich oval. Flügel gross; Areola klein, kaum gestielt, den rücklaufenden Nerv im Endwinkel aufnehmend. Beine lang und schlank. Hinterleib vom 3. Segment an stark von der Seite zusammengedrückt; das 1. Segment kräftig und ziemlich breit, etwas länger als die hintersten Hüften; das 2. Segment viel länger als breit, die folgenden Segmente quer. — Das ganze Tier rotgelb; Ocellenraum schwärzlich; Fühler gegen das Ende bräunlich; Augenränder verschwommen gelb. Flügel hyalin, Stigma gelblich, durchscheinend. Hinterleib ganz rotgelb.

L. 13 mm.

Marokko.

Man würde die Art einfach mit *P. testaceus* vereinigen, wenn dem nicht die Kürze des 3. und der folgenden Segmente widerspräche.

25. **P. testaceus** Grav. 1829 *Paniscus testaceus* Gravenhorst, *Ichneum.* Eur. III p. 626 ♀♂ | 1858 *Paniscus testaceus* Holmgren, *Svensk. Vet.-Akad. Handl.* II p. 32 ♀♂ | 1889 *Paniscus testaceus* Brauns, *Arch. Naturg. Mecklenb.* XLIII p. 84 | 1899 *Paniscus testaceus* Kokujew, *Horae Soc. Ent. Ross.* XXXIV p. 134 | 1887 *Paniscus melanurus* Thomson, *Opusc. Entom.* XII p. 1199 ♀♂.

*Paniscus testaceus* ist der Typus der ganzen Gattung und umfasst bei den älteren Autoren auch die verwandten Arten. — Kopf nach hinten verengt; Augen an die Nebenaugen stossend; Mesonotum ziemlich matt, mit langen Parapsidenfurchen; Schildchenseiten scharf bis zur Spitze gerandet; Metathorax hinten an den Seiten mit deutlichen Querleisten. — Rotgelb; Ocellenraum schwärzlich. Die letzten Hinterleibssegmente sind bei allen meinen Exemplaren schwarz. Was ich von Exemplaren mit ganz rotgelbem Hinterleibe gesehen habe, gehörte zu *P. ocellaris*, *opaculus*, *gracilipes* u. s. w. Thomson hat deshalb für *P. testaceus* die neue Benennung *P. melanurus* gebraucht, ich bin aber mit Brauns dafür, den alten Gravenhorst'schen Namen beizubehalten; wir haben ja eine ganze Menge von Beispielen, dass ältere Autoren den Artnamen in viel weiterer Ausdehnung gebrauchten. In keinem Falle kann *melanurus* als Varietät von *P. testaceus* aufgefasst werden, da es die Normalfärbung ist. Wie bei wohl allen *Paniscus*-Arten zeigt das Mesonotum nicht selten drei verdunkelte Streifen.

L. 12—18 mm.

Die Art ist über ganz Europa, Vorderasien und Nordafrika verbreitet. — Die Zahl der angegebenen Wirte ist eine sehr grosse; von Lepidopteren folgende: *Smerinthus populi*, *Bombyx pini*, *Phigalia pilosaria*, *Nyssia pomonaria*, *Eupithecia castigata*, *Dicranura vinula*, *D. bifida*, *D. furcula*, *Hybocampa Milhauseri*, *Clostera anachoreta*, *Acronycta leporina*, *A. psi*, *A. megacephala*, *Nonagria geminipuncta*, *Mesogona oxalina*, *Hadena pisi*, *H. dentina*, *Xylina rhizolitha*, *Cucullia scrophulariae*, *C. lychnitis*, *C. asteris*, *C. argentea*, *C. artemisiae*, *Toxocampa craccae*, *Perigrapha cincta*, *Cloantha radiosa*, *Pygaera curtula*, *Polia polymita*. — Dazu kommen als Wirte noch folgende Hymenopteren: *Cimbex femorata*, *Clavellaria amerinae*, *Lophyrus abietis* und *Lyda erythrocephala*.

26. **P. ocellaris** Thoms. 1888 *Paniscus ocellaris* Thomson, Opusc. Entom. XII p. 1199 ♀ | 1889 *Paniscus ocellaris* Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII p. 84 | 1899 *Paniscus testaceus* var. *ocellaris* Kokujew, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV p. 135.

Kopf nach hinten verschmälert; Nebenaugen sehr gross, an die Augen stossend; Mesonotum ziemlich glänzend, mit langen Parapsidenfurchen; Querleisten des Metathorax kräftig. — Rotgelb; Ocellenraum schwärzlich.

Von *P. testaceus* (= *melanurus* Thoms.) unterscheidet sich die vorliegende Art nur dadurch, dass das Mesonotum glänzender und die Hinterleibsspitze nicht schwarz ist. Sehr ähnlich ist die Art auch dem *P. opaculus*, aber sie ist durchschnittlich grösser, der Ocellenraum ist schwarz, die Nebenaugen stossen an die Augen, und das Mesonotum ist glänzender. Von dem sehr häufigen *P. gracilipes* unterscheidet sich *P. ocellaris* durch den schwarzen Ocellenraum, die am Ende dunklen Fühler, die kräftigen Querleisten des Metathorax und die hellgelben hintersten Tarsen.

L. 12—14 mm.

Nord- und Mitteleuropa. Hier in Thüringen mindestens ebenso häufig als *P. testaceus*.

## 7. Tribus **Banchini.**

1868 Banchoidae, Familie 9, Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV pp. 141 und 157.

1894 Banchini, Tribe IX, Ashmead, Proc. Ent. Soc. Wash. III p. 277.

Die Banchinen schliessen sich ziemlich eng an die Paniscinen an, besonders durch die Lage der Luftlöcher des 1. Segments und durch die Stellung und Brechung des Nervellus, sie unterscheiden sich aber leicht schon durch die dunklere Färbung. Der Hinterleib ist sitzend oder wenn er etwas gestielt ist, dann ist der Stiel deprimiert; die Luftlöcher des 1. Segmentes liegen vor der Mitte. Der Thorax ist meist fein lederartig punktiert und matt, selten glatt und glänzend; die Parapsidenfurchen sind nur selten tief und vollständig. Das Stigma im Vorderflügel ist lang und schmal. Bei einigen in ihrer Stellung sehr fraglichen Gattungen, wie z. B. *Lapton*, fehlt die Areola gänzlich, sonst ist sie bei den meisten Gattungen gross, rhombisch oder ein verschobenes Viereck bildend. Der 2. Abschnitt des Radius ist an der Basis nicht stark einwärts gebogen, wie es bei den meisten Gattungen der Paniscinen der Fall ist. Der Nervellus ist in der Regel sehr schräg nach

aussen gestellt und weit über der Mitte gebrochen. Die Mittelschienen besitzen 2 Endsporen, die Klauen sind sehr selten gekämmt.

Verschiedene Gattungen mit weit vorstehendem Bohrer bilden einen Uebergang zu den Pimplinen, speziell Acönitinen. So stellt Ashmead die Gattung *Leptobatus* zu den letzteren, ich bin jedoch dafür, sie in der Nähe von *Exetastes* zu lassen. Andere Gattungen wieder haben Anklänge an die Tryphoninen. Thomson ist sogar geneigt, *Banchus*, *Exetastes* und *Leptobatus* als eine eigene Sektion der Tryphoniden aufzufassen, die er wegen des stark zurückgebogenen Clypeus Tryphonidae *macrochili* nennt. Ich bin durchaus nicht für diese ewigen Umtaufereien und Umstellereien; dadurch wird das schönste Studium verleidet. *Leptobatus* hat zuerst bei den Pimplinen gestanden, dann ist die Gattung zu den Ophioninen gekommen und nun soll sie zu den Tryphoniden gestellt werden, wohin sie wegen des langen Bohrers am allerwenigsten passt. Und was machen wir mit *Nawaia* und was mit den exotischen Gattungen *Aethria* und *Baliena*? Aus all dem geht hervor, dass wir in den Banchinen keine scharf umgrenzte Tribus vor uns haben, sondern eine Gruppe, welche zahlreiche Uebergänge zu anderen Unterfamilien aufweist.

#### Uebersicht der Gattungen.

1. Flügel mit Areola. 2.  
Flügel ohne Areola. 18.
2. Gesicht unterhalb der Fühler mit einem Höcker. Mund rüsselartig verlängert. Schwarz, Hinterleib und Beine rot gezeichnet.

##### 1. *Rhynchobanchus* Kriechb.

Gesicht unterhalb der Fühler ohne Höcker oder Zapfen. Mund nicht rüsselartig verlängert. 3.

3. Diskokubitalnerv winklig gebrochen, mit deutlichem Ramellus (Nervenast) oder wenigstens mit einer Spur davon. 4.  
Diskokubitalnerv nicht winklig gebrochen, sondern ziemlich gerade verlaufend, ohne Ramellus. 9.
4. Der ganze Körper, namentlich der Kopf, zottig grau behaart. Metathorax grob punktiert, ohne Leisten. Areola gross, sitzend, fast viereckig. Pulvillus halb so lang wie die Klauen. Schwarz, Schenkel und Schienen braunrot.

cf. Lissonotinen-Gattung *Arenetra* Holmgr.

Körper, namentlich der Kopf, ohne diese auffallende Behaarung. 5.



5. Areola gross, rhombisch oder verschoben vierseitig. 6.  
Areola klein, dreiseitig, meist gestielt. 8.
6. Fühler an der Spitze nicht verdünnt. Areola rhombisch.  
Bohrer so lang oder länger als der Hinterleib.

3. **Leptobatus** Grav.

Fühler gegen die Spitze verdünnt. Areola nicht regelmässig rhombisch. Bohrer weit kürzer als der Hinterleib. 7.

7. Flügel hyalin. Diskokubitalnerv nicht stark gebrochen.

2. **Exetastes** Grav.

Flügel blauschwarz. Diskokubitalnerv stark gebrochen.  
Südafrika.

**Rhynhexetastes** Cam.

(Ann. South Afric. Mus. V. 1906. p. 102.)

8. Klauen gekämmt. Das 1. Hinterleibssegment nicht gekrümmt und an der Basis unten nicht gezähnt. Australien.

**Leptobatopsis** Ashm.

(Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900. p. 47.)

Klauen am Ende zweizählig. Hinterleibsstiel lang, schmal und wie bei einem *Cryptus* gekrümmt, unten an der Basis mit starkem Zahn. Das letzte Bauchsegment nicht vorspringend. Bohrer von Hinterleibslänge. Java.

**Aethria** Tosqu.

(Mém. Soc. Ent. Belgique X. 1903 p. 114.)

9. Mundteile normal; Unterlippe nicht stark verlängert. Areola im Vorderflügel meist gross und sitzend. 10.

Mundteile nicht normal, indem die Unterlippe sehr stark verlängert ist. Areola im Vorderflügel gestielt. 16.

10. Areola klein, dreieckig, meist gestielt. Mesonotum vorn mit deutlichen Parapsidenfurchen. Hinterleib schwarz, höchstens die Segmentränder schmal hell. 11.

Areola gross. Mesonotum ohne Parapsidenfurchen. 13.

11. Bohrer weit kürzer als der Hinterleib. Metathorax hinten mit grossem, deutlich abgegrenzten Felde. Das 8. Rücken-segment dreieckig zusammengedrückt, hinten spitz, oben mit einem elliptischen Längsschlitz. Bohrerklappen hinter der Basis erweitert; Bohrer vor der Spitze oben mit Einkerbung. 4.

4. **Xenoschesis** Först.

Bohrer länger als der Hinterleib. Metathorax hinten ohne deutlich abgegrenztes Feld. 12.

12. Schildchen flach. Metathorax fast so lang wie das Mesonotum, ohne Kiele. Klauen gespalten. Bohrer aus einer Bauchspalte. Schwarz, Gesicht weiss; Beine rotgelb, Hüften schwarz, die hintersten Schienen schwarz und weiss. Bohrer fast so lang wie der ganze Körper. Ostindien.

**Baliene** Cam.

(Mem. and Proc. Manchest. Philos. Society XXXIV 1900 p. 101.)

Schildchen convex. Metathorax deutlich kürzer als das Mesonotum, mit 4 hinten abgekürzten Längskielen. Klauen einfach. Das letzte Bauchsegment sehr gross, pflugscharförmig abstehend.

cf. Pimplinen-Gattung **Coleocentrus** Grav.

13. Areola im Vorderflügel gross, pentagonal. Hinterleib nach hinten zugespitzt. Nervellus weit über der Mitte gebrochen. Schildchen in einen kurzen Dorn endend.

5. **Nawaia** Ashm.

Areola im Vorderflügel drei- oder vierseitig. 14.

14. Areola dreiseitig; der rücklaufende Nerv im Endwinkel mündend. Fühler kurz und dick, gegen das Ende wenig verdünnt. Zwischen den Fühlern zwei starke Leisten. Körper schwarz, mit reicher gelber Zeichnung.

8. **Banchoides** Dalla Torre.

Areola vierseitig; der rücklaufende Nerv weit vor dem Ende mündend. Fühler schlank, gegen das Ende stark verdünnt. Zwischen den Fühlern keine oder ganz undeutliche Leisten. 15.

15. Hinterleib gegen das Ende mehr oder weniger von der Seite zusammengedrückt und auf der Bauchseite erweitert. Auf Segment 2 und 3 keine schrägen Furchen. Klauen beim ♀ mit ziemlich kurzen und nicht sehr dicht stehenden Kammzähnen. Fühlerschaft aussen bis fast zur Basis ausgeschnitten. Schildchen oft in einen Dorn endend.

6. **Banchus** Grav.

Hinterleib gegen das Ende allmählich zugespitzt. Segment 2 und 3 mit schrägen Furchen. Klauen beim ♀ mit 1 oder 2 Zähnen nahe der Basis.

**Ceratogaster** Ashm.

(The Canad. Entomol. XXXII. 1900. p. 368. — Ceratosoma Cress.)

16. Mesonotum mit deutlichen Parapsidenfurchen. Nervulus interstitial. Mexico.

**Agathilla** Westw.

(Tijdschr. v. Entom. XXV. 1882. p. 23.)

Mesonotum ohne Parapsidenfurchen. 17.

17. Nervulus interstitial. Metathorax am Ende breit und tief eingedrückt. Kapland.

**Allotheca** Cam.

(Ann. South. Afric. Mus. V. 1906. p. 103.)

Nervulus nicht interstitial. Metathorax am Ende nicht auffallend eingedrückt. Nordamerika.

**Agathobanchus** Ashm.

(Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900. p. 97.)

18. Fühler kräftig, länger als der Körper. Hintertarsen verdickt. Endrand des Clypeus in der Mitte mit starkem und spitzem Zahn. Klauen dicht und lang gekämmt.

cf. Tryphoninen-Gattung **Scolobates** Grav.

Hintertarsen nicht verdickt. Klauen nicht gekämmt. 19.

19. Nervus areolaris (Cubitalquernerv) ganz fehlend. 20.

Nervus areolaris vorhanden. 21.

20. Hinterleib von der Seite zusammengedrückt. Diskokubitalnerv winklig gebrochen. Bohrer weit vorragend, zusammengedrückt und nach unten gebogen.

cf. Pimplinen-Gattung **Tropistes** Grav.

Hinterleib von der Seite nicht zusammengedrückt. Diskokubitalnerv nicht winklig gebrochen.

**Ithagenes** Först.

Anmerk. Ich führe diese rätselhafte Gattung der Vollständigkeit wegen mit an. In den hinterlassenen Schriften Försters findet sich darüber weiter keine Notiz.

21. Der rücklaufende Nerv mündet hinter dem Nervus areolaris. Mundteile verlängert. Metathorax gefeldert. Bohrer kürzer als der Körper. Hinterleibsmitte rot.

8. **Lapton** Nees.

Der rücklaufende Nerv mündet vor dem Nervus areolaris. Klauen vor der Mitte gespalten. Mittel- und Hinter-schienen mit kurzen Dörnchen. Bohrer von Körperlänge. Hinterbeine ziemlich verlängert. Hinterleib schwarz, Segment 1 und 2 weiss gerandet. Metatarsen grösstenteils weiss.

cf. Pimplinen-Gattung **Arotes** Grav.

1. Gen. **Rhynchobanchus** Kriechb.

1894 Rhynchobanchus Kriechbaumer, Termész. Füzet. XVII p. 59.

? 1868 Semnophrys Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. p. 158.

Kopf quer; Gesicht quadratisch, unter den Fühlern höckerartig vortretend; Fühler ungefähr von Hinterleibslänge, dick,

gegen das Ende zugespitzt; Clypeus in der Mitte grubenartig vertieft; Mund rüsselartig vorgezogen. Thorax kaum länger als hoch, vorn zwischen dem Vorderrand des Mesonotums und dem Halse senkrecht abfallend; Mesonotum ohne Parapsidenfurchen; Schildchen kurz, stumpf dreieckig, von der Seite etwas zusammengedrückt und ziemlich bucklig; Metathorax allmählich abfallend, runzlig, ohne Felder; Luftlöcher gross und linear. Stigma im Vorderflügel lang und zugespitzt; Radius vor der Mitte desselben entspringend, an der Basis fast gerade; die Endhälfte des Radius an der Basis leicht gekrümmt, kaum länger als die Basalhälfte. Areola gross und schräg, trapezoidisch; Diskokubitalnerv gebogen, mit deutlichem Nervenast (Ramellus); der untere Aussenwinkel der Discoidalzelle spitz; Nervulus postfurkal; Nervellus sehr schräg, nahe dem oberen Ende gebrochen. Beine ziemlich lang und kräftig; Schiensporen lang; Klauen dünn und einfach. Hinterleib sitzend, oval spindelförmig, glatt und glänzend, mit zerstreuten Punkten; das 1. Segment hinten kaum doppelt so breit als an der Basis, doppelt so lang als hinten breit, hinter der Basis etwas bucklig, in der Mitte mit Längsfurche; das 2. Segment hinten etwas breiter als lang, an der Basis beiderseits eingedrückt; das 3. Segment breiter als lang, gegen das Ende kaum verbreitert; die folgenden Segmente allmählich schmaler werdend und etwas sichelförmig nach unten gekrümmt; das letzte Segment stumpf konisch; Genitalanhänge kurz und stumpf.

Im Habitus und Flügelnervatur erinnert die Gattung sehr an *Banchus volutatorius*; sie unterscheidet sich durch die verlängerten Mundteile, den deutlichen Ramellus und das nicht gedornete Schildchen.

**Rh. bicolor** Kriechb. 1894 Rh. bicolor Kriechbaumer, Termész. Füzet. XVII p. 60 ♀.

Schwarz; Kopf, Thorax und Beine braun behaart. Die inneren Augenränder und der grössere Teil der äusseren schmal hellgelb. Fühler rostrot, Schaft und Fühlerspitze schwarz. Flügel hyalin, Vorderflügel nur am Ende leicht getrübt; Stigma bräunlich, mit dunklem Rand; Tegulä und Flügelbasis rot. Beine schwarz, die vordersten Schenkel und Schienen vorn und die Kniee der Mittelbeine rötlichgelb. Das 1. Hinterleibssegment am Ende, das 2. mit Ausnahme einer Längsmakel an der Basis, Segment 3—5 an den Seiten und Segment 6 und 7 rot, das 6. Segment an der Basis mit einem spitz dreieckigen, schwarzen Flecke.

L. 13 mm. — ♂ unbekannt.

Ein einziges Exemplar aus Südungarn.

2. Gen. **Exetastes** Grav.

1829 Exetastes Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 395.

Kopf quer, nach hinten verschmälert, in der Regel dicht punktiert und matt; Augen innen nicht oder kaum ausgerandet; Fühler lang und dünn, gegen das Ende fein zugespitzt; Schaft am Ende schräg abgestutzt; Stirn eingedrückt; Gesicht in der Mitte schwach erhaben; Clypeus nicht vom Gesicht getrennt, am Ende abgestutzt und nicht eingeschnitten, beiderseits mit tiefen Gruben; Zwischenraum zwischen Augen und Mandibulabasis ziemlich gross; Mandibeln kräftig, stark gekrümmt, an der Basis aussen längsrissig, mit gleichlangen Endzähnen; Palpen fadenförmig. Thorax robust; Mesonotum dicht punktiert, schwach glänzend; Parapsidenfurchen kaum angedeutet; Schildchen am Ende abgerundet, ohne Dorn; Metathorax runzlig punktiert, ohne Felderung, mit länglich ovalen oder eine Längsspalte bildenden Luftlöchern; Brustseiten dicht und ziemlich grob punktiert. Endabschnitt des Radius doppelt geschwungen; Areola gross, rhombisch oder verschoben vierseitig; Diskokubitalnerv gebrochen, mindestens mit der Spur eines Nervenastes (Ramellus); Nervellus sehr schräg, weit über der Mitte gebrochen. Hinterbeine weit länger und kräftiger als die Vorderbeine; Klauen meist einfach, seltener mit zerstreuten, langen steifen Borsten, bei *E. crassus* ziemlich dicht und lang gekämmt. Hinterleib glatt und glänzend; Luftlöcher des 1. Segmentes kurz vor der Mitte; das 2. und 3. Segment an den Seiten gerandet, die folgenden Segmente von der Seite zusammengedrückt; Bohrer kurz vorstehend, höchst selten fast von halber Hinterleibslänge.

Die Unterscheidung der ziemlich zahlreichen Arten hat nicht geringe Schwierigkeit gemacht. Noch heute sind einige Gravenhorst'sche Arten ziemlich unklar. So hat sich herausgestellt, dass *E. albitarsus* Grav. weiter nichts ist als *Meniscus murinus* Grav. und es liegt die Befürchtung nahe, dass auch einige andere Arten, die nur in dem einen Geschlecht bekannt sind, gar nicht zur Gattung *Exetastes* gehören. So scheint mir der *E. latus* Grav. auch weiter nichts als eine dunkle Färbung des *Meniscus murinus* Grav. zu sein; sicherlich ist er kein *Exetastes*. Ueber den *E. nigripes* Grav. vergleiche man am Schluss der Arten.

Eine ziemliche Sonderstellung nimmt *E. crassus* Grav. ein, einesteils durch den robusten Bau, andernteils ganz besonders durch die ziemlich dicht und lang gekämmten Klauen. Ich würde denselben zu einer eigenen Gattung erhoben haben, hätte ich nicht gefunden, dass auch bei anderen Arten wenn

auch nur zerstreute Zähne oder Borsten auftreten, so z. B. bei *E. ichneumoniformis* und bei dem gemeinen *E. laevigator*. Eine scharfe Trennung lässt sich also nicht durchführen.

Was die Lebensweise betrifft, so haben sich alle Arten als Schmarotzer von Eulenraupen ergeben, nur der häufige *E. laevigator* ist von Giraud auch beim Kohlweissling gefunden worden, wofern nicht ein Irrtum vorliegt.

#### Uebersicht der Arten.

1. Hinterleib ganz schwarz. 2.  
Hinterleib ganz oder teilweise rot gefärbt. 10.
2. Schildchen weiss gezeichnet. 3.  
Schildchen ganz schwarz. 4.
3. Körper stark glänzend. Alle Schenkel und die Vorder-  
schienen rot, letztere an der äussersten Basis weiss. End-  
segmente hinten schmal weiss gerandet. ♂ in der Regel  
mit weissen Flecken vor und unter den Flügeln. 10 mm.

##### 1. **albiger** Kriechb. ♀♂.

Körper schwächer glänzend. Beine rot; Hüften, Trochan-  
teren, Endhälfte der hintersten Schienen und die hintersten  
Tarsen schwarz. ♂ ohne weisse Zeichnungen vor und  
unter den Flügeln; Schildchen nur an der Spitze weiss.  
10—12 mm.

##### 2. **Braunsi** D. T. ♀♂.

4. Fühler mit Weissm Ring. Glied 2—4 der hintersten Tarsen  
weiss oder gelblichweiss. 5.  
Fühler und die hintersten Tarsen ohne weissen Ring. 6.
5. Schenkel, Schienen und Tarsen rot; Glied 2—4 der hin-  
tersten Tarsen gelblichweiss; das 1. und 5. Tarsenglied  
rot. 10—11 mm.

##### 3. **cinctipes** Retz. ♀.

Beine schwarz, an den Vorderbeinen die Schenkelspitzen  
und Schienen verschwommen rötlich; Endhälfte des 2.  
Tarsengliedes der hintersten Beine, das 3. und 4. ganz  
und Basis des Endgliedes weiss. Beim ♂ Seitenflecken  
des Gesichtes und eine Bogenbinde des Clypeus weisslich.  
10—11 mm.

##### 4. **illyricus** Strobl.

6. Schenkel und Schienen rot, höchstens die hintersten  
Schienen zum Teil schwarz. 7.  
Hinterschenkel braun oder schwarz. (Sehr fragliche Arten.) 9.

7. Die hintersten Hüften und Schenkel und die Vorderbeine mit Ausnahme der Hüften und Trochanteren rot. Stigma schwärzlich. Bohrer kurz. Beim ♂ Seitenstreifen des Gesichtes, zuweilen auch des Mesonotums gelb. Grosse Art von 12—14 mm Länge.

5. **calobatus** Grav. ♀♂.

Alle Hüften und Trochanteren schwarz. 8.

8. Grosse Art von 13—15 mm Länge. Die hintersten Schienen wie die Schenkel gelbrot, nur an der Spitze schwarz. Bohrer kurz.

6. **fornicator** F. ♀♂.

Kleine Art von nur 10—11 mm Länge. Die hintersten Schienen gegen das Ende ausgedehnter schwärzlich gezeichnet. Bohrer ziemlich lang.

7. **alpinus** Kriechb. ♀♂.

9. Die vorderen Schenkel und Schienen rot; die hintersten Schenkel braunrot, die Schienen schwarz. Bohrer sehr kurz. Beim ♂ Clypeus und oft auch eine Gesichtsmakel gelb; 12—13 mm.

30. **aethiops** Grav. ♀♂.

Alle Schenkel und Schienen rotbraun. Bohrer von  $\frac{1}{8}$  Hinterleibslänge. Fühler auf der Unterseite in der Mitte rot. 12 mm.

31. **brunnipes** Grav. ♀.

10. Fühler mit weissem oder gelbem Ring. 11.

Fühler ohne weissen oder gelben Ring. 18.

11. Mesonotum vorn beiderseits mit gelbem Längsfleck. Schildchen gelb oder mit gelbem Punktfleck. Schenkel, Schienen und Hinterleibsmittle rot; die hintersten Schienenspitzen und Tarsen schwarz, letztere mit weissem Ring. 12 mm.

29. **bilineatus** Grav. ♂.

Mesonotum ohne gelbe Schulterflecken. 12.

12. Die hintersten Schenkel schwarz, an der Spitze rötlich; beim ♂ braun, oben und am Ende unbestimmt rötlich. Fühlerring und Schildchen gelb. Grosse Art von 14—16 mm.

8. **ichneumoniformis** Grav. ♀♂.

Alle Schenkel rot. Fühlerring weiss; Schildchen schwarz oder weiss gezeichnet. 13.

13. Hinterschienen schwarz. 14.

Hinterschienen rot, höchstens an der Spitze schwarz. 16.

14. Schildchen nicht weiss gezeichnet, sondern Thorax einfarbig schwarz. Beim ♂ die hintersten Tarsen mit Weissm Ring. Hinterleib meist ganz rot, nur die Basis des 1. Segmentes schwarz. 8—11 mm.

9. **medianus** Szepl. ♀♂.

Schildchen ganz weiss oder mit Weissm Fleck. 15.

15. Schildchen ausgedehnt weiss. Das 2. Geisselglied wenig länger als breit. Die hintersten Tarsen mit schmalen Weissm Ring. 8—12 mm.

10. **guttatorius** Grav. ♀♂.

Schildchen nur mit kleiner Weissm Makel. Das 2. Geisselglied doppelt so lang als breit. Glied 2—4 der hintersten Tarsen weiss. 9—10 mm.

11. **guttifer** Thoms. ♀♂.

16. Schildchen schwarz. Fühler des ♀ und die Hintertarsen bei ♀ und ♂ mit Weissm Ring. Hinterleibsmittle und Schenkel und Schienen rot, die hintersten mit schwarzen Spitzen. Beim ♂ das Gesicht weiss gezeichnet. 11—13 mm.

13. **illusor** Grav. ♀.

Schildchen weiss gezeichnet. Spitzen der hintersten Schienen und die hintersten Tarsen braun, letztere mit Weissm Ring. 17.

17. Hüften, Trochanteren und Hinterleibsspitze schwarz. Fühler fast länger als der Körper, dünn und sehr lang zugespitzt. Färbung gelbbrot. 11—13 mm.

14. **gracilicornis** Grav. ♀.

Die ganzen Beine mit Ausnahme der hintersten Schienenspitzen und Tarsen und der Hinterleib rot. Fühler wenig länger als Kopf und Thorax zusammen. Habitus von *E. guttatorius*. 9—10 mm.

12. **syriacus** n. sp. ♀♂.

18. Schildchen weiss oder gelblich gezeichnet. 19.  
Schildchen schwarz, nicht weiss oder gelblich gezeichnet. 23.

19. Gesicht weiss. 20.  
Gesicht nicht weiss. 21.

20. Die hintersten Schienen und Metatarsen rötlich, die folgenden Tarsenglieder gelblich. Mesonotum vorn mit gelben Seitenflecken. Schildchen mit gelbem Endfleck. Hinterleibsmittle rötlich, verschwommen dunkel gezeichnet. 11—12 mm.

3. **cinctipes** Retz. ♂.



Die hintersten Schienen und zwei Drittel des Metatarsus schwarz, die übrigen Tarsenglieder weisslich.

15. **facialis** Desv. ♂.

21. Schenkel und Schienen rot, die hintersten Schienen höchstens an der Spitze verdunkelt. Endsegmente verdunkelt, mit weisslichen Endsäumen.

14. **gracilicornis** Grav. ♂.

Mindestens die hintersten Schienen schwarz und nur an der Basis schmal rötlich. 22.

22. Beine schwarz, nur die vordersten Schienen vorn rötlich. ♂ mit weissen Schulterflecken. Stirn beiderseits hinter den Fühlern mit tiefem Eindruck; dazwischen ein deutlicher Höcker. Bohrer so lang wie das halbe 1. Segment. 11—13 mm.

16. **notatus** Holmgr. ♀♂.

Schenkel und Vorderschienen, sowie Segment 1—3 rot, das 1. an der Basis schwarz. Die hintersten Schienen schwarz, an der Basis rot. Bohrer weit vorstehend, fast von  $\frac{1}{3}$  Hinterleibslänge. 12—14 mm.

17. **robustus** Grav. ♀♂.

23. Hintertarsen weiss oder gelb geringelt. 24.  
Hintertarsen nicht weiss oder gelb geringelt. 29.

24. Gesicht, Clypeus und Mandibeln ausgedehnt weisslich gezeichnet. Vorderschenkel an der Basis, Hinterschenkel an der Spitze breit schwarz; die hintersten Schienen schwarz, im Basaldrittel rötlich. Hinterleib rot, an Basis und Spitze schwarz. 12—13 mm.

13. **illusor** Grav. ♂.

Gesicht nicht weiss gezeichnet. 25.

25. Hinterschenkel rot. 26.  
Hinterschenkel schwarz. 28.

26. Kopf und Thorax kurz und dicht schwarz behaart. Hinterschienen schwarz, nur an der Basis rot.

cf. 23. **puberulus** Szepl.

Kopf und Thorax nicht auffallend behaart. 27.

27. Hinterschenkel an der Spitze breit schwarz. Bohrer kurz. Fühler lang und schlank, bei ♀ und ♂ ohne weissen Ring. 12—14 mm.

18. **geniculosus** Holmgr. ♀♂.

Hinterschenkel rot, an der Spitze nicht schwarz. Bohrer ziemlich lang, kaum kürzer als das 1. Segment. Fühler kurz. Endglieder der hintersten Tarsen gelblich. 9—13 mm.

19. **laevigator** Vill. ♀♂.

28. Vorderschenkel oben an der Basalhälfte, Mittelschenkel mit Ausnahme der Spitze schwarz. Die hintersten Beine schwarz, Schienen an der Basis trüb rötlich, Tarsenglieder 3 und 4 weiss. 12—13 mm.

24. **nigripes** Grav. ♂.

Vorder- und Mittelschenkel rötlichgelb, höchstens an der Basis etwas gebräunt. Die hintersten Schienen und Tarsen rötlichgelb, Schienen am Ende schwärzlich, das letzte Tarsenglied gebräunt. 12—13 mm.

25. **flavitaris** Grav. ♂.

29. Hinterschenkel rot. 30.  
Hinterschenkel schwarz. 35.

30. Beine schwarz, nur die hintersten Schenkel rot, mit schwarzen Spitzen. Segment 1 am Ende breit, 2 und 3 ganz und 4 an der Basis rot. Bohrer nicht ganz so lang wie das 1. Segment. 12—13 mm.

20. **femorator** Desv. ♀ ♂.

Alle Schenkel ganz oder grösstenteils rot. 31.

31. Schenkel, Schienen und Tarsen rot, die hintersten Schienen am Ende kaum verdunkelt, nur die hintersten Tarsen bräunlich. Flügel namentlich beim ♀ stark verdunkelt. Segment 1 hinten und 2 und 3 rot. Beim ♂ der Scheitel beiderseits neben den Augen mit braunroter Makel. 11—13 mm.

21. **nigripennis** Grav. ♀ ♂.

Die hintersten Schienen am Ende mehr oder weniger ausgedehnt schwarz. Flügel heller. 32.

32. Bohrer fast halb so lang als der Hinterleib. Körper gross und robust. Fühler kurz und dick. Clypeus mit gelblicher Querbinde. Die hintersten Schienen und Tarsen braun, Schienen an der Basis verschwommen rötlich. Segment 1 am Ende und 2—4 hell braunrot, Endsegmente mit rötlichem Endrand. 14 mm.

27. **crassus** Grav. ♀.

Bohrer nicht über ein Drittel der Hinterleibslänge. Körper weniger robust. 33.

33. Hinterschienen nur an der Spitze verdunkelt. Segment 6 und 7 hinten schmal weiss gerandet. Ein dreieckiger Schulterfleck und eine unterbrochene Querbinde am Ende des Metathorax gelb. Segment 1—4 rot. 10 mm.

22. **variegatus** Szepl. ♂.

Hinterschienen schwarz, nur an der Basis rot. Segment 6 und 7 hinten nicht weiss gerandet. 34.

34. Kopf und Thorax dicht und kurz schwarz behaart. Die hintersten Tarsen zum Teil rot. Ende des 1. Segmentes, das 2. und 3. ganz, das 4. an der Basis, zuweilen ganz rot. 10—12 mm.

23. **puberulus** Szepl. ♀♂.

Kopf und Thorax nicht auffallend behaart. Die hintersten Schienen und Tarsen schwarz, die Schienen an der Basis rot. Körper gross und robust. Das 1. Segment am Ende und das 2.—4. rot. 12—14 mm.

28. **bicoloratus** Grav. ♀♂.

35. Vorder- und Mittelschienen einfarbig rostrot, die hintersten Schienen braunrot, gegen das Ende schwärzlich. Endhälfte von Segment 1 und 2—4 rot, das 4. namentlich beim ♂ am Ende meist bräunlich. 12—13 mm.

24. **nigripes** Grav. ♀.

Vorder- und Mittelschienen oben braun, unten gelb. Endhälfte von Segment 1 und 2 und 3 rot. Grösser und robuster als die vorige Art. 13—14 mm.

26. **inquisitor** Grav. ♀.

1. **E. albiger** Kriechb. 1886 Exetastes albiger Kriechbaumer, Entom. Nachr. XII p. 245 ♀♂.

Körper stark glänzend; dadurch erinnert die Art, wie schon Kriechbaumer richtig bemerkt, sehr an *Leptobatus rufipes*. Gesicht und Metathorax sind matt; ersteres ist dicht und ziemlich grob punktiert, der Metathorax ist grob runzlig-punktiert, mit linearen Luftlöchern. Areola im Vorderflügel deutlich gestielt. Klauen unbewehrt. Bohrer kurz vorstehend, etwa halb so lang wie das 1. Segment. — Schwarz; Fühler ohne hellen Ring. Eine Makel unterhalb der Flügelbasis und Schildchen weiss. Flügel schwach getrübt; Stigma gelblich. Schenkel und Schienen gelbrot; die hintersten Schienen mit Ausnahme des gelbroten Basaldrittels und die hintersten Tarsen schwarzbraun, letztere an der Basis der Glieder gelbrot. Hinterleibssegmente 2—7 oben mit weissem Endrande. Bauchfalte schwarz, mit weisslichen Einschnitten. Die Männchen haben nach Kriechbaumer weisse Schulterbeulen; bei meinen beiden Exemplaren ist das nicht der Fall, bei dem einen fehlt sogar der weisse Fleck unter den Fühlern.

L. 10—12 mm.

Die Art wurde von Kriechbaumer nach Exemplaren von Zara in Dalmatien beschrieben. Mir wurde sie durch den bekannten Lepidopterologen Herrn Amtsgerichtsrat Püngeler in Aachen eingesandt, der sie aus *Cucullia linosyridis* (anthemidis) von St. Goarshausen gezogen hatte. Die Art scheint also weiter verbreitet zu sein.

2. **E. Braunsi** D. T. 1901 *Exetastes Braunsi* Dalla Torre, Catal. Hymen. Vol. III p. 69 ♀ ♂ | 1888 *Exetastes scutellaris* Brauns, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII p. 7 ♀ ♂ (non Cresson 1865).

Die Art musste umgetauft werden, weil bereits Cresson einen *E. scutellaris* aus Nordamerika beschrieben hat.

Diese und die vorhergehende Art sind eng mit einander verwandt. Während *E. albiger* durch den starken Glanz mehr an *Leptobatus* erinnert, steht *E. Braunsi* im Habitus dem gemeinen *E. guttatorius* sehr nahe. *E. albiger* ist eine südliche Art, *E. Braunsi* scheint dem Alpengebiete eigentümlich zu sein.

Ziemlich glänzend. Kopf hinter den Augen etwas verschmälert. Gesicht matt. Fühler länger als der halbe Körper, beim ♂ länger als beim ♀. Thorax robust, fein punktiert; Metathorax runzlig-punktiert; Luftlöcher oval, beim ♂ linear. Areola gross, kurz gestielt; Ramellus deutlich, Nervellus stark postfurkal, weit über der Mitte gebrochen. Hinterleib glatt und glänzend, Luftlöcher des 1. Segmentes vorragend; Segment 2 und 3 von gleicher Länge; Bohrer wenig länger als das 2. Segment; Bohrerklappen gegen das Ende etwas verbreitert. — Schwarz. Fühler ohne hellen Ring. Schildchen weiss, beim ♂ nur an der Spitze. Beine rot; Hüften, Trochanteren, Endhälfte der hintersten Schienen und die hintersten Tarsen schwarz.

L. 10—12 mm.

Brauns beschrieb die Art nach Schweizer Exemplaren; ich besitze mehrere Stücke von Innsbruck.

3. **E. cinctipes** Retz. 1783 *Ichneumon cinctipes* Retzius, Gen. et spec. Insect. p. 68 | 1785 *Ichneumon junci* Fourcroy, Entom. Paris II. p. 413 | 1787 *Ichneumon osculatorius* Fabricius, Mant. Insect. I p. 151 ♂ | 1793 *Ichneumon clavator* Fabricius, Entom. System. II p. 151 ♀ | 1804 *Ophion clavator* Fabricius, Syst. Piez. p. 134 ♀ | 1804 *Ophion tarsator* Fabricius Syst. Piez. 134 ♀ | 1829 *Exetastes clavator* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 405 ♀ | 1829 *Exetastes osculatorius* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 413 ♂ | 1899 *Exetastes cinctipes* Thomson, Opusc. Entom. XXII p. 2414 ♀ ♂.

Die vorliegende Art ist unter verschiedenen Namen beschrieben worden, hauptsächlich weil die beiden Geschlechter verschieden von einander gefärbt sind und als zwei verschiedene Arten aufgefasst wurden.

Kopf und Thorax schwach glänzend; Hinterleib mit stärkerem Glanz. Kopf nach hinten verschmälert; Fühler fast von Körperlänge, dünn; Gesicht dicht und fein punktiert, matt. Thorax etwas schmaler als der Kopf; Metathorax grob runzlig. Flügel nur mit Andeutung des Ramellus. Hinterleib glatt und glänzend; das 2. und 3. Segment von gleicher Länge; Bohrer etwa so lang wie das 2. Segment. —

♀. Schwarz. Fühler mit weissem Ring. Tegulä dunkelbraun; Stigma gelblich. Beine rostrot, Hüften und Trochanteren schwarz; die hintersten Schienen an der Spitze verdunkelt; Vordertarsen bräunlich; der hinterste Metatarsus rostrot, Glied 2—4 gelblichweiss, das Endglied schwach verdunkelt.

♂. Das ♂ weicht bedeutend vom ♀ ab, namentlich durch die helle Zeichnung von Mesonotum und Schildchen und durch die rötliche Hinterleibsmittle. — Schwarz. Gesicht, Clypeus, Palpen und Mandibeln gelblichweiss; Fühler ohne weissen Ring, Schaft auf der Unterseite meist mit weissem Fleck. Je ein langer Seitenfleck vorn auf dem Mesonotum, Schulterbeulen, ein Fleck unterhalb der Flügelbasis und Schildchen Spitze weisslichgelb. Sehr selten ist das Schildchen ganz schwarz. Flügel schwach getrübt; Tegulä weisslichgelb; Stigma dunkelgelb. Beine wie beim ♀ gefärbt; die vorderen Hüften und Trochanteren unten weisslichgelb. Hinterleibsmittle verschwommen rostrot gezeichnet; und zwar ist meist der Endrand des 1. Segmentes und das 2. bis 4. Segment vorn in der Mitte von rostroter Färbung.

L. 10—12 mm.

Die Art scheint über ganz Europa verbreitet aber nirgends häufig zu sein. Hier in Thüringen ist sie sehr selten; ich habe bis jetzt nur wenige Stücke gefunden. — Als Wirte werden angeführt *Mamestra brassicae*, *Retinia pinicolana*, *Noctua persicariae* und *N. oleracea*.

4. ***E. illyricus*** Strobl. 1903 *Exetastes illyricus* Strobl, *Ichneum. Steierm.* V. Fam. Ophion. pp. 45 und 46 ♀ | 1909 *Exetastes illyricus* Habermehl, *Deutsch. Ent. Zeitschr.* p. 567 ♀♂.

Die Art hat im Habitus und in der Färbung eine ganz täuschende Aehnlichkeit mit dem *Euryproctus annulatus*; durch die ganz verschiedene Areola sind beide leicht von einander zu unterscheiden.

Kopf und Mesonotum fein runzlig punktiert und matt. Kopf nach hinten verschmälert; Fühler von Körperlänge, dünn borstenförmig; Seiten von Brust und Metathorax dicht punktiert, schwach glänzend; Metathorax obenauf ziemlich grob gerunzelt, mit länglich ovalen Luftlöchern.

Areola fast sitzend; Ramellus deutlich. Klauen unbewehrt. Hinterleib mit fein lederartiger Skulptur, ziemlich glänzend; Bohrer so lang wie das 2. Segment. — Schwarz. Fühler mit weissem Ring. Flügel fast hyalin; Stigma braun; Tegulä schwarz. Beine schwarz, an den Vorderbeinen die Schenkelspitzen und Schienen verschwommen rötlich. Endhälfte des 2. Tarsengliedes der hintersten Beine, das 3. und 4. ganz und die Basis des Endgliedes weiss. Die mittleren Segmente mit rötlichen Einschnitten.

Beim ♂ hat das Gesicht beiderseits neben den Augen je einen weissen Fleck, der Clypeus hat oben eine weisse Bogenbinde. Im Uebrigen stimmt es in der Färbung mit dem ♀ überein. Der weisse Fühlerring ist breit; die hintersten Metatarsen sind nur im Basaldrittel schwarz, das Endglied ist fast ganz weiss.

L. 10—12 mm.

Die Art wurde von Strobl in Steiermark entdeckt, später fand sie Habermehl am Rhein, ich selbst besitze beide Geschlechter von Blankenburg in Thüringen.

5. **E. calobatus** Grav. 1829 *Exetastes calobatus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 405 ♀ | 1878 *Exetastes calobatus* Bridgman, Entomologist p. 36 ♂ | 1895 *Exetastes calobates* Kriechbaumer, Schletterer: Prog. Gymnas. Pola p. 37 ♂.

Die Art ist mit *E. fornicator* verwandt, sie unterscheidet sich abgesehen von der Färbung der hintersten Beine durch schlankere Fühler und Beine und das schmälere erste Segment.

Kopf nach hinten deutlich verschmälert; Fühler dünn borstenförmig, fast von Körperlänge. Areola im Vorderflügel sitzend. Beine schlank. Hinterleib schmaler als Kopf und Thorax, gegen das Ende von der Seite zusammengedrückt; das 1. Segment fast drei mal so lang als hinten breit; Bohrer kurz, kaum so lang wie das 2. Segment. — Schwarz. Fühler und die hintersten Tarsen bei beiden Geschlechtern ohne hellen Ring. Flügel schwach getrübt; Stigma braun, Tegulä schwärzlich. Vorderbeine gelbrot, Hüften und Trochanteren schwarz, Tarsen am Ende braun; die hintersten Beine schwarz, Hüften und Schenkel gelbrot.

Beim ♂ sind die Maxillarpalpen, das letzte Glied der Labialpalpen, ein länglicher Fleck der Mandibeln, ein nach oben oder beiderseits zugespitzter Streif am Augenrande des Gesichtes und zuweilen ein solcher beiderseits auf dem Mesonotum, sowie der Clypeus gelb. Vorderhüften schwarz,

unten gelb; Mittel- und Hinterhüften rötlichgelb, Mittelhüften an der Basis mit schwarzem Fleck.

L. 12—14 mm.

Die Art ist selten und scheint mehr im Süden vorzukommen. Gravenhorst's Exemplare stammten von Oberitalien. Schletterer hat sie bei Pola gefangen und zwar auf *Pinus halepensis*. Nach Bridgman kommt sie auch in England vor. Ich kenne sie nicht.

6. **E. fornicator** F. 1781 *Ichneumon fornicator* Fabricius, Spec. Insect. I p. 432 | 1798 *Banchus fornicator* Fabricius, Suppl. entom. System. p. 233 | 1829 *Exetastes fornicator* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 402 ♀♂.

Eine der grössten *Exetastes*-Arten; daran und an der Färbung leicht kenntlich. Körper robust. Kopf nach hinten verschmälert, dicht runzlig-punktiert; Oberkopf schwach glänzend; Gesicht matt. Fühler ziemlich kräftig, borstenförmig, wenig kürzer als der Körper. Thorax robust, dicht punktiert, schwach glänzend; Metathorax grob runzlig-punktiert, matt, mit Spuren von Längsleisten; Luftlöcher linear. Areola gross, gestielt; Diskokubitalnerv deutlich gebrochen und mit langem Ramellus. Beine, namentlich die hintersten, kräftig; Klauen den Pulvillus deutlich überragend, die der Vorderbeine mit einigen Kammborsten; die der hintersten Beine fast ohne solche. Hinterleib glatt und glänzend; die vorderen Segmente namentlich an den Seiten mit zerstreuten Punkten; Segment 2 und 3 so lang als breit, unter sich von gleicher Länge; die folgenden Segmente stark von der Seite zusammengedrückt; Bohrer kurz, etwas kürzer als das 2. Segment. — Schwarz. Schenkel, Schienen und Vordertarsen gelbrot; Spitzen der hintersten Schienen und die hintersten Tarsen dunkelbraun, Tarsen gegen das Ende rötlich.

Var. Das 2., selten auch das 3. Segment verschwommen rötlich gezeichnet.

L. 14—16 mm.

Verbreitet und meist nicht selten. Hier in Thüringen nicht so häufig wie *E. guttatorius*, *laevigator* und *illusor*. — Als Wirte sind bekannt: *Noctua oleracea*, *Cucullia balsamita* und *Hadena brassicae*.

7. **E. alpinus** Kriechb. 1888 *Exetastes alpinus* Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIV p. 354 ♀♂.

„Kopf und Thorax punktiert, ziemlich glänzend. Hinterleib glatt und glänzend; Bohrer im Verhältnis länger als bei dem verwandten *E. fornicator*. — Schwarz. Stigma im Vorderflügel gelblich. Schenkel, Schienen und Vordertarsen

gelbrot. Die hintersten Schienen und Tarsen schwarzbraun, die Schienen nur an der Basis gelbrot. — Das ♂ stimmt mit dem ♀ überein; die Fühler sind etwas länger und kräftiger.

Man könnte geneigt sein, diese niedliche Art für eine verkümmerte Form des *E. fornicator* zu halten, da Gravenhorst's Diagnose und Beschreibung dieser Art sich recht gut darauf anwenden liesse; nur die Angabe „*aculeus longitudine sextae partis abdominis*“ spricht dagegen und macht eine Vereinigung mit dieser Art unmöglich. Von der Farbe des Hinterleibs abgesehen, scheint mir vielmehr *E. laevigator* am nächsten verwandt zu sein und da bei diesem Exemplare vorkommen, bei welchen die schwarze Färbung des Hinterleibs mehr als gewöhnlich sich ausbreitet, so könnte *E. alpinus* vielleicht für eine Varietät genannter Art mit schwarzem Hinterleib gehalten werden. Allein abgesehen von der nach den bisherigen Erfahrungen standhaft schwarzen Färbung ist *E. alpinus* auch kürzer und gedrungener, im Ganzen auch etwas kleiner. Bei einem der ♀ zeigt das 3. und 4. Glied der Hintertarsen eine kleine Neigung zu hellerer Färbung, während die Hintertarsen des ♂ entschieden schwarz gefärbt sind.

L. 10—11, Bohrer  $2\frac{1}{2}$  mm.

Die Art ist bis jetzt nur aus dem höheren Alpengebiete bekannt. Sie wurde gefunden im Engadin und in Graubünden, bei Andermatt, auf der Alp Sussillon im Wallis und auf dem Stifserjoch.

Ich besitze ein *Exetastes*-Pärchen aus Innsbruck durch Friese. Bei diesem sind die hintersten Schienen nur in der Endhälfte, namentlich auf der Rückseite gebräunt. Auffallend ist, dass bei dem ♂ Glied 3—5 der hintersten Tarsen weisslich ist. Ohne weiteres Material möchte ich keine neue Art daraus machen.

8. ***E. ichneumoniformis*** Grav. 1829 *Exetastes ichneumoniformis* Gravenhorst, *Ichneum.* Eur. III p. 410 ♀♂ | 1899 *Exetastes ichneumoniformis* Kriechbaumer, *Entom. Nachr.* XXV p. 303 ♀♂.

Eine der grössten und auffallendsten *Exetastes*-Arten. Körper ziemlich schlank. Kopf und Thorax dicht und ziemlich grob punktiert, matt. Kopf nach hinten verschmälert; Fühler fast von Körperlänge, borstenförmig. Metathorax wie bei *E. fornicator* grob runzlig punktiert, mit linearen Luftlöchern. Flügel mit grosser, kurzgestielter Areola und deutlichem Ramellus. Klauen der Vorderbeine mit deutlichen Kammborsten, die der hintersten Beine fast



einfach. Hinterleib schmaler als der Thorax, gegen das Ende von der Seite zusammengedrückt; glänzend, bei starker Vergrösserung mit feiner Skulptur und zerstreuter Punktierung; das 1. Segment mit Längsfurche; das 2. und 3. Segment von gleicher Länge, so lang als breit; Bohrer kurz, nicht ganz so lang als das 2. Segment. — Schwarz. Fühler mit gelbem Ring. Hals mit gelbem Vorderrand. Palpen rötlichgelb, Schildchen gelb. Flügel gelblich; Stigma und Nerven rostgelb; Tegulä gelblich. Beine rotgelb; Hüften und Trochanteren schwarz; die hintersten Schenkel mit Ausnahme der Spitze schwarzbraun; die hintersten Schienen am Ende braun; Glied 2—4 der hintersten Tarsen gelblichweiss. Endrand des 1. Segmentes und das 2. und 3. rotgelb; die Endsegmente schwärzlich oder braunschwarz, das 4. und 5. mit rötlichem Saum, die folgenden am Endrande gelb.

Das ♂ stimmt mit dem ♀ überein; es hat wie dieses gelbgeringelte Fühler und Hintertarsen. Bei meinem Exemplar ist der Clypeus schwarz; nach Kriechbaumer soll er auch gelblich vorkommen. Nach Gravenhorst sind die Hintertarsen einfarbig rötlich; es ist kein Grund anzunehmen, dass er möglicherweise eine andere Art vor sich gehabt hat, wie Kriechbaumer andeutet. Die hintersten Schenkel sind nach Kriechbaumer braun, oben und am Ende verschwommen braunrot. Bei meinem Exemplar sind sie schwarz, an der äussersten Basis und Spitze rötlich. Der Clypeus ist gelblich, was Gravenhorst ebenfalls zu erwähnen vergessen hat.

L. 14—16 mm.

Die Art ist aus Deutschland und Oesterreich bekannt, ist aber selten und scheint an vielen Orten ganz zu fehlen. Ich fing sie vor Jahren bei meinem früheren Wohnorte Gumperda in Thüringen fast jedes Jahr und zwar nur in einem kleinen Kiefernwäldchen; hier bei Blankenburg ist sie mir nie vorgekommen.

9. **E. medianus** Szépl. 1898 *Exetastes medianus* Szepligeti, Rovart. Lapok V p. 30 ♀♂.

„Schwarz. Mitte der Fühler unten weiss. Hinterleib rot, Basis des 1. Segmentes schwarz. Beine rot, Hüften, Trochanteren, Hinterschienen und Tarsen schwarz, manchmal auch die Spitze der Hinterschenkel; Basis der Hinterschienen rot. Stigma dunkelbraun. Beim ♂ das 3. und 4. Tarsenglied weiss.

Var. ♀. Basalhälfte des 1. Segmentes und Segment 6 und 7 schwarz.

L. 8--11 mm.

Ungarn.

Von *E. cinctipes*, *bilineatus* und *variegatus* verschieden durch den einfarbigen Thorax, von ersterem noch durch das schwarze Gesicht, von letzterem noch durch die nicht weiss gesäumten Segmente 6 und 7."

10. ***E. guttatorius*** Grav. 1829 *Exetastes guttatorius* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 411 ♀♂ | 1858 *Exetastes guttatorius* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 154 ♀♂ | 1899 *Exetastes guttatorius* Thomson, Opusc. Entom. XXII p. 2417.

Kleine, höchstens mittelgrosse und ziemlich schlanke Art. Kopf nach hinten verschmälert, fein und dicht runzlig-punktiert, matt; Fühler kurz, wenig länger als der halbe Körper; das 2. Geisselglied kaum länger als breit. Mesonotum und Seiten des Thorax dicht punktiert und ziemlich glänzend; Metathorax ziemlich grob gerunzelt, mit Spuren von Längsleisten, hinten mit Querleiste. Areola sitzend oder kurz gestielt; Diskokubitalnerv mit kurzem aber deutlichem Ramellus. Hinterleib schlank, glatt und glänzend; das 1. Segment lang, ziemlich stark gekrümmt; das 2. Segment deutlich länger als hinten breit, etwas länger als das 3. Segment, dieses nur wenig länger als breit; Bohrer lang, kaum kürzer als das 1. Segment. — Schwarz. Fühler mit weissem Ring. Am Thorax ist das Schildchen ganz oder zum Teil weiss; in der Regel ist nur die Hinterhälfte weiss. Schulterbeulen nicht selten weiss gefleckt. Flügel kaum getrübt; Stigma braun oder braungelb; Nerven schwärzlich; Tegulä schwarz, zuweilen rötlich gefleckt. Beine rot; Hüften, Trochanteren, die hintersten Schienen und Tarsen schwarz, letztere mit schmalem weissen Ring, in der Regel ist das 3. Tarsenglied weiss, mit etwas verdunkeltem Ende. Nach Gravenhorst sollen die hintersten Tarsen schwarz, die mittleren Glieder, entweder Glied 3 oder 2 und 3 oder 2—4 rostrot sein. Hinterleib rot, die Basis des 1. Segmentes, zuweilen auch die Endsegmente schwarz.

Das ♂ stimmt mit dem ♀ fast ganz überein. Der Kopf ist ganz schwarz; die Fühler haben meist nur einen schmalen weissen Ring. Der Halsrand ist weiss, meist auch ein schmaler Streif unter der Flügelbasis und die Schulterbeulen. Das Schildchen ist zuweilen ganz weiss. Die Schulterbeulen sind meist ganz schwarz. Die hintersten Tarsen wie beim ♀ mit schmalem weissen Ring.

L. 8—12 mm.

Durch ganz Europa verbreitet und eine der häufigsten Arten. — Als Wirte werden angeführt *Caradrina Kadenii* und *ambigua* und *Toxocampa pastinum*. Ihrer Häufigkeit nach zu schliessen, muss die Art noch bei zahlreichen anderen Wirten schmarotzen.

11. **E. guttifer** Thoms. 1899 *Exetastes guttifer* Thomson, Opusc. Entom. XXII p. 2417 ♀ | 1829 *Exetastes guttatorius* var. Gravenhorst, Op. Ichneum. Eur. III p. 411 ♀.

„Schwarz, Hinterleib mit Ausnahme der Basis, Vorder-schienen und alle Schenkel rot; Fühler und die hintersten Tarsen mit weissem Ring; Schildchen an der Spitze weiss.

Dem *E. guttatorius* ähnlich und verwandt, aber Schildchen nur mit weissem Fleck an der Spitze, Glied 2—4 der hintersten Tarsen weiss, Hinterleib länger, die Endsegmente mehr vorgezogen, Bohrer länger, das 2. Geisselglied doppelt so lang als breit und die Brustseiten feiner punktiert.

L. 9—10 mm.

Schweden.“

Ich muss gestehen, dass es mir nicht gelungen ist, einen scharfen Unterschied zwischen *E. guttatorius* und *E. guttifer* herauszufinden.

12. **E. syriacus** n. sp.

In Grösse, Habitus und Skulptur mit *E. guttatorius* übereinstimmend und nur durch die Färbung verschieden.

Fühler wie bei *E. guttatorius* mit breitem weissen Halbring. Schildchen fast ganz weiss, an der Basis in der Mitte rötlich gefleckt; Schulterbeulen weiss gefleckt. Tegulä nicht wie bei *E. guttatorius* schwarz, sondern rostrot mit weissem Fleck. Stigma braun, Nervatur schwärzlich. Der Ramellus ist bei allen Exemplaren nur angedeutet, während er bei *E. guttatorius* ziemlich lang ist. Die ganzen Beine mit Einschluss der Hüften und Trochanteren rot, nur die äusserste Spitze der hintersten Schienen und die hintersten Tarsen mit Ausnahme von Glied 3 und 4 gebräunt, die letzterwähnten Glieder weisslich. Der ganze Hinterleib rot.

Beim ♂ ist der weisse Fühlerring schmaler und umfasst auch die Unterseite. Der Clypeus ist rostgelb. Halskragen, Tegulä, Schulterbeulen, ein Streif unter der Flügelbasis und das Schildchen sind weiss; in die Basis des letzteren greift die schwarze Färbung dreieckig ein. Die Spitze der hintersten Schienen ist breiter und dunkler braun gefärbt; die hintersten Tarsenglieder 1, 2 und 5 sind schwärzlich, die übrigen weiss. Der Hinterleib ist wie beim ♀ ganz rot.

L. 9—10 mm.

Ich traf die Art im April 1909 am Oelberg bei Jerusalem, namentlich an der Ostseite bei Bethanien; sie besuchte die zahlreichen Dolden, die dort in den Feldern stehen. Später fand ich die Art auch bei Jericho, ebenfalls auf Dolden. Ich hielt sie beim ersten Anblick für *E. guttatorius* und man könnte sie auch als geographische Form der erwähnten Art auffassen.

13. **E. illusor** Grav. 1829 *Exetastes illusor* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 427 ♀♂ | 1858 *Exetastes illusor* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 151 ♀♂ | 1899 *Exetastes illusor* Thomson, Opusc. Entom. XXII p. 2416 ♀♂.

Durchschnittlich etwas grösser als *E. guttatorius*, mit längeren und dünneren Fühlern und kürzerem Bohrer. Kopf nach hinten verschmälert, fein lederartig, fast matt; Stirn beiderseits oberhalb der Fühler mit glatten und glänzenden Vertiefungen; Fühler dünn borstenförmig, fast von Körperlänge. Mesonotum, Schildchen und Thoraxseiten fein und dicht punktiert, ziemlich glänzend; Metathorax dicht und fein gerunzelt, matt, mit fast linearen Luftlöchern. Areola kurz gestielt oder fast sitzend; Ramellus deutlich; Nervulus in der Regel weit hinter der Gabel. Hinterleib fast glatt, glänzend; das 1. Segment mit seichter Längsrinne und vorspringenden Luftlöchern, das 2. und 3. Segment von gleicher Länge, etwas länger als breit; Bohrer kurz, nur halb so lang als das 1. Segment. — Schwarz. Fühler mit weissem Halbring. Kopf und Thorax beim ♀ ohne jede weisse Zeichnung. Stigma im Vorderflügel gelblich; Nerven und Tegulä schwärzlich. Beine rot, Hüften, Trochanteren, Basis der Vorderschenkel und die Spitze der hintersten Schenkel ziemlich breit schwarz; Endhälfte der hintersten Schienen und alle Tarsen braun; die hintersten Tarsen mit einem meist verschwommenen weissen Ring; gewöhnlich ist das Ende des 2. Gliedes und das 3. und 4. zum Teil weisslich. Hinterleib rot, Basis des 1. Segmentes und die Hinterleibsspitze schwarz.

Dem ♂ fehlt der weisse Fühlerring, die Fühler selbst sind gegen das Ende bräunlich. Gesicht mit grossen gelblichweissen zackigen Seitenflecken, die in der Gesichtsmitte 2 Längsstreifen emporschicken. Clypeus, Basis der Mandibeln und Palpen ebenfalls gelblichweiss. Thorax und Flügel wie beim Weibchen. An den Beinen ist die schwarze Färbung an der Basis der Vorderschenkel ausgedehnter, die hintersten Schenkel sind im ganzen Enddrittel schwarz. Vordertarsen rötlich, der weisse Ring der hintersten Tarsen scharf und zwar nimmt er die Endhälfte des 2. und das

ganze 3. und 4. Glied ein. Die mittleren Segmente sind zuweilen, namentlich an den Seiten, dunkel gewässert.

L. 11—13 mm.

Durch den grössten Teil von Europa verbreitet und wohl überall nicht selten; hier in Thüringen jedoch nicht so häufig als *E. guttatorius* und *laevigator*. — Als Wirte werden angeführt *Hadena contigua*, *Agrotis putris* und *Pieris brassicae*.

14. **E. gracilicornis** Grav. 1829 *Exetastes gracilicornis* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 429 ♀ | 1880 *Exetastes gracilicornis* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 199 ♀.

Durch die lebhaftete rote Färbung des Hinterleibs und der Beine und das weisse Schildchen eine der zierlichsten *Exetastes*-Arten.

Kopf und Thorax dicht und ziemlich fein punktiert. Kopf nach hinten wenig verschmälert; Scheitel ziemlich glänzend; Gesicht matt; Fühler dünn borstenförmig, so lang wie der Körper. Thorax glänzend; Metathorax runzlig-punktiert, matt. Areola bei meinen Exemplaren sitzend; Ramellus kurz; Nervulus etwas hinter der Gabel. Klauen der Vorderbeine mit zerstreuten Kammborsten. Hinterleib weit gedrungener als bei *E. guttatorius* und Verwandten; das 1. Segment kurz,  $1\frac{1}{2}$  mal so lang als hinten breit; das 2. und 3. Segment deutlich breiter als lang, mit Spuren von Quereindrücken hinter der Mitte; Bohrer wenig länger als das 2. Segment. — Schwarz. Fühler bräunlich, beim ♀ hinter der Mitte mit schmalem, etwas unreinem, weissem Halbring, der sich etwa auf 4 Glieder erstreckt. Am Thorax ist der Halsrand, ein Fleck unter der Flügelbasis und fast das ganze Schildchen weiss. Flügel leicht getrübt; Stigma bräunlichgelb; Tegulä braun, mit rötlichem Aussenrande. Beine gelbrot, Hüften und Trochanteren schwarz; Spitze der hintersten Schenkel und Schienen und die hintersten Metatarsen schwach gebräunt. Hinterleib gelbrot, vom 5. Segment an schwarz, die Endsegmente oben mit weisslichem Endrande.

Beim ♂ sind die Fühler gegen das Ende rostbraun; der weissliche Halbring fehlt. Kopf schwarz, nur die Palpen und der Clypeus zum grössten Teil rostgelb. Mesonotum vorn mit grossen weisslichen Seitenflecken; der weisse Fleck unter der Flügelbasis ist grösser als beim Weibchen. Bei meinen Exemplaren hat der Metathorax hinten kleine rundliche Seitenflecken. Die hintersten Metatarsen sind dunkelbraun, die folgenden 3 Glieder gelblichweiss. Die

roten Hinterleibssegmente haben an den Seiten meist dunkle Längsstreifen; die rote Färbung erstreckt sich auch auf die Basis des 5. Segmentes.

L. 11—13 mm.

Die Art ist mit Sicherheit nur aus Deutschland nachgewiesen worden; sie soll auch in Russland gefunden worden sein; ihr Vorkommen in England ist fraglich. Hier in Thüringen ist sie nur in manchen Jahren zu finden, nur einmal fand ich sie ziemlich zahlreich hier bei Blankenburg auf *Pastinaca*.

15. **E. facialis** Desv. 1856 *Banchus* (*Exetastes*) *facialis* Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. p. 95 ♂.

Eine höchst fragliche Art. Ich führe sie nur der Vollständigkeit wegen an und weil Morley noch einige Notizen dazu gegeben hat.

Die kurze Beschreibung der Art ergibt sich aus der Bestimmungs-Tabelle. Durch das weisslich gefärbte Gesicht und Schildchen und den rot gezeichneten Hinterleib schliesst sich die Art eng an *E. cinctipes* ♂ an, unterscheidet sich aber durch die Färbung der Hinterbeine. Morley erhielt 3 Männchen aus England, von denen er folgende Notizen gibt: Gesicht gelblich, ohne dunkle Mittellinie. Tegulä gelblich; Stigma bräunlich. Hinterleib rot, nur das 1. Segment schwarz. Die hintersten Schenkel rot, an der Basis schwarz; die hintersten Schienen mit Ausnahme der äussersten Basis und die Basis des Metatarsus zu zwei Drittel schwarz, das Enddrittel und die übrigen Tarsenglieder weiss. Das eine Exemplar hat das Schildchen fast ganz weiss, bei dem zweiten hat es 2 weisse Flecken, bei dem dritten ist es ganz schwarz.

L. 12—13 mm.

Diese fragliche Art wird bloss von England erwähnt.

16. **E. notatus** Holmgr. 1858 *Exetastes notatus* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 153 ♀♂ | 1899 *Exetastes notatus* Thomson, Opusc. Entom. XXII p. 2417 ♀♂ | 1829 *Exetastes nigripes* var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 416 ♀♂.

Im Habitus, namentlich auch durch die breiten mittleren Hinterleibssegmente, schliesst sich diese Art an *E. gracilicornis* an; sie unterscheidet sich auf den ersten Blick durch die düstere Färbung.

Kopf nach hinten wenig verschmälert; Scheitel grob und dicht punktiert, schwach glänzend; Stirn oberhalb der Fühler mit deutlichem Höcker; Gesicht runzlig-punktiert, matt; Fühler wenig kürzer als der Körper. Thorax robust,

dicht und grob punktiert, schwach glänzend; Metathorax mit gröberen Punkten, nur wenig gerunzelt und deshalb ebenfalls ziemlich glänzend; Luftlöcher linear. Areola im Vorderflügel gross; Ramellus kurz. Klauen fast ganz ohne Kammzähne. Hinterleib glänzend, die vorderen Segmente mit fein lederartiger Skulptur, die hinteren Segmente fein punktiert; das 1. Segment mit vorspringenden Luftlöchern, das 2. und 3. Segment breiter als lang; Bohrer etwa so lang wie das halbe 1. Segment. — Schwarz. Fühler und Hintertarsen in beiden Geschlechtern ohne hellen Ring. Thorax beim ♀ schwarz; das Schildchen ganz oder grösstenteils weiss. Flügel schwach getrübt; Stigma gelblich; Tegulä schwarz. Beine schwarz, nur die vordersten Schenkel an der Spitze, die Vorderschienen vorn und die Tarsen verschwommen rötlich. Hinterleib schwarz, Segment 1 am Ende, 2 und 3 ganz, 4 meist nur an der Basis, selten ganz rot.

Das ♂ hat ganz schwarzen Kopf und Fühler. Das Mesonotum hat beiderseits vorn einen weisslichen Keilfleck; weiss sind ferner das Schildchen, meist mit Ausnahme der Basis, und ein Fleck unterhalb der Flügelbasis. An den Vorder- und Mittelbeinen sind die Schenkel, mit Ausnahme der Hinterseite der Basis, und die Schienen rötlich.

L. 11—13 mm.

Nord- und Mitteleuropa; überall selten, an vielen Orten wohl ganz fehlend. — Als Wirt ist bis jetzt *Cucullia argentea* durch Brischke nachgewiesen.

17. **E. robustus** Grav. 1829 *Exetastes robustus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 422 ♀♂ | 1858 *Exetastes robustus* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 153 ♀ | 1899 *Exetastes robustus* Thomson, Opusc. Entom. XXII p. 2417 ♀.

Körper robust. Kopf nach hinten kaum verschmälert, dicht punktiert; Scheitel schwach glänzend; Gesicht matt, Fühler ziemlich kräftig, borstenförmig, etwas kürzer als der Körper. Thorax kräftig, dicht punktiert, ziemlich glänzend; auch der Metathorax dicht punktiert und nur schwach gerunzelt. Das 1. Segment breit, nach hinten stärker verbreitert, als bei der Mehrzahl der Arten; Postpetiolus fast 3 mal so breit als der Petiolus; Segment 2 und 3 von gleicher Länge; Bohrer lang, fast länger als das 1. Segment. — Schwarz. Fühler in beiden Geschlechtern ohne weissen Ring. Thorax schwarz; Schildchen weiss. Vorderbeine rot, Hüften und Trochanteren schwarz, an den hintersten Beinen Hüften und Trochanteren schwarz, Schenkel rot mit schwarzen

Knieen, Schienen schwarzbraun, gegen die Basis rötlich, das 1. Tarsenglied braun, die folgenden rötlich. Segment 1 mit Ausnahme der Basis und 2 und 3 rot.

Das ♂ stimmt in der Färbung fast ganz mit dem ♀ überein. Unter der Flügelbasis befindet sich ein weisser Fleck.

L. 12—14 mm.

Die Art findet sich in Nord- und Mitteleuropa; sie scheint sehr selten zu sein; mir ist sie nie vorgekommen.

18. **E. geniculosus** Holmgr. 1858 *Exetastes geniculosus* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 152 ♀♂ | 1899 *Exetastes geniculosus* Thomson, Opusc. Entom. XXII p. 2416 ♀♂ | 1838 *Tryphon* (*Exetastes*) *incurvator* Zetterstedt, Insect. Lappon. I. p. 386 ♀♂ (partim).

Die Art kommt dem *E. illusor* und *laevigator* sehr nahe, aber sie ist grösser und robuster. Das ♀ unterscheidet sich von *E. illusor* durch den Mangel des weissen Fühler-ringes, das ♂ durch den ganz schwarzen Kopf. Von *E. laevigator* unterscheidet sich die vorliegende Art durch die längeren und schlankeren Fühler, durch den kürzeren Bohrer und durch die weiss gezeichneten Hintertarsen. Nach Thomson ist *E. geniculosus* vielleicht nur als Varietät von *E. illusor* aufzufassen.

Kopf nach hinten verschmälert; Fühler dünn borstenförmig, von zwei Drittel Körperlänge. Thorax fein und dicht punktiert, ziemlich glänzend; Metathorax gerunzelt, matt. Hinterleib fast glatt, glänzend; das 2. und 3. Segment von gleicher Länge, etwas länger als breit; Bohrer kurz, nur halb so lang als das 1. Segment. — Schwarz. Fühler in beiden Geschlechtern ohne weissen Ring. Flügel fast hyalin; Stigma bräunlichgelb; Tegulä schwärzlich. Beine rot, Vorderbeine mehr gelbrot; Hüften, Trochanteren, Spitze der hintersten Schenkel und Schienen und die hintersten Tarsen schwarz, letztere in beiden Geschlechtern gegen das Ende mit einem namentlich beim ♀ etwas verschwommenen weissen Ring. Die hintersten Schenkel sind am Ende in der Regel breiter schwarz als bei *illusor*. Segment 1 schwarz mit rotem Endrande, 2 und 3 ganz rot, 4 meist an der Basis rot, selten ganz rot oder schwarz.

Das ♂ stimmt in der Färbung fast ganz mit dem ♀ überein. Kopf und Thorax sind ganz schwarz. Die roten Hinterleibssegmente 2 und 3 sind zuweilen verschwommen dunkel gezeichnet.

L. 12—14 mm.

Zerstreut in Nord- und Mitteleuropa; hier in Thüringen sehr selten.



19. **E. laevigator** Vill. 1789 *Ichneumon laevigator* Villers, C. Linnaei Entom. III p. 193 | 1818 *Cryptus laevigator* Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX p. 288 | 1829 *Exetastes laevigator* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 424 ♀♂ | 1858 *Exetastes laevigator* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 151 ♀♂ | 1899 *Exetastes laevigator* Thomson, Opusc. Entom. XXII p. 2416 ♀♂ | 1838 *Tryphon* (*Exetastes*) *incurvator* Zetterstedt, Insect. Lappon. I p. 386 (partim) | ? 1829 *Exetastes bicoloratus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 421 ♀♂.

Körper gedrungen und kräftig, weit mehr z. B. als bei *E. illusor*. Kopf nach hinten verschmälert; Scheitel und Stirn zerstreut punktiert und weit glänzender als bei den verwandten Arten; Fühler kurz, wenig länger als der halbe Körper; das 1. Geisselglied sehr lang, die nächstfolgenden deutlich von einander abgesetzt; Gesicht, Clypeus und Mandibeln ziemlich dicht und grob punktiert, schwach glänzend. Thorax robust, dicht punktiert, glänzend, namentlich die Brustseiten; Metathorax runzlig - punktiert, matt; mit länglich ovalen Luftlöchern. Areola gross, gestielt; Ramellus deutlich; Nervulus hinter der Gabel. Beine, namentlich die hintersten kräftig; Klauen der Vorderbeine mit einigen zerstreuten Kammborsten. Hinterleib glatt und glänzend; das 1. Segment gebogen, mit vorspringenden Luftlöchern; das 2. und 3. Segment wenig länger als breit; Bohrer lang, so lang wie das 1. Segment. — Schwarz. Kopf und Thorax kurz schwärzlich behaart, ohne jede helle Zeichnung. Flügel deutlich getrübt; Stigma rostgelb; Tegulä schwarz. Beine rötlich, Hüften und Trochanteren schwarz; die hintersten Schienen etwa von der Mitte oder schon von etwas vor der Mitte an gegen das Ende mehr und mehr verdunkelt; auch die hintersten Tarsen, namentlich der Metatarsus dunkelbraun, die Endglieder, meist von der Spitze des 3. Gliedes an, heller. Segment 1—3—4 rot; das 1. Segment an der Basis, das 4. meist am Ende verschwommen dunkel gezeichnet.

Das ♂ unterscheidet sich in der Färbung kaum vom ♀; Kopf und Thorax sind sehr kräftig und wie die Fühler durchaus schwarz; die Behaarung ist noch deutlicher als beim Weibchen. Die Beine sind lebhafter, mehr gelbbrot gefärbt; die Endhälfte der hintersten Schienen und die hintersten Tarsen sind schwarzbraun, das 4. und meist auch das Ende des 3. Gliedes rostgelb, wodurch der helle Ring der hintersten Tarsen viel deutlicher erscheint als beim Weibchen. Das 1. Segment hat in der Regel nur einen breiten hellroten Endrand; das 2. Segment ist nicht länger als hinten breit und etwas kürzer als das 3. Segment.

L. 9—13 mm.

Die Art ist über ganz Europa verbreitet und wohl überall nicht selten; hier in Thüringen ist sie in manchen Jahren sehr häufig. — Merkwürdigerweise ist über Zuchten noch nichts bekannt.

Ueber die Frage, ob *E. bicoloratus* Grav. hierher zu ziehen ist, vergleiche man bei dieser Art.

20. ***E. femorator*** Desv. 1856 *Banchus* (*Exetastes*) *femorator* Desvignes, Catal. Brit. Ichneum p. 94 ♀♂ | 1858 *Exetastes femorator* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 152 ♀ | 1899 *Exetastes femorator* Thomson, Opusc. Entom. XXII p. 2415 ♀.

Diese Art ist an der auffallenden Färbung der Beine leicht zu erkennen.

Kopf nach hinten verschmälert; Stirn und Scheitel punktiert, schwach glänzend; Gesicht fast matt; Fühler borstenförmig, deutlich länger als Kopf und Thorax zusammen. Thorax robust, dicht punktiert, ziemlich glänzend; Metathorax runzlig-punktiert matt. Vorderflügel mit langem Ramellus. Klauen den Pulvillus überragend, an der Basis mit Kammzähnen. Hinterleib glatt und glänzend; das 1. Segment leicht gekrümmt, das 2. und 3. an Länge unter sich gleich; Bohrer von  $\frac{2}{3}$  Länge des 1. Segmentes. — Schwarz. Kopf mit Einschluss der Fühler und Thorax ohne helle Zeichnung. Flügel ziemlich getrübt, mit gelblichem Stigma. Beine schwarz oder schwarzbraun; die Vorderschenkel an der Spitze und die Vorderschienen vorn rötlich; die hintersten Schenkel rot, an der äussersten Spitze schwärzlich. Segment 1 am Ende und 2—4 rot, das 4. hinten schwarz.

Das ♂ stimmt in der Färbung mit dem ♀ überein.

L. 12—13 mm.

Die Art scheint sehr selten zu sein. Sie wurde zuerst aus England bekannt; Brischke führt sie für Ost- und Westpreussen an und Thomson für Schweden. Ich kenne sie nicht.

21. ***E. nigripennis*** Grav. 1829 *Exetastes nigripennis* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 426 ♀♂.

Kein späterer Autor erwähnt diese Art; sie erscheint deshalb sehr fraglich und ich muss mich damit begnügen, die Gravenhorst'sche Beschreibung hier anzuführen.

„Durch kürzere und kräftigere Beine von den übrigen Arten ausgezeichnet. — Kopf und Thorax kurz schwarz behaart, schwarz; beim ♂ der Scheitel beiderseits neben den Augen mit braunroter Makel. Fühler borstenförmig, etwas kürzer als der Körper. Flügel ziemlich stark ge-

trübt, beim ♀ stärker als beim ♂; Stigma dunkelbraun; Tegulä rötlich; Areola unregelmässig, sitzend oder fast sitzend. Beine gelbrot; Hüften und Trochanteren schwarz; die hintersten Tarsen beim ♀ braun. Hinterleib beim ♀ so lang wie Kopf und Thorax zusammen, beim ♂ länger; Postpetiolus etwa so lang wie breit, doppelt so breit als der Petiolus und so lang wie dieser; das 1. Segment rot, mit schwarzer Basis; beim ♂ schwarz und nur am Ende rot; das 2. und 3. Segment rot, das 3. zuweilen mit schwarzem Endrand; die folgenden Segmente schwarz. Bohrer von  $\frac{1}{3}$  Hinterleibslänge.

L. 11—13 mm.

Ein Pärchen aus Oesterreich; ein ♀ aus Volhynien.“

22. **E. variegatus** Szepl. 1898 *Exetastes variegatus* Szepligeti, Rovart. Lapok V. p. 30 ♂.

Die Art ist insofern etwas unsicher, als nur das ♂ beschrieben ist. „Schwarz. Palpen rot; an den Schultern je ein dreieckiger Fleck, unter der Flügelbasis je eine Linie und ein in der Mitte unterbrochenes Band am Ende des Metathorax sind gelb. Stigma braun, in der Mitte gelblich; Tegulä an der Basis rot, in der Mitte schwarz und am Endrand weiss. Flügelwurzel weiss. Beine rot; Hüften und Trochanteren schwarz; die Spitzen der hintersten Schienen und die hintersten Metatarsen unten braun. Segment 1—4 rot, der Endrand von Segment 6 und 7 schmal weiss. — Von *E. cinctipes* verschieden durch das schwarze Gesicht; von *E. bilineatus* durch die roten Tarsen und von beiden durch die weiss gerandeten Hinterleibssegmente; von *E. gracilicornis* durch die einfarbigen Fühler.

L. 10 mm.

Ungarn.“

Bei den Unterschieden von *E. cinctipes* und *E. gracilicornis* nimmt Szepligeti keine Rücksicht auf das gelb oder weiss gezeichnete Schildchen dieser Arten; sollte sein *variegatus* auch ein hellgezeichnetes Schildchen haben? Er erwähnt nichts davon.

23. **E. puberulus** Szepl. 1898 *Exetastes puberulus* Szepligeti, Rovart. Lapok V. p. 30 ♀♂.

„Kopf und Thorax mit kurzen, schwarzen Haaren ziemlich dicht bedeckt. Schwarz. An den Vorder- und Mittelbeinen die Schenkel, Schienen und Tarsen, an den Hinterbeinen die Schenkel ganz, die Schienen an der Basis und das 4. und 5. Tarsenglied rot. Areola kurz gestielt. Ende

des 1. Segmentes, des 2. und 3. ganz, des 4. an der Basis rot. Bohrer so lang wie das 1. Segment. Bei manchen Exemplaren ist das 4. Segment ganz rot, das 1. nur an der Basis schwarz; das 4. Tarsenglied weiss, das 5. und manchmal auch das 3. rot oder rötlich. — Das schwarze Gesicht und Schildchen des ♂, sowie die nicht weiss geringelten Fühler des ♀ deuten auf eine Verwandtschaft mit *E. geniculosus* und *E. femorator*; von diesen unterscheidet sich *E. puberulus* durch die schwarzen, nur an der Basis roten Hinterschienen und den schwarz und kurz behaarten Körper.

L. 10—12 mm.

Ungarn.“

Es ist ganz auffallend, dass Szepligeti diese neu aufgestellte Art nur mit *E. geniculosus* und *E. femorator* und nicht mit *E. laevigator* vergleicht, mit dem sie doch fast in allen Punkten übereinstimmt. Sollte Szepligeti diese gemeine Art garnicht in natura gekannt haben. Die kurze und ziemlich dichte schwarze Behaarung auf Kopf und Thorax besitzt *E. laevigator* auch; es bliebe dann nur noch der Unterschied, dass die hintersten Schienen bei *E. puberulus* schwarz und nur an der Basis rot sein sollen, aber auch in diesem Punkte ist ja kein scharfer Unterschied zu machen. Meiner Meinung nach ist *E. puberulus* weiter nichts als *E. laevigator* und schliesslich fällt auch *E. bicoloratus* damit zusammen.

24. ***E. nigripes*** Grav. 1829 *Exetastes nigripes* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 416 ♀♂ (excl. var.) | 1858 *Exetastes nigripes* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II p. 153 ♀♂ | 1899 *Exetastes nigripes* Thomson, Opusc. Entom. XXII p. 2415 ♀♂.

Kopf nach hinten deutlich verschmälert, dicht punktiert, schwach glänzend; Fühler ziemlich kurz, nicht viel länger als der halbe Körper, borstenförmig; Gesicht in der Mitte mit rundlicher Erhebung, fast matt. Thorax ziemlich grob und dicht punktiert, schwach glänzend; Metathorax des ♀ längs der Mitte und hinten grob wulstartig gerunzelt, mit länglich ovalen Luftlöchern. Areola im Vorderflügel gross, kurz gestielt; Ramellus kurz; Nervulus interstitial. Klauen, auch die der Vorderbeine, ohne Kammzähne. Hinterleib glatt und glänzend; das 1. Segment ziemlich kurz, nach hinten stark verbreitert; das 2. und 3. Segment so lang als breit, unter sich von gleicher Länge; Bohrer lang, kaum kürzer als das 1. Segment, mit schmalen Klappen. — Kopf mit den Fühlern und der ganze Thorax schwarz. Flügel ziemlich getrübt; Stigma bräunlichgelb; Tegulä schwärzlich. Hüften, Trochanteren und Schenkel schwarz; Vorder-

schenkel an der Spitze, die vordersten auch vorn und die vorderen Schienen und Tarsen rötlich, Schienen an der Hinterseite verdunkelt; die hintersten Schienen und Metatarsen braun, gegen die Basis verschwommen rötlich; Glied 2—4 der hintersten Tarsen rötlichgelb, das Endglied braun. Die Endhälfte von Segment 1 und Segment 2—4 rot, das 4. gewöhnlich hinten schwärzlich.

Das ♂ stimmt im Grossen und Ganzen mit dem ♀ überein. Am inneren Augenrande oberhalb des Clypeus befindet sich je ein heller Fleck, ebenso sind die Mandibeln häufig gelb gefleckt. Bei dem einzigen Exemplare, welches ich besitze, sind diese Zeichnungen höchst undeutlich. Vorderbeine wie beim ♀; die hintersten Beine sind schwarz, die Schienen an der Basis verschwommen rötlich, Glied 3 und 4 der Tarsen weiss. Bei meinem Exemplar ist das Basaldrittel des 1. Segmentes, das 2. bis 4. ganz und die Seiten des 5. rot.

L. 12—13 mm.

Nord- und Mitteleuropa; eine der selteneren Arten. Als Wirt führt Bignell *Mamestra brassicae* an.

25. **E. flavitarsus** Grav. 1829 *Exetastes flavitarsus* Gravenhorst, *Ichneum. Eur.* III p. 420 ♂.

Ich besitze von dieser Art 3 Exemplare, leider auch nur Männchen, und kann deshalb eine ausführliche Beschreibung geben.

Von Gestalt des *E. nigripes* ♂, aber robuster. Kopf nach hinten wenig verschmälert; Stirn und Scheitel fein und ziemlich dicht punktiert, schwach glänzend; Gesicht dichter und gröber punktiert, fast matt, in der Mitte mit runder Erhebung; Fühler fast von Körperlänge. Thorax robust, schwach glänzend; Mesonotum fein und dicht, Brustseiten gröber und zerstreuter punktiert; Metathorax vorn grob punktiert, nach hinten grob gerunzelt; Luftlöcher länglich oval. Areola bei allen 3 Exemplaren sitzend; Ramellus deutlich; Nervulus interstitial. Klauen einfach. Hinterleib mit feiner und zerstreuter Punktierung, glänzend, wenig von der Seite zusammengedrückt und deshalb ziemlich breit; das 1. Segment kurz und kräftig, wenig gekrümmt, mit stark vorspringenden Luftlöchern; das 2. und 3. Segment unter sich gleich lang, so lang als breit. — Kopf mit den Fühlern und Thorax schwarz. Clypeus grösstenteils rostgelb. Scheitel beiderseits neben den Augen mit gelbem Strich. Gravenhorst erwähnt davon nichts; wahrscheinlich hat er ihn übersehen. Schulterbeulen rostgelb gefleckt. Flügel

schwach gelblich getrübt; Stigma gelblich, dunkel gesäumt; Tegulä braun, mit breitem rostgelbem Aussenrand. Beine rötlichgelb, Hüften, Trochanteren, die hintersten Schenkel und die Spitzen der hintersten Schienen schwarz. Glied 2—4 der hintersten Tarsen blassgelb; Metatarsen und Endglied trüb rötlichgelb. Mittelschenkel, zuweilen auch die vordersten Schenkel an der Basis leicht gebräunt. Segment 1 mit Ausnahme der Basis und 2—4—5 rot, 4 und 5 meist dunkel gewässert.

L. 12—13 mm.

Gravenhorst's Exemplare stammten von Breslau; Brischke fand die Art bei Danzig; ich fing meine Exemplare vor vielen Jahren bei Gumperda in Thüringen auf Eichengebüsch und zwar zusammen mit *E. nigripes* ♀, sodass ich bestimmt glaubte, in ihnen das richtige Männchen von *E. nigripes* gefunden zu haben.

26. ***E. inquisitor*** Grav. 1829 *Exetastes inquisitor* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 419 ♀ | 1880 *Exetastes inquisitor* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. p. 199 ♀ | ? 1804 *Ichneumon ambustor* Panzer, System. Nomencl. p. 88 | ? 1829 *Ichneumon ambustor* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 1032.

Ich kenne diese Art nicht; ich glaube auch nicht, dass sie von *E. nigripes* verschieden ist. Der einzige Unterschied liegt in der Färbung der Vorderschienen und des Hinterleibs, sowie in der Länge des Bohrers, aber auch bei *E. nigripes* sind die Vorderschienen hinten etwas verdunkelt, und ich finde den Bohrer reichlich von  $\frac{1}{4}$  Hinterleibslänge. Auf die Zeichnung des Hinterleibs ist kein besonderes Gewicht zu legen. Gravenhorst gibt die folgende Beschreibung: „Von *E. nigripes* ♀ verschieden durch grössere und kräftigere Gestalt, etwas dickere Beine, breiteren Hinterleib, kürzeres 1. Segment und längeren Bohrer. — Flügel etwas getrübt; Stigma rostrot; Tegulä schwarz; Flügelwurzel braun. Beine schwarz; die vordersten Schenkel unten und an der Spitze, die mittleren nur an der Spitze rötlichgelb; die vordersten Schienen rötlichgelb, oben gebräunt; die mittleren braun, unten gelblich; die vordersten Tarsen rötlichgelb, die mittleren oben braun, die hintersten rostrot. Das 1. Segment doppelt so lang als hinten breit (bei *E. nigripes* nach Gravenhorst mehr als doppelt, fast 3 mal so lang als breit); Segment 1—3 rot, das 1. mit schwarzer Basis. Bohrer von  $\frac{1}{4}$  (bei *E. nigripes* nach Gravenhorst von  $\frac{1}{5}$ ) Hinterleibslänge.

L. 13—14 mm.

Gravenhorst's Exemplare stammten von Wien und Dresden, Brischke erwähnt die Art von Danzig. Er hätte doch wohl ausführlichere Notizen über diese Art bringen sollen, wenn er glaubte, sie gefunden zu haben, als einfach zu sagen „Glied 2—4 der Hintertarsen rot“.

27. **E. crassus** Grav. 1829 Exetastes crassus Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 423 ♀ | 1876 Exetastes crassus Vollenhoven, Pinacogr. P. 4 p. 26 ♀; T. 17 F. 9.

Ich habe die Art in mehreren Exemplaren in Thüringen gefangen und kann deshalb die Gravenhorst'sche Beschreibung vervollständigen. Das ♂ ist mir leider unbekannt geblieben. *E. crassus* steht ziemlich isoliert und könnte als eigene Gattung aufgestellt werden, deren Hauptkennzeichen bestehen würden in der kräftigen und breiten Gestalt, den kurzen und dicken, nicht borsten- sondern fadenförmigen, am Ende kurz zugespitzten Fühlern und den lang und ziemlich dicht gekämmten Klauen; auch der lange Bohrer wäre zu erwähnen, obwohl dieser auch bei anderen *Exetastes*-Arten vorkommt.

Kopf und Thorax dicht bräunlichgrau pubescent, am stärksten im Gesicht und auf dem Metathorax. Kopf quer, wenig schmaler als der Thorax, nach hinten kaum verengt; Scheitel und Stirn dicht punktiert, schwach glänzend; Gesicht gröber punktiert; Fühler kurz und dick, kaum länger als Kopf und Thorax zusammen, fadenförmig, am Ende kurz zugespitzt; das 1. Geisselglied reichlich 3 mal so lang als am Ende breit; das 2. und 3. unter sich von gleicher Länge, so lang als breit; die Glieder im Enddrittel der Geissel quer; Clypeus am Ende abgestutzt, der Endrand zweihöckrig. Mesonotum und Thoraxseiten dicht und grob punktiert, ziemlich stark glänzend, Metathorax ebenfalls grob punktiert, dazwischen fein gerunzelt, nur schwach glänzend; Luftlöcher linear. Areola im Vorderflügel gross, kurz gestielt; Ramellus nur angedeutet; Nervulus interstitial; Nervellus an der Basis stark geschwungen. Beine dick; Klauen den Pulvillus überragend, alle mit langen, nicht dicht stehenden Kammzähnen; an den hintersten Klauen stehen nur an der Basis einige solche. Hinterleib glänzend, glatt mit zerstreuten Pünktchen, namentlich an den Seiten, gegen das Ende wenig zusammengedrückt; das 1. Segment kurz und breit, kaum  $1\frac{1}{2}$  mal so lang als hinten breit, Postpetiolus vorn in der Mitte mit rundlicher Vertiefung; das 2. und 3. Segment von gleicher Länge, etwas breiter als lang; das 2. in der Mitte mit Quereindruck; Bohrer lang, kaum kürzer als der halbe Hinterleib, etwa so lang als das 2. und 3. Segment zusammen. — Kopf mit

den Fühlern und Thorax schwarz; Clypeus mit rostgelbem Querfleck. Flügel etwas getrübt; Stigma rostrot, dunkel gesäumt; Tegulä schwarz. Beine hellrot; Hüften und Trochanteren schwarz; die hintersten Schienen an der Basis rötlich und dann durch Rotbraun in Schwarzbraun übergehend; die hintersten Tarsen schwarzbraun, mit rötlichen Einschnitten. Das 1. Segment in der Endhälfte, das 2. bis 4. ganz rot; die folgenden Segmente sind schwarz, mit rötlichen Endrändern; das 5. ist auch an den Seiten, rot.

L. 14 mm.

Gravenhorst besass ein Weibchen aus Ungarn. Ich fand mehrere Exemplare vor Jahren bei Gumperda in Thüringen. — Als Wirte führt Mocsary *Chariclea delphinii* und *Notodonta ziczac* an.

28. **E. bicoloratus** Grav. 1829 *Exetastes bicoloratus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 421 ♀♂ | 1876 *Exetastes bicoloratus* Vollenhoven, Pinacogr. P. 4 p. 26; T. 17 F. 5.

Holmgren und nach ihm Thomson halten den *E. bicoloratus* Grav. nur für eine Varietät des *E. laevigator*. Es ist schwer in solchen Fällen ein bestimmtes Urteil zu fällen, und es sind mit solchen Vereinigungen schon genug Fehlgriffe getan worden. So hält Holmgren auch den *E. crassus* Grav. möglicherweise nur für eine Varietät des *E. laevigator*, und doch haben beide nicht das Geringste mit einander zu tun. Gravenhorst's Beschreibung des *E. bicoloratus* lautet: „Statur robuster als bei den übrigen *Exetastes*-Arten, mit Ausnahme von *E. robustus* und *E. crassus*. Clypeus zuweilen mit rötlicher Makel. Fühler länger als der halbe Körper, bis fast körperlang, am Ende verdünnt und gekrümmt. Thorax bucklig. Flügel schwach getrübt; Stigma rostgelb; Tegulä dunkelbraun; Flügelwurzel beim Weibchen gelblich, beim Männchen rötlich; Areola kurz gestielt. Beine rot, Hüften und Trochanteren schwarz; die hintersten Schienen und Tarsen schwärzlich, die Schienen an der Basis rötlich. Hinterleib so lang als Kopf und Thorax zusammen oder etwas länger, schmaler als der Thorax, gegen das Ende von der Seite zusammengedrückt; das 1. Segment doppelt so lang als hinten breit, rot mit schwarzer Basis, beim ♂ zuweilen ganz rot, Segment 2—4 rot, 5 beim ♀ zuweilen verschwommen rot gezeichnet, beim ♂ zuweilen ganz rot; die folgenden Segmente schwarz. Bohrer von  $\frac{1}{4}$  oder  $\frac{1}{6}$  Hinterleibslänge.

L. 12—14 mm.

Gravenhorst's Exemplare stammten aus Deutschland, Oberitalien und Frankreich.“ — Nach Giraud lebt die Art in *Cucullia scrophulariae*.



29. **E. bilineatus** Grav. 1829 *Exetastes bilineatus* Gravenhorst, *Ichneum.* Eur. III p. 415 ♂.

Die vorliegende Art ist ziemlich fraglich, da sie von keinem späteren Autor erwähnt wird; dazu kommt, dass sie nur im männlichen Geschlecht bekannt ist. Da die Areola wie bei *E. cinctipes* sein soll, so ist immerhin anzunehmen, dass wir es mit einem *Exetastes* zu tun haben. Gravenhorst's Beschreibung lautet: „Grösse und Habitus ganz wie bei *E. cinctipes*. Clypeus zuweilen rostrot. Fühlerglieder 15—18 oben weisslich; bei dem 2. Exemplar ist dieser weisse Halbring sehr undeutlich. Mesonotum beiderseits vorn mit gelbem Schulterfleck. Schildchen entweder ganz gelb oder mit gelbem Fleck. Flügel schwach getrübt; Areola kurz gestielt oder fast sitzend (wie bei *E. cinctipes*); Stigma schwärzlich; Tegulä weisslich. Beine rot; Hüften und Trochanteren schwarz, Hüften zuweilen rötlich gefleckt; die Spitzen der hintersten Schienen und die hintersten Tarsen schwarz, Glied 3 und 4 der letzteren, zuweilen auch die Spitze des 2. Gliedes weisslich. Hinterleib rot, die Basis des 1. Segmentes und Segment 7 und 8 schwarz. Bei dem einen Exemplare hat das 1. Segment nur einen roten Endrand.

L. 12 mm. — ♀ unbekannt.“

Gravenhorst beschrieb die Art nach 2 Exemplaren aus Oberitalien.

30. **E. aethiops** Grav. 1829 *Exetastes aethiops* Gravenhorst, *Ichneum.* Eur. III p. 398 ♀♂.

Diese und die folgende Art sind sehr fraglich; da die Areola als dreieckig, ähnlich wie bei *Xenoschesis fulvipes* angegeben wird, dürften sie schwerlich zur Gattung *Exetastes* gehören. Gravenhorst gibt folgende Beschreibung: „Grösse und Habitus von *E. (Xenoschesis) fulvipes*, aber Flügel und Beine länger. Beim ♂ Clypeus, zuweilen auch eine Makel der Mandibeln und eine Makel im Gesicht gelblich. Fühler am Ende gebogen, fast von Körperlänge. Flügel schwach getrübt, Stigma und Tegulä braun, letztere beim ♂ gelblich; Areola unregelmässig, dreieckig, gestielt. Vorderbeine rot, Hüften und Trochanteren schwarz; beim ♂ die Vorderchenkel nicht selten verschwommen dunkel; die hintersten Beine schwarz, beim ♀ die Schenkel zuweilen verschwommen braunrot; Schienen in der Mitte rötlich. Hinterleib fast gestielt, etwas länger und schmaler als Kopf und Thorax zusammen, beim ♀ gegen das Ende von der Seite zusammengedrückt, beim ♂ im Durchschnitt rundlich; das 1. Segment mit Längsfurche, nach hinten allmählich ver-

breitert; Postpetiolus etwas länger als breit; Bohrer kurz vorstehend, von  $\frac{1}{7}$  Hinterleibslänge.

L. 12—13 mm.

Deutschland.“

Meiner Meinung nach ist die vorliegende Art synonym mit *Neoeryma stygium* Kriechb.

31. **E. brunnipes** Grav. 1829 *Exetastes brunnipes* Gravenhorst, *Ichneum. Eur.* III p. 399 ♀.

Diese Art ist noch schwieriger zu entziffern, als die vorhergehende. Nur das Weibchen ist bekannt; die kurze Beschreibung lautet: „Fühler länger als der halbe Körper, gegen das Ende verdünnt und zurückgebogen; Glied 5 und die nächstfolgenden unten rostrot, gegen die Spitze hin dunkler werdend, die Endglieder braun. Thorax wie der Kopf fein punktiert und behaart. Flügel hyalin, Stigma schwärzlich, Tegulä rostrot; Areola fast regelmässig gestielt. Beine ziemlich lang, braunrot; Hüften und Trochanteren schwarz; die hintersten Schienen gegen die Basis schwärzlich, mit einem verloschenen weisslichen Punktfleck; die hintersten Tarsen schwarz. Hinterleib kaum länger als Kopf und Thorax zusammen, schmaler als der Thorax, glänzend, lang spindelförmig, gegen das Ende von der Seite zusammengedrückt, schwarz; das 1. Segment fein punktiert, über doppelt so lang als hinten breit, gegen das Ende allmählich verbreitert; Bohrer von  $\frac{1}{3}$  Hinterleibslänge.

L. 12 mm.

Das einzige bekannte ♀ stammte von Wien.“

\*            \*            \*

Ueber **Exetastes tristis** Grav. (*Ichneum. Eur.* III p. 409 ♀) vergleiche man bei der Gattung *Xenoschesis*.

\*            \*            \*

Der Vollständigkeit wegen führe ich noch die folgenden von Kokujew aus Central- und Ostasien beschriebenen Arten an:

### **Allexetastes** (subg. nov.) Kok.

1904 *Allexetastes* Kokujew, *Revue Russe d'Entom.* p. 106.

In Körperbildung und Flügelnervatur mit *Exetastes* übereinstimmend, aber Stirn mit einem Höcker bewaffnet; beim ♀ ist das Gesicht eingedrückt, in der Mitte des Eindrucks höckerartig vortretend, Fühler kürzer als der Körper, Hinterleib

stark zusammengedrückt; beim ♂ ist die Stirn hinter den Fühlern stärker als bei *Exetastes* eingedrückt, die Fühler sind länger als der Körper.

1. **Exetastes** (*Allexetastes*) **Komarovi** Kok. l. c. p. 106 ♀♂.

Kopf und Thorax fein punktiert, weisslich behaart, etwas glänzend; Mandibeln aussen grob punktiert; Clypeus nicht vom Gesicht getrennt, an der Basalhälfte wie das Gesicht dicht punktiert und matt. Mesonotum ohne Parapsidenfurchen; Schildchen wenig convex; Metathorax der Länge nach leicht eingedrückt; Hinterleib glänzend; Bohrer ziemlich weit vorstehend.

♀ Schwarz. Schildchenspitze gelb. Flügel namentlich in der Mitte getrübt. Beine schwarz, Spitze der vorderen Schenkel, Schienen und Tarsenglieder rötlich. Endrand des 1. Segmentes und Segment 2 und 3 ganz rot.

♂ Schulterflecken des Mesonotums, ein Fleck unterhalb der Flügel und die Spitze des Schildchens gelb. Flügel gleichmässig getrübt. Vorderbeine rötlichgelb, an der Basis schwarz; Mittelschenkel schwarz, unten und an der Spitze gelblich; Schienen trüb gelblich, am Ende schwarz; die hintersten Beine grösstenteils schwarz.

L. 11—12 mm.

Nördliches Korea.

2. **E.** (*Allexetastes*) **coreanus** Kok. l. c. p. 107 ♂.

♂ Kopf und Thorax fein punktiert; weisslich pubescent, ziemlich glänzend; Fühler deutlich länger als der Körper; Clypeus dicht punktiert, matt. Schildchen ziemlich convex, punktiert; Metathorax der Länge nach vertieft. Segment 1 und 2 glatt und glänzend, 2 quer, hinter der Mitte beiderseits schräg eingedrückt; Segment 3 und die folgenden fein anliegend behaart. — Schwarz. Flügel leicht getrübt; Stigma rötlichgelb. Beine schwarz, an den vordersten Beinen die Spitze der Schenkel und die Schienen zum Teil bräunlichgelb; auch die Spitze der mittleren Schenkel und die Basis der Schienen gelb; die hintersten Beine ganz schwarz. Hinterleib schwarz, Endrand von Segment 1—3 rot.

Die Grösse ist nicht angegeben.

Am Jalu-Fluss im nördlichen Korea.

3. **Exetastes punctulatus** Kokujew, Revue Russe d'Entom. 1905 p. 11 ♂.

♂ Kopf und Thorax fein punktiert, bräunlich pubescent, wenig glänzend; Stirn kaum eingedrückt; Fühler von Körperlänge;

Gesicht in der Mitte convex. Mesonotum ohne Parapsidenfurchen; die beiden Schildchen dicht punktiert, convex; Metathorax dicht runzlig - punktiert, matt, ohne Felder. Hinterleib an der Basis deutlich punktiert, gegen das Ende glatt; das 1. Segment mit deutlicher Längsfurche; das 2. und 3. Segment quer. — Schwarz. Flügel getrübt; Stigma rötlichgelb; Tegulä schwarz, dicht punktiert. Beine rötlichgelb, Hüften, Trochanteren, Endhälfte der hintersten Schienen und die hintersten Tarsen schwarz.

Dem *E. fornicator* sehr ähnlich, aber Gesicht und Clypeus mehr convex, Tegulä grob punktiert, Hinterschildchen nicht glänzend, sondern wie das Schildchen punktiert, Flügel dunkler und Hinterleibsbasis dicht punktiert.

L. 14—15 mm. — ♀ unbekannt.

Im Tjan-shan.

4. **Exetastes similis** Kokujew, Revue Russe d'Entom. 1905 p. 12 ♂.

♂ Kopf und Thorax fein punktiert, bräunlich pubescent, glänzend; Stirn kaum eingedrückt; Fühler von Körperlänge; Gesicht in der Mitte convex. Mesonotum ohne Parapsidenfurchen; Schildchen convex, dicht punktiert; Hinterschildchen flach, glatt und glänzend; Metathorax gerunzelt, in der Mitte zerstreut punktiert und mit 2 Längseindrücken, der Raum zwischen diesen convex, glatt und glänzend. Tegulä glatt, fast ohne Punkte. Hinterleib glatt und glänzend, nur Segment 2—4 an den Seiten mit einzelnen Punkten. — Schwarz. Flügel getrübt; Stigma und Tegulä schwarz. Beine rotgelb; Hüften, Trochanteren und die hintersten Schienen mit Ausnahme der Basis, alle Schienenspornen und die Tarsen schwarz.

Dem *E. fornicator* ähnlich, aber Metathorax mit anderer Skulptur, Stigma und Schienenspornen schwarz und Segment 2 und 3 länger.

L. 11 mm. — ♀ unbekannt.

Tjan-shan.

### 3. Gen. **Leptobatus** Grav.

1829 *Leptobatus* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 432.

Kopf quer, nach hinten nicht oder nur wenig verschmälert; Fühler ungefähr von  $\frac{1}{2}$  Körperlänge; Schaft aufgetrieben, am Ende schräg abgestutzt; Geißel fadenförmig, gegen das Ende kaum verdünnt; Clypeus am Ende nicht ausgeschnitten. Mesonotum ohne Parapsidenfurchen; Metathorax längs der Mitte

gerunzelt, an den Seiten mehr runzlig-punktiert; Luftlöcher linear. Flügel wie bei Exetastes; Ramellus deutlich. Die hintersten Beine weit kräftiger als die vorderen; Klauen einfach, nur die der Vorderbeine wie bei den meisten Exetastes-Arten mit einzelnen Kammborsten. Hinterleib glatt und glänzend, wie bei Exetastes gebildet; Luftlöcher des 1. Segmentes vor der Mitte; Segment 2 und 3 an den Seiten gerandet; Bohrer länger als der Hinterleib.

Die Gattung *Leptobatus* stimmt in den Hauptkennzeichen mit Exetastes überein. Kriechbaumer war geneigt, beide Gattungen zu vereinigen. Ich folge dem Beispiele Thomson's und lasse beide getrennt. Der Hauptunterschied liegt in den Fühlern, die nicht wie bei Exetastes gegen das Ende borstenförmig verdünnt sind; nur bei *L. rufipes* zeigt sich in der Fühlerbildung eine Annäherung an Exetastes; charakteristisch ist ferner der lange Bohrer. Durch das letztere Merkmal bildet die Gattung eine Verbindung mit den Pimplinen. Auf jeden Fall würde sie sich dort viel besser ausnehmen, als bei den Tryphoninen. Ich habe bereits bei der Charakteristik der vorliegenden Tribus über diesen Punkt gesprochen. *Leptobatus* schliesst sich auch in der Lebensweise an Exetastes an; soweit bis jetzt bekannt ist, leben die Arten in Eulenraupen.

#### Uebersicht der Arten.

1. Körper schwarz, höchstens das Schildchen weiss. 2.  
Hinterleibsmittle rot oder braunrot. 3.
2. Körper schlanker als bei der folgenden Art. Fühler schlank, gegen das Ende etwas verdünnt und dadurch etwas an Exetastes erinnernd. Schildchen mit grossem, weissen Fleck. Die hintersten Schienen nur an der äussersten Spitze, meist nur an den Seiten gebräunt. 12—13 mm.

##### 1. *rufipes* Gmel.

Körper robuster als bei der vorhergehenden Art. Fühler kräftig, gegen das Ende nur wenig verdünnt. Schildchen schwarz oder nur am Ende mit gelblichweissem Punktfleck. Die hintersten Schienen im ganzen Enddrittel gebräunt. Metathorax an der Basis meist mit Spur von 2 Längskielen und Mittelfurche. 12—13 mm.

##### 2. *degener* Grav.

3. Gesicht, die beiden Schildchen und verschiedene Flecken des Thorax gelb. Fühler fast ganz und Hinterleib mit Ausnahme der Basis des 1. Segmentes hellrot. 11—12 mm.

##### 5. *multiguttatus* Strobl.

Gesicht höchstens mit hellen Seitenrändern. Hinterleib mehr braunrot gefärbt. 4.

4. Beine schwarz, Vorderschienen und Spitze der Vorder-  
schenkel rostrot. Das 1. Segment am Ende und Segment  
2 und 3 braunrot. Körper ziemlich robust. 12 mm.

3. **Ziegleri** Grav. ♀.

Beine rot, Hüften und Trochanteren schwarz, Schienen  
gelblich, die hintersten im Enddrittel und die hintersten  
Tarsen gebräunt. Körper schlanker als bei der vorher-  
gehenden Art. 11—12 mm.

4. **gracilis** Brauns ♂.

1. **L. rufipes** Gmel. 1790 *Ichneumon rufipes* Gmelin, Linné: Syst.  
nat. Ed. 13. p. 2683 | 1829 *Leptobatus rufipes* Gravenhorst, Ichneum.  
Eur. III p. 435 ♀♂.

In Habitus und Färbung an *Exetastes albiger* und  
*Braunsi* erinnernd. — Körper schlanker als bei der folgenden  
Art. Kopf und Thorax dicht punktiert, schwach glänzend.  
Gesicht fast matt. Kopf quer, nach hinten kaum ver-  
schmälert; Stirn ausgehöhlt, oberhalb der Fühler mit  
flachen, glänzenden Gruben; Fühler schlank, gegen das  
Ende allmählich verdünnt, beim ♀ von  $\frac{3}{4}$  Körperlänge;  
Raum zwischen Augen und Mandibeln so lang wie die  
Breite der Mandibelbasis. Thorax bucklig; Brustseiten  
mit dem Speculum dicht punktiert; Metathorax oben runzlig  
punktiert, an den Seiten punktiert, fast ohne Runzeln,  
hinten mit Querleiste. Areola im Vorderflügel deutlich  
gestielt; Ramellus ziemlich lang. Hinterleib glatt und  
glänzend, gegen das Ende deutlich von der Seite zusammen-  
gedrückt; das 1. Segment doppelt so lang als hinten breit,  
gegen das Ende allmählich verbreitert; das 2. Segment  
wenig breiter als lang, so lang wie das 4. Segment; Bohrer  
wenig länger als der Hinterleib. — Schwarz, fein und sehr  
kurz braun pubescent. Gravenhorst nennt das Schildchen  
weiss. Meine sämtlichen Exemplare haben nur einen  
grossen, annähernd viereckigen weissen Fleck. Flügel  
ganz leicht getrübt; Stigma bräunlichgelb; Tegulä schwarz.  
Beine rot, Hüften und Trochanteren schwarz; die hintersten  
Schienen an der Spitze und die hintersten Tarsen gebräunt.  
Bei meinen Exemplaren haben die hintersten Schienen  
an der Spitze beiderseits nur einen braunen Fleck.

Ich besitze nur ein einziges Männchen. Die Fühler sind  
so lang wie der Körper und kräftiger als beim Weibchen.  
Die Endhälfte des Schildchens ist weiss. Die Spitze der  
hintersten Schienen und die hintersten Tarsen sind schwarz-  
braun. Im Uebrigen stimmt es mit dem Weibchen überein.

L. 12--13 mm.

Mittleres Europa; selten.

2. **L. degener** Grav. 1829 *Leptobatus degener* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 436 ♀♂ | 1897 *Leptobatus degener* Thomson, Opusc. Entom. XXII p. 2418 ♀.

Die Art stimmt in den Hauptmerkmalen mit *L. rufipes* überein, und sind die Unterschiede in der Tabelle bereits angeführt. Die Art ist robuster als die vorhergehende. Die Fühler sind auch beim ♀ kräftiger und gegen das Ende nur wenig verdünnt. Das Schildchen wird von Gravenhorst und Thomson als schwarz angegeben; ich besitze 2 Exemplare, die an der Schildchenspitze einen gelblichweissen Punktfleck haben. Der Metathorax ist längs der Mitte stärker gerunzelt und zeigt vorn in der Mitte 2 mehr oder weniger deutliche Längskiele und dazwischen eine Längsfurche. Die hintersten Schienen sind im Enddrittel und die hintersten Tarsen dunkelbraun. Bei dem Weibchen haben die mittleren Segmente meist rötliche Einschnitte.

Das ♂ kann mit *Exetastes fornicator* und *Exetastes alpinus* leicht verwechselt werden; es unterscheidet sich von diesen hauptsächlich durch die dicken fadenförmigen Fühler. Meine sämtlichen Exemplare haben durchaus schwarzes Schildchen.

L. 12—13 mm.

Die Art findet sich im nördlichen und mittleren Europa, ist aber ebenfalls überall selten. Ich besitze eine Anzahl Exemplare aus Scharzfeld im Harze, welche aus *Dianthoecia xanthocyanea* Hb. gezogen wurden.

3. **L. Ziegleri** Grav. 1829 *Leptobatus Ziegleri* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 434 ♀ | 1903 *Exetastes Ziegleri* Strobl, Ichneum. Steierm. V. Fam. Ophon. p. 47 ♂.

Ich kenne diese Art nicht und kann nur die Beschreibung nach Gravenhorst geben. Die Art lässt sich leicht an der dunklen Färbung der Beine erkennen. „♀. Schwarz. Fühler etwas kürzer als der Körper, gegen das Ende verdünnt und eingekrümmt. Thorax bucklig. Flügel schwach getrübt; Stigma braun; Tegulä gelblich; Areola unregelmässig, fast sitzend; Ramellus deutlich. Beine schlank, schwarz; die vordersten Schenkel rötlich, mit schwarzer Basis; die Mittelschenkel gegen das Ende unten rötlich; Vorderschienen gelbrot; Vordertarsen trüb rot; die hintersten Schienen und Tarsen braun, die Schienen am Ende schwärzlich. Hinterleib glänzend, so lang und breit wie Kopf und Thorax; das 1. Segment gegen das Ende allmählich verbreitert, doppelt so lang als hinten breit, am Ende braunrot; ebenso gefärbt ist der Rücken des 2. und 3. Segmentes. Bohrer von Körperlänge.

Von dem ♂ gibt Strobl die folgende ausführliche Beschreibung: „Clypeus schmal aber sehr tief ausgerandet, fast zweizählig. Mesonotum und Brustseiten durch feine Skulptur fast ganz matt; Metathorax etwas gröber dicht runzlig-punktiert, ohne Andeutung von Feldern; Luftlöcher linear. Hinterleib fast garnicht comprimiert, stark glänzend, zerstreut punktiert; das 1. Segment dick, fast gleich breit, nur hinter den vorspringenden Luftlöchern eingeschnürt, letztere weit vor der Mitte; zwischen denselben ist die Oberseite bucklig gewölbt; hinter dem Buckel liegt eine kurze und tiefe Mittelrinne. Am Ende des 2. Segmentes erreicht der Hinterleib seine grösste Breite. — In der Färbung stimmt das ♂ sehr mit dem ♀ überein, nur ist das, was beim ♀ rot ist, hier gelb. Fühler rotgelb, die 2 oder 3 Basalglieder und die 12 Endglieder schwärzlich. Vorderschenkel vorn in der Spitzenhälfte gelb; Mittelschenkel nur an der Spitze vorn mit gelbem Fleck; Hinterschenkel ganz schwarz. Vorderschienen vorn ganz gelb, hinten braun; Mittelschienen an der Basis vorn mit gelber Längslinie. Hinterleib glänzend kastanienbraun; das 1. Segment schwarz mit braunrotem Endsaum, das 2. Segment in der Basalhälfte schwärzlich, mit 2 grossen, flachen, hellen Höckern. Ausserdem besitzt das ♂ noch folgende, dem ♀ fehlende Zeichnungen: Innerer und äusserer Augenrand fein gelb; Mitte der Mandibeln, Seitenlinien vorn auf dem Mesonotum und ein Punktfleck auf der Schildchen-spitze gelb.

L. 12 mm.

Die Art scheint auf Oesterreich-Ungarn beschränkt zu sein.

4. **L. gracilis** Brauns. 1896 *Leptobatus gracilis* Brauns, Termész. Füzet. XIX p. 272 ♂.

Von dieser Art, von welcher nur das ♂ bekannt ist, gibt Brauns die folgende Beschreibung: „Dem *L. Ziegleri* Grav. ähnlich aber schlanker. Schwarz, fein pubescent, Hinterleib und Beine grösstenteils rot. — Kopf und Thorax runzlig-punktiert, matt. Palpen und Fühler schwarz, letztere fast länger als der Körper. Schulterbeulen weisslich. Metathorax ohne Felderung, mit linearen Luftlöchern. Flügel hyalin; Stigma rötlich, Tegulä und Flügelwurzel weisslich; Areola unregelmässig, kurz gestielt; Ramellus vorhanden; Nervulus interstitial, Nervellus stark postfurcal und weit über der Mitte gebrochen. Beine rot, Hüften und Trochanteren schwarz; Schienen gelblich; die hintersten im Enddrittel und die hintersten Tarsen gebräunt. Das 1. Segment rot, an der äussersten Basis und an den Seiten bis zu den



Luftlöchern schwarz, das 2. und 3. Segment ganz, das 4. bis über die Mitte hinaus rot; Postpetiolus und das 2. und 3. Segment an der Basis beiderseits über dem Seitenrande mit schwarzem Strich; Endsegmente schwarz, mit hellem Endrand.

L. 11—12 mm. — ♀ unbekannt.

1 ♂ aus der Umgebung von Budapest.

Das Tier ist dem *L. Ziegleri* Grav. ähnlich. Wegen der Färbung der Beine und auch des Hinterleibs kann es aber nicht wohl eine Varietät dazu sein; auch sprechen noch andere Umstände gegen eine solche Annahme. Die, ähnlich wie bei *Campoplex*, namentlich, wenn man das Tier gegen das Licht hält, deutlich hervortretenden schwarzen Striche auf den ersten Hinterleibssegmenten finden sich übrigens auch bei *L. Ziegleri* zuweilen angedeutet.“

5. ***L. multiguttatus*** Strobl. 1903 *Exetastes multiguttatus* Strobl, *Ichneum. Steierm. V. Fam. Ophion*, p. 48 ♂.

Die Art stimmt in der Skulptur fast ganz mit *L. Ziegleri* überein, nur die Punktierung des Hinterleibs ist so fein, dass sie nur auf dem 2. und 3. Segmente deutlich ist; die drei ersten Palpenglieder sind sehr kurz und dick. — Die Färbung ist ganz auffallend verschieden: Mund, Gesicht, äussere und obere Augenränder sind gelb; Fühler hellrot, nur die beiden ersten Glieder oben schwarz gefleckt, unten gelb. Am Thorax sind gelb: das Schildchen (mit braunem Punkt an der Spitze), Hinterschildchen, ein Fleck seitlich vor dem Schildchen, ein Punkt und ein dreieckiger Fleck vor den gelben Flügeldecken und eine Linie unterhalb derselben, bisweilen ist auch der Metathorax oberhalb der Hinterhüften dunkelrot gefleckt. Flügel gelblich hyalin, Nervatur wie bei *L. Ziegleri*. Die vier vorderen Hüften und Trochanteren gelb oder erstere an der Basis schwarz gefleckt; die hintersten Hüften schwarz gefleckt. Die vier vorderen Schenkel und Schienen sind auf der Vorderseite ganz gelb, auf der Hinterseite gelb mit einer rotgelben Längsstrieme; die hintersten Schenkel und Schienen sind rot, letztere an der Wurzel breit gelb. Tarsen rot, die vorderen mehr gelblich, Hinterleib hellrot, nur die Basalhälfte des 1. Segmentes schwarz. Wenigstens das 3. Segment, meist aber auch das 2. und 4. vor dem Hinterrande mit 2 gelben Flecken.

L. 11—12 mm. — ♀ unbekannt.

Auf Fichten bei Seitenstetten in Steiermark Ende April und Anfang Mai.

4. Gen. **Xenoschesis** Först.1868 *Xenoschesis* Förster. Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV p. 158.

Der Typus dieser Gattung, der *Exetastes fulvipes* Grav., hat, so zu sagen, kein ruhiges Plätzchen finden können. Bei der Gattung *Exetastes* konnte er natürlich nicht bleiben und so wurde er dann von Holmgren, Brischke und Vollenhoven und anfangs auch von Thomson zu *Notopygus* gestellt. Später glaubte Thomson in ihm die Förster'sche Gattung *Polycinetis* zu erblicken. Das war ein Irrtum. Förster hat, wie auch aus seinen nachgelassenen Schriften hervorgeht, die letztere Gattung einzig und allein auf den *Notopygus resplendens* Holmgren errichtet, dessen Metathorax ohne alle Leisten ist, was bei *Xenoschesis fulvipes* Grav. nicht der Fall ist. Dass Förster unter seiner Gattung *Xenoschesis* den *Exetastes fulvipes* Grav. verstanden hat, ergibt sich ebenfalls aus seinen zurückgelassenen Schriften. Ich habe diese und die verwandten Gattungen bereits in meinen „Hymenopteren Mitteleuropas“ klar legen können. Gravenhorst und Förster stellen, wie mir scheint mit Recht, die vorliegende Gattung zu den Ophioninen. Ich finde bei Förster folgende Notiz: „Diese Gattung wurde von Gravenhorst zu *Exetastes* mit mehr Recht gestellt als sie von Holmgren zu *Notopygus* gebracht worden ist, denn der nach der Spitze hin deutlich zusammengedrückte Hinterleib und die langgestreckte Radialzelle weisen auf die Banchoideae unverkennbar hin. Dazu kommt noch der deutlich vorragende Bohrer, welcher bei *Notopygus* die Spitze des Hinterleibs nicht überragt. Da mir nun die Unterschiede von *Exetastes* zahlreich und gewichtig genug erschienen, so habe ich aus dem *Exetastes fulvipes* Grav., der unzweifelhaft identisch mit dem *Notopygus fulvipes* Holmgr. ist, eine neue Gattung gemacht.

Kopf quer, nach hinten nur schwach verengt, dicht runzlig-punktiert, fast glanzlos; Stirn leicht eingedrückt; Fühler beim ♀ wenig kürzer als der Körper, beim ♂ so lang wie dieser, kräftig, fadenförmig, gegen das Ende allmählich verdünnt; Clypeus vom Gesicht getrennt, am Ende abgestutzt; Mandibeln grob punktiert, mit 2 gleichen, stumpfen Endzähnen. Thorax bucklig, dicht punktiert, ziemlich glänzend; Parapsidenfurchen deutlich, Metathorax kurz, hinten steil abfallend, fein runzlig-punktiert; Area posteromedia gross, glatt und glänzend, durch eine starke Querleiste abgetrennt; bei *X. nigripes* ist dieselbe nur an den Seiten angedeutet; in der Regel verlaufen 2 genäherte Längsleisten längs der Mitte des Metathorax bis zu der Area posteromedia; Brustseiten glänzend, zerstreut punktiert; Speculum poliert. Areola im Vorderflügel klein,

dreieckig, gestielt, den rücklaufenden Nerv kurz vor dem Endwinkel aufnehmend; Radialzelle langgestreckt; die beiden Abschnitte des Radius ziemlich gerade; Diskokubitalnerv stark nach innen gekrümmt, nicht gebrochen, ohne Ramellus; Nervulus hinter der Gabel; Nervellus in der Mitte gebrochen. Beine kräftig; Klauen einfach. Hinterleib fein punktiert, beim ♀ in der hinteren Hälfte stark von der Seite zusammengedrückt; das 1. Segment stark nach hinten verbreitert,  $1\frac{1}{2}$  mal so lang als hinten breit, mit 2 Längskielen bis über die Mitte hinaus, dazwischen mit seichter Längsfurche; das 2. Segment etwas kürzer als breit, das 3. Segment beim ♀ etwas länger als breit, beim ♂ kürzer. Das 8. Rückensegment beim ♀ dreieckigzusammengedrückt, hinten spitz, oben mit einem elliptischen Längsschlitz. Bohrer deutlich vorragend, fast so lang wie das 1. Segment; Bohrerklappen hinter der Basis erweitert.

Die Arten haben sich als Schmarotzer der Gattung *Lyda* im weiten Sinne erwiesen.

#### Uebersicht der Arten.

1. Fühler mit weissem Ring. Schildchen weiss. Beine grösstenteils schwarz. Segment 2 und 3 an der äussersten Basis und am Endrande, 4 nur am Endrande trüb rot. 10 mm.

#### 4. **tristis** Grav.

Fühler ohne weissen Ring. Schildchen nicht weiss. Hinterleib schwarz. 2.

2. Beine schwarz, nur die Vorderschenkel an der Spitze und die vordersten Schienen trüb rötlich. Area posteromedia nur an den Seiten durch schwache Leiste abgegrenzt.

#### 3. **nigripes** n. sp.

Beine rot oder gelbrot, höchstens die Hüften und die hintersten Schienen und Tarsen schwärzlich. Area posteromedia durch deutliche Leiste rings abgegrenzt. 3.

3. Die hintersten Schenkel an der Spitze nicht oder kaum verdunkelt; die hintersten Schienen nur an der Spitze schwärzlich. Bohrer kürzer als bei der folgenden Art.

#### 1. **fulvipes** Grav.

Die hintersten Schenkel an der Spitze und die hintersten Schienen und Tarsen schwärzlich. Bohrer länger als bei *E. fulvipes* und gegen das Ende stärker zugespitzt.

#### 2. **mordax** Thoms.

1. **X. fulvipes** Grav. 1829 *Exetastes fulvipes* Gravenhorst, Ichneum. Eur. III p. 401 ♀ | 1856 *Notopygus fulvipes* Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I p. 378 ♀ | 1883 *Notopygus fulvipes* Thomson, Opusc. Entom. IX p. 925 ♀♂ | 1895 *Polycinetus fulvipes* Thomson, Opusc. Entom. XIX p. 1983 | 1907 *Xenoschesis fulvipes* Schmiedeknecht, Hymen. Mitteleurop. p. 604.

Schwarz; kaum behaart. Fühlergeissel in der Regel rostrot, aber auch bis ganz schwarz variierend, auch die Farbe der Mandibeln verschieden, von rötlichgelb bis fast schwarz. Flügel nur schwach getrübt; Stigma dunkelbraun; Tegulä blassgelb, bei kleineren Stücken zuweilen verdunkelt. Beine hellrot; die vordersten Hüften an der Basis gewöhnlich schwarz; die hintersten Schienen an der Spitze und die hintersten Tarsen schwärzlich.

Beim ♂ sind die Palpen, die Mandibeln, der Clypeus und ein dreieckiger Fleck in der Mitte des Gesichtes gelb; auch die vordersten Hüften, Schienen und Tarsen sind zum grössten Teil gelblich.

L. 12—15 mm.

Var. ♀. Kleiner als die Stammform. Alle Hüften schwarz. Ich besitze eine ganze Reihe von Exemplaren dieser Varietät. In Anbetracht der grossen Veränderlichkeit in der Fühlerfärbung glaube ich nicht, dass man auf diese abweichende Beinfärbung eine besondere Art machen kann.

*X. fulvipes* ist über Nord- und Mitteleuropa verbreitet, scheint namentlich in Gebirgsgegenden vorzukommen. Ratzeburg zog ihn aus *Lyda*-Arten.

2. **X. mordax** Thoms. 1883 *Notopygus mordax* Thomson, Opusc. Entom. IX p. 925 ♀ | 1895 *Notopygus* (*Polycinetus*), *mordax* Thomson, Opusc. Entom. XIX p. 1983.

Ich habe bereits gesagt, dass *X. fulvipes* in der Färbung sehr veränderlich ist, deshalb ist mir diese von Thomson aufgestellte Art sehr fraglich. Thomson's ganze Beschreibung lautet: „Schwarz, Beine rot, die hintersten Schienen und Tarsen schwarz, Bohrer weit vorstehend. — In Gestalt dem *X. fulvipes* sehr ähnlich, aber die Spitze der hintersten Schenkel und die hintersten Schienen und Tarsen schwarz; Bohrer länger und gegen das Ende mehr zugespitzt. L. 12 mm.“

Ich habe vor mir eine Anzahl Exemplare aus Thüringen, deren Hinterbeine schwarze Schenkelspitzen und Schienen und Tarsen haben, in der Bohrerlänge finde ich jedoch keinen Unterschied von der vorhergehenden Art, auch sind es lauter grosse Exemplare, während *X. mordax* nach Thomson's Angabe kleiner als *X. fulvipes* ist. Mein *X. nigripes* kann auch nicht der *X. mordax* sein, da er keinen längeren Bohrer besitzt.

# Opuscula Ichneumonologica.

Herausgegeben

mit Beihilfe des Königl. Preuss. Ministeriums  
für Landwirtschaft und Forsten

von

**Professor Dr. Otto Schmiedeknecht.**




Fasc. XXIV.



Blankenburg i. Thür.

1910.



Ich gebe, so weit der Vorrat reicht, folgende

## Sammlungen

ab:

### *Hymenopteren,*

Repräsentanten sämtlicher Familien.

600 Stück in	400 Arten	=	50 Mk.
1000 " "	600 " "	=	100 "
1600 " "	900 " "	=	200 "
2000 " "	1200 " "	=	300 "
2500 " "	1500 " "	=	500 "
3000 " "	1800 " "	=	800 "

### *Ichneumoniden.*

400 Stück in	250 Arten	=	50 Mk.
600 " "	400 " "	=	100 "
1000 " "	600 " "	=	200 "
1400 " "	800 " "	=	400 "
1600 " "	900 " "	=	500 "

### *Braconiden.*

200 Stück in	150 Arten	=	50 Mk.
300 " "	200 " "	=	100 "
450 " "	300 " "	=	200 "

### *Chalcididen und Proctotrupiden.*


200 Stück in	100 Arten	=	50 Mk.
300 " "	150 " "	=	100 "

### *Dipteren.*

500 Stück in	300 Arten	=	50 Mk.
800 " "	400 " "	=	80 "

### *Rhynchoten.*

300 Stück in	200 Arten	=	40 Mk.
--------------	-----------	---	--------






Druck von W. Greve  
Neubrandenburg.
















UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA



3 0112 018253069